

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AF06

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

ZIAGEN GLAXO SMITHKLINE; Sol. orală 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 240 ml (S/P-RF)

ZIAGEN GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 300 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Terapia combinată antiretrovirală, tratamentul adulților infectați cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV).

Dz: Oral, 300 mg de două ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente, IH severă.

Al: Pacienții trebuie monitorizați în timpul primelor două luni de trat. cu abacavir. Atenție la reacțiile de hipersensibilitate. Atenție în cazul trat. simultan cu abacavir și alte medicamente cunoscute cu risc de toxicitate cutanat. Trebuie evitat la cei cu afecțiuni renale în stadiul terminal, IH moderată, copii. Poate determina acidoză lactică, uneori fatală, de obicei asociată cu hepatomegalie și steatoză hepatică. Trat. cu analogi nucleozidici trebuie întrerupt în cazul creșterii rapide a concentrației aminotransferazelor, hepatomegaliei progresive sau acidozei metabolice/lactice de etiologie necunoscută. Soluția orală nu este recomandată pacienților cu intoleranță ereditară la fructoză deoarece conține sorbitol. Nu este recomandat femeilor gravide sau în perioada de alăptare.

RA: Greață, vărsături, letargie și astenie, febră, cefalee, diaree și anorexie. Acidoză lactică, uneori fatală. Hipersensibilitate: febră și/sau erupție; simptome gastrointestinale; letargie și indispoziție; simptome respiratorii; simptome musculo-scheletice, cefalee, parestezii și edeme, limfadenopatie, leziuni ale mucoaselor și hTA. Creșterea valorilor testelor funcționale hepatice, creatinfosfokinazei, creatininei sau limfopenie. IR. Anafilaxie în asociere cu reacțiile de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: B01AC13**REOPRO** ELI LILLY; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (S)

Ind: Adjuvant al heparinei și acidului acetilsalicilic: la pacienții supuși intervențiilor coronariene percutanate (PTCA), la pacienții cu angină instabilă.

Dz: *Adulți:* inj. i.v. 0,25 mg/kg în bolus, urmată imediat de perfuzie i.v. continuă 0,125 µg/kg și min (până la cel mult 10 µg/min.). Pentru stabilizarea pacienților cu angină instabilă, adm. trebuie începută cu până la 24 de ore înaintea posibilei intervenții și trebuie oprită la 12 ore după aceasta. Pentru prevenirea complicațiilor ischemice cardiace, la pacienții la care se practică o intervenție coronariană percutanată și care nu sunt sub trat. cu abciximab, în perfuzie, bolusul trebuie adm. cu 10 până la 60 de min înaintea intervenției, urmat de perfuzie timp de 12 ore.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare din componentele produsului sau la anticorpii monoclonali murini, hemoragie internă activă; antecedente de accident vascular cerebral în ultimii 2 ani; intervenție chirurgicală sau traumatism la nivelul creierului sau măduvei spinării; intervenție chirurgicală majoră; neoplasm intracranian; malformație arteriovenoasă sau anevrism; diateză hemoragică cunoscută sau HTA severă necontrolată; trombocitopenie preexistentă; vasculită; retinopatie diabetică sau hipertensivă; IH sau IR severă. Nu trebuie adm. la femeile gravide. Alăptarea în timpul trat. trebuie întreruptă.

Al: Trebuie folosit ca adjuvant al trat. cu acid acetilsalicilic și heparină. Se asociază cu o creștere a frecvenței sângerării în special la locul de acces al cateterului în artera femurală. Trebuie evitate punctiile arteriale și venoase, inj. i.m., folosirea de rutină a cateterelor urinare, intubația naso-traheală, sondele naso-gastrice și manșetele pentru măsurarea automată a TA, dacă nu sunt necesare. Înaintea adm. trebuie măsurate numărul de plachete, ACT, timpul de protrombină și APTT, pentru a identifica eventualele tulburări de coagulare preexistente. Valorile Hb și Ht trebuie verificate înaintea adm. de abciximab, la 12 ore după injectarea bolusului și din nou la 24 de ore după aceasta. Trebuie efectuate înregistrări ECG pe durata trat. Semnele vitale se vor controla la fiecare oră în primele 4 ore după injectarea bolusului de abciximab, apoi la 6, 12, 18 și 24 de ore după aceasta. Abciximab trebuie întrerupt în cazul hemoragiilor severe necontrolate sau în cazul necesității interv. chir. TS trebuie determinat prin metoda Ivy. Dacă TS rămâne mai lung de 12 minute, se pot adm. 10 unități de plachete. Prudență când se asociază cu alte medicamente care afectează hemostaza. Risc de reacții alergice sau de hipersensibilitate ori dim. beneficiilor dacă se adm. la pacienți tratați anterior cu anticorpi monoclonali. Beneficiile pot fi reduse la pacienții cu boli renale sau patologie vasculară periferică.

RA: Hemoragii, dureri lombare, hipotensiune, grețuri, dureri precordiale, vărsături, cefalee, bradicardie, febră, durere la locul de injectare și trombocitopenie. Rar tamponadă cardiacă și sindrom de detresă respiratorie a adultului. Rareori reacții de hipersensibilitate sau alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: A10BF01](#)

GLUCOBAY 50 mg, GLUCOBAY 100 mg BAYER AG; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-6L)

Ind: Terapie adjuvantă la pacienții diabetici.

Dz: Oral, 150-300 mg/zi, maxim 600 mg/zi, împărțit în 3 prize.

Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului, pacienți sub 18 ani, tulburări intestinale cronice asociate cu tulburări specifice de digestie sau malabsorbție, stări patologice care se pot agrava ca urmare a formării de gaz în cantități crescute în intestin (de ex.: sindrom Roemheld, hernii mari, obstrucții intestinale și ulcere intestinale), pacienți cu afectare renală severă (clearance la creatinină < 25 ml/min).

Al: Poate să determine creșteri asimptomatice ale enzimelor hepatice.

Dacă acarboza este prescrisă împreună cu sulfoniluree sau metformin, sau împreună cu insulină poate necesita o scădere adecvată a dozei acestora. Dacă apare hipoglicemie acută trebuie avut în vedere că zaharoza (zahărul) este descompusă în fructoză și glucoză mult mai lent; pentru acest motiv pentru înlăturarea hipoglicemiei trebuie folosită glucoza. Adm. simultană de antiacide, colestiramină, absorbantți intestinali, enzime digestive trebuie evitată. Trebuie evitat în timpul sarcinii și nu se recomandă în timpul alăptării.

RA: Flatulență și garguimente, diaree, distensie abdominală, dureri abdominale. Reacții de hipersensibilitate cutanate, de ex.: eritem, exantem și urticarie. Hepatită și/sau icter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: M01AB16](#)

AFLAMIL RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. film. 100 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Tratamentul simptomatic al inflamațiilor și al durerii din artrita reumatoidă, spondilartrita anchilozantă (boala Bechterew), artroză și din alte afecțiuni ale aparatului locomotor (de ex. periartrita scapulo-humerală și reumatismul extraarticular).

Dz: *Adulți* Doza maximă 1 cpr. de 2 ori/zi. În caz de insuficiență hepatică se reduce doza la jumătate. Cpr. se înghit întregi, cu o cantitate suficientă de lichid.

Cind: Hipersensibilitate la aceclofenac, la alte AINS (de ex. diclofenac). Antecedente de astm bronșic, urticarie sau rinită acută în urma tratamentului cu acid acetilsalicilic sau cu alte AINS. Ulcer gastro-duodenal, hemoragie digestivă sau de altă natură, sarcină și alăptare, insuficiență cardiacă, renală sau hepatică severă.

Al: Pe parcursul tratamentului de lungă durată, se impune efectuarea periodică a examenelor hematologice, a controlului parametrilor funcțiilor hepatice și renale. Poate diminua fertilitatea, de aceea nu este recomandat femeilor care doresc să rămână însărcinate.

RA: Cel mai frecvent: dispepsie, dureri abdominale, greață, diaree, slăbiciune, erupții cutanate (prurit și rash). Mai pot apărea ocazional: creșterea anormală a transaminazelor hepatice, a creatininei plasmatice și a azotului ureic, dispnee, nefrită interstițială, bufeuri vasomotorii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AB11

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

RANTUDIL FORTE BAYER AG; Cps. 60 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. *(P-RF)*
RANTUDIL RETARD BAYER AG; Cps. ret. 90 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. *(P-RF)*
Ind: Antiinflamator AINS din grupa indometacinului.
Dz: 1 cps. de 1-2 ori pe zi.
Cind:, Al:, RA: vezi Indometacin.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACOMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: B01AA07**ACENOCUMAROL 2 mg** LAROPHARM SRL; Cpr. 2 mg; ct. × 1 blist × 20 cpr. (P-RF)**SINTROM®** NOVARTIS PHARMA; Cpr. 4 mg; ct. × 2 blist × 10 cpr. (P-RF)**TROMBOSTOP® 2 mg** TERAPIA SA; Cpr. 2 mg; ct. × 3 blist × 10 cpr. (P-RF)

Ind: *Profilactic:* prevenirea trombozelor postoperatorii; postpartum și la cardiaci: IMA, FA. *Curativ:* tromboflebite, flebotromboze, trombangeită obliterantă, arterioscleroză obliterantă, tromboză coronariană, IM, embolii pulmonare, retinopatii (vasculare).

Dz: Inițial: în prima zi 8-12 mg și în a doua zi 4-8 mg. Doza de întreținere: 1-8 mg pe zi, în funcție de valorile timpului Quick sau INR. Este necesară efectuarea regulată a testelor de coagulare și adaptarea dozelor în funcție de rezultate. Doza zilnică trebuie prescrisă ca doză unică și adm. la aceeași oră a zilei.

Cind: Alergie cunoscută la derivați cumarinici, sarcină, lipsă de cooperare a pacientului. În situațiile în care riscul hemoragic este mai mare decât beneficiul probabil. Ulcere peptice sau hemoragii ale tractului gastrointestinal, urogenital, aparatului respirator, precum și hemoragii cerebrale, pericardite uscate și lichidiene, endocardite bacteriene subacute. HTA severă, leziuni parenchimatose severe hepatice și renale. Activitate fibrinolitice crescută. În sarcină.

Al: Se adm. cu grijă în: tireotoxicoză, tumori, boli renale, infecții, inflamații, disfuncții hepatice sau renale, în bolile ce afectează absorbția gastrointestinală, în IC severă, la vârstnici. Scurtarea timpului de protrombină impusă de intervenții diagnostice sau terapeutice trebuie realizată cu mare atenție. Efectul poate fi potențat de trat. concomitent cu: allopurinol, steroizi anabolizanți, androgeni, antiaritmice (amiodaronă, chinidină), antibiotice (eritromicină, tetraciclină, neomicină, cloramfenicol), acid clofibrac și derivații săi, disulfiram, acid etacrinic, glucagon, antagoniști ai receptorilor H, derivați imidazolici; sulfamide cu durată lungă de acțiune, antidiabetice orale, hormoni tiroidieni, sulfinpirazonă. Efectul poate fi potențat de: heparină, inhibitorii agregării plachetare, fenilbutazonă sau alți derivați pirazolonici. Utilizarea împreună cu alte AINS impune repetarea mai frecventă a testelor de coagulare. Efectul anticoagulant poate fi diminuat prin adm. concomitentă a barbituricelor, aminoglutetimidei, carbamazepinei, colestiraminei, griseofulvinei, contraceptivelor orale, rifampicinei, diureticelor tiazidice. Crește concentrația serică a derivaților de hidantoină. Potențează efectul hipoglicemiant al derivaților de sulfoniluree. Pacienții nu trebuie să consume alcool. Pacienții nespitalizați trebuie să poarte asupra lor o adeverință care certifică trat. cu anticoagulante, în eventualitatea unui accident.

RA: Hemoragii, tulburări gastrointestinale, reacții alergice. Cazuri izolate: necroză hemoragică cutanată, asociată de obicei unui deficit congenital de proteină C sau leziunilor hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: S01EC01](#)

EDEREN 250 mg TERAPIA SA; Cpr. 250 mg; ct. × 2 sau 100 blist × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Glaucom cronic simplu și preoperator, glaucom acut congestiv; uveite hipertensive; epilepsie, ca trat. adjuvant; retenție de fluide: tensiune premenstruală, edeme medicamentoase, obezitate și IC congestivă; sindrom Ménière.

Dz: Glaucom: adulți 250-1000 mg/zi în 4 doze; copii mai mari de 5 ani 125-750 mg/zi (5-10 mg/kg și zi). Retenție de fluide: - numai pentru adulți: IC: 250-375 mg/zi timp de 2 zile, urmate de o zi pauză; apoi se va repeta; tensiune premenstruală: o doză unică de 125-375 mg/zi începând cu 5-10 zile înainte de debutul menstruației, sau la debutul simptomelor; obezitate: 250-375 mg/zi. Epilepsie: adulți: 250-1000 mg/zi în mai multe doze; copii: 125-750 mg/zi în mai multe doze.

Cind: Acidoză, precomă și comă hepatică, IR cu anurie, stări de hiponatremie și hipokaliemie, boala Addison, comă sau precomă diabetică, litiază renală, alergie sau intoleranță la acetazolamidă și sulfamide. În primul trimestru de sarcină.

Al: Prudență la cirofici, alte condiții de dezechilibru electrolitic sever, la diabetici și la gutoși; nu se adm. timp îndelungat în glaucomul cronic congestiv cu unghi închis. Figurează pe lista substanțelor dopante. Scade eficacitatea antidiabeticelor orale și a litiului; mărește riscul toxic al salicilaților; asociația cu digitalice, glucocorticoizi, alte diuretice, laxative iritante crește riscul de hipokaliemie; asocierea cu antiaritmice chinidinice, amiodaronă, prenilamină, vincamină în prezența hipokaliemiei favorizează aritmiile; nu se asociază cu metenamina.

RA: Hipokaliemie, somnolență, parestezii ale feței și extremităților, mai rar oboseală, nervozitate, tremor, depresie, dezorientare, ataxie, sete, tulburări digestive, uneori erupții cutanate alergice; foarte rar agranulocitoză, trombocitopenie, leziuni renale, surditate și miopie trecătoare; poate determina acidoză hipokaliemică, calculoză renală, hiperglicemie, hiperuricemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACOMETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: S01EB09](#)

MIOCHOL-E CIBA VISION; Pulb. liof. 10 mg; ct. × 1 blist. × 1 fl. cu 2 compartimente: 10 mg pulb., respectiv 2 ml solv. (S)

Ind: Obținerea rapidă și completă a miozei în chirurgia oculară (extracția cristalinului în operația de cataractă, iridectomie, keratoplastie).

Dz: Adm. intraoculară.

Al: Afectează capacitatea de a conduce mașina sau de a efectua activități de precizie.

RA: Bradicardie, hTA, roșeață, transpirație, dificultăți respiratorii (toate aceste efecte sunt reversibile sub atropină).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETILSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: R05CB01](#)

ACC® 100 SALUTAS PHARMA GmbH; Pulb. sol. orală 100 mg; ct. × 20 plicuri; ct. × 1 fl. × 30 g granule pt. 75 ml susp.; ct. × 1 fl. × 60 g granule pt. 150 ml susp. **(OTC)**

ACC® 200 SALUTAS PHARMA GmbH; Cps. 200 mg; Cpr. eferv. 200 mg; Pulb. sol. orală 200 mg/plic; ct. × 2 blist. × 10 cps.; ct. × 1 tub × 20 sau 25 cpr. eferv., respectiv ct. × 20 plicuri **(OTC)**

ACC® 600 SALUTAS PHARMA GmbH; Cpr. eferv. 600 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. **(OTC)**

ACC® INJECT SALUTAS PHARMA GmbH; Sol. inj. 100 mg/ml; ct. × 5 f. × 3 ml **(S/P-RF)**

ACETILCISTEINĂ LPH® 200 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. 200 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. **(OTC/S)**

BRUNAC BRUSCHETTINI; Colir, 5 g/100 ml **(P-6L)** - [Cod ATC: S01XA08](#)

FLUIMUCIL® ZAMBON; Sol. inj. 100 mg/ml; ct. × 5 f. 3 ml **(S/P-RF)** - [Cod ATC: V03AB23](#)

FLUIMUCIL® 100; FLUIMUCIL® 200 ZAMBON; Gran. sol. orală 100 mg/plic, 200 mg/plic; ct. × 30 plicuri **(OTC)**

FLUIMUCIL® 600 ZAMBON; Cpr. eferv. 600 mg; ct. × 5 blist. × 2 cpr. **(OTC)**

HIDONAC ZAMBON; Sol. perf. 200 mg/ml; ct. × 1 fl. × 25 ml **(S)** - [Cod ATC: V03AB23](#)

MUCOVIM 200 VIM SPECTRUM SRL; Cps. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. **(OTC)**

SIRAN® 200; SIRAN® LONG TEMMLER PHARMA; Cpr. eferv. 200 mg, 600 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (200 mg), ct. × 1 tub × 10 cpr. (600 mg) **(OTC)**

SIRAN® 200 TEMMLER PHARMA; Gran. pt. sol. orală 200 mg; ct. × 20 sau 50 plicuri unidoză **(OTC)**

Ind: Bronșite acute, bronșite cronice și reacutizările lor, emfizem pulmonar, mucoviscidoză și bronșiectazii. Intoxicația accidentală sau voluntară cu paracetamol, uropatie la iso- și ciclofosamidă. În toate formele de leziuni corneene.

Dz: Oral: maladii acute: copii până la 2 ani: 50 mg × 3/zi; copii de la 2 la 12 ani: 100 mg × 3/zi; copii după vârsta de 12 ani și adulți: 600 mg pe zi, în doză unică (de preferință seara) sau mai multe doze. *Trat. de lungă durată:* 400 mg pe zi, în 2 doze, cel mult 3-6 luni. *Mucoviscidoză:* Dozaj identic, cu excepția copiilor mai mari de 6 ani cărora li se vor adm. 200 mg × 3/zi sau o dată pe zi 600 mg. *Inj. i.m.* profund 300 mg o dată, de 1-2 ori pe zi. La copii mai mici dozele trebuie înjumătățite. *Inj. i.v.* (în intoxicația cu paracetamol): inițial 150 mg/kg într-un volum egal de soluție de glucoză 5% în decurs de 15 min. Doze de întreținere: 50 mg/kg se adm. la fiecare 4 ore, i.v., timp de 72 ore împreună cu o soluție de glucoză 5%. *Aerosoli:* se nebulizează 300 mg o dată de 1-2 ori pe zi timp de 5-10 zile. *Instilare endobronșică:* 300 mg o dată, de 1-2 ori pe zi. *Instilarea și lavajul endoauricular sau al altor cavități:* 150-300 mg o dată.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la acetilcisteină.

Al: La pacienții incapabili să expectoreze, pentru a evita retenția secrețiilor este nevoie de a se recurge la drenaj postural sau la aspirație bronșică. Pacienții cu astm bronșic trebuie să fie supravegheați cu atenție în timpul trat.; dacă apare bronhospasmul trat. trebuie întrerupt imediat

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM

ACICLOVIRUM

ACIDUM ACETILSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: J05AB01

ACICLOVIR GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ACICLOVIR ARENA GROUP SA; Cps. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps; ct. × 1 fl. × 20 cps. (P-RF)
ACICLOVIR 200 mg TERAPIA SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ACICLOVIR 200 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. disp. 200 mg; ct. × 4 blist. × 5 cpr. (P-RF)
ACICLOVIR 200 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ACICLOVIR 200 mg; ACICLOVIR 400 mg EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 200 mg, 400 mg; ct. × 4 blist. × 5 cpr. (200 mg), ct. × 2 blist. × 5 cpr. (400 mg) (P-RF)
ACICLOVIR 5% GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 5 g sau 15 g (P-RF) - **Cod ATC: D06BB03**
ACICLOVIR 5% EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 2 g (OTC); ct. × 1 tub × 10 g (P-RF)
ACICLOVIR 5% OZONE LABORATORIES Ltd.; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 5 g (P-RF)
ACICLOVIR 5% TIS FARMACEUTIC; Ung. 3%; ct. × 1 tub × 10 g (P-RF)
ACICLOVIR MK MARK PHARMACEUTICS SRL; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 7,5 sau 15 g (P-RF)
CARGOSIL GENEAPHARM SA; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 10 g (P-RF) sau 2 g (OTC) - **Cod ATC: D06BB03**
CLOVIRAL® ANTIBIOTICE SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CLOVIRAL® ANTIBIOTICE SA; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 12 g. (P-RF)
EUVIROX EUROPHARM SA; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 15 g (P-RF) - **Cod ATC: D06BB03**
EUVIROX 200 mg EUROPHARM SA; Cps. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
HERPESIN 250 LACHEMA; Pulb. liof. 250 mg; ct. × 10 fl. (S) **Cod ATC: J05AB01**
HERPESIN® PLIVA-LACHEMA; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 2 g (OTC); ct. × 1 tub × 5 g (P-RF) **Cod ATC: D06BB03**
LOVIR 200 mg; LOVIR 400 mg; LOVIR 800 mg RANBAXY LAB.; Cpr. disp. 200 mg, 400 mg, 800 mg; ct. × 2 sau 10 blist. × 5 cpr. (P-RF)
LOVIR RANBAXY LAB.; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 2 g (OTC); ct. × 1 tub × 5 sau 10 g (P-RF)
VIROLEX KRKA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF); **Cod ATC: J05AB01**
VIROLEX KRKA; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg/fl.; ct. × 5 fl. (S); **Cod ATC: J05AB01**
VIROLEX KRKA; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 5 g (P-RF) **Cod ATC: D06BB03**
VIROLEX KRKA; Ung. oft. 3%; ct. × 1 tub × 4,5 g (P-6L) **Cod ATC: S01AD03**
XOROX F. JOH KWIZDA GmbH; Ung. oft. 3%; ct. × 1 tub × 4,5 g (P-6L) **Cod ATC: S01AD03**
XOROX F. JOH KWIZDA GmbH; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 2 g (OTC) **Cod ATC: D06BB03**
XOROX® 200 mg; XOROX® 400 mg F. JOH KWIZDA GmbH; Cpr. 200 mg, 400 mg; ct. × 5 blist. × 5 cpr. (200 mg), ct. × 6 blist. × 10 cpr. (400 mg) (P-RF)
XOROX® 250 mg F. JOH KWIZDA GmbH; Pulb. liof. pt. sol. perf. 250 mg/fl.; ct. × 5 fl. (S)
ZOVIRAX GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 200 mg, 800 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (200 mg), ct. × 7 blist. × 5 cpr. (800 mg) (P-RF)
Cod ATC: J05AB01
ZOVIRAX GLAXO SMITHKLINE; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 2 g (OTC) sau ct. × 1 tub × 5 g (P-RF); **Cod ATC: D06BB03**
ZOVIRAX GLAXO SMITHKLINE; Ung. oft. 3%; ct. × 1 tub × 4,5 g (P-6L) **Cod ATC: S01AD03**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETILSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: N02BA01](#)

ACID ACETILSALICILIC ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 sau 200 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
ACID ACETILSALICILIC 500 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT 500 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 500 mg; ct. × 5 blist. × 6 cpr. (OTC)
ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT 100 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 100 mg; ct. × 3 folii × 10 cpr. (OTC) -
 Cod ATC: B01AC06
ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT SANTA SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
ALKA-SELTZER BAYER AG; Cpr. eferv. 324 mg; ct. × 5 sau 10 folii × 2 cpr. eferv. (OTC)
ASAprin 160 AC HELCOR SRL; Cpr. 160 mg; ct. × 20 cpr. (OTC) - Cod ATC: B01AC06
ASAprin 500 AC HELCOR SRL; Cpr. 500 mg; ct. × 20 cpr. (OTC)
ASAprin T AC HELCOR SRL; Cpr. 500 mg; ct. × 20 cpr. (OTC)
ASPENTER 325 mg TERAPIA SA; Cpr. film. gastrorez. 325 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (OTC) - Cod ATC: B01AC06
ASPENTER 75 mg TERAPIA SA; Cpr. film. gastrorez. 75 mg; ct. × 3 sau 5 blist. × 10 cpr. (OTC) - Cod ATC: B01AC06
ASPIMAX LAROPHARM SRL; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cpr. (OTC)
ASPIMAX T LAROPHARM SRL; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cpr. (OTC)
ASPIRIN 500 BAYER AG; Cpr. 500 mg; ct. × 2 sau 10 blist. × 10 cpr. (OTC)
ASPIRIN DIREKT BAYER AG; Cpr. mast. 500 mg; ct. × 5 folii × 2 cpr. mast. (OTC)
ASPIRIN PROTECT 100; ASPIRIN PROTECT 300 BAYER AG; Cpr. gastrorez. 100 mg, 300 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
EUROPIRIN 500 mg; EUROPIRIN T EUROPHARM SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
ROMPIRIN ANTIBIOTICE SA; Cpr. 100 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. (S/OTC) - Cod ATC: B01AC06
ROMPIRIN ANTIBIOTICE SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. (S/OTC) - Cod ATC: N02BA51
THROMBO ASS LANNACHER; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr., ct. × 5 blist. × 20 cpr. (OTC) - Cod ATC: B01AC06

Ind: Trat. durerilor de intensitate slabă sau moderată, febrei, în boli cardiovasculare sau cerebrovasculare, ca agent antiplachetar în profilaxia IMA, al anginei pectorale instabile, ischemiei acute tranzitorii și accidentelor cerebrovasculare ischemice.

Dz: Ca analgezic, antipiretic și antiinflamator: *Oral: Adulți:* 250-1000 mg în priză unică, repetându-se la nevoie la intervale de 4-8 ore, maxim 4 g/zi. *Copii: 5-9 ani* - 250 mg o dată, repetându-se la intervale de 4-8 ore, maxim 750 mg/zi. *Ca antiagregant plachetar: Adulți:* 100 mg pe zi sau 500 mg la 2-3 zile, adm. int.

Cind: Alergie cunoscută la acidul acetilsalicilic sau la alte componente ale produsului, intoleranță la alte AINS, diateză hemoragică, ulcer gastric sau duodenal, ultimul trimestru de sarcină.

Al: În sarcină. În caz de hipersensibilitate la AINS, teren alergic, trat. concomitent cu anticoagulante, tulburări grave

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

Cod ATC: M05BA04

FOSAMAX® 5 mg; FOSAMAX® 10 mg MERCK SHARP & DOHME; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. **(P-6L)**
FOSAMAX® 70 mg, "o dată pe săptămână" MERCK SHARP & DOHME; Cpr. 70 mg; ct. × 1 blist. × 1, 2 sau 4 cpr., ct. × 7 blist. × 4 cpr. **(P-6L)**

Ind: Trat. osteoporozei la femeile în postmenopauză pentru prevenirea apariției fracturilor, inclusiv ale celor de șold și ale coloanei vertebrale. Trat. osteoporozei la bărbați pentru prevenirea fracturilor. Trat. și prevenirea osteoporozei indusă de glucocorticoizi, atât la bărbați cât și la femei.

Dz: Oral, 5 sau 10 mg, o dată/zi, sau 70 mg o dată/săptămână.

Cind: Anomalii ale esofagului (stricturile sau acalazia). Incapacitate de a sta în poziție ridicată timp de cel puțin 30 de minute. Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Hipocalcemie. Alendronatul sodic nu trebuie adm. în sarcină sau la mame care alăptează.

Al: Posibile reacții esofagiene, disfagie, odinofagie sau durere retrosternală. Paciente cu afecțiuni active ale tractului gastrointestinal superior. Pacienții trebuie să înghită produsul cu un pahar plin cu apă și să nu stea în poziție culcată timp de cel puțin 30 de minute și până după prima masă a zilei. Pacienții nu trebuie să mestece sau să sugă tableta. Pacienții trebuie informați în mod special să nu ia comprimatul la culcare sau înainte de a se ridica din pat. Clearance al creatininei < 35 ml/min. Hipocalcemia și alte tulburări ale metabolismului mineral (hipovitaminoza D) trebuie tratate înaintea inițierii terapiei. Între adm. alendronatului și cea a oricărui alt medicament oral, pacientele trebuie să respecte un interval liber de cel puțin o jumătate de oră.

RA: Durere abdominală, dispepsie, esofagită, ulcer esofagian, disfagie și distensie abdominală. Rash și eritem. Dureri ale musculaturii scheletice, constipație, diaree, flatulență și cefalee. Scăderile asimptomatice, moderate și tranzitorii ale calciului și fosfatului seric.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: N07XN03, A16AX01](#)**THIOCTACID® 600 HR** VIATRIS; Cpr. film. 600 mg; ct. × 1 fl. × 30, 60 sau 100 cpr. (P-6L)**THIOCTACID® 600T** ASTA MEDICA; Sol. inj. 25 mg/ml; ct. × 1 f. × 24 ml (S/P-RF)**THIOGAMMA® 600** WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. 600 mg; ct. × 3, 6 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)**THIOGAMMA® 600 INJEKT** WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Sol. inj. 30 mg/ml; ct. × 5, 10 sau 20 f. × 20 ml (P-RF)**THIOGAMMA® TURBO-SET** WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Sol. perf. 12 mg/ml; ct. × 1 sau 10 fl. × 50 ml (S/P-RF)**Ind:** Tulburări de sensibilitate în polineuropatia diabetică.

Dz: I.v. lent 600 mg acid a-lipoic/zi timp de 2-4 săpt. F. și sol. perf. trebuie protejate de lumină. Pt. adm. de acid a-lipoic în perf. se folosește exclusiv serul fiziologic. Se recomandă continuarea trat. oral cu 600 mg acid a-lipoic pe zi, ca trat. de întreținere.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la acidul a-lipoic.

Al: Se va evita consumul de alcool etilic. Diminuă acțiunea cisplatinei. Efectul hipoglicemiant al insulinei și al medicamentelor antidiabetice orale poate fi potențat. Nu se va adm. în perioada de alăptare.

RA: Creșterea presiunii intracraniene și senzație de sufocare. Reacții alergice la locul injectării însoțite de urticarie și eczeme, ca și manifestări sistemice, până la șoc. Spasme, diplopie, peteșii și predispoziție la diateze hemoragice. Scăderea nivelului glicemiei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: A11GA01**CEBION® 1 g BLUTORANGE; CEBION® 1 g CITRUS** MERCK KGaA; Cpr. eferv. 1 g; tub × 20 cpr. eferv. (OTC)**CEBION RETARD 500** MERCK KGaA; Cps. elib. prel. 500 mg; ct. × 2, 4 sau 8 blist. × 15 cps. (OTC)**CETEBE®** GLAXO SMITHKLINE; Cps. elib. prel. 500 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (OTC)**CEVITIL** E.I.P.I.C.O.; Cpr. eferv. 1 g; ct. × 1 tub × 12 cpr. eferv. (OTC)**HERMES CEVIT®** HERMES ARZNEIMITTEL GmbH; Cpr. eferv. 1 g; ct. × 1 fl. × 20 cpr. eferv. (OTC)**REDOXON** HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. eferv. 1 g; ct. × 1 fl. × 10 cpr. (OTC)**SICOVIT® C 500 mg/5 ml** SICOMED SA; Sol inj. 100 mg/ml; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 5 ml (S/P-RF)**SICOVIT® C 200 mg** SICOMED SA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)**UPSAVIT VITAMIN C** BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. eferv. 1 g; ct. × 1 tub × 10 cpr. (OTC)**VITAMIN C EFF. INSTANT** SEDICO; Pulb. eferv. 1 g/plic; ct. × 10 plicuri (OTC)**VITAMINA C 200 mg** LAROPHARM SRL; Cpr. mast. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)**VITAMINA C 200 mg** ANTIBIOTICE SA; Cpr. mast. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)**VITAMINA C 250 mg; VITAMINA C 500 mg** PHARMEX ROM IND.; Cpr. mast. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. mast. (OTC)

Ind: Profilaxia și trat. scorbutului și altor forme de hipovitaminoză C: boli grave, stări febrile prelungite, infecții, intervenții chirurgicale. Plăgi atone, parodontoză, gingivite, stomatite, osteoporoză, fracturi, hemoragii prin fragilitate capilară, anumite forme de anemie (în asociere cu fierul sau cu acidul folic), methemoglobinemie. Surmenaj, efort fizic prelungit, astenie de primăvară. Profilaxia virozei și a gripei.

Dz: *Adulți:* 0,1-1 g/zi. *Copii:* 0,05-0,30 g/zi.

Cind: Litiază renală, stări de supraîncărcare cu fier, la bolnavii cu hemocromatoză, talasemie, deficit de acid folic sau la cei care primesc transfuzii de sânge frecvent.

Al: Acidul ascorbic poate favoriza precipitarea sulfamidelor în urină. Scade efectele anticoagulantelor orale, fenotiazinelor. Accentuează efectele adverse ale contraceptivelor orale și estrogenilor.

RA: Diaree, precipitarea oxalaților și uraților în urina acidă. Inj. rapidă i.v. poate provoca amețeli sau chiar lipotimie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: D10AX03](#)

SKINOREN® SCHERING AG; Cremă 20%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)

SKINOREN® 15% SCHERING AG; Gel 15%; ct. × 1 tub × 30 sau 50 g (*P-RF*)

Ind: Acnee vulgară, acnee rozacee. Secundar, în afecțiuni însoțite de hiperpigmentare, cum ar fi melanomul malign, lentigo-ul malign, melasma, melanodermiile postinflamatorii.

Dz: Local (tegumentul feței, gâtului, brațelor) de 2 ori/zi (dimineața și seara), pe perioade lungi, în funcție de evoluția bolii.

RA: Senzație de arsură, de înțepătură sau roșeață tegumentară. Reacții tardive: dermatită iritativă, cu mâncărime, descuamare și eritem.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: M05BA02](#)

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

BONEFOS® 400 mg SCHERING AG; Cps. 400 mg; ct. × 1 fl. × 100 cps. (P-RF)

BONEFOS® 800 mg SCHERING AG; Cpr. film. 800 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (P-RF)

BONEFOS® 60 mg/ml SCHERING AG; Conc. pentru sol. perf. 60 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml (S)

CLODRONAT® 400 mg SCHERING AG; Cps. 400 mg; ct. × 1 fl. × 100 cps. (P-RF)

SINDRONAT® 400 mg SINDAN SRL; Cps. 400 mg; ct. × 3 sau 12 blist. × 10 cps.; ct. × 1 fl. × 100 cps. (P-6L)

SINDRONAT® 300 g/5 ml SINDAN SRL; Conc. pt. sol. perf.; ct. × 1 fl. × 5 ml. (S)

Ind: Osteoliza produsă de metastazele osoase ale tumorilor solide sau de către neoplaziile hematologice. Hipercalcemia produsă de metastaze osoase sau de tumori maligne care induc distrucție osoasă în afara metastazelor osoase.

Dz: Oral: 1040 mg acid clodronic zilnic, adm. în priză unică. În cazuri individuale, pot fi necesare 2080 mg pe zi. La pacienții cu IR, la care clearance-ul creatininic variază între 10 și 30 ml/min, doza zilnică trebuie redusă la jumătate. Trat. este de obicei de lungă durată, depinzând de evoluția bolii.

Inj.: 300 mg ca o doză unică zilnică prin perf. i.v. lentă. Conținutul unei fiole trebuie dizolvat în minimum 500 ml de soluție izotonă de clorură de sodiu sau de glucoză 5%. Trat. nu trebuie să depășească 10 zile consecutive, după care se trece la terapie per os. În hipercalcemie trat. trebuie ajustat în funcție de răspunsul la terapie. Ca urmare, trebuie monitorizat zilnic nivelul calciului seric.

Cind: Hipersensibilitate la medicament, IR cu un clearance creatininic < 10 ml/min, boli inflamatorii acute severe ale tractului gastrointestinal. La copii. În timpul sarcinii.

Al: Acțiunea hipocalcemică este crescută de aminoglicozide. Trebuie monitorizată funcția renală. Trat. trebuie oprit în eventualitatea unei deteriorări a funcției renale. Nivelul calciului seric trebuie monitorizat. În cazul apariției hipocalcemiei, trat. i.v. trebuie oprit. Înaintea terapiei trebuie stimulată eliminarea renală a calciului seric în exces și restaurat echilibrul hidroelectrolitic și producția normală de urină. Se evită suprahidratarea la pacienții cu risc de IC. Mâncărurile cu un conținut ridicat de calciu, precum și medicamentele care conțin fier, calciu sau magneziu reduc absorbția acidului clodronic adm. oral. Perf. sau inj. i.v. rapide pot induce IRA.

RA: Simptome gastrointestinale (greața și diareea). IRA după perf. i.v. Deteriorări ale funcției renale și proteinurie tranzitorie imediat după perf. Reacții adverse cutanate. Hipocalcemie. Modificări ale fosfatului seric, albuminelor serice, LDH și transaminazelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: R01AC01](#)

CROMOHEXAL® HEXAL AG; Aerosol nazal 20 mg/ml; 2,8 mg/doză; ct. × 1 fl. × 15 ml (OTC)

CROMOHEXAL® HEXAL AG; Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC) - [Cod ATC: S01GX01](#)

DADCROME® DAR AL DAWA; Sol. nazală 2%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)

STADAGLICIN® STADA ARZNEIMITTEL AG; Aerosol nazal 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (OTC)

STADAGLICIN® STADA ARZNEIMITTEL AG; Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC) - [Cod ATC: S01GX01](#)

VEKFANOL FARAN LAB.; Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 5 ml (OTC)

Ind: Adm. naz.: rinită alergică perenă; rinită alergică sezonieră (de exemplu febra fânului). Adm. oft.: trat. simptomatic al afecțiunilor oftalmice de etiologie alergică.

Dz: Adm. naz.: *Adulți și copii:* o doză (puf) de 4 ori pe zi, în fiecare nară. Dacă este necesar, doza zilnică poate fi crescută, dar nu trebuie depășită doza de un puf de 6 ori pe zi. După ameliorarea simptomelor, trat. trebuie continuat până la îndepărtarea factorilor declanșatori (polen, praf de casă, spori de ciuperci, alergeni alimentari). După stabilizarea simptomatologiei trebuie încercată scăderea dozei.

Adm. oft.: *Adulți și copii:* Se instilează în sacul conjunctival o picătură soluție oftalmică de 4 ori pe zi, în fiecare ochi. Doza zilnică poate fi crescută la o picătură de 6 ori pe zi. După ameliorarea simptomelor trat. trebuie continuat până la îndepărtarea factorilor alergeni (polen, praf de casă, spori de ciuperci, alergeni alimentari etc.). După stabilizarea simptomatologiei clinice trebuie încercată scăderea dozei.

Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului.

A!: În caz de reacție alergică la aerosol nazal. Nu se vor folosi lentilele de contact moi în timpul trat. cu soluție oftalmică. Lentilele de contact tari trebuie îndepărtate înaintea adm. picăturilor și nu trebuie reaplicate mai devreme de 15 minute. În cazul trat. concomitent cu alte soluții oftalmice, se recomandă adm. acestora la intervale de minim 15 minute. În timpul sarcinii trebuie evitat. Sol. oft. afectează vederea, după adm., pt. câteva min. Pacientul trebuie să aștepte până când tulburările de vedere dispar, înainte de a participa la traficul rutier sau de a folosi utilaje.

RA: Adm. naz.: prurit ușor la nivelul nasului, rareori cefalee sau modificări ale gustului. Rar: epistaxis, ulceratii ale mucoasei nazale, inflamația limbii, tuse sau insuficiență respiratorie, edem laringian sau edem Quincke, reacții anafilactice generalizate grave, însoțite de bronhospasm. Adm. oft.: senzații de arsuri oculare sau de corp străin, chemozis și hiperemie conjunctivală. Rar, reacții de hipersensibilitate după adm. oft.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: A05AAN1](#)

FIOBILIN® TERAPIA SA; Cpr. 250 mg; ct. × 1, 2 sau 5 blist. × 10 cpr. (OTC)

Ind: Dispepsii diverse: flatulență, eructații, grețuri, digestie dificilă; litiază biliară recurentă, angiocolită recurentă, diskinezie biliară, obstrucție parțială cronică a coledocului; după interv. chir. recente pe căile biliare și în caz de drenaj prelungit al coledocului infectat prin fistulă biliară sau tub T; hepatite epidemice, adjuvant în trat. cu diuretice mercuriale, migrene și algii de origine hepatică, constipație cronică, migrene și alergii de origine hepatică.

Dz: *Adulți:* 250-500 mg de 3 ori/zi după mese, timp de 15 zile. *Copii:* 7-15 ani, 250-500 mg/zi.

Cind: Afecțiuni hepato-biliare acute, IH gravă, ciroza avansată, icter mecanic, boala ulceroasă, esofagita de reflux, diaree, alergii specifice. Nu se va adm. în sarcină și perioada de alăptare.

Al: Prudență la vârstnici. Este incompatibil cu substanțele cu reacție acidă.

RA: Greață, vomă, gust amar, diaree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: B03BB01](#)

ACIFOL® 5 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. film. 5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)

Ind: Anemie macrocitară, nutrițională, anemie macrocitară de sarcină, sprue, sindrom megaloblastic al copiilor mici, ciroză alcoolică (insuficiența formării și depozitării de foliați activi), anemie hemolitică sau neoplasme rapid evolutive, hipertiroidieni.

Dz: Oral, 1-5 mg/zi în 1-2 prize. Trat. se face până la dispariția cauzei, sau indefinit dacă aceasta persistă. În scop profilactic (sarcină, lactație) sunt suficiente 0,2-0,5 mg acid folic/zi.

Cind: Ca trat. unic în anemiile prin deficit de vit. B. Nu trebuie utilizat singur în anemia pernicioasă. Nu se adm. la persoanele peste 60 de ani, la care ar putea stimula evoluția unui eventual proces neoplazic latent.

Al: Poate întârzia stabilirea diagnosticului și instituirea trat. corect în anemiile megaloblastice. Nu se asociază cu sulfamidele. Dozele mari interferă efectul anticonvulsivant al fenobarbitalului, fenitoinei, primidonei.

RA: Manifestări alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: D06AX01](#)

FUCIDIN® LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; Ung. 2%; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 15 g (**P-RF**) - [Cod ATC: D06AX01](#)

FUCIDIN® LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; Cpr. film. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-RF**) - [Cod ATC: J01XC01](#)

FUCITHALMIC® LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; Gel. oft. 1%; ct. × 1 tub × 5 g (**P-RF**) - [Cod ATC: S01AA13](#)

Ind: Trat. infecțiilor cutanate determinate de microorganisme sensibile la acidul fusidic: impetigo, plăgi infectate, hidrosadenită, foliculite, furuncule, abcese, eritasmă. Fucithalmic-gel oftalmic este indicat pentru tratamentul infecțiilor oculare determinate de microorganisme sensibile la acidul fusidic (conjunctivite, blefarite, keratite, dacriocistite).

Dz: Fucidin cremă/unguent se aplică local de 2-3 ori/zi, după spălarea și uscarea zonei afectate, cu sau fără pansament ocluziv, timp de 7 zile. Fucidin comprimate se administrează la *adulți și copii peste 12 ani* câte 1 cpr. de 2 ori pe zi. În infecțiile oculare se instilează în sacul conjunctival o picătură de Fucithalmic de 2 ori pe zi. Tratamentul se va continua cel puțin 2 zile după ce ochiul revine la aspectul normal.

Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente. Infecții cutanate la nivelul zonei mamare la femeile care alăptează.

Al: Indicat numai pentru aplicații cutanate. Nu se aplică pe mucoase sau pe plăgi. Trebuie evitat contactul cu ochii, în tratamentul cu Fucidin cremă/unguent. În timpul tratamentului cu Fucithalmic nu se vor aplica lentile de contact.

RA: Fenomene de iritație sau hipersensibilizare (eritem, prurit, senzație de arsură), usturime locală oculară. Puțin probabil reacții adverse sistemice (toxicitate hepatică).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z **Toate**

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: V08CA08](#)

MULTIHANCE® 0,5M BRACCO; Sol. inj. 529 mg gadobenat de dimeglumină/1 ml; ct. × 1 fl. × 15 sau 20 ml (S)

Ind: Acidul gadobenic este o substanță de contrast paramagnetică utilizată în diagnosticul ficatului și a sistemului nervos central (SNC) prin rezonanță magnetică (MRI). Acidul gadobenic este indicat pentru decelarea leziunilor focalizate hepatice la pacienții cunoscuți sau suspecti de cancer hepatic primar (ex. carcinom hepatocelular) sau cu metastaze. Acidul gadobenic este, de asemenea, indicat pentru examen MR al SNC sau a coloanei vertebrale unde îmbunătățește decelarea leziunilor și furnizează informații suplimentare față de cele obținute prin examen MR fără substanță de contrast.

Dz: *Ficat:* Doza recomandată pentru administrarea injectabilă de acid gadobenic la pacienții adulți este de 0,05 mmol/kgcorp. Aceasta corespunde la

0,1 ml/kg din soluția 0,5 M. *SNC:* doza recomandată de acid gadobenic pentru administrare injectabilă la pacienții adulți este de 0,1 mmol/kgcorp. Aceasta corespunde la 0,2 ml/kg din soluția 0,5 M. Produsul trebuie administrat intravenos, fie în bolus, fie prin injecție lentă (10 ml/min) fără diluție. Examinarea poate fi făcută imediat după administrarea în bolus (MRI dinamic) sau între 40-120 minute după injectarea lentă (MRI întârziată), modul de examinare depinzând de nevoile individuale. În examinarea SNC, aceasta trebuie făcută după 60 de minute de la administrare pentru a obține o imagine clară.

Cind: Nu se adm. la pacienții cu hipersensibilitate la oricare din substanțele conținute sau la unul din compușii chelatați ai gadolinium-ului. Nu se adm. la pacienții cu disfuncție renală (clearance-ul creatininei < 30 ml/min). Nu este recomandată adm. la femeile însărcinate.

Al: Nu este recomandată adm. la pacienți sub 18 ani. Pacienții recunoscuți cu reacții alergice sau cu hipersensibilitate trebuie ținuti sub observație strictă în timpul și după examinare. Precauție la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. În timpul examenului, după administrare, pot fi eliberate mici cantități de alcool benzilic (< 0,2%) de către substanța activă - gadobenat de dimeglumină. De aceea, acidul gadobenic nu trebuie administrat la pacienții cu sensibilitate cunoscută la alcool benzilic.

RA: În mai mult de 1% din cazuri - hipertensiune; în 0,5-1% din cazuri - alterarea sensibilității la locul injectării, tahicardie, cefalee, greață, vomă; la mai puțin de 0,5% din cazuri - prurit, diaree, uscăciunea gurii, vasodilatație, erupții cutanate, amețeli, dureri abdominale, tremor, hipotensiune, dureri abdominale, aritmie, alterări ale gustului, edeme locale. Majoritatea efectelor secundare semnalate sunt ușoare, tranzitorii și nu au necesitat nici o formă de tratament. Posibile reacții anafilactice (dispnee sau spasm laringeal) dar de intensitate moderată. Foarte rar cazuri la care au apărut: mialgie, convulsii, incontinență urinară sau fecală. Valori anormale ale probelor de laborator cum ar fi albuminurie, leucocitoză, glicozurie, reducerea concentrației fierului total din sânge și o creștere a nivelului transaminazelor fosfatazei alcaline, creatininei serice și fierului seric au fost semnalate după administrarea de acid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: V08CA01

MAGNEVIST SCHERING AG; Sol. inj. 78,63 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5, 10, 20, 30 sau 100 ml; ct. × 1 fiolă seringă × 10, 15 sau 20 ml (S/P-RF)

Ind: Examen de rezonanță magnetică (RMN) craniană și spinală. Utilizat în special pentru depistarea tumorilor cât și pentru clarificarea problemelor de diagnostic diferențial în suspiciunea de meningiom, neurinom (acustic), tumori invazive (de ex. gliom) și metastaze; pentru a demonstra tumorile mici și/sau izointense; în suspiciunea de recidivă după intervenția chirurgicală sau radioterapie; pentru diagnosticul diferențial în forme rare de neoplasm ca: hemangioblastom, ependimom și adenoame hipofizare mici; pentru o mai bună delimitare a tumorilor de origine necerebrală. Suplimentar în RMN spinal, utilizat pentru diferențierea tumorilor intra și extramedulare, diagnosticarea zonelor tumorale solide în fistule cunoscute, determinarea extinderii tumorale intramedulare. Examen de rezonanță magnetică (RMN) al întregului corp, incluzând craniul facial, regiunea gâtului, spațiul toracic și abdominal, sânii, pelvisul și aparatul locomotor activ și pasiv.

Dz: Pacientul nu trebuie să mănânce cu 2 ore înainte de examinare. Doza recomandată este administrată intravenos sau în bolus. Examenul RMN poate începe imediat după injectare.

Principiile de dozare se aplică la adulți și copii: RMN cranian și spinal: în general, administrarea de 0,2 ml/kg corp este suficientă pentru o bună opacifiere și răspunde necesităților clinice. Dacă persistă o suspiciune clinică a leziunii în ciuda unui RMN normal, o injecție suplimentară a dozei totale inițiale în decursul a 30 minute urmată imediat de RMN poate crește eficiența diagnosticului. RMN-ul întregului corp: în general, administrarea de 0,2 ml/kg corp este suficientă pentru o bună opacifiere și pentru a răspunde necesităților clinice. În cazuri speciale, de ex. leziunile slab vascularizate și/sau un spațiu extracelular mic, pot fi necesari 0,4 ml/kg corp pentru un efect de contrast adecvat, în special în timpul T₁ al secvenței de scanare.

Cind: Nu se cunosc.

RA: Ocazional, după administrare de acid gadopentetic au fost observate greață, vărsături precum și reacții alergice ale tegumentului și mucoasei. Pacienții cu predispoziție alergică prezintă mai des decât ceilalți reacții de hipersensibilitate. În cazuri foarte rare pot fi întâlnite reacții anafilactice până la șoc.

Foarte rar, sunt posibile senzații discrete de căldură și durere la locul injectării, asociate puncției venoase sau injectării substanței de contrast. În cazuri rare au fost observate convulsii după administrarea de acid gadopentetic, totuși este greu de făcut o legătură cauzală între cele două evenimente.

Dureri de cap tranzitorii, vasodilatație, amețeli, frisoane și sincope, urmate administrării substanței de contrast au fost raportate ocazional, fără a se putea stabili o legătură cauzală.

Senzații gustative tranzitorii pot apărea după administrarea în bolus a substanței.

Soluția injectabilă este stabilă la temperatura de păstrare recomandată și nu prezintă schimbări de culoare în timpul depozitării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: M09AX01](#)

HYALGAN® CSC PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 0,15%; ct. × 1 sau 5 seringi preumplute × 2 ml; ct. × 1 fl. × 2 ml (**P-RF**)
EYESTIL S.I.F.I.; Sol. oft. 20 mg/2 ml; ct. × 1 fl. 10 ml (**OTC**)

Ind: Osteoartritele genunchiului, pentru ameliorarea de durată a durerii. Uz oftalmic: Tratament topic al tulburărilor filmului lacrimal datorate evaporării excesive a apei (strat lipidic redus sau alterat) - de exemplu în sindromul de ochi uscat (sindrom Sjogren).

Dz: *Adulți (inclusiv vârstnici):* Conținutul unei fiole (20 mg/2 ml) sau al unei seringi pre-umplute (20 mg/2 ml) trebuie injectat în articulația afectată o dată pe săptămână, 5 săptămâni consecutiv, utilizându-se o tehnică standard de injectare. Tratamentul poate fi repetat la intervale de cel puțin 6 luni. Oftalmic: 1 pic. de până la 6 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la hialuronatul de sodiu, proteinele de origine aviară sau la oricare dintre excipienții produsului (hialuronatul de sodiu - Hyalectin - este de origine aviară). Infecții sau alte afecțiuni cutanate la locul de injectare.

Al: Înainte de administrarea Hyalgan se îndepărtează lichidul articular, dacă există. Precauție pentru a nu suprasolicita articulația imediat după injectia intraarticulară. Produsul se utilizează numai dacă soluția este clară. Nu se adm. concomitent sau în amestec cu alte preparate injectabile intraarticulare, datorită experienței limitate. Nu se utilizează concomitent cu dezinfectante care conțin săruri cuaternare de amoniu. Prudență la gravide, femei care alăptează.

RA: Foarte rar, la locul injectării pot să apară durere, tumefacție, căldură, roșeață (dispar spontan în 1-4 zile). Dacă manifestările apar, articulația afectată se pune în repaus și se aplică local gheață. Cazuri izolate de reacții de tip anafilactic. Rareori, pot apărea reacții alergice, atât sistemice, cât și locale. La folosirea oftalmică: manifestări de tip alergic cum sunt inflamații palpebrale, conjunctivită, prurit, senzație de arsură, eritem, lăcrimare abundentă sau cheratită superficială.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: M05BA06

BONDRONAT HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 50 mg; ct. × 4 sau 12 blist. × 7 cpr. (P-6L)

BONDRONAT HOFFMANN LA ROCHE; Conc. pt. sol. perf. 6 mg/6 ml; ct. × 1, 5 sau 10 fl. × 6 ml (S/P-RF)

BONVIVA® HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 2,5 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 6 cpr. (P-6L)

BONVIVA® HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 150 mg (P-6L)

Ind: Creșteri patologice (anormale) ale valorilor calcemiei (hipercalcemie) ca rezultat al tumorilor. Prevenția afectărilor osoase (fracturi patologice, complicații osoase care necesită radioterapie sau intervenții chirurgicale) la pacienții cu cancer de sân și metastaze osoase. Se recomandă ca funcția renală, calcemia, fosfatemia și magneziemia să fie monitorizate în conformitate cu practica clinică. La pacienții cu risc de insuficiență cardiacă, trebuie evitată hiperhidratarea.

Dz: Cpr.: Doza uzuală este de un comprimat pe zi. În afecțiuni renale severe, medicul poate reduce doza la un comprimat pe săptămână. Comprimatele se administrează după un post nocturn de cel puțin 6 ore. Se evita alimentele sau medicamentele care conțin calciu înainte de administrare. După administrare se așteaptă cel puțin 30 minute înainte de administrarea oricăror altor medicamente, inclusiv a celor pentru indigestie, a suplimentelor cu calciu și a vitaminelor.

Sol. perf.: Prevenția afectării osoase la pacienții cu cancer de sân și metastaze osoase: doza recomandată este de 6 mg intravenos, administrată la fiecare 3-4 săptămâni. Doza trebuie administrată perfuzabil în 1 oră. La pacienții cu insuficiență renală severă (CLcr < 30 ml/min), doza recomandată este de 2 mg, administrată la fiecare 3-4 săptămâni, în perfuzie cu durată de 1 oră. Hipercalcemia determinată de tumori: înainte de tratament, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu clorură de sodiu 0,9%. Se ține cont de severitatea hipercalcemiei și tipul de tumoră. La majoritatea pacienților cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină $\leq$ 3 mmol/l sau $\leq$ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienții cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficientă este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus nici un beneficiu suplimentar în termeni de eficacitate.

Calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

- calcemia corectată cu albumină (mmol/l) = calcemia (mmol/l) - $[0,02 \times \text{albumină (g/l)}] + 0,8$
sau

- calcemia corectată cu albumină (mg/dl) = calcemia (mg/dl) + $0,8 \times [4 - \text{albumină (g/dl)}]$.

Pentru a converti calcemia corectată cu albumina din mmol/l la mg/dl, se înmulțește cu 4. Trebuie amestecat doar cu soluție izotonă de clorură de sodiu sau cu soluție de glucoză 5%.

Cind: Hipersensibilitate (alergie) la substanța activă sau la excipienți. Nu se utilizează la copii, în sarcină și alăptare.

RA: Creșterea temperaturii corpului, ocazional. Sindrom pseudo-gripal cu febră, frisoane, dureri osoase sau

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: M01AG01](#)

VIDAN VIANEX SA; Cpr. film. 500 mg; ct. × 3 blist. × 8 cpr. (P-6L)

Ind: Terapia simptomatică în: artrita reumatoidă; spondilite anchilozante; artrite psoriazice. În dismenoree primară; migrene, dureri dentare, dureri postoperatorii; metroragii datorate unor disfuncții hormonale.

Dz: *Adulți și copii mai mari de 14 ani:* 500 mg la 8 ore.

Cind: Hipersensibilitate la componentele medicamentului; simptomatogie alergică la alte AINS (aspirina); persoane cu antecedente gastrice. Se evită asocierea cu alte medicamente AINS.

Al: La cei cu disfuncții hepatice sau renale. Acidum mefenamicum poate potența efectul altor medicamente. Prudență la pacienții tratați concomitent cu anticoagulante cumarinice, sulfoniluree, hidantoine sau sulfamide. Poate determina o falsă reacție pozitivă pentru biliurie.

RA: Dispepsii, dureri de cap, diaree, dureri abdominale, vertij. Ulcer peptic, hemoragii la nivelul tractului gastro-intestinal, tulburări vizuale și nervoase, creșteri ale uremiei, nefrite interstițiale; disfuncții hematologice; pancreatite, convulsii epileptice, tulburări psihice, biliurie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: J01MB02](#)

NALIXID® 500 mg ZENTIVA ROMANIA; Cps. 500 mg; ct. × 1 fl. × 56 cps. (P-RF)

Ind: Infecții urinare. Profilactic, înainte și după intervenții în sfera urogenitală.

Dz: *Adulți:* 4 g/zi în primele 1-2 săptăm., apoi, dacă este nevoie, câte 2 g/zi. *Copii:* 0,055 g/kg/zi în 4 prize egale. În caz de terapie prelungită 0,033 g/kg/zi.

Cind: Infecții cu germeni rezistenți la acid nalidixic. În primul trimestru al sarcinii și în prima lună de viață.

Al: Evitarea expunerii la soare. Se impune testarea periodică a sensibilității germenilor. Metaboliții săi pot determina, în anumite teste, valori incorecte pentru glucoză, 17-cetosteroizilor urinari. Dacă trat. se continuă peste 14 zile, se impune efectuarea periodică a examenului hematologic și a probelor funcționale hepatice și renale. Asocierea cu nitrofurantoina, cloramfenicolul și tetraciclinele nu este indicată. Prudență în timpul trat. cu anticoagulante cumarinice.

RA: Tulburări gastrointestinale, fenomene alergice, reacții cutanate de fotosensibilizare. Mai rar somnolență, cefalee, amețeli, colestază, parestezii, trombopenie sau anemie hemolitică. Uneori tulburări de vedere. Psihoze toxice sau convulsive la persoane predispuse. La sugari și la copii, rar, semne de hipertensiune intracraniană.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C10AD02

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

NIASPAN 350 mg; NIASPAN 500 mg; NIASPAN 750 mg; NIASPAN 1000 mg MERCK KGaA; Cpr. elib. prel. 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg; ct. × 1, 2, 4 sau 7 blist. × 14 cpr. **(P-6L)**

Ind: Tratamentul dislipidemiilor în special la pacienții cu dislipidemii mixte caracterizate prin niveluri crescute ale LDL-colesterolului și trigliceridelor și niveluri scăzute ale HDL-colesterolului, precum și la pacienții cu hipercolesterolemie primară. Trebuie administrat pacienților în combinație cu inhibitori de HMG-CoA reductază (statine) atunci când efectele monoterapiei cu inhibitorii de HMG-CoA reductază sunt inadecvate.

Dz: Seara, înainte de culcare, după o gustare ce conține puține grăsimi. Dozele se vor crește gradat, până la doza de întreținere cuprinsă între 1000 mg și 2000 mg, o dată pe zi.

Cind: Hipersensibilitate, hemoragii recente, ulcer gastroduodenal, disfuncție hepatică severă.

Al: Monitorizarea funcției hepatice înainte și în timpul tratamentului. La diabetici, poate fi necesară ajustarea dozelor de insulină sau de antidiabetice orale.

RA: Episoade de flushing (caracterizate prin calor, rubor, prurit și/sau parestezii), tulburări digestive (diaree, greață, vărsături, dureri abdominale, dispepsie), cefalee, amețeli, tahicardie, palpitații, dispnee, reacții cutanate (prurit, rash, piele uscată, exantem generalizat), edeme periferice, astenie, frisoane, creșterea nivelului sanguin pentru transaminazele hepatice, fosfataza alcalină, bilirubină, LDH, amilază, acid uric, scăderea numărului de trombocite.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: M02AA17](#)

NIFLUGEL BRISTOL-MYERS SQUIBB; Gel 2,5%; ct. × 1 tub × 30 sau 60 g (OTC)

NIFLURIL BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. 250 mg; ct. × 2, 3, 6 sau 10 blist. × 10 cps. (P-RF) - [Cod ATC: M01AX02](#)

NIFLURIL BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cremă 3%; ct. × 1 tub × 60 g (OTC)

Ind: Adulți și copii cu vârste peste 12 ani: ca trat. de durată în: reumatism inflamator cronic, artroze; ca trat. pe termen scurt în dureri acute; dureri datorate inflamației gâtului, urechilor sau gurii. Percutan: luxații, entorse.

Dz: Oral, la adulți și copii cu vârsta peste 12 ani, 250-750 mg pe zi. Local se aplică de 2-3 ori pe zi.

Cind: După luna a 6-a de sarcină, alergie cunoscută la acid niflumeric sau la alte medicamente înrudite, ulcer gastric sau duodenal activ, afecțiune hepatică severă, afecțiune renală severă, copii cu vârsta sub 12 ani. Nu trebuie asociat cu: anticoagulante orale, alte AINS, heparină, litiu, metotrexat în doze mari, ticlopidină.

Al: Trebuie adaptată doza în caz de: afecțiuni digestive; afecțiuni cardiace, hepatice și renale; utilizarea unui dispozitiv intrauterin în scop contraceptiv. Atenție pe parcursul primelor 5 luni de sarcină și în perioada lactației.

RA: Reacții alergice cutanate, de exemplu urticarie, prurit, reacții cutanate severe prin expunere la lumina solară sau la radiații ultraviolete; rar dermatită buloasă pe mucoase sau piele; crize de astm; șoc alergic; sângerare gastro-intestinală. Ulcerație duodenală și perforație. Tulburări digestive ca durere abdominală, vomă sau greață. Modificări osoase (fluoroze). Modificări ale rezultatelor testelor de laborator (hemogramă, teste funcționale hepatice și renale).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: M05BA03](#)

AREDIA® 15 mg NOVARTIS PHARMA; Liof. pentru sol. inj.; ct. × 4 fl. liof. × 15 mg + 4 f. × 5 ml solvent (S/P-RF)

Ind: Metastaze osoase, predominant osteolitice, mielom multiplu, tumori care induc hipercalcemie, boala Paget osoasă.

Dz: Soluția concentrată din fiole sau substanța activă din flacoane trebuie diluată cu soluții de clorură de sodiu 0,9% sau glucoză 5% și apoi perfuzată lent. Tumori care induc hipercalcemie: se recomandă ca pacienții să fie rehidratați cu soluție salină normală înaintea sau în timpul tratamentului. Doza totală de pamidronat disodic care trebuie utilizată în cursul unei cure de tratament depinde de nivelul calciului seric inițial al pacienților. Doza totală poate fi administrată fie într-o singură perfuzie sau în perfuzii multiple de-a lungul a 2-4 zile consecutive. Doza maximă admisă pentru o cură de tratament (la adulți și persoane vârstnice) este de 90 mg. În cazul tumorilor care induc hipercalcemie, se recomandă o rată a perfuziei între 15-30 mg/2 ore. Concentrația pamidronatului disodic în soluția pentru perfuzie nu trebuie să depășească 15 mg/125 ml.

În cazul tumorilor osteolitice fără hipercalcemie, doza totală recomandată este de 30 mg o dată pe săptămână timp de 4 săptămâni consecutiv, după care o dată la 2 săptămâni. Durata tratamentului trebuie să fie de 6 luni, doza va fi diluată în cel puțin 250 ml soluție salină sau glucoză, iar rata perfuziei de 2 ore. În boala Paget osoasă, doza totală recomandată este de 180-210 mg care poate fi administrată astfel: fie 30 mg o dată pe săptămână, timp de 6 săptămâni (doza totală de 180 mg), fie 60 mg o dată pe săptămână, timp de 3 săptămâni, la care se adaugă o doză inițială de 30 mg (doza totală de 210 mg). Doza de 30 mg se va dilua în 250 ml soluție salină, iar cea de 60 mg în 500 ml. Se recomandă o rată a perfuziei de 15 mg/oră.

Cind: Hipersensibilitate la pamidronat disodic sau alți bifosfonați.

Al: Pamidronatul disodic nu trebuie administrat în bolus (poate determina tulburări locale importante), ci diluat și perfuzat lent intravenos. Pamidronatul disodic nu trebuie asociat altui bifosfonat, întrucât nu există studii clinice asupra compatibilității acestuia. Se impune monitorizarea electrolitilor serici (calciu, fosfat) înaintea începerii tratamentului cu pamidronat disodic. Pacienților cu hipocalcemie cărora li se administrează pamidronat disodic în perfuzie i.v. trebuie să li se evalueze periodic funcția renală (prin teste de laborator și parametri clinici). În studiile clinice, pamidronatul disodic a fost utilizat fără a se demonstra efecte adverse la pacienții cu insuficiență renală moderată (nivelul creatininei serice de două ori mai mare decât valoarea normală), dar nu și la pacienții cu insuficiență renală severă. În cazul acestora, clinicianul trebuie să evalueze beneficiile administrării comparativ cu riscurile. Pacienților cu boală Paget osoasă aflați sub tratament cu pamidronat disodic trebuie să li se administreze calciu oral sau vitamină D pentru diminuarea riscului hipocalcemiei. Nu există date clinice privind administrarea pamidronatului disodic la copii.

Conținutul fiolei trebuie diluat în 250 ml soluție salină sau glucoză 5% și perfuzat lent în 2 ore.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: M05BA07](#)

ACTONEL® 5 mg; ACTONEL® 30 mg AVENTIS PHARMA; Cpr. film. 5 mg, 30 mg; ct. × 1, 2, 6 sau 10 blist. × 14 cpr. (P-6L)
ACTONEL® SĂPTĂMÂNAL AVENTIS PHARMA; Cpr. film. 35 mg; ct. × 1 blist. × 1, 2, 4 sau 10 cpr; ct. × 3 sau 4 blist. × 4 cpr. (P-6L)

Ind: Cpr. de 5 mg, cpr. săptămânale de 35 mg: pentru tratamentul osteoporozei postmenopauză, pentru reducerea riscului de fracturi vertebrale, a riscului de fracturi de șold. Profilaxia osteoporozei la femeile în postmenopauză care prezintă risc crescut de osteoporoză. Menținerea sau creșterea masei osoase la femeile în postmenopauză aflate sub tratament de lungă durată (peste 3 luni) cu glucocorticoizi, la doze de > 7,5 mg prednison pe zi sau echivalente. Cpr. de 30 mg: Tratamentul bolii Paget osoase.

Dz: Pentru profilaxia și tratamentul osteoporozei: **Adulți:** Doza zilnică recomandată pentru adulți este de 5 mg risedronat sodic administrat oral. Comprimatele de 35 mg se administrează exact la 7 zile. Pentru tratamentul bolii Paget osoase: doza zilnică recomandată pentru adulți este de 30 mg risedronat sodic administrat oral timp de 2 luni. Dacă se consideră necesar ca tratamentul să se repete (la cel puțin 2 luni post-tratament), terapia se poate relua cu aceeași doză pentru aceeași perioadă de timp. Deoarece absorbția risedronatului sodic este influențată de alimentație, pentru a asigura o absorbție adecvată, pacienta își va administra comprimatul filmat fie cu cel puțin 30 minute înaintea primului aliment/băutură (exceptând apa) din ziua respectivă, fie la cel puțin două ore după ingestia de alimente/băuturi, în orice alt moment al zilei, cu cel puțin 30 minute înainte de culcare. Comprimatele filmate se vor înghiți întregi. Pentru a facilita ajungerea comprimatului filmat în stomac, acesta se va administra cu un pahar de apă (120 ml), în ortostatism. Pacienta nu se va întinde la orizontală cel puțin 30 minute după administrarea produsului. Administrarea suplimentară de calciu și vitamina D poate fi luată în considerare dacă aportul alimentar este inadecvat. **Copii:** siguranța și eficiența risedronatului sodic nu au fost stabilite în cazul copiilor sub 18 ani.

Cind: Hipersensibilitate la risedronat sodic sau la oricare dintre excipienții produsului. Hipocalcemie. Sarcină și alăptare. Insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min).

Al: Alimentele, băuturile (altele decât apa) și medicamentele care conțin cationi polivalenți (calciu, magneziu, fier și aluminiu) pot interfera cu absorbția risedronatului sodic și nu trebuie administrate concomitent. De aceea, risedronatul sodic se va administra fie cu 30 de minute înainte de ingerarea primului aliment/băutură din ziua respectivă sau la cel puțin 2 ore după masă/ingestia băuturilor, în orice alt moment al zilei. Hipocalcemia trebuie tratată înainte de începerea tratamentului cu risedronat sodic. Alte tulburări ale metabolismului osos sau mineral (disfuncție paratiroidiană, hipovitaminoză D) trebuie tratate în momentul în care se începe terapia cu risedronat sodic. Este contraindicată administrarea risedronatului sodic femeilor însărcinate sau care alăptează.

RA: Reacții adverse frecvente: **Aparat digestiv:** constipație, dispepsie, greață, dureri abdominale, diaree, esofagite,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01GX03

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACOMETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

NAAXIA® NOVARTIS PHARMA; Sol. oft. 38 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (OTC)

Ind: Conjunctivite alergice.

Dz: Instilații în sacul blefaro-conjunctival, 1 picătură de 4 ori/zi.

Cind: Alergie la produs.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: A05AA02](#)

URSOFALK® DR. FALK PHARMA; Cps. 250 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 25 cps. (P-6L)

URSOSAN PRO. MED. CS PRAHA; Cps. 250 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (P-6L)

Ind: Dizolvarea calculilor biliari radiotransparenți colesterolici din colecist. Gastrită de reflux biliar. Colestaze hepatice.

Dz: Oral, seara înainte de culcare. Pentru dizolvarea calculilor biliari colesterolici și în colestazele hepatice, 10 mg/kg/zi. Pt. trat. gastritei de reflux biliar se adm. 250 mg pe zi. Trat. pt. dizolvarea calculilor biliari poate dura între 6 și 24 luni. Rezultatele terapiei trebuie monitorizate prin ecografie sau colecistografie la fiecare 6 luni. Pt. trat. gastritei de reflux biliar se adm. timp de 10-14 zile.

Cind: Inflamații acute ale colecistului, căilor biliare și pancreasului. Obstrucția tractului biliar. Afecțiuni inflamatorii ale intestinului gros sau subțire. Sarcină și alăptare. În caz de calculi calcificați, veziculă biliară ce nu poate fi vizualizată radiologic, tulburări de contractilitate a colecistului sau frecvente colici biliare. Nu se asociază cu cholestyramin, colestipol sau preparate antiacide ce conțin hidroxid de aluminiu.

Al: Este necesar controlul ecografic al calculilor biliari înainte de începutul trat. și la interval de 6 luni în cursul acestuia. Trat. va fi monitorizat și prin controlul inițial și periodic al transaminazelor SGOT și SGPT.

RA: Calcificarea calculilor biliari în timpul trat. Fecalele pot deveni păstoase.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: N03AG01](#)

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

CONVULEX® GEROT; Cps. 150 mg, 300 mg, 500 mg; ct. × 10 blist. × 10 cps. (P-6L)

CONVULEX® GEROT; Sirop 50 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-6L)

DEPAKINE® sirop SANOFI~SYNTHELABO; Sirop 5,764%; ct. × 1 fl. × 150 ml (P-6L)

DEPAKINE® 200 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. film. gastrorez.

200 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (P-6L)

DEPAKINE® 400 mg/4 ml SANOFI~SYNTHELABO; Pulb. + solv. pt. sol. inj/perf.; ct. × 4 fl. pulb. + 4 f. solv. × 4 ml (P-6L)

DEPAKINE® CHRONO 300 mg; DEPAKINE® CHRONO 500 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. film. elib. prel. 300 mg, 500 mg; ct. × 2 fl. × 50 cpr. (300 mg), ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)

ORFIRIL DESITIN; Sirop 300 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 250 ml (P-6L)

ORFIRIL-150; ORFIRIL-300 DESITIN; Cpr. gastrorez. 150 mg, 300 mg; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 cpr. (P-6L)

ORFIRIL-600 RETARD DESITIN; Cpr. film. ret. 600 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. film. ret. (P-6L)

ORFIRIL® LONG 150 mg; ORFIRIL® LONG 300 mg; ORFIRIL® LONG 500 mg; ORFIRIL® LONG 1000 mg DESITIN; Minicpr. elib. prel. 150 mg, 300 mg, 500 mg, 1000 mg; ct. × 50, 100, 200 miniplicuri cu minicpr. elib. prel. (P-6L)

PETILIN REMEDICA; Cpr. film. 200 mg; ct. × 10 blist. × 10 cpr.; ct. × 40 cpr. (P-6L)

VALEPIL ARENA GROUP SA; Sirop 200 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-6L)

Ind: Adm. oral: în diferite forme de epilepsie ale adulților și copiilor cu greutatea peste 17 kg și în trat. unor tulburări de comportament observate în timpul convulsiilor. Adm. i.v.: Trat. epilepsiei, pe o perioadă mai scurtă de 3 zile, în locul adm. orale, dacă aceasta este temporar inutilizabilă.

Dz: Adm. oral: 20-30 mg/kg și zi; divizat în 2-3 prize, sau în 1-2 prize pentru formele orale retard. Adm. i.v.: Injecție i.v. directă: pentru un adult: 400-800 mg. În perf.: 25 mg/kg/24 ore, într-o soluție injectabilă de clorură de sodiu 9%, timp de 24, 36 sau 48 ore.

Cind: Hepatită acută. Hepatită cronică. Antecedente familiale de hepatită severă. Hipersensibilitate la valproat.

Al: În caz de afecțiuni hepatice, IR. În timpul primelor 6 luni de trat., se vor supraveghea periodic funcțiile hepatice. Adm. inj. trebuie efectuată strict i.v. Sunt necesare examene hematologice periodice. În caz de sindrom abdominal dureros acut, este recomandat să se dozeze amilazemia. La copil, evitați adm. simultană cu salicilați. Atenție la asocierea cu: neuroleptice, antidepresive, fenobarbital, primidonă, alte antiepileptice cu efect inductor enzimatic (mai ales fenitoină, fenobarbital, carbamazepină). În timpul sarcinii trat. nu trebuie întrerupt. Monoterapia este recomandabilă. Se adm. doza zilnică minimă eficientă repartizată în mai multe prize.

RA: Afecțiuni hepatice. Risc teratogen. Stări confuzionale sau convulsive. Tulburări digestive. Căderea părului, ușoare tremurături, hiperamoniemie izolată. După inj. pot să apară senzații de greață sau de vertij. Rar, scădere a fibrinogenului, trombopenie sau alungirea timpului de sângerare, anemie și de leucopenie. Creșteri în greutate, amenoree și iregularități menstruale. Risc de necroză tisulară locală în caz de injecții repetate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: M05BA08](#)

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACOMETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

ACLASTA NOVARTIS PHARMA; Sol. perf. 5 mg/100 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (**S/P-RF**)

ZOMETA® NOVARTIS PHARMA; Pulb. pt. sol. perf. 4 mg/fl. + 1 f. × 5 ml solvent; ct. × 1, 4, 10, 20 fl. pulb. + 1, 4, 10, 20 f. × 5 ml solvent (**S/P-RF**)

Ind: Trat. hipercalcemiei induse de tumori (HIT). Tratamentul bolii Paget osoase.

Dz: *Adulți și vârstnici:* 4 mg într-o singură perf. i.v. cu durata de 15 minute. Pt. tratamentul bolii Paget, doza recomandată este de 5 mg acid zoledronic anhidru în 100 ml sol. apoasă, în cel puțin 15 minute.

Cind: În timpul sarcinii, la femeile care alăptează, la pacienții cu hipersensibilitate la oricare dintre componente.

Al: Calcemia, fosfatemia și magnezemia, trebuie supravegheate după începerea trat. Funcția renală trebuie supravegheată. Nu este recomandat la pacienți cu IR severă (creatininemie $\geq 400 \mu\text{mol/l}$ sau 4,5 mg/dl). Trebuie evitată hiperhidratarea la pacienți cu risc de IC. Prudență în cazul asocierii cu aminoglicozide. Este posibilă apariția hipomagneziemiei.

RA: Creșterea temperaturii corporale. Sindrom pseudo-gripal (febră și dureri osoase). Artralgii, oboseală, confuzie, sete, pancitopenie și bradicardie. Scăderea fosfatemiei. Reacții gastrointestinale (greață și vărsături). Reacții locale la nivelul locului de perfuzare, cum sunt eritem și edem. Eupții cutanate, prurit și dureri toracice. Conjunctivită. Hipomagneziemie. IR.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: C10AD06](#)

OLBETAM PHARMACIA & UPJOHN; Cps. 250 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)

Ind: Trat. tulburărilor lipidice cu nivele plasmatice crescute ale trigliceridelor (hiperlipoproteinemie tip IV), ale colesterolului (hiperlipoproteinemia tip IIa) și ale trigliceridelor și colesterolului (hiperlipoproteinemia tip IIb, III și IV).

Dz: Oral, 250 mg de 2 sau 3 ori pe zi, după mese. La pacienții cu IR este recomandabilă reducerea dozei în funcție de valorile clearance-ului creatininei.

Cind: Hipersensibilitatea la medicament. Ulcerul peptic.

Al: Se recomandă regim hipolipidic și hipocolesterolemiant. În timpul trat. prelungite, sunt necesare determinări periodice ale nivelelor lipidice și lipoproteice precum și ale funcțiilor hepatice și renale. A se evita în sarcină și alăptare.

RA: Vasodilatație tegumentară cu senzație de căldură, roșeață și prurit. Tulburări gastrice moderate, cefalee și astenie. Reacții imunoalergice (urticarie, edem palpebral și/sau labial, erupție cutanată, dispnee, hipotensiune).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: D05BB02](#)

NEOTIGASON® HOFFMANN LA ROCHE; Cps. 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-RF)

Ind: Tulburări severe de keratinizare, ca: psoriazis eritrodermic; psoriazis pustular localizat sau generalizat; ihtioză congenitală; pitiriazis rubra pilaris; boala Darier.

Dz: Oral, o dată pe zi, cu alimente (la masă) sau cu lapte. *Adulți:* inițial de 25- 30 mg/zi, timp de două, până la patru săpt. Doza de întreținere 25-50 mg/ zi, timp de alte șase sau opt săpt. Maxim 75 mg/zi. *Copii:* 0,5-1 mg/kg/zi maxim 35 mg/zi.

Cind: Este teratogen, nu trebuie folosit de femeile gravide, în perioadă fertilă sau care alăptează. Donarea de sânge este interzisă în timpul și un an după trat. cu acitretin. La pacienți cu funcție renală sau hepatică sever alterată și la cei cu valori cronic crescute ale lipidelor serice. Nu se utilizează concomitent cu tetraciline, metotrexat, vit. A sau alți retinoizi. În caz de sensibilitate la preparat sau la alți retinoizi.

Al: Funcția hepatică trebuie controlată înaintea începerii trat. și periodic în cursul trat. Colesterolul și trigliceridele serice trebuie monitorizate. La diabetici, retinoizii pot fie să amelioreze, fie să scadă toleranța la glucoză. Nivelele glicemiei trebuie controlate mai frecvent. Poate produce anomalii de osificare. La copii este necesară monitorizarea strictă a parametrilor de creștere și a dezvoltării osoase.

RA: Agravarea simptomatologiei bolii. Simptome de hipervitaminoză A. Uscăciunea gurii și sete. Subțierea pielii și cruste, mai ales la nivelul palmelor și suprafețelor plantare. Reacții de fotosensibilitate. Ocazional, cefalee, alterarea vederii nocturne și dureri musculare, articulare și osoase. Căderea părului, fragilitate unghială și paronichie. Pot apărea hiperostoză și calcificări extrascheletale. Creșteri tranzitorii ale transaminazelor și fosfatazei alcaline. Creșteri reversibile ale trigliceridelor serice și colesterolului seric. Nu poate fi exclus riscul aterogenezei asociate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: C01EB10**ADENOCOR®** GLAXO WELLCOME; Sol. inj. 6 mg/2 ml; ct. × 6 fl. × 2 ml (S)

Ind: Conversia rapidă la ritm sinusal normal a tahicardiilor paroxistice supraventriculare, inclusiv a celor asociate cu fascicule de conducere accesorii (sindrom Wolff-Parkinson-White). Indicații diagnostice: diagnosticul tahicardiilor supraventriculare cu complexe QRS largi sau înguste. Cu toate că nu convertește flutter-ul atrial, fibrilația atrială sau tahicardia ventriculară la ritm sinusal, încetinirea conducerii atrio-ventriculare ajută la diagnosticul activității atriale. Sensibilizarea investigațiilor electrofiziologice intracavitare.

Dz: Exclusiv în spital, sub monitorizare și cu echipament de resuscitare cardio-respiratorie disponibil pentru utilizare imediată. Se adm. i.v. în bolus, rapid. Doze în indicația terapeutică: *Adulți*, doza inițială: 3 mg, sub formă de bolus intravenos rapid (injectat în 2 secunde); a doua doză: dacă prima doză nu a condus la dispariția tahicardiei supraventriculare în 1-2 minute, trebuie să se administreze încă 6 mg, tot sub formă de bolus intravenos rapid. A treia doză: dacă a doua doză nu a condus la dispariția tahicardiei supraventriculare în 1-2 minute, trebuie să se administreze încă 12 mg, tot sub formă de bolus intravenos rapid. Nu sunt recomandate doze suplimentare sau doze mai mari. *Copii*: dozele eficace pentru copii au fost cuprinse între 0,0375-0,25 mg/kg. Doze în indicația diagnostică: Schema de dozare crescătoare de mai sus, trebuie utilizată până când se obțin informații diagnostice suficiente.

Cind: La pacienții care suferă de: bloc atrio-ventricular de gradul II și III (cu excepția pacienților cu pacemaker artificial în stare de funcționare), boala nodului sinusal cu excepția pacienților cu pacemaker artificial în stare de funcționare, astm, hipersensibilitate la adenozină.

Al: Administrarea se face în spital, sub monitorizare electrocardiografică. La pacienții cu fibrilație/flutter atrial și o cale de conducere accesorie poate apărea creșterea conducerii pe calea anormală. Precauție la pacienții cu interval QT alungit, indiferent dacă acesta este congenital sau dobândit prin inducție medicamentoasă sau sechele metabolice, boală pulmonară obstructivă cro-nică, severă. Interacțiuni cu: dipiridamol (nu este recomandat în asociere), teofilină, cafeină. În sarcină și alăptare se poate administra numai dacă este esențial.

RA: După injectare apar, de obicei, flush facial, dispnee, bronhospasm, senzație de constricție toracică, greață și senzație de cap gol. Mai rar, au fost observate următoarele efecte adverse: senzație de disconfort, transpirații, palpitații, hiperventilație, presiune intracraniană, senzație de teamă, încetșarea vederii, senzații de arsură, bradicardie, asistolie, dureri toracice, cefalee, vertij, greutate în brațe, dureri de brațe, gât și spate, gust metalic. Aceste efecte adverse au fost ușoare, de scurtă durată (de obicei mai puțin de 1 minut), și în general bine tolerate de pacient. A fost raportat un singur caz de agravare a presiunii intracraniene (trecător și reversibil). În momentul conversiei la ritmul sinusal normal, electrocardiograma poate înregistra contracții ventriculare premature, contracții atriale premature, fibrilație atrială, bradicardie sinusală, tahicardie sinusală, pauză sinusală și/sau bloc

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: A16AB03](#)

REPLAGAL TKT EUROPE 5S AB; Conc. pt. sol. perf. 1 mg/ml; ct. × 1, 4 sau 10 fl. × 3,5 ml (S)

Ind: Agalsidasa este indicată pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficiență de alfa-galactozidază A).

Dz: Tratamentul cu agalsidasă trebuie supravegheat de un medic cu experiență în terapia bolnavilor cu boala Fabry sau alte boli metabolice ereditare. Agalsidasa se administrează în doză de 0,2 mg/kg, la fiecare două săptămâni, prin perfuzie intravenoasă în interval de 40 min (se diluează volumul total de concentrat Replagal necesar în 100 ml soluție perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9%). Nu s-au efectuat studii la copii și adolescenți (0-17 ani) sau pacienți cu vârsta peste 65 ani și de aceea nu se pot face recomandări privind doza la acești pacienți, deoarece nu s-au stabilit siguranța și eficacitatea produsului. Nu s-au efectuat studii la pacienții cu insuficiență hepatică. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

AI: *Interacțiuni medicamentoase:* Agalsidasa nu trebuie administrată împreună cu clorochină, amiodaronă, benochin sau gentamicină, întrucât aceste substanțe prezintă potențialul de a inhiba activitatea alfa-galactozidazei intracelulare. *Sarcină și alăptare:* Nu s-a stabilit dacă agalsidasa este excretată în laptele matern. Este necesară prudență atunci când produsul este prescris gravidelor sau femeilor care alăptează.

RA: Cele mai frecvente reacții adverse raportate au fost asociate cu reacțiile la perfuzie, care au apărut la aproximativ 10% dintre pacienții tratați în cadrul studiilor clinice. Majoritatea reacțiilor adverse au fost ușoare până la moderate și cele mai multe au urmat cursul natural al bolii Fabry. Simptomele au cuprins în special frisoane și înroșirea feței, iar câțiva pacienți au prezentat cefalee, dispnee, dureri abdominale, greață sau dureri toracice. Aceste reacții nu au fost însoțite de modificări ale semnelor vitale sau de urticarie. Toate simptomele au dispărut după acordarea îngrijirilor medicale adecvate, cum ar fi oprirea perfuziei după care aceasta a fost reluată, sau terapia medicamentoasă cu antihistaminice sau glucocorticoizi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: P02CA03](#)

ABACAVIRUM
ABCIKIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

DUADOR 200 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr. (P-RF)

ESKAZOLE GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (P-RF)

ZENTEL GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr. (P-RF)

ZENTEL GLAXO SMITHKLINE; Susp. orală 200 mg/5ml; ct. × 1 fl. unidoză × 10 ml (P-RF)

Ind: Helminthiazele intestinale și giardoză: Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Taenia sp. Helminthiaze sistemice: Echinococoză, Neurocisticercoză, Trichineloză, Toxocarioză, Capilarioză, Gnatostomiază.

Dz: Helminthiaze intestinale și giardoză: *Adulți și copii în vârstă de peste 2 ani:* 400 mg în priză unică în cazul parazitozelor cu: Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenale și Necator americanus. În caz de strongiloidoză sau teniază, se adm. 400 mg în prize unice, 3 zile consecutiv. *Helminthiaze sistemice:* Posologia depinde de parazitul implicat, greutatea corporală a pacientului și severitatea infecției. Dozele uzuale sunt cuprinse între 400 și 800 mg/zi timp de 5-30 zile. Ciclul terapeutic se poate repeta după o pauză de 14 zile.

Cind: În sarcină sau la femeile presupuse a fi însărcinate. În caz de hipersensibilitate la constituenții produsului.

A!: Poate produce creșterea nivelului enzimelor hepatice. Dacă nivelul enzimelor hepatice crește semnificativ trat. trebuie întrerupt. Înaintea fiecărui ciclu de trat. și cel puțin din 2 în 2 săpt. în cursul trat. trebuie efectuate testele funcționale hepatice. Poate induce reduceri ale numărului total de elemente albe. Înaintea debutului și la fiecare două săpt. În cursul fiecărui ciclu de trat., trebuie efectuată numărătoarea elementelor sanguine. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să înceapă trat. numai după obținerea rezultatului negativ al testului de sarcină.

RA: Creșterea nivelului enzimelor hepatice, tulburări digestive, leucopenie, vertij și cefalee, alopecie reversibilă și febră. Rar, pancitopenie și reacții de hipersensibilitate (rash, prurit, urticarie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: L01XC04

MABCAMPATH® 10 mg/ml; MABCAMPATH® 30 mg/ml SCHERING AG; Conc. pt sol. perf. 10 mg/ml, 30 mg/ml; ct. × 3 f. × 3 ml, respectiv ct. × 3 fl. × 1 ml (S)

Ind: Tratamentul pacienților cu leucemie limfocitară cronică (LLC), refractară la alte tratamente, cum ar fi cu agenți alchilanți și fosfat de fludarabină.

Dz: În prima săptămână, se administrează 3 mg alemtuzumab în soluție în prima zi, apoi 10 mg în ziua a doua și 30 mg în ziua a treia. Se va continua administrarea cu 30 mg 3 zile alternativ în fiecare săptămână. Tratamentul poate continua până la 12 săptămâni, în funcție de eficacitate.

Cind: Alergie la alemtuzumab, proteine de origine similară sau la oricare dintre componentii conținuți în fiolă. Infecție, HIV, afecțiuni maligne secundare. Sarcină, alăptare.

Al: Pot apărea reacții adverse după administrarea primei doze de alemtuzumab (acestea se reduc pe măsură ce se continuă tratamentul). Dacă reacțiile adverse sunt severe, se pot administra antihistaminice și analgezice. Tratamentul cu alemtuzumab poate duce la scăderea rezistenței naturale la infecții și necesitatea introducerii unui tratament cu antibiotic. Prudență la pacienți cu vârstă peste 65 ani, afecțiuni cardiace, dureri de piept și/sau tratament pentru reducerea tensiunii arteriale. Se supraveghează constantele sanguine. Femeile aflate la vârstă fertilă trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă sigură în timpul tratamentului și cel puțin 6 luni după încetarea acestuia. Siguranța și eficacitatea alemtuzumab nu au fost stabilite la copii sub 17 ani sau la pacienți cu insuficiență hepatică sau renală. Se oprește alăptarea la începutul tratamentului. Reluarea alăptatului nu trebuie făcută timp de cel puțin 4 săptămâni de la terminarea tratamentului. Trebuie informat medicul asupra altor medicamente administrate concomitent, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală. Nu se administrează timp de 3 săptămâni de la administrarea altor antineoplazice. Nu se face vaccinare în timpul tratamentului și timp de cel puțin 12 luni după terminarea tratamentului.

RA: Reacțiile adverse foarte frecvente: febră, tremurături/frisoane, transpirații, greață (senzația de vomă), vărsături, scăderea tensiunii arteriale, oboseală, erupții cutanate, prurit, dificultate în respirație, dureri de cap, diaree și pierderea apetitului (pot apărea în timpul primei săptămâni de la începerea tratamentului). Pneumonie.

Reacțiile adverse frecvente: hipertensiune arterială, creșterea frecvenței cardiace, palpitații, spasme vasculare, înroșirea feței, scăderea leucocitelor și trombocitelor, vânătăi la locul perfuziei; pierderea gustului, scăderea simțului pipăitului, amețeli, tremurături, agitație, inflamarea ochilor, senzație de înțepături sau de arsuri la nivelul pielii; dureri abdominale, sângerări la nivelul stomacului și intestinului, balonare, iritații și/sau ulceratii în regiunea bucală, disfuncții hepa-tice, constipație, indigestie, flatulență; inflamare și/sau constricție pulmonară, a gâtului și/sau sinusurilor, slabă oxigenare a organelor, tuse, hemoptizie. Tulburări generale: durere, înroșire sau inflamare la locul perfuzării, stare de rău general, slăbiciune, dureri în diferite părți ale corpului (mușchi, spate, piept, oase, articulații).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

Cod ATC: A11CC03

ALPHA D₃ TEVA PHARM. IND. Ltd.; Cps. moi 0,25 µg, 0,50 µg, 1 µg; ct. × 1 fl. × 50 cps. (0,25 µg); ct. × 1 fl. × 30 cps. (0,50 µg, 1 µg) (**P-RF**)

Ind: Tratament curativ al osteodistrofiei renale la pacienți cu insuficiență renală în stadiu de uremie, adulți și copii, înainte de începerea dializei - clearance al creatininei mai mic de 30 ml/min și 1,73 m². Osteodistrofia renală trebuie diagnosticată înainte de începerea tratamentului - prin examen radiologic și/sau creșterea fosfatazei alcaline și scăderea calcemiei sub 95 mg/l. Tratament preventiv al osteodistrofiei renale la copii și adulți cu insuficiență renală, nedializați, numai în caz de hiperparatiroidism diagnosticat și doar după corectarea hiperfosfatemiei. Rahitism pseudocarențial. Rahitism și osteomalacie prin hipofosfatemie vitamino-rezistente, în asociere cu fosfați și vitamina D. Hipoparatiroidism și pseudohipoparatiroidism. Prevenirea hipocalcemiei post-paratiroidectomie în cazul hiperparatiroidismului primar sau terțiar. Osteoporoză.

Dz: Nu este recomandat copiilor cu greutatea sub 20 kg.

Osteodistrofie renală: Doza recomandată pentru tratamentul curativ la adult este de 1-2 µg alfacalcidol pe zi. Se recomandă începerea tratamentului cu 0,5-1 µg alfacalcidol pe zi la adulți și copii cu greutate peste 20 kg. Ulterior, doza se va ajusta pentru a menține un raport fosfo-calcic normal. Doza recomandată pentru tratamentul preventiv este de 0,5-1 µg alfacalcidol pe zi la adult și copii cu greutate mai mare de 20 kg. **Rahitism pseudocarențial:** Se recomandă inițierea tratamentului cu doze de 2-4 µg alfacalcidol pe zi; pentru tratamentul de întreținere se administrează 0,75-2 µg alfacalcidol pe zi. În formele cu alopecie se administrează 5-8 µg alfacalcidol pe zi, în asociere cu fosfați. **Rahitism și osteomalacie prin hipofosfatemie vitamino-rezistente:** Doza recomandată este de 1-6 µg alfacalcidol pe zi, în asociere cu fosfați. **Hipoparatiroidism și pseudohipoparatiroidism:** Doza recomandată la adulți și la copii cu greutate peste 20 kg este de 1-3 µg alfacalcidol pe zi. **Osteoporoză:** Doza recomandată este de 0,5 µg alfacalcidol pe zi. În funcție de răspunsul biochimic, doza inițială va fi ajustată pentru a evita hipercalcemia. Calciul plasmatic va fi determinat inițial săptămânal. Doza de alfacalcidol poate fi mărită la nevoie, prin creșteri de 0,25-0,50 µg pe zi. Cei mai mulți pacienți răspund la doze de 1-3 µg alfacalcidol zi. După stabilirea dozei, calcemia poate fi măsurată o dată la 2-4 săptămâni. Capsulele se vor înghiți cu puțină apă, fără a le mesteca, suge sau sfărâma.

Cind: Hipercalcemie (mai mare de 2,6 mmol/l); hiperfosfatemie (cu excepția celei din hipoparatiroidism); hipermagneziemie; hipersensibilitate la vitamine D sau la oricare dintre componentele produsului.

Al: Hiperparatiroidismul autonom (primar sau terțiar) și osteomalacia prin intoxicație cu aluminiu nu sunt indicații ale tratamentului cu alfacalcidol. Tratamentul trebuie supravegheat prin urmărirea calcemiei și fosfatemiei, precum și a calciuriei, cel puțin o dată la 3 luni. Se va prescrie alfacalcidol numai atunci când există facilități pentru monitorizarea calcemiei și a altor parametri biochimici. Se urmăresc creatinina, magneziul, fosfataza alcalină și

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: G04CA01](#)

XATRAL® LP 5 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. film. elib. prel. 5 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 14 cpr. (**P-6L**)

XATRAL® SR 10 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. elib. prel. 10 mg;
ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

Ind: Manifestările hipertrofiei benigne de prostată.

Dz: Oral, uzual 2,5 mg de 3 ori/zi, maxim 10 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la produs, antecedente de hTA ortostatică, asociere cu alte a1-blocante sau inhibitori de calciu.

Al: La unii subiecți poate apărea hTA ortostatică. La bolnavii cu hipersensibilitate la a1-blocante. Prudență la subiecții tratați cu antihipertensive. În caz de angor trat. va fi întrerupt.

RA: Tulburări digestive, tendințe lipotimice. Senzație de uscăciune a gurii, tahicardie, dureri toracice, astenie, somnolență, erupții cutanate, prurit, înroșirea pielii. La bolnavii cu HTA tratați cu alfuzosin s-au observat uneori: palpații, hTA ortostatică, edeme.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABACAVIRUM
 ABCIXIMABUM
 ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACETETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM

[Cod ATC: M04AA01](#)**ALLOPURINOL** ARENA GROUP SA; Cpr. 100 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)**MILURIT** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 100 mg, 300 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (100 mg), ct. × 1 fl. × 30 cpr. (300 cpr.) (P-6L)

Ind: Reducerea concentrației de urați din fluidele organismului și/sau din urină și pt. a preveni sau opri depunerea de urați/acid uric. Guta idiopatică, litiaza urică, nefropatia urică acută, afecțiuni neoplazice și mieloproliferative cu rată mare de creștere celulară, probleme enzimatice care duc la o producere prea mare de urați și implică: hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaze, inclusiv sindrom Lesch-Nyhan, glucozo-6-fosfataza, incluzând afecțiuni în stocarea de glicogen, sinteza de fosfo-ribozil-pirofosfat, amidotransferaze fosforibozilfosfat, adenin-fosforibozil-transferaze, glutatión reductază, glutamat-dehidrogenază. Este indicat și pt. tratarea calculilor renali și în caz de recurență a calculilor renali micști din oxalat de calciu, în prezența hiperuricozuriei.

Dz: Dozarea se reglează prin monitorizarea concentrației serice de urați și a nivelurilor de urați/acid uric în urină. *Adulți:* Afecțiuni ușoare: 2-10 mg/kg/zi sau 100-200 mg/zi. Afecțiuni moderate sau severe: 300-600 mg/zi. Afecțiuni grave: 700-900 mg/zi. *Copii sub 15 ani:* 10-20 mg/kg/zi. În IR dozele trebuie reduse.

Cind: Intoleranță la allopurinol.

Al: Trat. trebuie oprit imediat când apare o iritație a pielii sau orice alt semn sau hipersensibilitate. Trebuie redusă doza în caz de disfuncții renale sau hepatice grave. Hiperuricemia asimptomatică per se nu este o indicație pentru folosirea allopurinolului. Poate precipita atacurile de gută sau artrita gutoasă. Crește riscul de calculi urinari xantini. Acest risc trebuie redus prin hidratare adecvată. Duce la dizolvarea calculilor renali mari de acid uric, existând apoi posibilitatea fixării lor în ureter. Medicamentele cu activitate uricazică (probenecidul sau dozele mari de salicilați) pot scădea activitatea terapeutică a allopurinolului. Potențează activitatea hipoglicemică a clorpropamidei. A nu se folosi în sarcină decât atunci când nu există o alternativă sigură și când boala în sine comportă riscuri pt. mamă sau copil.

RA: Reacții cutanate (erupții pruriginoase, maculopapulare, uneori cu aspect solzos, alteori înroșit, rar ca exfolieri). Hipersensibilitate generalizată (Reacțiile la nivelul pielii: exfolieri, febră, limfadenopatie, artralgie și/sau eozinofilie, asemănătoare cu sindromul Stevens-Johnson și/sau Lyell apar rar. Reacții asociate la nivel vascular și al țesuturilor se pot manifesta în moduri diferite inclusiv hepatită, nefrită interstițială și, foarte rar, epilepsie). Limfadenopatie angioimunoblastică. Hepatită granulomatoasă. Disfuncții gastrointestinale (greață și vomă, foarte rar hematemeză și steatoree). Ocazional trombocitopenie, agranulocitoză și anemie aplastică. Febră, stare generală proastă, astenie, durere de cap, vertij, ataxie, somnolență, comă, depresie, paralizie, parestezie, neuropatie, probleme vizuale, cataractă, discromie; tulburări de gust, stomatită, modificarea tranzitului intestinal; infertilitate, impotență;

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Toate](#)

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ABCIXIMABUM
ACARBOSUM
ACECLOFENACUM
ACEMETACINUM
ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM

[Cod ATC: G03DC01](#)

ALILESTRENOL 5 mg TERAPIA SA; Cpr. 5 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)

Ind: Iminență de avort; avort habitual; amenințare de naștere prematură.

Dz: Iminență de avort: Oral, 5 mg de 3 ori/zi, 5-7 zile sau mai mult. Avort habitual când sarcina este în curs: 5-10 mg/zi, mai multe luni. Amenințare de naștere prematură: posologie variabilă până la 40 mg/zi (câteva zile).

Cind: Afecțiuni tromboembolice manifeste sau în antecedente, cancer mamar sau genital, sângerări vaginale neregulate nediagnosticate, IH, icter familial, antecedente de sarcină cu icter idiopatic, cu prurit marcat sau herpes.

Al: Prudență la diabetici. Poate interfera cu efectele bromocriptinei și poate crește concentrația plasmatică a ciclosporinelor. Adm. la femeile însărcinate poate provoca fenomene de virilizare a fătului feminin și malformații genitale la fătul masculin. Din această cauză adm. se va face cu precauție.

RA: Greață, vomă. Dureri pelvine, creșterea libidoului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: N05BA12](#)

ACARBOSUM
 ACECLOFENACUM
 ACOMETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM

ALPRAZOLAM LPH® 0,25 mg; ALPRAZOLAM LPH® 0,5 mg; ALPRAZOLAM LPH® 1 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 0,25 mg; 0,5 mg și 1 mg; ct. × 2, 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

FRONTIN EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cpr. (P-RF)

HELEX KRKA; Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-RF)

NEUROL 0,25; NEUROL 1,0; NEUROL 2,0 ZENTIVA AS; Cpr. 0,25 mg, 1 mg și 2 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

PRAZOLEX® 0,25 mg; PRAZOLEX® 0,5 mg; PRAZOLEX® 1 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-RF)

XANAX PHARMACIA & UPJOHN; Cpr. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg și 2 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

XANAX XR PFIZER; Cpr. elib. prel. 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

ZOLAREM 0,5 EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 0,5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Stări anxioase (nevroza anxioasă). Depresie anxioasă. Depresie nevrotică sau reactivă. Stări de panică care evoluează cu sau fără fobie. Blocarea sau atenuarea atacurilor de panică și a fobiei la pacienți care au agorafobie cu atacuri de panică.

Dz: Doza trebuie individualizată în funcție de severitatea simptomelor și de răspunsul fiecărui pacient în parte. Doza zilnică poate varia între 0,25 și

4,5 mg, adm. oral în priză unică sau fracționat. Oprea trat. se face prin reducerea gradată a dozelor.

Cind: Pacienți cu sensibilitate cunoscută la benzodiazepine.

Al: Pot apărea obișnuință și dependență fizică/psihică. Trebuie acordată atenție pacienților cu predispoziție la abuzul de medicamente. Scăderea rapidă sau întreruperea bruscă a trat. determină simptome de abstință. Adm. la pacienții cu depresie severă sau cu tendință la suicid se face cu precauții. Precauții în cazul folosirii pt. trat. stărilor de panică. Precauție la pacienții cu afectare renală sau hepatică. Precauții la copii sub 18 ani. Atenție când este adm. concomitent cu: alte psihotrope, anticonvulsivante, antihistaminice, alcool, alte medicamente care deprimă SNC. Folosirea în primul trimestru de sarcină trebuie evitată. Mamele nu trebuie să alăpteze în timpul trat. cu alprazolam. Pacienții care primesc alprazolam trebuie sfătuiți să nu conducă mașini sau să opereze utilaje periculoase.

RA: Senzație de somnolență și de amețeală. Tulburări de vedere, cefalee, depresie, insomnie, nervozitate/anxietate, tremor, modificări de greutate, tulburări de memorie/amnezie, tulburări de coordonare, diferite simptome gastrointestinale și manifestări vegetative. Distonie, iritabilitate, anorexie, oboseală, vorbire neclară, icter, slăbiciune musculară, modificări ale libidoului, neregularități ale ciclului menstrual, incontinență, retenție de urină și afectarea funcției hepatice. Rar creșterea presiunii intraoculare. Mai puțin frecvente au fost modificarea afectului, dermatită. Dificultăți de concentrare, stări confuzionale, halucinații, excitații, precum și efecte de comportament advers ca iritabilitate, agitație, furie și agresivitate sau reacții de tip ostil.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACECLOFENACUM
 ACOMETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM

Cod ATC: G04BE01

CAVERJECT PHARMACIA & UPJOHN; Liof. pt. sol. inj. 10 µg/ml și 20 µg/ml; ct. × 1 fl. liof. + 1 seringă preumplută × 1 ml solvent (*P-RF*)

MUSE 125 µg; MUSE 250 µg; MUSE 500 µg; MUSE 1000 µg ASTRAZENECA; Sist. transuretral 125 µg, 250 µg, 500 µg, 1000 µg; ct. × 1 sau 6 plicuri × 1 sist. transuretral (*P-RF*)

VASAPROSTAN 20 SCHWARTZ PHARMA; Liof. pt. sol. perf. 20 µg; ct. × 10 f. × 5 ml (*S*)

Ind: Disfuncție erectilă de etiologie neurogenă, vasculară, psihogenă sau mixtă. Ca adjuvant în testele diagnostice ale insuficienței erectiei.

Dz: Doza trebuie individualizată prin tatonare, cu prudență sub supravegherea unui medic. Se începe cu doza cea mai mică, care se crește progresiv în funcție de răspuns. Injectarea intracavernoasă se face obișnuit pe fața dorsală sau laterală a penisului, în treimea proximală, în condiții sterile. *Dozarea inițială în cabinetul medicului:* Tatonarea dozei trebuie începută de la 1,25-2,5 µg alprostadil. În lipsa unui efect satisfăcător urmează creșteri de 5-10 µg. *Terapia de întreținere:* auto-injectarea: Terapia de auto-injectare la domiciliu trebuie începută cu doza stabilită în cabinetul medicului. Frecvența recomandată a injectării este de 3 ori pe săptăm., cu cel puțin 24 de ore între doze. Doza medie de întreținere este 5-20 µg. Nu se recomandă doze de întreținere mai mari de 60 µg. Alprostadilul ca adjuvant în diagnosticul insuficienței erectiei: se va folosi doza care induce o erecție fermă.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la alprostadil; boli care predispun la priapism (anemie cu celule falciforme, mielom multiplu, leucemie); deformații anatomice ale penisului (angulație, fibroză cavernoasă, boala Peyronie); implanturi peniene; activitate sexuală contraindicată.

Al: Poate să apară priapismul. Poate să apară fibroza peniană, incluzând angulație, noduli fibroși și boala Peyronie. Trat. trebuie întrerupt la pacienții care dezvoltă fibroză peniană. Pacienții trebuie instruiți asupra măsurilor de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV și a bolilor transmise prin sânge. Este destinat exclusiv bărbaților în perioada de activitate sexuală. Pacienții aflați sub trat. cu anticoagulate prezintă risc crescut de sângerare după injectarea intracavernoasă.

RA: Durere peniană ușoară-moderată. Fibroza peniană, incluzând angulație, noduli fibroși și boala Peyronie. Hematom și echimoză la locul inj. Priapism. Rar s-au raportat următoarele reacții adverse locale: balanită, hemoragie, inflamație, prurit, edem la locul inj., sângerare uretrală, senzație de căldură, amorteală, infecții micotice, iritație, sensibilizare, fimoză, eritem, mici hemoragii venoase, erecție dureroasă și ejaculare anormală. Rar s-au raportat următoarele evenimente sistemice: durere testiculară, afectare scrotală, hematurie, afectare testiculară, tulburări de micțiune, durere pelvină, hTA, vasodilatație, boli vasculare periferice, extrasistole supraventriculare, reacții vasovagale, hiperestezie, slăbiciune, diaforeză, rash, prurit la distanță de locul injectării, greață, uscăciunea gurii, creșterea creștină a serului, crampe musculare și midriază. Au fost observate modificări hemodinamice

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACETETACINUM
 ACENOCUMAROLUM
 ACETAZOLAMIDUM
 ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM

Cod ATC: B01AD02

ACTILYSE® 50 mg BOEHRINGER INGELHEIM; Pulb. pt. sol. inj. 50 mg (S)

Ind: Tratamentul trombolitic în infarctul miocardic acut (poate reduce mortalitatea la 30 de zile pentru pacienții diagnosticați cu infarct miocardic acut). Tratamentul trombolitic în embolia pulmonară acută masivă cu instabilitate hemodinamică. Tratamentul trombolitic al accidentului vascular ischemic acut.

Dz: Conținutul flaconului de 50 mg substanță activă liofilizată se dizolvă cu apă distilată 50 ml, pentru a obține concentrația necesară de 1 mg/ml care se administrează i.v. Soluția reconstituită poate fi în continuare diluată cu ser fiziologic (0,9%) până la obținerea unei concentrații de minimum 0,2 mg/ml.

Infarctul de miocard: 15 mg prin injectare i.v. în bolus, apoi 50 mg prin perfuzare, în cursul primelor 30 de minute, urmată de perfuzarea a 35 mg, timp de 60 de minute, până la atingerea dozei maxime de 100 mg sau 10 mg, prin injectare i.v. în bolus, 50 mg, prin perfuzare i.v. în cursul primei ore, urmată de perfuzare i.v. a 10 mg, în 30 de minute până la atingerea dozei maxime de 100 mg, în 3 ore. Doza maximă admisă este de 100 mg.

Embolia pulmonară: O doză totală de 100 mg trebuie administrată timp de 2 ore.

Accident vascular ischemic: Doza recomandată este de 0,9 mg/kg (maximum 90 mg) administrată în perfuzie timp de 60 minute, din care 10% din doza totală administrată inițial prin injectare i.v. în bolus.

Cind: Risc crescut de hemoragie prin diateză hemoragică cunoscută (diagnosticată), pacienți care beneficiază de tratament cu anticoagulante orale, ca de ex. warfarina sodică, sângerare periculoasă sau gravă, recentă sau manifestă, intervenții chirurgicale intracraniale sau intraspinale recente, traume cerebrale grave sau antecedente recente de atacuri cerebrale, neoplasm intracranian, malformații arterio-venoase sau anevrism, retinopatie hemoragică, de ex. în diabet (tulburările vizuale pot indica retinopatia hemoragică), masaj cardiac extern traumatizant (mai puțin de 10 zile), manevre obstetricale, puncții recente ale unor vase de sânge necompresibile (de ex. puncție în vena jugulară sau subclaviculară), hipertensiune arterială gravă necontrolată, endocardită de origine bacteriană, pericardită, pancreatită acută, ulcer gastrointestinal depistat în cursul ultimelor 3 luni, varice esofagiene, anevrism arterial, malformații arteriale/venoase, neoplasm cu risc crescut de hemoragie, afecțiuni hepatice grave, inclusiv insuficiență hepatică, ciroză, hipertensiune portală (varice esofagiene) și hepatite active, intervenții chirurgicale majore sau traumatisme grave în decursul ultimelor 3 luni. În cazul accidentului vascular cerebral ischemic, adițional se fac referințe la următoarele contraindicații: antecedente sau hemoragie intracraniană confirmată; suspiciune de hemoragie sub-arachnoidiană; acces de congestie cerebrală; administrarea de heparină în decursul celor 48 de ore ce depășesc atacul apoplectic manifestat-sesizabil prin creșterea valorilor timpului parțial de tromboplastină, determinarea trombocitelor sub 100000/mm³.

A!: Alteplase trebuie folosit numai de medici cu experiență în administrarea tratamentului trombolitic și împreună cu facilitățile oferite de folosirea monitorizării. Riscul de hemoragie intracerebrală este mai mare la pacienții vârstnici.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACENOCUMAROLUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM

[Cod ATC: N04BB01](#)

VIREGYT®-K EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cps. 100 mg; ct. × 1 fl. × 50 cps. (P-6L)

Ind: Afecțiuni idiopatice ale bolii Parkinson și sindroame de origini variate, cu excepția medicamentelor care provoacă parkinsonism.

Dz: Doza zilnică inițială: 100 mg pe o perioadă de 4-7 zile. Doza de întreținere: 200 mg zilnic, după mese. Doza zilnică maximă: 300 mg. Aceasta va trebui ajustată la un dozaj efectiv mai mic, în cazul în care se stabilizează simptomatic boala.

Cind: Hipersensibilitate la medicament, epilepsie, psihoze grave, afecțiuni renale sau hepatice, sarcină și alăptare. Nu se recomandă copiilor sub vârsta de 1 an. Nu se administrează în combinație cu stimulatori SNC. Administrarea amantadinei este contraindicată pe perioada sarcinii și alăptării.

Al: Se recomandă efectuarea terapiei de către un specialist în condiții de spitalizare. În cazul apariției efectelor secundare grave sau a intoleranței, poate fi necesară întreruperea tratamentului. Administrarea clorhidratului de amantadină nu trebuie întreruptă brusc, deoarece la întreruperea bruscă a tratamentului pot să apară crize de tip Parkinson.

RA: Durere epigastrică, uscăciunea cavității bucale, anorexie, nicturie, piele marmorată. În cazuri rare: dereglări psihice (simptome paranoice-depresive). Simptomele dispar de regulă după câteva zile de tratament și nu necesită reducerea dozajului. În cazul dozelor de 300 respectiv 400 mg (sau mai mari) pot apărea stări de tensiune, insomnie, amețală, vorbire necontrolată, ataxie, deconcentrare, stare depresivă, dereglări ale activității cardiace, edem.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACETAZOLAMIDUM
ACETYLCOLINII CHLORIDUM
ACETYLCYSTEINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM

[Cod ATC: R02AA01](#)

AMBASEPT MAGISTRA C&C; Cpr. de supt 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)

FARINGOSEPT® 10 mg; FARINGOSEPT® „L” 10 mg TERAPIA SA; Cpr. de supt 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)

Ind: Profilactic și adjuvant în trat. infecțiilor acute buco-faringiene: gingivite, stomatite, faringite, după amigdalectomie și extracții dentare.

Dz: 30-50 mg ambazonă pe zi, timp de 3-4 zile. Cpr. se lasă să se dizolve lent în gură.

Cind: Copiii sub 2 ani. Alergie la ambazonă.

Al: Cpr. nu se înghit. Precauție în sarcină și alăptare.

RA: Irritație ușoară a mucoasei bucale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: R05CB06](#)

ACETYLCHOLINII CHLORIDUM
 ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
AMBROXOLUM

AMBOLAR DAR AL DAWA; Sirop. 0,3%; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
AMBROHEXAL HEXAL AG; Sirop. 0,3% (15 mg/5 ml); ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
AMBROSANDOZ HEXAL AG; Sirop. 0,3%; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
AMBROXOL GLAXO SMITHKLINE; Sol. orală 7,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (OTC)
AMBROXOL TERAPIA SA; Sol. orală 0,3%; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
AMBROXOL TERAPIA SA; Pic. orale sol. 0,75%; ct. × 1 fl. picurător × 20 ml (OTC)
AMBROXOL EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 30 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
AMBROXOL EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sirop 0,3%; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
AMBROXOL AL SIROP ALIUD PHARMA; Sirop 0,3%; ct. × 1 fl. × 100 sau 250 ml (OTC)
AMBROXOL AL PICĂTURI ALIUD PHARMA; Sol. orală în picături 0,75%; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (OTC)
AMBROXOL AL 30 ALIUD PHARMA; Cpr. 30 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 30 cpr. (OTC)
AMBROXOL CLORHIDRAT 30 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 30 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (OTC)
AMBROXOL 30 mg VIM SPECTRUM SRL; Cpr. 30 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
AMBROXOL Q BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS Ltd.; Cpr. 30 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
MUCOANGIN® BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. pt. supt 20 mg; ct. × 1, 2, 4 sau 5 blist. × 10 cpr. (OTC)
MUCOSIN CU MIERE SIROP ZENTIVA AS; Sirop 3 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
MUCOSIN CU MIERE PICĂTURI ORALE ZENTIVA AS; Sol. orală 7,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml (OTC)
MUCOSOLVAN® BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 30 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
MUCOSOLVAN® BOEHRINGER INGELHEIM; Sirop 30 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
MUCOSOLVAN® JUNIOR BOEHRINGER INGELHEIM; Sirop 15 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
MUCOSOLVAN® RETARD BOEHRINGER INGELHEIM; Cps. elib. prel. 75 mg; ct. × 1, 2, 5 sau 10 blist. × 10 cps. (OTC)
MUXOL LAB. LEURQUIN; Cpr. 30 mg; ct. × 1 blist. × 30 cpr. (OTC)
MUXOL LAB. LEURQUIN; Sol. orală 3 mg/ml; ct. × 1 fl. × 180 ml (OTC)

Ind: Boli respiratorii acute și cronice, exacerbări acute în BPOC, prevenirea complicațiilor pulmonare postoperatorii.

Dz: Cpr. a 30 mg ambroxol clorhidrat: *Adulți:* 30 mg × 3/zi, uneori 60 mg × 2/zi. Sirop cu 30 mg/5 ml: *Adulți și copii peste 12 ani:* 10 ml (2 lingurițe) de 2 ori pe zi, aproximativ 14 zile. *La copiii mai mici de 12 ani* se recomandă doze mai mici, în funcție de vârstă.

Cind: Hipersensibilitate la ambroxol sau alți componenți ai produsului.

Al: Adm. concomitentă cu antibiotice (amoxicilină, cefuroxim, eritromicină, doxiciclină) duce la creșterea concentrației antibioticului în țesutul pulmonar. Adm. în primul trimestru de sarcină se va face numai la indicația medicului.

RA: Tulburări gastrointestinale. Reacții alergice mai ales la pacienții atopici.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACETYLCYSTEINUM
 ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYSALYCILICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM

Cod ATC: A08AA03

REGENON® TEMMLER PHARMA; Cps. moi 25 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 30 cps. (P-RF)

REGENON® RETARD TEMMLER PHARMA; Cps. elib. prel. 60 mg; ct. × 3 sau 6 blist. × 10 cps. (P-RF)

Ind: Terapie de întreținere a pacienților cu obezitate și cu un indice al masei corporale de cel puțin 30 kg/m² care nu au obținut rezultate numai cu un regim corespunzător.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* de 3 ori pe zi câte 25 mg amfepramonă. Doza zilnică să nu depășească 75 mg. Ultima adm. să se facă cu cel puțin 4 ore înainte de culcare. Durata trat. este de 4-6 săptăm. și nu va depăși trei luni.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la una dintre ingrediente; tahicardie paroxistică; tahiaritmie; feocromocitom; hipertiroidism; forme severe de angină pectorală; glaucom cu unghi închis; hipertensiune pulmonară; HTA severă; antecedente sau afecțiuni cardiovasculare sau cerebrovasculare; antecedente sau afecțiuni psihice incluzând anorexia nervoasă și depresia; tendință la abuz de medicamente, dependență de droguri sau alcool; ateroscleroză avansată; copii sub 12 ani. Este cind. asocierea cu orice alt produs anorexigen cu activitate centrală datorită riscului de hipertensiune pulmonară, potențial letal. Amfepramona va fi adm. cu prudență deosebită în: afecțiuni ale prostatei cu formare de reziduu urinar; în boli metabolice (de ex. diabetul zaharat); în boli cardiace.

Al: Risc de supradozare și dependență. Poate produce tulburări psihice. Întreruperea bruscă a trat. poate determina astenie psihică și stări depresive. Intoxicația cronică se manifestă prin dermatoze severe, insomnie marcată, iritabilitate, hiperactivitate și tulburări de personalitate. Cea mai severă manifestare a intoxicației cronice este psihoza. Nu va fi prescris pacienților cu boli cardiovasculare, cerebrovasculare, epileptici. Au fost menționate cazuri grave de hipertensiune pulmonară. Atenție în cazul asocierii cu: amine adrenergice, antidepresive, amantadina, IMAO, anestezice, antihipertensive (guanetidină, a-metildopa), neuroleptice. Nu se recomandă adm. în sarcină și în perioada de alăptare. Participarea la traficul rutier sau desfășurarea unor activități de precizie trebuie evitate.

RA: Hipertensiune pulmonară. Toleranță, dependență și sindrom de abstință. La nivel SNC: reacții psihotice sau psihoze, stări depresive, nervozitate, agitație, tulburări de somn și vertij. Ocazional: stare tensională, iritabilitate, amețeli sau cefalee, diskinezii, tulburări de vedere, hiperexcitabilitate, anxietate, euforie, disforie, tremor, midriază, somnolență sau influențarea stării generale. S-au semnalat crize comițiale. La nivel CV: tahicardie, palpitații, HTA, durerile precordiale, accidente cardiovasculare sau cerebro-vasculare, angină pectorală, IM, IC și stop cardiac, aritmii și modificări ECG, foarte rar hTA. La nivel gastrointestinal: uscăciunea mucoasei bucale, constipație, greață, diaree, crampe abdominale, gust neplăcut. Sistem endocrin: impotență, modificări de libidou, ginecomastie sau tulburări de ciclu. Sistem hematopoietic: depresie medulară, agranulocitoză, leucopenie sau trombocitopenie. Reacții alergice sau pseudoalergice cutanate. Au fost menționate diverse cazuri de.: disurie, dispnee, alopecie, mialgie, transpirație și poliurie. Există riscul supradozării și dezvoltării fenomenului de dependență. Adm. în doze mari și o perioadă îndelungată poate duce la grave tulburări psihice (halucinații și psihoze).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACICLOVIRUM
 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
 ACIDUM ALENDRONICUM
 ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM

Cod ATC: V03AF05

ETHYOL SCHERING PLOUGH EUROPE; Liof. pt. sol. perf. 375 mg, 500 mg; ct. × 3 fl., respectiv ct. × 5 fl. (S)

Ind: În chimioterapie amifostina este indicată pentru scăderea riscului de infecție legat de neutropenie (ex. febră neutropenică), provocat de terapia asociată cu ciclofosamidă și cisplatină la pacienții cu carcinom ovarian în stadiu avansat (stadiul III sau IV FIGO). Amifostina este indicată pentru a proteja pacienții cu tumori solide non-germinale, în stadiu avansat, de nefrotoxicitatea cumulativă a regimurilor care conțin cisplatină, în cazul în care dozele unice de cisplatină variază între 60-120 mg/m², în asociere cu măsuri adecvate de hidratare. Radioterapie: Amifostina este indicată la pacienții cu cancer la nivelul capului și gâtului, tratați cu radioterapia standard fracționată, pentru a proteja împotriva xerostomiei acute și tardive.

Dz: Înaintea administrării i.v., amifostina se reconstituie cu 7,3 ml soluție sterilă de clorură de sodiu 0,9%. Amifostina se utilizează exclusiv sub supravegherea medicilor cu experiență în chimioterapie sau radioterapie antineoplazică.

În chimioterapie, doza inițială recomandată de amifostină este de 910 mg/m², administrată o dată pe zi, sub forma unei perfuzii i.v. cu o durată de 15 minute, începând cu 30 de minute înaintea chimioterapiei cu agenți administrați prin perfuzie de scurtă durată. Pentru doze de cisplatină de 100-120 mg/m², doza inițială recomandată de amifostină este de 910 mg/m², administrată sub forma unei perfuzii cu o durată de 15 minute, începând cu 30 de minute înaintea chimioterapiei. Dacă doza de cisplatină este între 60-100 mg/m², doza inițială recomandată de amifostină este de 740 mg/m², administrată sub forma unei perfuzii cu o durată de 15 minute, începând cu 30 de minute înaintea chimioterapiei. Dacă amifostina se folosește pentru a proteja împotriva manifestărilor toxice asociate radioterapiei, doza recomandată de amifostină este de 200 mg/m², administrată zilnic sub forma unei perfuzii i.v. cu o durată de 3 minute, începând cu 15-30 de minute înaintea radioterapiei standard fracționate.

Cind: Hipersensibilitate la amifostină, la alți aminotoli sau la celelalte componente ale produsului; hipotensiune arterială sau stare de deshidratare; întrucât amifostina se administrează în asociere cu medicamente cunoscute pentru efectul lor teratogen și mutagen, această terapie nu se va administra femeilor însărcinate sau celor care alăptează; la pacienții cu afectare renală sau hepatică, la copii sau la pacienții în vârstă de peste 70 de ani, amifostina este contraindicată acestor grupe de pacienți.

Al: Înaintea administrării perfuziei cu amifostină, pacienții trebuie să fie hidratați corespunzător, iar în timpul administrării perfuziei cu soluția reconstituită de amifostină, pacienții trebuie menținuți în clinostatism. Dacă tensiunea arterială scade, pacienții trebuie așezați în poziție Trendelenburg și li se va administra o perfuzie cu ser fiziologic. Hipotensiunea arterială poate să apară în cursul sau la puțin timp după administrarea perfuziei cu amifostină, chiar și în condițiile unei hidratări adecvate sau a unei poziții corecte a pacientului. Amifostina nu este indicată în cazul în care glandele parotide nu sunt cuprinse în zona de iradiere. Această terapie nu se va administra femeilor gravide. Dacă pacienta rămâne însărcinată în timpul administrării tratamentului, trebuie să se evalueze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: J01GB06](#)

ACIDUM ACETYSALYCILICUM
ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM

AMIKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB; Sol. inj. i.m./i.v. 250 mg/ml; ct. × 1 fl. × 2 sau 4 ml (**P-RF**)

AMIKOZIT ECZACIBASI ILAC; Sol. inj. 100 mg/2 ml, 500 mg/2 ml; ct. × 1 fl. × 2 ml (**P-RF**)

ORLOBIN HELP PHARMACEUTICALS Ltd.; Sol. inj. 250 mg/ml; ct. × 1 fl. × 2 ml (**P-RF**)

PIERAMI LAB. FOURNIER; Sol. inj. 50 mg/ml; 125 mg/ml;
250 mg/ml sulfat de amikacină; ct. × 5 sau 100 f. × 2 ml (**S/P-RF**)

Ind: Infecții cauzate de tulpini microbiene sensibile la amikacină. În bacteriemie și septicemie; în infecții grave ale tractului respirator, ale oaselor și articulațiilor, ale SNC, ale pielii și ale țesuturilor moi; infecțiile intraabdominale; în infecțiile la arși și post-operatorii, în infecții grave, complicate și repetate ale tractului urinar.

Dz: I.m. sau i.v.. Este necesară evaluarea funcției renale prin testarea concentrației serice a creatininei și prin clearance-ul creatininei. Doza uzuală i.m. sau i.v. pentru adulți, copii și sugarii mari, cu funcția renală normală este de 15 mg/kg/zi, divizată în doză unică sau în două sau trei doze egale adm. la 8-12 ore. La nou-născuți doza folosită este mai mică. La pacienții cu afectare renală (clearance la creatinină < 50 ml/min) nu se recomandă adm. amikacinei într-o doză unică zilnică. Dozele trebuie să fie ajustate fie prin adm. de doze normale la intervale de timp prelungite, fie prin adm. unor doze reduse.

Cind: Hipersensibilitate la amikacină în antecedente.

Al: Risc de ototoxicitate și nefrotoxicitate. Pacienții trebuie să fie bine hidratați. Dacă apare hiperazotemia sau oliguria, trat. trebuie să fie imediat întrerupt. În cazul asocierii cu anestezice sau cu relaxante musculare, poate apărea blocaj neuromuscular cu paralizie a mușchilor respiratori. Trebuie să fie adm. cu atenție la pacienții cu miastenia gravis sau cu boala Parkinson. Poate provoca, la pacienții sensibili, reacții alergice și crize de astm bronșic. Asocierea cu alte medicamente ototoxice și/sau nefrotoxice trebuie evitată. Adm. concomitentă cu diuretice cu acțiune rapidă prezintă risc major de surditate ireversibilă. La femeia gravidă (ca și la nou-născut), trebuie utilizată numai când este absolut necesar.

RA: Ototoxicitate, nefrotoxicitate și blocaj neuromuscular. Erupecie cutanată, febră, parestezii, eozinofilie, anemie, artralгии, hipomagneziemie, greață, vărsături și hTA.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM ALENDRONICUM
ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM

Cod ATC: L02BG01

ROGLUTEN® 250 mg SINDAN SRL; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (S/P-RF)

Ind: Cancer de sân; hipercorticism, unele cazuri de hiperaldosteronism.

Dz: Oral, 250-500 mg de 1-6 ori/zi în funcție de afecțiune. Ultima priză trebuie adm. seara, înainte de culcare.

Cind: În premenopauză; porfirie; hipersensibilitate la aminoglutetimidă, sarcină și alăptare.

Al: Crește metabolizarea unor glucocorticoizi și a anticoagulantelor cumarinice; nu se asociază diuretice și antitiroidiene; se vor evita băuturile alcoolice.

RA: Obnubilare, letargie, ataxie. În primele două săptăm. apare un exantem însoțit uneori de febră, care poate să dispară după 7-10 zile; persistența acestuia impune întreruperea trat. Diminuări ale funcției tiroidiene și modificări ale formulei sanguine. Tulburări gastrointestinale (greață, diaree).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: R03DA05](#)

ACIDUM ALFA-LIPOICUM (ACIDUM THIOCTICUM)
 ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM

AMINOFILINĂ BIO EEL SRL; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. (P-RF)

AMINOFILINĂ ARENA; Cpr. 100 mg, 200 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)

MIOFILIN® 100 mg ZENTIVA ROMANIA; Cps. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)

MIOFILIN® ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 24 mg/ml; ct. × 5 sau 100 f. × 2 sau 10 ml (S/P-RF)

MIOZONE OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Criza de astm bronșic, astm bronșic cronic și bronșite obstructive reversibile, bronchoconstricție de efort.

Dz: Inj. i.v. (10 ml timp de 5 minute) lent sau perf. i.v., numai în cazurile de urgență. Doza uzuală este de 4-6 mg/kg o dată până la 3 ori/zi. Inj. i.m. se va face în doze de 500-1000 mg pe zi. Oral, uzual 100-200 mg de 3-4 ori/zi. Cpr. ret.: 175-350 mg la fiecare 12 ore. Doza poate fi crescută gradat la 700 mg aminofilină. Intrarectal, prin supozitoare, în doze de 360-720 mg zilnic.

Cind: Epilepsie. Adm. inj. este cind. în IMA.

Al: Precauție, dozele vor fi scăzute, la pacienții cu IH și la pacienții cu IC acută. Eliminarea este redusă în cazul asocierii medicamentului cu antibiotice macrolidice. Inj. i.v. prea rapide pot fi fatale la pacienții cu IM recent. Precauție la pacienții hipersensibili la teofilină. Nu este recomandată pe timpul sarcinii. Nu va fi adm. împreună cu alte preparate xantينية (cafea, ceai). În trat. IC congestive trebuie avut în vedere că stimulează centrul respirator și de aceea trebuie asociată cu morfina.

RA: Efecte cardiovasculare: scăderea presiunii arteriale și dureri precordiale. Durere trecătoare la locul inj. i.m. Adm. oral: tulburări gastro-intestinale, stimularea SNC (cefalee, anxietate). Sup. pot cauza proctite.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: C01BD01](#)

ACIDUM ASCORBICUM
 ACIDUM AZELAICUM
 ACIDUM CLODRONICUM
 ACIDUM CROMOGLICICUM
 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
 ACIDUM FOLICUM
 ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM

AMIODARONĂ ARENA GROUP SA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-RF)
AMIODARONĂ 200 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
AMIODARONĂ LPH® 200 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
AMIODARONĂ 200 mg TERAPIA SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
AMIOKORDIN KRKA; Cpr. 200 mg; ct. × 3 sau 6 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CORDARONE® 150 mg/3 ml SANOFI~SYNTHELABO; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 6 f. × 3 ml (S)
CORDARONE 200 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. diviz. 200 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
DARITMIN® 200 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-RF)
MIORITMIN 200 mg AC HELCOR SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 30 cpr. (P-RF)
SEDACORON EBEWE PHARMA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-RF)
SEDACORON EBEWE PHARMA; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 3 ml (S)

Ind: Tulburări de ritm severe: tulburări de ritm supraventriculare, cu ritm ventricular rapid; tahicardie în cadrul sindromului WPW; tulburări de ritm ventricular confirmate, simptomatice și invalidante.

Dz: *Perf. i.v.:* Trat. inițial: doza uzuală este 5 mg/kg în soluție glucozată izotonă, adm. în timp de 20 de minute până la 2 ore. Trat. de întreținere: 10-20 mg/kg și zi (obișnuit 600-800 mg/zi cel mult 1,2 g/zi) în 250 ml soluție glucozată izotonă, timp de câteva zile. Treptat se înlocuiește cu trat. oral. *Adm. oral:* *Adulți:* Doza de atac: 600 mg, maxim 1000 mg/pe zi timp de 8-10 zile. Doza de întreținere: 200-400 mg/zi, timp de 5 zile pe săptăm. (2 zile pauză, neconsecutiv). *Copii:* Doza de atac se calculează în funcție de suprafața corporală. Doza de întreținere este jumătate din cea de atac. Se adm. 5 zile/săpt.

Cind: Hipersensibilitate la iod, la amiodaronă sau la celelalte componente ale produsului. Bradicardie sinusală și bloc sinoatrial fără pacemaker. Boala nodului sinusal fără pacemaker. Tulburări de conducere de grad înalt fără pacemaker. Colaps cardiovascular, hTA severă. Hipertiroidism. Sarcină în trimestrele II și III. Alăptare. Copii sub 3 ani. Nu se asociază cu anumite medicamente care pot provoca "torsada vârfurilor".

Al: Nu trebuie adm. pe cale venoasă periferică. Perturbările electrolitice, în particular hipokaliemia, pot favoriza apariția efectelor proaritmice. Se recomandă monitorizarea regulată a testelor funcționale hepatice. Nu este recomandabilă asocierea cu: astemizol, terfenadină, halofantrină, pentamidină, laxative stimulante (iritante), diltiazem injectabil, beta-blocante, altele decât esmolol. Necesită precauție asocierea cu: anticoagulante orale, ciclosporină, diltiazem oral, digitalice, esmolol, medicamente hipokaliemiante (diuretice care provoacă pierdere de potasiu, corticosteroizi sistemici, tetracosactid; amfotericina B intravenos). Crește concentrația plasmatică a fenitoinăi cu semne de supradozare. Asocierea cu tacrin prezintă risc de bradicardie excesivă. Asocierea cu anestezice generale are risc de complicații potențial severe.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM AZELAICUM
ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM

[Cod ATC: N05AL05](#)

SOLIAN® 50 mg; SOLIAN® 100 mg; SOLIAN® 200 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

SOLIAN® 400 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. film. 400 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Psihoze. Stări productive: schizofrenie paranoică și productivă. Stări deficitare: schizofrenie, procese psihotice reziduale, stări de inhibiție cu retardare.

Dz: Oral, 50-250 mg pe zi.

Cind: Alergie la oricare dintre ingrediente. Sarcină sau alăptare. Tumoră prolactinică sau cancer mamar.

Al: Boli renale, boală Parkinson sau antecedente de crize epileptice. La copii. Poate altera capacitatea de a conduce vehicule sau de a utiliza mașini.

RA: Insomnie, agitație, somnolență, amețeală, tulburări gastrointestinale, neliniște, galactoree, amenoree sau tulburări de menstruație, ginecomastie, dureri de sân, disfuncții de orgasm și potență, creștere în greutate. Rar: rigiditate musculară, spasm sau hipersalivație. Extrem de rar: febră inexplicabilă, tulburări de cunoștință.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ACIDUM CLODRONICUM
ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTILINUM

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: N06AA09](#)

AMITRIPTILIN 25 R. DE SITIN; AMITRIPTILIN 50 R. DE SITIN *DESITIN*; Cps. ret. 25 mg, 50 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. **(P-RF)**
AMITRIPTILINĂ 25 mg *TERAPIA SA*; Cpr. film. 25 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Sindroame depresive cu componentă anxioasă. Psihoze sau nevroze. Enurezis nocturn. Algii rebele, migrenă.

Dz: Stări depresive: oral 75-150 mg/ zi, în 2-3 prize (seara o doză mai mare); la bolnavii spitalizați 100-300 mg/zi; la tineri și bătrâni 50 mg/zi. Doza de întreținere la *adulți* este de 50-100 mg/zi. După obținerea efectului scontat se scade posologia până la stabilirea dozei minime eficace, care se administrează timp de 3 luni (sau mai mult), pentru prevenirea recăderilor. Enurezis nocturn: *copii sub 6 ani*, 10 mg la culcare; *copii 6-10 ani*, 10-20 mg/zi; *copii 11-16 ani*, 25-50 mg/ zi. Migrene și alte algii rebele: oral, 12,5-25 mg de 3 ori/zi.

Cind: Copii sub 6 ani; alergie la amitriptilină; IM; aritmii, BAV; IH; glaucom cu unghi îngust; adenom de prostată; psihoză maniactală. Asocierea cu IMAO.

Al: A nu se consuma băuturi alcoolice! Prudență la: epileptici, cardiaci, hepatici, hipertiroidieni. Hipnoticele, tranchilizantele și alte deprimante centrale, potențează acțiunea amitriptilinei. Crește efectul altor antidepresive, anticolinergice, simpatomimetice directe, hormoni tiroidieni. Antagonizează efectul antihipertensiv al guanetidinei și clonidinei. A se evita adm. în primul trimestru de sarcină și în timpul alăptării. Diminuează performanțele psihomotorii ale bolnavului. Atenție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Sedare, uscăciune a gurii, constipație, micțiune dificilă, tahicardie, tulburări de acomodare și tremor; la psihotici favorizează apariția delirului; rareori: hTA, sudorație; foarte rar: tulburări extrapiramidale, discrazii sanguine, convulsii. În stările depresive poate crește riscul suicidar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: C08CA01](#)

ACIDUM CROMOGLICICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM

AMLODIPIN 5 mg; AMLODIPIN 10 mg VIM SPECTRUM SRL; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
AMLODIPIN AL 5; AMLODIPIN 10 ALIUD PHARMA; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
AMLOHEXAL® 5 mg; AMLOHEXAL® 10 mg HEXAL AG; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CRISTACOR LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
TENOX® 5; TENOX® 10 KRKA; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 sau 9 blist. × 10 cpr. (P-6L)
NORVASC PFIZER; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: HTA. Angina stabilă și angina Prinzmetal (sau angina variabilă). IC cronică severă (Clasa NYHA III-IV) fără semne clinice sau simptome de ischemie majoră.

Dz: Oral, 5-10 mg o dată pe zi.

Cind: Sensibilitate cunoscută la dihidropiridine.

Al: Precauție la pacienți cu IH. Prudență la gravide sau femei care alăptează.

RA: Cefalee, edeme, fatigabilitate, somnolență, greață, dureri abdominale, roșeață, palpitații și amețeli. Mai puțin frecvente: modificări ale dinamicii intestinale, artralгии, astenie, dispepsie, dispnee, hiperplazie gingivală, ginecomastie, impotență, polachiurie, modificări de dispoziție, crampe musculare, mialgii, prurit, rash, tulburări de vedere și rar eritem polimorf. Foarte rar, icter și creșteri ale enzimelor hepatice. Următoarele efecte adverse au fost raportate rar și nu se poate face distincția de istoria bolii de bază; IM, aritmie (incluzând tahicardia ventriculară și fibrilația atrială) și precordialgii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM

[Cod ATC: N05CA](#)

AMITAL 200 ARENA GROUP SA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)

Ind: Insomnie, stări anxioase, hiperexcitație nervoasă; pregătirea intervențiilor chirurgicale și a anesteziei generale.

Dz: Oral, 100 mg seara la culcare ca hipnotic, 25-50 mg de 2-3 ori/zi ca sedativ.

Cind: Alergie sau intoleranță la barbiturice, porfirie hepatică acută, insuficiență respiratorie, IH și IR avansată, leziuni miocardice grave, dureri rebele, alcoolism sau dependență medicamentoasă în antecedente.

Al: Prudență la bătrâni și la copii. Prudență la asocierea cu alte deprimante centrale, inclusiv băuturile alcoolice; poate scădea eficacitatea anticoagulantelor cumarinice, griseofulvinei, rifampicinei, a medicamentelor steroidice, inclusiv asociațiile estro-progestative, a fenitoiniei, fenotiazinelor, antidepresivelor triciclice. Prudență la femeile însărcinate și în perioada de alăptare. Se evită adm. la șoferi și la cei cu activități de precizie.

RA: Oboseală, diminuarea performanțelor psihomotorii, amețeli, rar agitație și stare confuzivă, erupții cutanate alergice; dozele mari și folosirea timp îndelungat pot determina toleranță și dependență, tulburări de somn și tulburări psihice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FUSIDICUM
ACIDUM GADOBENICUM
ACIDUM GADOPENTETICUM
ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

[Cod ATC: J01CR02](#)

AMOKSIKLAV® 2X LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 625 mg (500 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic), 1 g (875 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic); ct. × 2 blist. × 7 cpr. **(P-RF)**

AMOKSIKLAV®; AMOKSIKLAV® FORTE LEK PHARMACEUTICALS; Pulb. susp. orală 156,25 mg/5 ml (125 mg amoxicilină și 31,25 mg acid clavulanic), respectiv 312,5 mg/5 ml (250 mg amoxicilină și 62,5 mg acid clavulanic); ct. × 1 fl. pulb. pt. 100 ml susp. **(P-RF)**

AMOKSIKLAV® LEK PHARMACEUTICALS; Pulb. sol. inj. 600 mg (500 mg amoxicilină și 100 mg acid clavulanic), 1200 mg (1000 mg amoxicilină și 200 mg acid clavulanic) **(P-RF)**

AMOXIPLUS 600 mg; AMOXIPLUS 1,2 g ANTIBIOTICE SA; Pulb. sol. inj./perf. 600 mg (500 mg amoxicilină și 100 mg acid clavulanic), 1200 mg (1000 mg amoxicilină și 200 mg acid clavulanic) **(P-RF)**

AUGMENTIN® BIS 625 mg, AUGMENTIN BIS 1 g GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 625 mg (500 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic), 1 g (875 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic); ct. × 2 blist. × 7 cpr. **(P-RF)**

AUGMENTIN® GLAXO SMITHKLINE; Pulb. susp. 457 mg (400 mg amoxicilină și 57 mg acid clavulanic)/5 ml; ct. × 1 fl. cu pulb. pt. 35 ml, 70 ml sau 140 ml susp. orală **(P-RF)**

AUGMENTIN® INTRAVENOS 600 mg, AUGMENTIN® INTRAVENOS 1,2 g, AUGMENTIN® INTRAVENOS 2,2 g GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. sol. perf. 600 mg, 1,2 g sau 2,2 g **(S)**

AUGMENTIN® SR GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. elib. prel. 1062,5 mg (1000 mg amoxicilină și 62,5 mg acid clavulanic); ct. × 7 blist. × 4 cpr. **(P-RF)**

AUGMENTIN® ES GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. susp. orală 642,9 mg (600 mg amoxicilină și 42,9 mg acid clavulanic)/5 ml; ct. × 1 fl. cu pulb. pt. 100 ml susp. **(P-RF)**

BIOCLAVID® 625 mg; BIOCLAVID® 1000 mg SANDOZ GmbH; Cpr. film. 625 mg (500 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic), 1000 mg (875 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic); ct. × 14 cpr. **(P-RF)**

BIOCLAVID® SANDOZ GmbH; Pulb. susp. orală 156,25 mg/5 ml (125 mg amoxicilină și 31,25 mg acid clavulanic), 312,5 mg/5 ml (250 mg amoxicilină și 62,5 mg acid clavulanic); ct. × 1 fl. pulb. pt. 60 sau 100 ml susp. **(P-RF)**

CLAVUMOX DUO 625 mg; CLAVUMOX DUO 1 g GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 625 mg, 1 g; ct. × 14 cpr. **(P-RF)**

CLAVUMOX DUO GLAXO SMITHKLINE; Pulb. susp. 457 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 35, 70 sau 140 ml susp. **(P-RF)**

FORCID SOLUTAB ASTELLAS PHARMA; Cpr. disp. 156,25 mg (125 mg amoxicilină + 31,25 mg acid clavulanic), 312,5 mg (250 mg amoxicilină + 62,5 mg acid clavulanic), 468,75 mg (375 mg amoxicilină + 93,75 mg acid clavulanic), 625 mg (500 mg amoxicilină + 125 mg acid clavulanic), 1000 mg (875 mg amoxicilină + 125 mg acid clavulanic); ct. × 5 blist. × 4 cpr. (156,25 mg, 312,5 mg, 468,75 mg, 625 mg), ct. × 2 blist. × 7 cpr. (1000 mg) **(P-RF)**

MEDOCLAV MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. susp. 156,25 mg/5 ml (125 mg amoxicilină și 31,25 mg acid clavulanic/5 ml); ct. × 1 fl. cu pulb. pt. 100 ml susp. **(P-RF)**

MEDOCLAV FORTE MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. susp. 312,5 mg/5 ml (250 mg amoxicilină și 62,5 mg acid clavulanic/5 ml); ct. × 1 fl. cu pulb. pt. 100 ml susp. **(P-RF)**

MEDOCLAV 375 mg MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. film. 375 mg (250 mg amoxicilină și 125 mg acid clavulanic); ct. × 4 blist. × 4 cpr. **(P-RF)**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: J01CA04](#)

ACIDUM FUSIDICUM
 ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM

AMOXICILINĂ 250 mg; AMOXICILINĂ 500 mg ARENA GROUP SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 2 sau 100 blist. × 5 cps. (S/P-RF)
AMOXICILINĂ 250 mg; AMOXICILINĂ FORTE 500 mg LEK PHARMATECH; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
AMOXICILINĂ 125 mg/5 ml; AMOXICILINĂ 250 mg/5 ml LEK PHARMATECH; Pulb. susp. orală 125 mg/5 ml; 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 20 g pulb. pt. 60 ml suspensie orală (P-RF)
AMOXICILINĂ 250 mg; AMOXICILINĂ FORTE 500 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
AMOXICILINĂ 125 mg/5 ml; AMOXICILINĂ 250 mg/5 ml OZONE LABORATORIES Ltd.; Pulb. susp. orală; ct. × 1 fl. cu pulb. pt. 60 ml susp. orală (P-RF)
AMOXICILINĂ ANTIBIOTICE SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 1, 2 sau 100 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
AMOXICILINĂ 250 EUROPHARM SA; Cps. 250 mg; ct. × 1 blist. × 12 cps. (P-RF)
AMOXICILINĂ FORTE 500 mg FARMEX COMPANY; Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
AMOXICILINĂ FORTE 500 mg MARK PHARMACEUTICS; Cps. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
DISPAMOX LEK PHARMATECH; Cpr. disp. 1 g; ct. × 1 blist. × 6 cpr. (P-RF)
DUOMOX ASTELLAS PHARMA; Cpr. 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg; ct. × 4 blist. × 5 cpr. (P-RF)
E-MOX® E.I.P.I.C.O.; Cps. 500 mg; ct. × 1 blist. × 8 cps. (P-RF)
E-MOX® E.I.P.I.C.O.; Pulb. susp. 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 60 ml susp. (P-RF)
EPHAMOX EUROPHARM SA; Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. (P-RF)
JULPHAMOX GULF PHARMACEUTICAL IND. (JUPHAR); Pulb. susp. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 100 ml susp. (P-RF)
MOXILEN MEDOCHEMIE Ltd.; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cps. (P-RF)
MOXILEN; MOXILEN FORTE MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. susp. 125 mg/5 ml, 250 mg/ml; ct. × 1 fl. cu pulb. pt. 60 ml susp. (125 mg/5 ml), respectiv ct. × 1 fl. cu pulb. pt. 60 sau 100 ml susp. (250 mg/5 ml) (P-RF)
OSPAMOX® 250 mg; OSPAMOX® 500 mg; OSPAMOX® 1000 mg SANDOZ GmbH; Cps. 250 mg; Cpr. film. 500 mg și 1000 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. (250 mg), ct. × 2 blist. × 6 cpr. (500 mg, 1000 mg) (P-RF)
OSPAMOX® 125 mg/5 ml; OSPAMOX® 250 mg/5 ml SANDOZ GmbH; Gran. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × pulb. pt. 60 sau 100 ml suspensie (P-RF)
RANOXIL 125 mg/5 ml; RANOXIL 250 mg/5 ml RANBAXY; Gran. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 20 g pulb. pt. 100 ml suspensie (P-RF)

Ind: Trat. infecțiilor produse de microorganisme sensibile la amoxicilină: Bronșită acută și acutizări ale bronșitei cronice; pneumopatii acute; infecții ORL; infecții ale aparatului urinar; infecții gonococice endocervicale și uretrale

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM GADOBENICUM
 ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM

[Cod ATC: J01CA01](#)

AMPICILINĂ ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 500 mg, 1 g; ct. × 3 sau 100 fl. (S/P-RF)
AMPICILINĂ ANTIBIOTICE SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
AMPICILINĂ ARENA GROUP SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 fl. × 10 sau 1000 cps. (S/P-RF)
AMPICILINĂ 250 mg; AMPICILINĂ FORTE 500 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
AMPICILINĂ SICOMED SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 fl. × 16 cps. (P-RF)
AMPICILINĂ 250 mg EUROPHARM SA; Cps. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
AMPICILINĂ LEK PHARMATECH; Pulb. susp. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 60 ml susp. (P-RF)
AMPICILINĂ 250 mg; AMPICILINĂ FORTE LEK PHARMATECH; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
AMPICILINĂ 250 mg; AMPICILINĂ 500 mg; AMPICILINĂ 1 g FARMACO SA; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 500 mg, 1 g; ct. × 12 sau 100 fl. (S/P-RF)
AMPICILINĂ FORTE FARMEX COMPANY; Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
AMPICILINĂ FORTE 500 mg MARK PHARMACEUTICS; Cps. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
AMPIDAR DAR AL DAWA; Cps. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
EPHICILIN EUROPHARM SA; Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. (P-RF)
EPICOCILLIN E.I.P.I.C.O.; Cps. 250 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. (P-RF)
EPICOCILLIN E.I.P.I.C.O.; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; ct. × 1, 12 sau 50 fl. (S/P-RF)
PAMECIL MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. pt. inj. 250 mg, 500 mg sau 1 g; ct. × 10, 50 sau 100 fl. (S/P-RF)
STANDACILLIN® 250 mg; STANDACILLIN® 500 mg SANDOZ GmbH; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 12 cpr; ct. × 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
STANDACILLIN® SANDOZ GmbH; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. granule pt. 60 ml susp. (S/P-RF)

Ind: Adm. intern: În infecții ușoare - moderate produse de microorganisme sensibile la ampicilină: infecții ale aparatului respirator; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții ale aparatului urogenital; infecții ale aparatului digestiv; infecții biliare; leptospiroză, listerioză; profilaxia infecțiilor chirurgicale la pacienții cu risc; pt. prevenirea endocarditei; pt. continuarea unui trat. cu ampicilină adm. parenteral la pacienții cu endocardită, meningită bacteriană, septicemii produse de agenți patogeni sensibili la ampicilină, listerioză; la pacienții cu encefalopatie hepatică.

Adm. inj.: Infecții ale tractului respirator; meningite bacteriene; septicemie și endocardită; infecții ale tractului urinar, infecții biliare, produse de tulpini sensibile ale unor bacterii grampozitiv și gramnegativ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM GADOPENTETICUM
 ACIDUM HIALURONICUM
 ACIDUM IBANDRONICUM
 ACIDUM MEFENAMICUM
 ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA

Cod ATC: J01CR01

AMPIPLUS® 750 mg; AMPIPLUS® 1,5 g ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 750 mg (500 mg ampicilină + 250 mg sulbactam) și 1,5 g (1 g ampicilină + 500 mg sulbactam) (*P-RF/S*)

UNASYN i.m./i.v. PFIZER; Pulb. pt. sol. inj. 1 g ampicilină + 500 mg sulbactam (*P-RF*)

Ind: Infecții produse de microorganisme sensibile. Infecții ale căilor respiratorii superioare: sinuzite, otite medii și tonsilite; infecții ale căilor respiratorii inferioare: pneumonii bacteriene și bronșite; infecții ale tractului urinar și pielonefrite; infecții intraabdominale inclusiv peritonite; colecistite; endometrite și celulite pelviene; septicemii bacteriene; infecții ale pielii țesuturilor moi, oaselor și articulațiilor și infecții gonococice. Preoperator pentru a reduce frecvența infecțiilor postoperator la pacienții supuși operațiilor abdominale sau pelviene. În cazul nașterilor normale sau prin cezariană se poate folosi profilactic pentru a reduce infecțiile postoperatorii.

Dz: *Adulți:* 1,5-12 g/zi i.m./i.v. la 6-8 ore până la o doză maximă de sulbactam de 4 g/zi. În infecțiile mai puțin severe - 1 adm. la 12 ore. Severitatea infecției: ușoară 1,5-3 g/zi (0,5+1 la 1+2); moderată până la 6 g/zi (2+4); severă până la 12 g/zi (4+8). *Copii și nou-născuți:* 150 mg/kg pe zi (50 mg/kg sulbactam și 100 mg/kg ampicilină), adm. de obicei la 6-8 ore. La nou-născuții în prima săpt. de viață (în special la prematuri) dozele se adm. uzual la 12 ore. Doza și frecvența adm. se modifică în relație cu funcția renală a pacientului. Pentru profilaxia infecțiilor chirurgicale se vor adm. 1,5-3 g sultamicilină i.m./i.v. în timpul inducerii anesteziei. În trat. gonoreei necomplicate sultamicilina i.m./i.v. poate fi adm. ca o doză unică de 1,5 g.

Cind: Reacții alergice la peniciline în antecedente. Sarcină și alăptare.

Al: Ca și în cazul altor antibiotice este importantă observarea permanentă pentru a descoperi semne de înmulțire a unor germeni insensibili la trat., inclusiv a fungilor. În cazul trat. prelungite, se recomandă să se verifice periodic funcțiile sistemelor: renal, hepatic și hematopoietic.

RA: *Gastrointestinale:* diaree, greață, vărsături, dureri/crampe abdominale. Rar, enterocolită și colită pseudomembranoasă. *Cutaneate:* rash și prurit. *Diverse:* somnolență/sedare, oboseală, indispoziție și cefalee. Durere la locul inj. i.m. *Flebite* după adm. i.v. *Hematologice:* anemie, trombocitopenie, eozinofilie, leucopenie. *Hepatice:* creșteri tranzitorii ale transaminazelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ACIDUM HIALURONICUM
ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: J05AE05](#)

AGENERASE® GLAXO SMITHKLINE; Cps. moi 50 mg, 150 mg; ct. × 1 fl. × 480 cps, respectiv ct. × 1 fl. × 240 cps. (S/P-RF)

AGENERASE® GLAXO SMITHKLINE; Sol. orală 15 mg/ml; ct. × 1 fl. × 240 ml (S/P-RF)

Ind: La adulți și copii mai mari de 4 ani infectați cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV), tratați anterior cu alți inhibitori de protează.

Dz: Oral. *Adulți și adolescenți peste 12 ani:* 1200 mg de 2 ori pe zi. În asociere cu ritonavir se recomandă doze mai mici. *Copii (4-12 ani) și pacienți în greutate mai mică de 50 kg:* 20 mg/kg de 2 ori pe zi, în asociere cu alte antiretrovirale, fără a depăși o doză zilnică totală de 2400 mg. Dozele trebuie micșorate în IH.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare din componente. Nu trebuie adm. concomitent cu produse medicamentoase cu fereastră terapeutică îngustă care sunt substraturi ale citocromului P450 3A4 (CYP3A4), cu rifampicină sau cu produse care conțin sunătoare (*Hypericum perforatum*). Soluția orală este CI la copii sub 4 ani.

Al: Trebuie utilizat în asociere cu cel puțin alte două antiretrovirale. Precauție la pacienții cu IH. Nu se recomandă suplimentarea de vitamina E. Trat. trebuie întrerupt când rash-ul este însoțit de simptome sistemice, simptome alergice sau interesează mucoasele. La pacienții tratați cu antivirale s-au raportat cazuri noi de diabet zaharat, hiperglicemie sau agravări ale diabetului zaharat preexistent. Pacienții hemofilici trebuie avertizați asupra posibilității de sângerare crescută.

Atenție în cazul asocierii cu: inhibitori de protează (IP), analogi nucleozidici inhibitori ai revers transcriptazei (NIRT), compuși non-nucleozidici inhibitori ai revers transcriptazei (NNIRT), antibiotice/antifungice, antiacide, benzodiazepine, blocante ale canalelor calciului, medicamente pentru trat. erecției insuficiente, medicamente hipolipemice, metadonă și derivați opioizi, steroizi, contraceptivelor hormonale, sunătoare. Atenție în cazul folosirii în sarcină. Se recomandă ca mamele tratate să nu alăpteze.

RA: Simptome gastro-intestinale. Eruții cutanate eritematoase sau maculopapulare, cu sau fără prurit. Rar reacții cutanate grave sau cu potențial letal, incluzând sindrom Stevens-Johnson. Redistribuire a țesutului adipos. Modificări ale parametrilor de laborator: creșterea transaminazelor, hipertrigliceridemie, creșterea amilazei, hiperbilirubinemie și hiperglicemie. Creșterea CPK, mialgii, miozită și rareori rhabdmioliză.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: L02BG03](#)

ACIDUM IBANDRONICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM

ARIMIDEX SINDAN SRL; Cpr. film. 1 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

ARIMIDEX ASTRAZENECA; Cpr. film. 1 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

Ind: Carcinomul mamar în stadiu avansat la femei la care s-a instalat menopauza, a căror boală a evoluat după trat. cu tamoxifen sau alte antiestrogenice.

Dz: *Adulți, inclusiv vârstnici:* oral, 1 mg/zi.

Cind: Femei în premenopauză; femei gravide sau care alăptează; paciente cu afectare severă a funcției renale (clearance-ul creatininei < 20 ml/min); paciente cu afectare hepatică moderată sau severă; antecedente de hipersensibilitate la anastrozol sau oricare dintre excipienți. Nu se asociază cu preparate care conțin hormoni estrogeni. La copii.

Al: Șoferi și activități de precizie.

RA: Valuri de căldură, uscăciunea mucoasei vaginale și subțierea firului de păr. Tulburări gastrointestinale (anorexie, greață, vărsături și diaree); astenie, somnolență, cefalee. Rash cutanat. Sângerare vaginală. Modificări hepatice. Creșterea nivelului colesterolului total.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM

[Cod ATC: G04BE](#)

UPRIMA 2 mg, UPRIMA 3 mg ABBOTT; Cpr. sling. 2 mg, 3 mg; ct. × 1 blist. × 1, 2, 3, 4 sau 8 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. disfuncției erectile.

Dz: Adm. s.l. **Adulți:** Un cpr. cu aproximativ 20 de min înainte activității sexuale. Doza poate fi crescută la 3 mg pentru atingerea efectului clinic dorit. O nouă doză se poate adm. după o perioadă minimă de 8 ore. La pacienții cu alterare severă a funcției renale, doza maximă nu trebuie să depășească

2 mg. Doza inițială pentru pacienții cu IH este de 2 mg și orice creștere a dozei trebuie făcută cu prudență.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. La pacienții cu angină instabilă severă, IM recent, IC severă sau hTA și alte condiții în care activitatea sexuală nu este recomandată.

Al: Precauție la pacienții cu deformări anatomice ale penisului (angularea, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie). Poate determina rar sindrom tranzitoriu vasovagal, care se poate manifesta ca o senzație de leșin autolimitată/sincopă. Precauție la pacienții cu HTA necontrolată, hTA sau la cei care au antecedente de hTA ortostatică. Precauție la pacienții cu afectarea funcției renale sau hepatice.

Precauție la pacienții tratați concomitent cu: nitrați, antihipertensive, antiemetice (exceptând: ondansetron, proclorperazină, domperidonă), alți agonisti sau antagonisti dopaminergici cu acțiune centrală, alți agenți pentru disfuncția erectilă, antidepresive, anticonvulsivante sau alți agenți cu acțiune asupra SNC, alcool. Precauție la șoferi sau persoane cu activități de precizie.

RA: Greață, dureri de cap, amețeli, căscat, rinită, faringită, somnolență, infecții, durere, tuse accentuată, înroșirea feței, modificări ale gustului și transpirații. Rar, sindrom vasovagal tranzitoriu care poate conduce la senzație de leșin autolimitată/sincopă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM NALIDIXICUM
 ACIDUM NICOTINICUM
 ACIDUM NIFLUMICUM
 ACIDUM PAMIDRONICUM
 ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM

Cod ATC: B02AB01

GORDOX RICHTER GEDEON Ltd.; Sol. inj. 10000 ui/ml; ct. × 25 f. × 10 ml (S)
GORDOX RICHTER GEDEON Ltd.; Sol. perf. 500000 KIU; ct. × 10 fl. × 50 ml (S)
TRASYSOL® 500000 UIK BAYER AG; Sol. perf. 500 000 KIU; ct. × 1 fl. × 50 ml (S)

Ind: Hemoragia prin hiperfibrinoliză apărută posttraumatic, postoperator sau în timpul circulației extracorporeale la adulți. Complicații în terapia trombolitică.

Dz: Inj. i.v. sau perf. Testarea hipersensibilității: o doză de 10000 KIU cu cel puțin 10 min. înainte restului dozei. Doza terapeutică: Hemoragia hiperfibrinolică: Inițial 500000 KIU; apoi 200000 KIU la fiecare 4 ore. *Copii:* 20000 KIU/kg/zi. Tulburări hemostatice în obstetrică și ginecologie: Inițial 1000000 KIU, apoi 200000 KIU/oră. Chirurgia cardiovasculară cu circulație extracorporală: 1-2 milioane KIU prin inj./perf. lentă i.v. pe o durată de 15-20 min, după inducerea anesteziei și înainte sternotomie. Alte 1-2 milioane KIU trebuie adăugate pompei mașinii plămân-inimă. Perfuzarea bolusului inițial este urmată de adm. unei perf. continue de 250000-500000 KIU/oră până la sfârșitul operației. Cantitatea totală nu trebuie să depășească 7 milioane KIU.

Cind: Hipersensibilitate la aprotinină.

Al: Risc de reacții alergice. S-a raportat o creștere a IR și mortalității. Trat. anticoagulant adecvat cu heparină trebuie să fie asigurat. Metoda *in vitro* pentru a determina gradul anticoagulării în sângele heparinizat poate fi denaturată în prezența aprotininei. Inhibă activitatea agenților trombolitici (streptokinaza, urokinaza, alteptaza (r-tPA)). Atenție la utilizarea în sarcină.

RA: Posibile reacții anafilactice și anafilactoide (eritem facial, urticarie, prurit, greață, scăderea bruscă a tensiunii, tahicardie sau bradicardie, obstrucția căilor respiratorii, hipertensiune gravă, șoc anafilactic). Creșteri tranzitorii ale creatininei serice. IR. Creștere a incidenței perioperatorii a IM. Reacții locale tromboflebitice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM

[Cod ATC: A05BA01](#)

SARGENOR LAB. SARGET PHARMA; Sol. buv. 200 mg/ml; ct. × 20 sau 40 f. × 5 ml (*OTC*)

Ind: Hepatită cronică, ictere severe, comă posthemoragică, hiperamoniemie, astenie funcțională.

Dz: Sol. buv., adulți: 2-3 f./zi; copii peste 12 ani: 1-2 f./zi. Trat. maxim 15 zile. Conținutul fiolelor se dizolvă în puțină apă și se adm. de preferință înainte de repaus. Cpr. eferv., adulți: 2-3 cpr. eferv./zi, copii peste 12 ani: 1-2 cpr. eferv./zi., în cure de 8-15 zile. Cpr. mast., adulți: 2-3 cpr. mast./zi; copii peste 12 ani: 1-2 cpr. mast./zi, maxim 4 săptămâni.

Cind: Acidoză hipercloremică, anurie. Sarcină și alăptare.

A!: Adm. la copii sub 12 ani se face numai cu avizul medicului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM NIFLUMICUM
ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM

[Cod ATC: N05AX12](#)

ABILIFY 5 mg; ABILIFY 10 mg; ABILIFY 15 mg; ABILIFY 30 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg; ct. × 2, 4, 7, 8 sau 14 blist. × 7 cpr. (P-RF)

ABILIFY 5 mg; ABILIFY 10 mg; ABILIFY 15 mg; ABILIFY 30 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. orodispersabile 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg; ct. × 2, 4, sau 7 blist. × 7 cpr. (P-RF)

Ind: Tratamentul schizofreniei.

Dz: 15-30 mg/zi, într-o singură priză.

Cind: Hipersensibilitate.

AI: Poate potența efectul medicamentelor antihipertensive

RA: Amețeală, astenie, acatizie, somnolență, tremor, tulburări de vedere, greață, vărsături, dispepsie, constipație, cefalee, astenie, sindrom neuroleptic malign, diskinezii tardive, convulsii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM PAMIDRONICUM
ACIDUM RISEDRONICUM
ACIDUM SPAGLUMICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM

[Cod ATC: L01XX02](#)

ASPARAGINASE 5000 MEDAC; ASPARAGINASE 10000 MEDAC MEDAC GESELLSCHAFT; Pulb. pt. sol. inj. 5000 UI, 10000 UI; ct. × 1 sau 5 fl. **(S)**

Ind: Leucemii acute mieloblastice și leucemii acute limfoblastice, meningite leucemice, limfoame non-Hodgkiniene.

Dz: Se adm. numai în mediu spitalicesc.

Cind: IH, pancreatită. Hipersensibilitate la asparaginază, sarcină, alăptare.

Al: În caz de diabet zaharat, avertizați medicul.

RA: Tulburări digestive, fenomene alergice, edem Quincke, reacții febrile, rash, prurit cutanat, amenoree, azoospermie, modificări ale probelor biochimice hepatice și pancreatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM RISEDRONICUM
 ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM

[Cod ATC: J05AE](#)

REYATAZ BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. 100 mg, 150 mg, 200 mg; ct. × 60 cps. (S/P-RF)

REYATAZ BRISTOL-MYERS SQUIBB; Pulb. pt. sol. orală 50 mg/1,5 g; ct. × 1 fl. × 180 g pulb. (S/P-RF)

Ind: Tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane dobândite (HIV-1), la adulți experimentați în tratamentul antiretroviral, în combinație cu alte medicamente antiretrovirale.

La pacienții experimentați în tratamentul antiretroviral, demonstrarea eficacității este bazată pe un studiu comparativ între atazanavir, 300 mg o dată pe zi în combinație cu ritonavir 100 mg o dată pe zi și lopinavir/ritonavir, fiecare regim terapeutic în combinație cu tenofovir. Bazat pe date disponibile virusologice și clinice, nu se așteaptă nici un beneficiu la pacienții cu tendință la rezistență multiplă la inhibitorii de proteaze (> 4 PI mutații).

Dz: Terapia trebuie inițiată de către un medic cu experiență în tratamentul infecției HIV. *Adulți:* oral, 300 mg atazanavir o dată pe zi administrat cu ritona-vir 100 mg o dată pe zi, cu alimente. Dacă atazanavir și ritonavir sunt adminis-trate concomitent cu didanosine, se recomandă ca didanosina să fie luată la 2 ore după ce atazanavir cu ritonavir au fost înghițite cu alimente. Capsulele se înghit întregi. Pulberea orală este disponibilă pentru pacienții care sunt incapabili să înghită capsule. *Sugari, copii mici și adolescenți:* nu a fost stabilită eficacitatea și siguranța atazanavir.

Cind: Hipersensibilitate la atazanavir sau la oricare dintre excipienți. Pacienți cu insuficiență hepatică moderată - severă. La femei însărcinate se utilizează numai dacă beneficil justifică riscul. Asocierea atazanavir cu ritonavir nu trebuie folosit în combinație cu rifampicină, astemizol, terfenadină, cisapridă, pimoizidă, chinidină, bepridil, și alcaloizi din ergot, în special ergotamină, dihidroergotamină, ergonovină, metilergonovină, simvastatină.

Nu se utilizează în combinație cu produse conținând sunătoare (*Hypericum perforatum*).

Al: În timpul tratamentului se vor lua măsuri de precauție pentru prevenirea riscului de transmitere a HIV prin sânge sau contact sexual. Administrarea atazanavir cu ritonavir trebuie utilizată cu precauție la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară. Precauții la pacienții cu probleme de conducere atrioventri-culară (utilizarea se va face numai dacă beneficiile depășesc riscurile), pacienți cu hemofilie A și B (crește riscul sângerărilor). S-au raportat în urma tratamentului apariția diabetului zaharat, exacerbaria diabetului zaharat existent, creșteri reversibile ale bilirubinei indirecte. Se evită utilizarea concomitentă a atazanavir cu contraceptive orale. Prudență la conducători auto.

RA: Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând convenția: foarte frecvente: = 1/10; frecvente: = 1/100, < 1/10; neobișnuite = 1/1000, < 1/100; rare: = 1/10000, < 1/1000; foarte rare: = 1/10000. Reacții adverse la utilizarea atazanavir și unul sau mai mulți inhibitori de revers transcriptază (INTR):

Foarte frecvente: icter. *Frecvente:* lipodistrofie, cefalee, insomnie, simptome neurologice periferice, icter scleral, durere abdominală, diaree, dispepsie, greață, vărsături, astenie, rash. *Neobișnuite:* disgeuzie, flatulență, gastrită, pancreatită, stomatită aftoasă; durere la nivelul toracelui, oboseală, febră, indispoziție; reacții alergice; anorexie,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: C07AB03](#)

ACIDUM SPAGLUMICUM
 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
 ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIPRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM

ATECOR WIN-MEDICARE Ltd; Cpr. 100 mg; ct. × 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ATENOCOR 50, ATENOCOR 100 AC HELCOR SRL; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 30 cpr. (P-6L)
ATENOLOL 50 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ATENOLOL LPH® 50 mg; ATENOLOL LPH® 100 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 2, 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)
ATENOLOL 50 mg, ATENOLOL 100 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ATENOLOL 50 mg; ATENOLOL 100 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 3 sau 5 blist. × 10 cpr. (50 mg), respectiv ct. × 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (100 mg) (P-6L)
BLOCOTENOL® SANDOZ GmbH; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 2, 3 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
EPHITENSIN 100 mg EUROPHARM SA; Cpr. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
HYPOTEN HIKMA PH; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (50 mg), ct. × 1 blist. × 14 cpr. (100 mg) (P-6L)
VASCOTEN MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. film. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: HTA; angină pectorală; aritmii cardiace; IM.

Dz: *Adulți:* Hipertensiune: 50-100 mg/zi, oral, în priză unică. Angină: 100 mg/zi, oral, în priză unică sau fracționat. Aritmii: Doza de întreținere 50-100 mg/zi, oral, în priză unică. IM: 50-100 mg/zi, oral, în priză unică. Adm. tardivă: 100 mg/ zi, în priză unică. În IR dozele trebuie reduse.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la substanță; bradicardie; șoc cardiogen; hTA; acidoză metabolică; afecțiuni circulatorii arteriale periferice severe; bloc de gradul doi sau trei; sindrom de sinus bolnav; feocromocitom netratat; IC necontrolată medicamentos.

Al: La pacienți cu rezervă cardiacă redusă; angină tip Prinzmetal; cu bloc de gradul întâi. Poate masca semnele tireotoxicozei. Nu trebuie întrerupt brusc la pacienții care prezintă boală ischemică coronariană. Pacienți cu istoric de reacții anafilactice. Poate determina o creștere a rezistenței căilor aeriene la pacienții astmatici. Atenție la asocierea cu: blocantele canalelor de calciu, dihidropiridine, glicozizii digitalici, clonidină, agenți antiaritmici din clasa I, agenți simpatomimetici, inhibitoare ale prostaglandin-sintetazei, agenți anestezici. Atenție când se adm. la femeile care sunt, sau pot rămâne gravide, sau celor care alăptează la sân.

RA: Cardiovasculare: bradicardie; agravarea IC; hTA asociată uneori cu sincope; extremități reci. La pacienții susceptibili: precipitarea unui bloc de conducere; claudicație intermitentă, fenomen Raynaud. SNC: confuzie; amețeli; cefalee; modificări ale activității; coșmaruri; psihoze și halucinații; tulburări ale somnului. Gastrointestinale: uscăciunea mucoasei bucale, tulburări gastrointestinale. Hematologice: purpură, trombocitopenie. Tegumentare: alopecie; uscăciunea conjunctivelor; reacții cutanate psoriaziforme; exacerbarea psoriazisului; rash cutanat. Respiratorii: bronhospasm. Sensibilitatea vizuală: tulburarea acuității vizuale. Altele:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
ACIDUM ZOLEDRONICUM
ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM

[Cod ATC: N06BA09](#)

STRATTERA 10 mg; STRATTERA 18 mg; STRATTERA 25 mg; STRATTERA 40 mg; STRATTERA 60 mg ELI LILLY; Cps. 10, 18, 25, 40, 60 mg; ct. × 1, 2, 4 sau 8 blist. × 7 cps. (**P-6L**)

Ind: Deficit de atenție/hiperactivitate (ADHD) la copii peste 6 ani și adolescenți.

Dz: Doză unică zilnică, dimineața. Inițial, 0,5 mg/kg. Se menține doza cel puțin 7 zile înainte de a se crește, corelat cu răspunsul clinic. Doza de întreținere 1,2 mg/kg/zi.

Cind: Glaucom, asociere cu IMAO.

RA: Digestive - dureri abdominale, greață, vomă, anorexie. Cardiace - tahicardie. Nervoase - somnolență, astenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM VALPROICUM (VALPROAT DE SODIU)
 ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM

Cod ATC: C10AA05

SORTIS 10 mg; SORTIS 20 mg; SORTIS 40 mg; SORTIS 80 mg PFIZER; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cpr. (40 mg, 80 mg) (**P-6L**)

Ind: Hipercolesterolemie primară, inclusiv hipercolesterolemia familială, hipercolesterolemie mixtă, hipercolesterolemie familială homozigotă, ca terapie suplimentară altor trat. hipolipemiante sau atunci când aceste trat. nu sunt indicate.

Dz: Doza inițială uzuală este de 10 mg atorvastatin o dată pe zi. Dozajul este individualizat, corespunzător valorilor LDL-colesterol, scopului terapiei ca și răspunsului terapeutic al fiecărui pacient în parte. Doza maximă este de 80 mg o dată pe zi.

Cind: La pacienți cu hipersensibilitate la oricare din componentele medicamentului, afecțiuni hepatice active, miopatie, în timpul sarcinii sau alăptării și la femei la vârsta procreării și care nu utilizează mijloace contraceptive adecvate.

Al: Dozele trebuie reduse sau se întrerupe trat. dacă: valorile TGP sau TGO cresc de peste 3 ori față de normal și se mențin crescute, valorile creatinfosfokinazei (CPK) sunt crescute sau dacă este diagnosticată sau suspectată o miopatie. Trebuie adm. cu precauție la pacienții ce consumă cantități considerabile de alcool și/sau la cei cu afecțiuni hepatice în antecedente. Prudență la adm. concomitentă de atorvastatin și inhibitori ai citocromului P450 3A 4 (ciclosporina, antibiotice macrolidice, inclusiv eritromicina, și antimicotice de tip azol, inclusiv itraconazol), digoxin, contraceptive orale, colestipol, antiacide, warfarină, fenazonă, cimetidină.

RA: Constipație, flatulență, dispepsie, dureri abdominale, cefalee, greață, mialgie, astenie, diaree și insomnie. Creșterea transaminazelor serice. Valori crescute ale creatinfosfokinazei serice (CPK). Rar: miozită, miopatii, rabdomioliză, parestezii, neuropatie periferică, pancreatită, hepatită, icter colestatic, anorexie, vărsături, alopecie, prurit, rash, impotență, hiperglicemie, hipoglicemie, dureri pectorale, amețeli, trombocitopenie și reacții alergice, inclusiv edem angioneurotic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIDUM ZOLEDRONICUM
 ACIPIMOXUM
 ACITRETINUM
 ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIPRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM

Cod ATC: M03AC04

TRACRIUM GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 5 f. × 2,5 sau 5 ml (S)

Ind: Realizarea intubației endotraheale și relaxarea musculaturii striate în timpul intervențiilor chirurgicale și a ventilației asistate, sub anestezie generală.

Dz: *Adm. inj. i.v.:* inițial 0,3-0,6 mg/kg, la nevoie doze suplimentare de 0,1-0,2 mg/kg. *Adm. în perf.:* bolus inițial de 0,3-0,6 mg/kg, apoi, dacă este necesar, perfuzii continue cu un ritm de 0,3-0,6 mg/kg/oră. Se recomandă monitorizarea funcției neuromusculare în timpul adm. de atracurium, pentru a se determina dozele individuale necesare.

Cind: La pacienți cunoscuți cu hipersensibilitate la medicament.

A!: Trebuie adm. doar cu anestezie generală adecvată și numai de către sau sub supravegherea atentă a unui anestezist. Nu trebuie adm. în linia de transfuzie de sânge. Atenție la pacienții ce prezintă antecedente sugestive de sensibilitate crescută la efectele histaminei. Atenție în cazul pacienților cu miastenia gravis, alte boli neuromusculare și tulburări electrolitice severe. Nu trebuie amestecat în aceeași seringă cu thiopental sau orice alt agent alcalin. La pacienții arși poate apărea rezistență. Atenție când se asociază cu: anestezice inhalatorii precum halotan, izofluran și enfluran; antibiotice precum: aminoglicozide, polimixine, spectinomycină, tetraciline, lincomycină și clindamicină; antiaritmice: propranolol, blocanți ai canalelor de calciu, lignocaină, procain-amidă și chinidină; diuretice: furosemid, și posibil manitol, diuretice tiazidice și acetazolamidă; sulfat de magneziu; ketamină; săruri de litiu; blocanți ganglionari: trimetafan, hexametoniū. Anumite medicamente pot agrava sau demasca miastenia gravis latentă, sau pot induce un sindrom miastenic; acestea pot crește sensibilitatea la atracurium (diverse antibiotice, b-blocanți, antiaritmice, antireumatice (clorochină, D-penicilamină), trimetafan, clorpromazină, steroizi, fenitoin și litiu). Atenție la asocierea cu alți blocanți neuromusculari nedepolarizanți. Nu trebuie să se asocieze cu relaxanți musculari depolarizanți. Trebuie folosit cu atenție în sarcină.

RA: Erupții tegumentare, hTA ușoară tranzitorie sau bronhospasm, atribuite eliberării de histamină. Rar, reacții anafilactoide severe, slăbiciune musculară și/sau miopatie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ACIPIMOXUM
ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM

[Cod ATC: A03BA01, S01FA01](#)

APITROPIN AMMAN PHARM. IND.; Sol. oft. 1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-RF)

SULFAT DE ATROPINĂ ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 1 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml (S)

Ind: Bronșite cu hipersecreție, colici biliare, colici nefretice, hipersecreție gastrică, spasm piloric, constipație spastică, tenesme vezicale, hiperhidroză. Adjuvant în preanestezie și analgezie. Traumatisme craniene închise. În trat. crizelor de râs și plâns din sindroamele pseudobulbare. În unele tulburări de conducere (BAV complet cu crize Adam-Stockes), sindromul sinusului carotidian cu crize sincopale. Colită ulceroasă cronică nespecifică. Trat. profilactic al grețurilor și vărsăturilor din răul de mare și de avion. Pentru punerea irisului și a corpurilor ciliari în poziție de repaus în cursul inflamațiilor acute și cronice ale acestora, ale corneei cât și ale țesutului vascularizat (Uvea); în leziuni și la reducerea unor cicatrice ale irisului (Synechien); pentru scopuri diagnostice (determinarea refracției) și în tratamentul strabismului.

Dz: *Adulți:* Inj. s.c. 0,25-1 mg/zi. Sol. oft.: dacă nu este altfel indicat, se recomandă astfel: În tratamentul strabismului o dată pe zi 1 picătură în sacul conjunctival. În inflamații ale irisului și corpului ciliar 1-2 ori pe zi câte 1 picătură. Pentru combaterea sinechiilor de 3 ori pe zi câte 1 picătură. Înaintea determinării refracției, timp de 3 zile se administrează de 3 ori pe zi câte o picătură în sacul conjunctival.

Cind: Fibrilație atrială, glaucom, tbc pulmonară evolutivă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01XAN1

ACITRETINUM
ADENOSINUM
AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)

QUINAX ALCON; Sol. oft. 0,15 mg/ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (*P-6L*)

Ind: Cataractă senilă, cataractă traumatică, cataractă congenitală și cataractă secundară.

Dz: Instilații oft. în ochiul afectat, 2 pic. de 3 până la 5 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate față de oricare din componente.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AX01

ADENOSINUM
 AGALSIDASUM ALFA
 ALBENDAZOLUM
 ALEMTUZUMABUM
 ALFACALCIDOLUM
 ALFUZOSINUM
 ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM

IMURAN® GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 50 mg; ct. × 4 blist. × 25 cpr. (S/P-RF)

Ind: Antimetabolit imunosupresiv, la pacienții cu transplant de organe, la pacienți afectați de: artrită reumatoidă severă; LES; dermatomiozită și polimiozită; hepatită cronică activă autoimună; pemfigus vulgar; poliarterită nodoasă, anemie hemolitică autoimună; purpură trombocitopenică idiopatică cronică, refractară.

Dz: Dozarea în transplante: *adulti și copii:* doza de încărcare max. 5 mg/kg corp/zi, oral. Doza de întreținere 1-4 mg/kg corp/zi și trebuie ajustată în funcție de necesitățile clinice și toleranța hematologică.

Dozarea în alte situații: adulti și copii: doza inițială este de 1-3 mg/kg corp/zi și trebuie ajustată. Doza de întreținere poate varia între mai puțin de 1 mg/kg corp/zi și 3 mg/kg corp/zi, în funcție de afecțiunea tratată și de răspunsul individual, inclusiv toleranța hematologică. La pacienții cu IR și/sau hepatică, dozele adm. trebuie să fie la cel mai scăzut nivel al regimului terapeutic.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la azathioprină. Gravide sau la femei care pot să rămână gravide într-un viitor apropiat.

Al: Este necesară monitorizarea hematologică pe parcursul trat. Pacienții trebuie să raporteze imediat orice infecție, echimoze sau sângerări neașteptate, sau alte manifestări de depresie medulară. Atenție la cei cu un deficit de tiopurinmetiltransferaza (TPMT). Toxicitatea azatioprinei poate fi crescută în prezența IR. La pacienții cu disfuncții hepatice hemoleucograma completă și testele de funcție a ficatului trebuie efectuate periodic și dozajul trebuie redus la minim. Nu este benefică la pacienții cu deficit de hipoxantin-guanin-fosforibosiltransferază (sindromul Lesch-Nyhan). Au fost întâlnite anomalii cromozomiale la pacienți de ambele sexe tratați cu azatioprină. Se recomandă precauții contraceptive adecvate la oricare din partenerii care primesc azatioprină. Riscul dezvoltării limfoamelor post-transplant este crescut la pacienții care primesc trat. agresiv cu imunosupresive. S-a raportat creșterea frecvenței cancerului de piele la pacienții cu transplant renal care poate fi asociată cu terapia imunosupresivă. Atenție în cazul asocierii cu: allopurinol, oxipurinol și/sau thiopurinol, blocanți neuromusculari, warfarină, agenți citostatici/ mielosupresivi, co-trimoxazol, captopril, cimetidină, indometacin, furosemid. Atenție la adm. în timpul sarcinii.

RA: Reacții de hipersensibilitate (manifestările clinice includ stare de rău, amețeli, vărsături, diaree, febră, rigiditate, exantem, rash, dureri musculare, artralгии, disfuncții renale și hipotensiune). Depresia funcției măduvei osoase exprimată prin leucopenie, câteodată și prin anemie și trombocitopenie. Susceptibilitate crescută la infecții virale, fungice și bacteriene, la nivelul tegumentului și al altor sisteme. Reacții gastrointestinale (greață, colită, diverticulită și perforații intestinale, diaree severă). Pancreatită. Colestază și deteriorarea funcției ficatului. A fost descrisă o afecțiune rară, hepatică, veno-ocluzivă, cu risc letal. Pneumonie reversibilă. Alopecie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AGALSIDASUM ALFA
ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM

[Cod ATC: S01GX07, R01AC03](#)

ALLERGODIL ASTA MEDICA; Sol. oft. 0,05%; ct. × 1 fl. × 6 ml (**P-6L**)

ALLERGODIL ASTA MEDICA; Spray nazal sol. 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (**P-6L**)

Ind: Conjunctivite alergice și rino-conjunctivite, rinite alergice sezoniere și permanente.

Dz: Adm. oft.: *Adulți și copii peste 4 ani:* o pic. de 2-4 ori/zi, în fiecare sac conjunctival inferior. Adm. nazală: în fiecare nară de două ori/zi câte un puf (0,14 mg).

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului. La copii sub 6 ani.

Al: Nu se recomandă adm. de sol. oft. pt. trat. infecțiilor oculare și celor care poartă lentile de contact.

RA: Adm. oft.: Iritație oculară. Gust amar, greață. Adm. nazal: Iritarea mucoasei nazale, manifestată ca arsură, prurit, strănut, izolat epistaxis.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01FA10

ALBENDAZOLUM
ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM

AZITROMICINĂ SANDOZ 250 mg; AZITROMICINĂ SANDOZ 500 mg SANDOZ ROMANIA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr., respectiv ct. × 1 blist. × 3 cpr. **(P-RF)**
AZITROMICINĂ SANDOZ 100 mg/5 ml; AZITROMICINĂ SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ ROMANIA; Pulb. pt. susp. orală 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 20 ml susp. **(P-RF)**
AZITROX® 250; AZITROX® 500 ZENTIVA AS; Cpr. film. 250 mg și 500 mg; ct. × 1 blist. × 3 sau 6 cpr, respectiv ct. × 1 blist. × 3 cpr. **(P-RF)**
SUMAMED® PL/VA; Cps. 250 mg; Cpr. film. 125 mg sau 500 mg; ct. × 1 blist. × 6 cps. (250 mg); ct. × 1 blist. × 6 cpr. (125 mg); ct. × 1 blist. × 3 cpr. (500 mg) **(P-RF)**
SUMAMED®; SUMAMED® FORTE PL/VA; Pulb. susp. 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 20 ml susp., respectiv ct. × 1 fl. × 20 sau 30 ml susp. **(P-RF)**
Ind: Infecții cu microorganisme sensibile la azitromicină: infecții ORL, infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, infecții ale pielii și țesuturilor moi, infecții cu transmitere sexuală, infecții gastrice și duodenale provocate de *Helicobacter pylori*.
Dz: O singură dată pe zi, cu cel puțin 1 oră înainte sau cu 2 ore după masă. Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, ORL, ale pielii și țesuturilor moi (cu excepția eritemului cronic migrator) doza este de 500 mg, timp de 3 zile. În eritemul cronic migrator: 1 g în prima zi, apoi 500 mg în zilele 2-5. Doza totală este de 3 g. În infecții cu transmitere sexuală doza este de: 1 g în priză unică. În infecții gastrice și duodenale cu *Helicobacter pylori*: 1 g zilnic.
Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente.
Al: Prudență în IH. Atenție în cazul asocierii cu: antiacide, alcaloizi ergotaminici, digoxină, ciclosporină, teofilină, terfenadină, warfarină, carbamazepină, metilprednisolon, cimetidină și cu medicamentele metabolizate prin sistemul citocromului P 450 (astemizol, triazolam, midazolam și alfentanil). Atenție în cazul utilizării în timpul sarcinii și al alăptării. Atenție la șoferi și la cei cu activități de precizie.
RA: Reacțiile gastrointestinale (greață, vărsături, diaree, dureri epigastrice și flatulență). Creșteri reversibile ale valorilor serice ale transaminazelor hepatice și bilirubinemiei. Rar, edem angioneurotic și icter colestatic. Semne și simptome reversibile nervos-centrale (cefalee, vertij, parestezii, agitație, nervozitate). Episoade tranzitorii de neutropenie ușoară. Alte RA: artralгии, edeme, urticarie, aritmii, anorexie, constipație, astenie, nefrită interstițială, IRA, convulsii, tulburări ale auzului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ALEMTUZUMABUM
ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYICINUM
BACLOFENUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M03BX01**LIORESAL®** NOVARTIS PHARMA; Cpr. 10 mg, 25 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

Ind: Spasticitatea mușchilor scheletici în scleroza multiplă, tulburări spastice care apar în boli ale măduvei spinării sau de origine cerebrală.

Dz: *Adulți*, inițial 5 mg de 3 ori/zi, apoi se mărește din 3 în 3 zile cu 5 mg de 3 ori/zi, până se atinge doza zilnică necesară. Doza optimă este între 30 mg și 75 mg/zi, uneori poate fi necesară o doză zilnică de 100-200 mg. În IR se adm. doze mai mici. În pediatrie, doza este de 0,75-2 mg/kg, fracționată în 4 prize.

Cind: Hipersensibilitate la baclofen.

A!: Bolnavii cu tulburări psihotice, schizofrenie, stări confuzionale, epilepsie trebuie supravegheați. Aceeași atenție se recomandă bolnavilor cu ulcer peptic, maladii cerebrovasculare, alterări renale, hepatice, respiratorii. Precauție la bolnavii cu hipertonie preexistentă a sfincterului vezical. Trat. trebuie oprit prin reducerea gradată a dozei. Pacienții cu boli hepatice sau cu diabet zaharat trebuie supravegheați prin teste de laborator. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Atenție în cazul asocierii cu: preparate care acționează asupra SNC sau alcool, antidepresive triciclice, antiHTA, L-dopa sau carbidopa. Prudență la femei însărcinate.

RA: SNC: somnolență, uscăciune a gurii, scăderea capacității respiratorii, oboseală, confuzie mintală, amețală, greață, vomă, dureri de cap și insomnie, euforie, stări depresive, parestezii, mialgii, atonie musculară, ataxie, tremor, nistagmus, tulburări de acomodare, halucinații, coșmaruri, scăderea pragului de convulsie și crize convulsive. Gastrointestinal: constipație, diaree. Cardiovascular: hTA. Urogenital: disurie, micțiuni frecvente, enurezis. Alte RA: tulburări vizuale, hiperhidroză, erupții cutanate, tulburări ale funcției hepatice, spasticitate crescută, ca o reacție paradoxală la medicație; mai poate apărea hipotonia musculară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ALFACALCIDOLUM
ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARII SULFAS

Cod ATC: V08BA02**POLIBAR ACB E-Z-M**; Pulb. susp.; pungă × 397 g (S/P-RF)**SULFAT DE BARIU PRO RÖNTGEN FLORA FARM SRL**; Pulb. susp.; pungă × 90 g (S/P-RF)**Ind:** Examenul radiologic al tractului gastrointestinal.**Dz:** Susp. poate fi adm. oral sau rectal. 200-250 ml suspensie de sulfat de bariu este suficientă pentru examinarea stomacului; pentru examinarea intestinului subțire - 500 ml suspensie; pentru examinarea colonului (clismă) - 600-1500 ml. La copii posologia se va stabili în funcție de vârstă, greutate corporală și diagnosticul urmărit.**Cind:** În cazul suspiciunii de perforații sau obstrucții la nivelul tractului gastrointestinal. Hipersensibilitate cunoscută la sulfat de bariu.**A!:** Investigațiile radiologice pot dăuna fătului în faza organogenezei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ALFUZOSINUM
ALLOPURINOLUM
ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AA09

SIMULECT® 20 mg NOVARTIS PHARMA; Liof. pt. sol. inj./perf. 20 mg; ct. × 1 fl. liof. + 1 f. solv. × 5 ml solv. (S)

Ind: Profilaxia rejecției acute de organ în transplantul renal alogen de novo; se administrează concomitent cu ciclosporină microemulsionată și corticosteroizi, ca tratament imunosupresor la pacienții cu mai puțin de 80% anticorpi reactivi.

Dz: Basiliximabul trebuie prescris doar de medici cu experiență în terapia imunosupresoare după transplant de organe. El trebuie administrat numai sub supraveghere medicală calificată. Doza totală standard este de 40 mg, administrată în două prize a 20 mg fiecare. Prima priză se adm. cu 2 ore înaintea intervenției chirurgicale pentru transplant. Următoarea se adm. la 4 zile după transplant. Nu se administrează a doua priză dacă apar complicații post-operatorii cum ar fi respingerea grefei.

Mod de adm.: Sol. de basiliximab trebuie adm. sub formă de perfuzie i.v. într-un interval de 20-30 minute. **Copii:** Siguranța și eficacitatea folosirii basiliximabului la copii nu au fost stabilite. Datele farmacocinetice disponibile sunt foarte limitate. **Vârstnici:** Datele privind administrarea basiliximabului la bătrâni sunt limitate; dar nu există date că persoanele vârstnice necesită alt dozaj decât pacienții adulți.

Cind: Pacienți cu hipersensibilitate cunoscută la compus sau oricare alt component al produsului. În timpul sarcinii și alăptării.

Al: Experiența în folosirea basiliximabului împreună cu alți agenți imunosupresori decât ciclosporina microemulsionată și corticoizi este limitată. Nu s-au efectuat studii folosind azatioprina sau micofenolat mofetil ca parte a triplei medicații imunosupresoare. Medicația pentru tratamentul reacțiilor alergice severe, care pot să apară după administrarea de proteine trebuie să fie disponibilă pentru uz imediat. În general, pacienții sub terapie imunosupresoare după transplant prezintă un risc crescut de apariție a proceselor limfoproliferative și infecțiilor oportuniste. Nu au fost observate creșteri ale incidenței proceselor limfoproliferative sau ale infecțiilor oportuniste la pacienții tratați cu basiliximab.

RA: Constipație, infecții ale tractului urinar, durere, greață, edeme periferice, hipertensiune arterială, anemie, cefalee și hiperkaliemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ALLOPURINOLUM
 ALLYLESTRENOLUM
 ALPRAZOLAMUM
 ALPROSTADILUM
 ALTEPLASUM
 AMANTADINUM
 AMBAZONUM
 AMBROXOLUM
 AMFEPRAMONUM
 AMIFOSTINUM
 AMIKACINUM
 AMINOGLUTETHIMIDUM
 AMINOPHYLLINUM
 AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 BARIU SULFAS
 BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM

Cod ATC: R03BA01, R01AD01**ALDECIN INHALER** SCHERING PLOUGH EUROPE; Aerosol 50 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**BECLOCORT® MITE; BECLOCORT® FORTE** GLAXO SMITHKLINE; Aerosol 50 µg sau 250 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**BECLOFORTE® CFC-FREE** GLAXO SMITHKLINE; Sol. inhal. presurizată 250 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**BECONASE** GLAXO SMITHKLINE; Spray nazal susp. 0,05%; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**BECOTIDE® CFC-FREE** GLAXO SMITHKLINE; Sol. inhal. presurizată 50 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**CLENIL** CHIESI FARMACEUTICI; Sol. inhal. presurizată 250 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**CLENIL JET 250 mcg** CHIESI FARMACEUTICI; Sol. inhal. presurizată 250 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze + dispozitiv "spacer jet" cu capac (P-RF)**ECOBEC 100 µg CFC FREE; ECOBEC 250 µg CFC FREE** IVAX PHARMACEUTICALS; Aerosol 100 µg, 250 µg; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**ECOBEC EASI-BREATHE 100 µg CFC FREE; ECOBEC EASI-BREATHE 250 µg CFC FREE** IVAX PHARMACEUTICALS; Aerosol sol. inhal. 100 µg sau 250 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)**NASOBEK** IVAX PHARMACEUTICALS; Spray nazal susp. 50 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (P-RF)

Ind: Adm. inhal.: pacienți astmatici care necesită terapie de întreținere de lungă durată; pacienți cu astm bronșic sever, care sunt dependenți de corticosteroizi activi sistemic sau de ACTH. Când este necesară utilizarea corticosteroizilor activi sistemic în trat. bronșitei cronice obstructive.

Adm. nazală: În situații ce necesită un potent efect antiinflamator la nivelul tractului respirator.

Dz: Adm. inhal.: **Adulți:** Două inhalatii (fiecare 50 µg), de 3-4 ori pe zi. În cazurile severe dozele pot fi dublate (600-800 µg/zi). Când apare ameliorarea, dozele trebuie ajustate în funcție de răspuns. **Copii de 6-12 ani:** Una sau două inhalatii (50 sau 100 µg), 2-4 ori pe zi. Doza zilnică maximă: 20 de inhalatii (1 mg) la adulți și 10 inhalatii (0,5 mg) la copii între 6-12 ani.

Adm. nazală: **Adulți și copii peste 6 ani:** Două pulverizări în fiecare nară, de două ori pe zi. Doza totală maximă 8 pulverizări (400 mg).

Cind: Trat. primar al stării astmatice; episoade acute de astm unde sunt necesare măsuri de terapie intensivă; la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din ingredientele preparatului.

Al: Adm. inhal.: Atenție în cazul pacienților corticodependenți și ACTH - dependenți. În timpul perioadelor de stres sau a atacurilor severe de astm, pacienții transferați pe beclometazonă pot necesita cure scurte de corticosteroizi activi sistemic. Este necesară testarea periodică a funcției CSR. Poate fi utilizată concomitent cu spray-ul nazal conținând beclometazonă dipropionat, într-o doză totală combinată de până la 1000 mg la adulți și 500 mg la copii. **Adm. nazală:** Infecțiile pasajului nazal și a sinusurilor paranazale trebuie tratate corespunzător. Atenție în cazul unei funcții adenale afectate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ALLYLESTRENOLUM
ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM

Cod ATC: C09AA07

BENAZEPRIL SANDOZ 5; BENAZEPRIL SANDOZ 10; BENAZEPRIL SANDOZ 20 HEXAL AG; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr., ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

CIBACEN® 5; CIBACEN® 10; CIBACEN® 20 NOVARTIS PHARMA; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. **(P-6L)**

Ind: HTA; IC (clasa II-IV NYHA).

Dz: HTA: 10 mg/zi; se poate crește după 1-2 săpt. de trat. la 20 mg/zi; doza max. 40 mg/zi; în IR scad doza. IC congestivă: 2,5 mg/zi (se poate crește la 10-20 mg/zi, adm. în 1-2 doze).

Cind: Obezitate, edem Quincke, hipersensibilitate la produs.

Al: Manifest. anafilactice, IR, hiperkaliemie, stenoză aortică sau mitrală; vârstnici și copii.

RA: hTA, dureri toracice, angină, aritmii; tulburări gastro-intestinale nespecifice, erupții cutanate, prurit, fotosensibilizare, poliakiurie, tuse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C04AX11

ALPRAZOLAMUM
ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIU SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM

HALIDOR® EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sol. inj. 25 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 ml (*P-RF*)

Ind.: Afecțiuni vasculare, obliterație arterială periferică, cefalalgie, migrenă, angiopatie cerebrală.

Dz: În urgențe se adm. inj. i.v., i.a. sau i.m. 250-500 mg.

Al: Precauție în tendințe la colaps, tulburări circulatorii și respiratorii.

RA: Locale: reacții inflamatorii și infiltrative ale peretelui venos; uneori amețeli, grețuri, tulburări digestive.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ALPROSTADILUM
ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM

Cod ATC: A11DAN1

BENFOGAMMA® WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Dj. 50 mg; ct. × 3 sau 6 blist. × 10 dj., ct. × 5 blist. × 20 dj. (P-RF)

Ind: Prevenirea sau tratamentul deficitului clinic de vitamina B1, care nu poate fi tratat prin măsuri dietetice.

Dz: Preventiv, 50 mg de 1-2 ori pe săptămână; curativ, 50 mg de 1-3 ori pe zi.

Al: La pacienții cu psoriazis, benfotiamina poate agrava leziunile cutanate.

RA: Rar, hipersensibilitate (erupții cutanate, urticarie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ALTEPLASUM
AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIUM SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM

Cod ATC: G02BBN2

CONTRACEPT-M MAGISTRA C&C; Ovule 18,9 mg; ct. × 2 blist. × 5 cpr. (OTC)
PHARMATEX® 1,2% LAB. INNOTHERA; Cremă vag. 1,2%; ct. × 1 tub × 72 g cremă vag. + aplicator (OTC)
PHARMATEX® 18,9 mg LAB. INNOTHERA; Ovule 20 mg; ct. × 2 folii × 5 ovule (OTC)
Ind: Anticoncepțional local cu acțiune spermicidă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMANTADINUM
AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM

Cod ATC: J01C08E

MOLDAMIN® ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. susp. inj. benzatin benzilpenicilină 600000 UI/ml.; 1200000 UI/ml.; 2400000 UI/ml. (**S/P-RF**)

RETARPEN® 1,2; RETARPEN® 2,4 SANDOZ GmbH; Pulb. pt. susp. inj. benzatin benzilpenicilină 1200000 UI; 2400000 UI; ct. x 1 sau 100 fl. (**S/P-RF**)

Ind: În infecții cu germeni sensibili la benzilpenicilină, localizate: respirator, în sfera ORL și stomatologică, cutanat, uro-genital, digestiv; în profilaxia infecției streptococice la bolnavii cu reumatism poliarticular acut și în infecția sifilitică.

Dz: *Adulți:* I.m.: în faringita streptococică și în scarlatină: 1200000 UI într-o singură inj./zi, profilaxia infecției streptococice la bolnavii cu reumatism articular acut: 1200000 UI o dată pe săpt. timp îndelungat, în infecția sifilitică: 2400000 UI la intervale de 4-5 zile; 2 doze pentru profilaxie (la contact) și în sifilisul primar seronegativ; 3 doze în sifilisul primar seropozitiv; 5 doze în sifilisul secundar recent și în sifilisul tardiv fără afectare neurologică sau cardiovasculară. *Copii:* dozele uzuale sunt de 600000-1200000 UI.

Cind: Hipersensibilitate la benzilpenicilină.

Al: Inj. i.v. poate produce accidente embolice sau reacții toxice; inj. intraarterială poate produce necroză extinsă. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină. Atenție în cazul asocierii cu: metotrexat, probenecid. Poate modifica rezultatele dozării glucozei prin metode care folosesc substanțe reducătoare. Atenție în cazul utilizării în sarcină sau în perioada de alăptare.

RA: Manifestări alergice: urticarie, febră, eozinofilie, edem Quincke, excepțional șoc anafilactic. Tulburări digestive: greață, vărsături, diaree. Creșterea nivelului transaminazelor serice și tulburări hematologice reversibile (anemie, trombocitopenie, leucopenie). La pacienții cu IR poate determina tulburări nervos centrale (tulburări ale stării de conștiență, mișcări anormale, crize convulsive).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D10AE01

AMBAZONUM
AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM

BREVOXYL STIEFEL LAB.; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 40 g (OTC)

Ind: Tratamentul formelor ușoare și moderate de acnee vulgară.

Dz: Se aplică un strat subțire de cremă pe întreaga suprafață afectată, o dată sau de 2 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la peroxid de benzoil sau la oricare dintre excipienți.

Al: A se evita contactul cu ochii, mucoasa bucală sau alte mucoase. Prudență la aplicarea pe gât sau pe alte zone sensibile. Pe parcursul tratamentului, trebuie redusă la minimum expunerea la soare sau la lămpi ultraviolete. Produsul poate decolora materialele textile colorate.

RA: În primele zile, ușoară senzație de arsură, eritem și exfoliere moderată a pielii. Pot să apară temporar prurit, edem facial, dermatită, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M02AA05

AMBROXOLUM
AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIUM SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZDAMINUM

TANTUM GEL 5% CSC PHARMACEUTICALS; Gel 5%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)

TANTUM LEMON CSC PHARMACEUTICALS; Cpr. de supt 3 mg; ct. × 2 sau 3 pachete × 10 cpr. (OTC)

TANTUM ROSA CSC PHARMACEUTICALS; Gran. pt. sol. vaginală 500 mg/plic; ct. × 5 sau 10 plicuri (OTC)

TANTUM VERDE 0,15% CSC PHARMACEUTICALS; Sol. ext. 0,15%; ct. × 1 fl. × 60, 120, 150 sau 1000 ml, cu sau fără pompă dozatoare (OTC)

TANTUM VERDE 0,5% CSC PHARMACEUTICALS; Pastă de dinți 0,5%; tub × 10, 30 sau 60 g (OTC)

TANTUM VERDE P CSC PHARMACEUTICALS; Cpr. de supt 3 mg; ct. × 2 sau 3 pachete × 10 cpr. (OTC)

Ind: Adjuvant în trat. gingivitei, stomatitei, glositei, parodontopatiilor și după extracții dentare. Inflamații oro-faringiene: faringită, amigdalită, gingivită, stomatită, parodontopatii, leziuni ale mucoasei bucale de diferite etiologii (proteze, iradierii, manevre stomatologice).

Dz: Pastă: Se periază dinții și gingiile 2-3 ori pe zi. Cpr.: Un cpr. de 3-4 ori/zi; cpr. se păstrează cât mai mult timp în cavitatea bucală pentru o dizolvare lentă.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului.

Al: Pasta de dinți nu trebuie utilizată timp îndelungat. Atenție în cazul utilizării în timpul sarcinii. Se recomandă întreruperea alăptării. În cazul înghițirii unei cantități mari de pastă de dinți medicinală pot să apară halucinații vizuale, care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

RA: Senzație de amorțeală în cavitatea bucală și faringe. Senzații ușoare de arsură la nivelul cavității bucale, greață sau vărsături. În cazul înghițirii în cantități mari, pot să apară: tulburări de somn, agitație, halucinații vizuale, urticarie, exantem, fotosensibilizare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMFEPRAMONUM
AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM

Cod ATC: J01CE01

PENICILINĂ G POTASICĂ ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 400000 UI, 1000000 UI/ml benzilpenicilină potasică (S/P-RF)
PENICILINĂ G SODICĂ ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 400000 UI, 1000000 UI, 5000000 UI/ml benzilpenicilină sodică (S/P-RF)

Ind: Infecții cu germeni sensibili: pneumonie, meningită cu pneumococ, endocardită cu streptococ viridans, meningococemie, meningită cu meningococ, infecții severe cu anaerobi, sifilis, actinomicoză, antrax, gangrenă gazoasă, tetanos, infecții cu Listeria, sterilizarea purtătorilor de bacili difterici; profilactic, la bolnavii cu valvulopatii care suferă intervenții dentare și cu ocazia intervențiilor pe intestin sau tractul genito-urinar.

Dz: Inj. i.m., i.v. sau perf. i.v., obișnuit 1200000-6000000 u./zi la adulți și 400000-1200000 u./zi la copii, fracționat, la 4-8 ore interval; în infecțiile grave, inj. sau perf. i.v. cu 10-50 milioane u.i./zi.

Cind: Alergie la penicilină.

Al: Folosirea în aplicații locale trebuie evitată. Prudență în IC, IR. Poate interfera cu determinarea urobilinogenului și a glucozei urinare.

RA: Reacții alergice: urticarie, edem angioneurotic, febră, inflamații articulare, dermatită exfoliativă, șoc anafilactic. Suprainfecții cu Proteus, Pseudomonas, Candida; convulsii, anemie hemolitică, leucopenie, trombocitopenie, nefropatii; reacție Herxheimer, durere la locul inj. i.m.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMIFOSTINUM
AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIU SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM

Cod ATC: J01CE09

EFITARD ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. susp. inj. 300000 UI procain benzilpenicilină + 100000 UI benzilpenicilină potasică; 600000 UI procain benzilpenicilină + 200000 UI benzilpenicilină potasică (S/P-RF)

FORTIFIED PROCAINE PENICILLIN ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. susp. inj. 3000000 UI, 4 000000 UI (S/P-RF)

Ind: Indicată în forme ușoare sau de gravitate medie ale infecțiilor sistemice sau localizate, generate de germeni sensibili la Penicilină G, în care sunt suficiente titrurile ce se obțin prin injectarea preparatului: unele infecții bronho-pulmonare, scarlatină, angine, celulite, erizipel, infecții după intervenții ca amigdalectomia, extracția dentară ș.a.

Dz: Strict i.m., cât mai profund (se controlează, aspirând cu seringă, dacă acul nu a pătruns într-un vas sanguin). Posologia este în funcție de boală și de bolnav și de asemenea intervalele. Dozele uzuale sunt: *Adulți:* 400000-800000 UI la 12-14 ore. *Copii peste 2 1/2 ani:* 200000-400000 UI la 12-14 ore. În tratamentul sifilisului se recomandă administrarea unei doze totale de 6000000-12000000 UI în decurs de 10-15 zile.

Cind: Persoane sensibilizate la penicilină sau la procaină; în formele grave ale infecțiilor cu germeni sensibili (în care este necesară o penicilinemie de start ridicată, ce nu se poate obține cu procainbenzilpenicilină, ci numai cu o penicilină „acută”); în infecții cu germeni rezistenți la Penicilină G sau cu o sensibilitate moderată la aceasta. Nu se recomandă administrarea preparatului la copii sub 2 1/2 ani.

Al: Efectuarea antibiogrammei înainte de instituirea tratamentului cu procainbenzilpenicilină, iar în infecțiile determinate de stafilococ, testarea repetată a sensibilității acestuia (rezistența se poate instala foarte rapid).

RA: Cele mai importante sunt de tip alergic (erupții cutanate, fenomene asemănătoare celor din boala serului, mai rar șoc anafilactic, modificări sanguine - anemie, leucopenie, eozinofilie peste 25%, trombocitopenie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: P03AX01

AMIKACINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM

BENZOAT DE BENZIL MK MARK PHARMACEUTICS SRL; Cremă 25%; ct. × 1 tub × 35 g (*P-RF*)

Ind: Scabie, pediculoză.

Dz: Scabie - pe întreaga suprafață a corpului, pe pielea uscată, cu repetare a doua zi. Pediculoză - se aplică pe porțiunea de piele bine spălată și uscată, se menține 24 ore, cu repetare după 7 zile.

Cind: Hipersensibilitate.

Al: A nu se aplica pe pielea lezată sau inflamată. A se evita contactul cu ochii, urechile și buzele.

RA: Locale - senzație trecătoare de arsură, înroșirea și iritarea pielii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G02CXN2

AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARII SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM

ABUFENE® 400 mg BOUCHARA-RECORDATI; Cpr. 400 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. *(P-RF)*

Ind: Bufeuri la menopauză.

Dz: 1-3 cpr. pe zi, la indicația medicului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMINOPHYLLINUM
AMIODARONUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM

Cod ATC: N07CA01

BETASERC® 8 mg; BETASERC® 16 mg; BETASERC® 24 mg; SOLVAY PHARMACEUTICALS; Cpr. 8 mg, 16 mg și 24 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. și ct. × 4 blist. × 25 cpr. (8 mg), ct. × 3 blist. × 20 cpr. (16 mg), ct. × 1 blist. × 20 cpr. și ct. × 2 sau 4 blist. × 25 cpr. **(P-6L)**

MICROSER CSC PHARMACEUTICALS/FORMENTI; Cpr. 8 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

Ind: Deficit microcirculator la nivelul labirintului, sindroamele vertiginoase, sindrom Ménière, insuficiență circulatorie vertebro-bazilară. Profilactic sau curativ în trat. tinitusului sau pierderii auzului din sindromul Ménière.

Dz: Oral, 8-16 mg de 2-3 ori pe zi, preferabil în timpul meselor.

Cind: Hipersensibilitate. Ulcer gastric. Feocromocitom. Copii. Perioadă de alăptare.

A!: La pacienții cu antecedente de ulcer peptic, la pacienții cu astm bronșic. Nu se asociază cu antihistaminice. Prudență la femeile gravide.

RA: Greață, cefalee și manifestări de idiosincrazie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMIODARONUM
 AMISULPRIDUM
 AMITRIPTYLINUM
 AMLODIPINUM
 AMOBARBITALUM
 AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
 AMOXICILLINUM
 AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 BARIUM SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM

Cod ATC: H02AB01, D07AC01**BETADERM** E.I.P.I.C.O.; Cremă, unguent 0,1%; ct. × 1 tub × 20 g (P-RF)**CELESTONE** SCHERING PLOUGH EUROPE; Sol. inj. 4 mg/ml; ct. × 1 f. × 4 ml (P-RF)**DIPROPHOS** SCHERING PLOUGH EUROPE; Susp. inj. i.m. 7 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)**OPHTAMESTONE** DAR AL DAWA; Sol. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-RF)

Ind: Sol. inj.: trat. bolilor endocrine, șoc hemodinamic, șoc endotoxic, edem cerebral, episoade de rejet în transplantul renal, antepartum în prevenirea sindromului detresei respiratorii la prematuri, afecțiuni musculo-scheletice, boli de colagen, afecțiuni dermatologice, stări alergice, afecțiuni oftalmologice, afecțiuni respiratorii, tulburări hematologice, afecțiuni gastrointestinale, neoplazii, stări edematoase, alte afecțiuni. Adm. percutan: trat. diferitelor tipuri de eczeme inclusiv: eczema atopică, eczema infantilă; eczema Besnier și eczema de stază; neurodermatoze incluzând lichen plan; dermatite seboreice; sensibilizare și alergii de contact; psoriasis; înțepături ale insectelor.

Dz: Adm. inj. i.v., i.m., intraarticulară, intralezională sau în țesuturile moi. Doza inițială sol. inj. la adulți poate varia până la 8,0 mg pe zi depinzând de specificul afecțiunii tratate. Doza inițială, uzuală adm. i.m., la copii: 0,02-0,125 mg/kg/zi. După obținerea răspunsului terapeutic dozele se scad treptat până la doza minimă posibilă. Adm. topică: O cantitate mică se va aplica pe zona bolnavă 1-2 ori pe zi până se va produce ameliorarea. După aceasta este necesară o singură aplicare zilnică sau chiar mai rar.

Cind: Pacienții cu infecții fungice sau bacteriene. Acneea Rosacee, Acneea Vulgaris și dermatite periorale; infecții virale cutanate; hipersensibilitate la preparat. În caz de prurit perianal și genital și în dermatoze cu suprafață mai mare de 15 cm la copii sub 1 an.

Al: Pt. adm. inj.: Precauție la pacienții cu purpură trombocitopenică idiopatică. A se evita inj. într-o articulație anterior infectată. Nu trebuie inj. în articulații instabile, zone infectate sau spații intervertebrale. Evitați inj. direct în masa tendinoasă. Precauție la pacienții cu istoric de alergii. Poate masca unele semne de infecție. Intensifică eliminarea de potasiu. În timpul trat. pacienții nu trebuie vaccinați împotriva variolei. În tbc active corticoterapia trebuie limitată numai la cazurile de tbc fulminantă sau diseminată. Trebuie folosită cea mai mică doză posibilă; când este posibilă reducerea dozei, aceasta se va face treptat. Efectul este amplificat la pacienții cu hipotiroidism și la cei cu ciroză hepatică. Precauție la pacienții cu herpes simplex ocular. În timpul terapiei pot apărea probleme psihice. Precauție în: colitele ulcerative nespecifice, abces sau alte infecții piogenice; diverticulite; anastomoze intestinale noi; ulcer peptic activ sau latent; IR; HTA; osteoporoză; miastenia gravis. Atenție în cazul folosirii la copii și sugari. Adm. topică excesivă poate determina efecte sistemice. Atenție în cazul asocierii cu: fenobarbital, rifampicină, fenitoină, efedrină, estrogeni, diuretice care elimină potasiul, glicozizi cardiotonici, amfotericină B, anticoagulante cumarinice, AINS, alcool, antidiabetice. Corticosteroizii pot afecta testul „nitroblue tetrazolium” pentru infecție bacteriană și produce rezultate fals negative. Evitarea în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATACURURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIUM SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM

Cod ATC: S01ED02, C07AB05**BETAC** MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cpr., ct. × 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)**BETAXOLOL** TERAPIA SA; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 10 g (P-6L)**BETOPTIC** ALCON; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-6L)**BETOPTIC-S** ALCON; Susp. oft. 0,25%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-6L)**LOKREN® 20 mg** SANOFI-SYNTHELABO; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)**OPTIPRES** CIPLA; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)

Ind: Adm. int.: HTA. Profilaxia crizelor de angină pectorală de efort. Adm. local conjunctival: Glaucom cronic cu unghi deschis și al hipertensiunii intraoculare.

Dz: Adm. int.: 10-40 mg o dată pe zi. În IR dozele trebuie adaptate. Adm. local conj.: o picătură betaxolol 5 mg/ml instilată în ochiul afectat, de două ori pe zi. Presiunea intraoculară va fi determinată periodic.

Cind: În cazul adm. int.: hipersensibilitate la componentele produsului; forme severe de astm bronșic și BPOC; IC; șoc cardiogen; BAV gradul II și III, la pacienții fără un pacemaker implantat; angină Prinzmetal; boală sinusală; bradicardie; forme severe de sindrom Raynaud și boli arteriale periferice; feocromocitom netratat; hTA; reacții anafilactice în antecedente. În cazul adm. locale: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului. Bradicardie sinusală severă, BAV gradul II-III, șoc cardiogen, IC manifestă. Este CI asocierea cu: floctafenină și cu sultopridă.

Al: În cazul adm. int.: Trat. nu trebuie niciodată întrerupt brusc. Atenție în cazul pacienților cu: astm bronșic și BPOC, IC, bradicardie, BAV gradul I, angină Prinzmetal, afecțiuni arteriale periferice, feocromocitom; la vârstnici, în IR, la pacienți cu diabet zaharat, la cei cu psoriazis, la pacienții predispuși să dezvolte o reacție anafilactică severă, în caz de anestezie generală. În cazul adm. oft.: Poate interfera cu testele diagnostice pentru glaucom. Poate masca semnele CV ale tireotoxicozei. Prudență la pacienții cu glaucom cu unghi închis. Atenție, în cazul adm. sistemice, la asocierea cu: digitalice, anestezice inhalatorii halogenate, blocante ale canalelor de calciu, antiaritmice, baclofen, insulină și antidiabetice orale, lidocaină, substanțele de contrast care conțin iod, AINS, antidepresive triciclice, glucocorticoizi și tetracosactid, meflochină, simpatomimetice. În cazul adm. locale, atenție în cazul asocierii cu: epinefrină, rezerpină, medicamente psihotrope. Se recomandă supravegherea atentă a nou-născutului în primele 3-5 zile de viață, într-o unitate specializată. Alăptarea nu este recomandată pe durata trat. Atenție în cazul utilizării la șoferi sau la cei cu activități de precizie.

RA: În cazul adm. int.: astenie, extremități reci, bradicardie, tulburări gastrointestinale, impotență, amețeli și cefalee, insomnie, încetinirea conducerii atrio-ventriculare sau accentuarea unui BAV, IC, hTA, bronhospasm, hipoglicemie, sindrom Raynaud, agravarea claudicației intermitente, diferite reacții cutanate, inclusiv erupții psoriaziforme sau exacerbară psoriazisului, depresie. Apariția anticorpilor antinucleari; însoțiți excepțional de LES.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMITRIPTYLINUM
AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARII SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM

Cod ATC: L01XC07

AVASTIN 25 mg/ml HOFFMANN LA ROCHE; Conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml; ct. × 1 fl. × 4 sau 16 ml (S)

Ind: Bevacizumab, în asociere cu 5-fluorouracil/acid folinic i.v. sau cu 5-fluorouracil/acid folinic/irinotecan i.v. este indicat pentru tratamentul de primă linie al pacienților cu cancer de colon sau rect metastazat.

Dz: Avastin trebuie administrat sub supravegherea unui medic cu experiență în utilizarea produselor medicamentoase antineoplazice. Doza recomandată de Avastin este de 5 mg/kg, administrat o dată la fiecare 14 zile, sub formă de perfuzie intravenoasă.

Cind: Hipersensibilitate, sarcină, pacienți cu metastaze cerebrale netratate.

Al: Risc crescut de perforație gastro-intestinală la pacienții cu cancer de colon sau rect metastazat și proces inflamator intraabdominal. Bevacizumab afectează în sens negativ procesul de cicatrizare a plăgilor. Este necesar controlul tensiunii arteriale pe parcursul tratamentului, deoarece poate crește incidența hipertensiunii arteriale.

RA: Perforație gastro-intestinală, hemoragie, trombo-embolism arterial, hipertensiune arterială, astenie, diaree, greață.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C10AB02

AMLODIPINUM
AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIU SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM

REGADRIN-B BERLIN-CHEMIE AG; Dj. 200 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 dj. **(P-6L)**

Ind: Tulburări de metabolism lipidic care nu pot fi corectate suficient prin dietă; tulburări ale metabolismului lipidic care însoțesc maladii de bază ca diabetul zaharat, guta și altele.

Dz: Oral, 200 mg de 2-3 ori/zi.

Cind: Boli hepatice, ale vezicii biliare, tulburări severe ale funcției renale, sarcină și alăptare.

Al: Precauții în tulburări ușoare ale funcției renale; în perioada de creștere. Atenție în cazul asocierii cu: hipoglicemizante, anticoagulante, IMAO, colestir-amina.

RA: Tulburări gastro-intestinale (anorexie, greață, meteorism și diaree), cefalee, amețeli, slăbiciune, oboseală, reacții alergice cutanate (prurit, exantem), tulburări de potență, căderea părului, slăbiciune musculară și contractură, scăderi ale numărului de eritrocite, leucocite și trombocite, modificarea parametrilor de laborator, indicatori ai funcției hepatice și renale. Rar apare rabdomioliza. Formarea de calculi biliari.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMOBARBITALUM
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM

Cod ATC: L02BB03

CASODEX 50 mg; CASODEX 150 mg ASTRAZENECA; Cpr. film. 50 mg, 150 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. carcinomului de prostată în stadiu avansat.

Dz: *Adulți:* 50 mg o dată pe zi. Trat. trebuie început în același timp cu trat. cu un analog LH-RH sau cu castrarea chirurgicală.

Cind: Femei și copii. Gravide sau mame care alăptează. Hipersensibilitate la componentele produsului.

A!: La subiecții cu afectarea severă a funcției hepatice. Atenție în cazul asocierii cu anticoagulante cumarinice.

RA: Valuri de căldură, prurit, mastodinie și ginecomastie. Diaree, grețuri, astenie, tegumente uscate. Modificări ale funcției hepatice. Au mai fost raportate: IC, anorexie, uscăciunea mucoasei bucale, dispepsie, constipație, flatulență, amețeli, insomnie, somnolență, scăderea libidoului, dispnee, impotență, nicturie, anemie, alopecie, rash, transpirații, hirsutism, diabet zaharat, hiperglicemie, edem, creștere sau scădere în greutate, dureri abdominale, dureri toracice, cefalee, dureri pelvine, frisoane.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: DO1AC10

AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM

BIAZOL 1% GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15 g (*P-RF*)

MYCOSPOR® BAYER AG; șampon gel 1%; ct. × 1 fl. × 100 g (*OTC*)

MYCOSPOR® BAYER AG; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15 g (*P-RF*)

MYCOSPOR® BAYER AG; Sol. ext. 1%; ct. × 1 fl. × 15 ml (*P-RF*)

MYCO-FLUSEMIDON ANFARM HELLAS; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15 g (*P-RF*)

Ind: Trat. dermatitei seboreice a scalpului; micozelor cutanate produse de dermatofiți, levuri, îndepărtarea atraumatică a unghiei pentru trat. onicomicozelor.

Dz: Trat. dermatitei seboreice a scalpului: aplicații locale, câte 2 aplicații, de 3 ori/săpt. Trat. micozelor cutanate: aplicații locale, o dată pe zi, timp de 2-4 săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului.

Al: A se evita contactul cu ochii. Atenție în timpul sarcinii.

RA: Reacții alergice, dermatită de contact, prurit, rash veziculobulos.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N04AA02

AMOXICILLINUM
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDINUM

AKINETON ABBOTT; Cpr. 2 mg; ct. × 5 blist. × 10 sau 20 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. simptomelor extrapiramidale provocate de neuroleptice și medicamente cu acțiune similară, cât și a tulburărilor similare parkinsonului; alte tulburări de motilitate extrapiramidale, generalizate sau localizate, sindromul Meige, blefarospasm sau torticollis spasmodicus, intoxicații cu nicotină sau cu derivați organofosforici.

Dz: Adm. oral.: *adulți:* 1-2 mg de 1-4 ori/zi. Doza max. 16 mg/zi. *Copii în vârstă de 3-15 ani:* 1-2 mg de 1-3 ori/zi. La *vârstnici* dozele trebuie evaluate atent.

Cind: Glaucom cu unghi închis, stenoze mecanice ale tractului digestiv, megacolon.

Al: Atenție în cazul adenomului de prostată și al bolilor cardiace însoțite de tahicardie. Atenție în cazul adm. concomitente cu: alte medicamente psihotrope, anticolinergice, antihistaminice, antiparkinsoniene, spasmolitice, chinidină, levodopa, neuroleptice, metoclopramid, alcool. Precauție în timpul sarcinii, în special în primele 3 luni. Se recomandă întreruperea lactației în timpul trat. Atenție în cazul șoferilor și a celor care desfășoară activități de precizie.

RA: Oboseală, amețeli, uscăciunea gurii, neliniște, vertij, delir, iritare, slăbire a memoriei, halucinații, tulburări de acomodare vizuală, hipohidroză, constipație, simptome gastrice, creșterea frecvenței cardiace și, foarte rar, scăderea acesteia.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A06AB02

AMPICILLINUM
 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 BARI SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM

BICOLAX EUROPHARM SA; Sup. 10 mg; ct. × 2 sau 5 folii × 5 sup. (OTC)
BISACODIL TERAPIA SA; Dj. gastrorez. 5 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (OTC)
DULCOLAX® 5 mg BOEHRINGER INGELHEIM; Dj. gastrorez. 5 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (OTC)
LAXAMAG MAGISTRA C&C; Sup. 10 mg; ct. × 2 blist. × 3 sup. (OTC)
LAXATOL® SICOMED SA; Cpr. film. gastrorez. 5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (OTC)
STADALAX® STADA ARZNEIMITTEL AG; Dj. gastrorezist. 5 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 25 dj. (OTC)

Ind: Constipație; favorizarea evacuării (în cazul hemoroizilor; pre- și postoperator; pregătirea colonului pentru examene endoscopice).

Dz: *Adulți:* 10 mg seara la culcare. *Copii în vârstă de 4 ani și peste:* 5 mg.

Cind: Abdomenul acut chirurgical.

Al: Adm. concomitentă a antiacidelor (de exemplu, bicarbonat de sodiu) trebuie evitată. Precauție în timpul primelor trei luni de sarcină și la copii sub 4 ani.

RA: Disconfort abdominal. Rar, leziuni anale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMA
 AMPRENAVIRUM
 ANASTROZOLUM
 APOMORFINUM
 APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 BARI SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS

Cod ATC: A02BX05

DE-NOL ASTELLAS PHARMA; Cpr. film. 120 mg; ct. × 5 blist. × 8 cpr. (**P-6L**)

Ind: Ulcerul gastric și duodenal, gastrite, eradicarea Helicobacter pylori.

Dz: Oral: 240 mg de 2 ori pe zi pe stomacul gol, cu 1/2 de oră înainte de micul dejun și cu 1/2 de oră înainte de cină sau înainte de culcare sau 480 mg o dată pe zi pe stomacul gol. Trat. se continuă 1-2 luni.

Cind: IR gravă.

Al: Poate conduce ocazional la encefalopatie reversibilă. Nu se recomandă utilizarea concomitentă a altor medicamente conținând bismut, antiacide, lapte, fructe sau sucuri de fructe. Absorbția tetraciclinelor poate fi redusă de adm. concomitentă de subcitraț de bismut.

RA: Înnegrirea scaunului, grețuri, vărsături, constipație, diaree, reacții alergice la nivelul pielii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AMPRENAVIRUM
ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDINUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM

Cod ATC: C07AB07

BISOGAMMA® 5; BISOGAMMA® 10 WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. 5 și 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

BISOMERCK 5 mg; BISOMERCK 10 mg MERCK KGaA; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

BYOL® 5 mg; BYOL® 10 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

CONCOR® 5 mg; CONCOR® 10 mg MERCK KGaA; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

CONCOR® COR 2,5 mg; CONCOR® COR 5 mg; CONCOR® COR 10 mg MERCK KGaA; Cpr. film. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 2, 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: HTA, angină pectorală, IC congestivă.

Dz: Trat. cu bisoprolol se face pe o perioadă lungă. Oral: 5-10 mg de 1-2 ori/zi. În IR și IH, max. 10 mg.

Cind: IC decompensată; BAV de gradul II sau III, boală de nod sinusal; astm bronșic; bradicardie < 50/min; hTA marcată; șoc cardiogen; stadii avansate ale tulburărilor circulatorii periferice.

Al: Nu se va opri brusc adm. de bisoprolol. Se adm. cu atenție în: acidoză metabolică; diabet zaharat; în feocromocitom. Atenție în cazul asocierii cu: anestezice, antiaritmice și verapamil, insulină, sulfoniluree, antiHTA, glicozide cardiotonice, derivați ergotaminici nehidrogenați. Se indică oprirea trat. cu 72 de ore înainte de data presupusă a nașterii. Poate modifica reacțiile din timpul șofatului.

RA: Greață, diaree, constipație; oboseală; agravarea IC, bradicardie, BAV, scăderea TA; spasm bronșic; furnicături și senzație de rece la nivelul membrelor, agravarea tulburărilor circulatorii periferice; scăderea fluxului lacrimal; reacții cutanate; crampe musculare, slăbiciune musculară; tulburări de somn; halucinații; psihoze depresive; dezechilibrul stării de prediabet sau de diabet metabolic; rar, tulburări de dinamică sexuală. Mai pot apărea: amețeli, cefalee ușoară, transpirații, scăderea toleranței la glucoză mai ales la diabeticii vârstnici.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01DC01

ANASTROZOLUM
APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS

BLEOCIN NIPPON KAYAKU Co.; Pulb. liof. 15 mg; ct. × 1 f. (S)

Ind: Cancere cu celule scuamoase, boală Hodgkin și alte limfoame maligne, teratom testicular, revărsări maligne ale cavităților seroase.

Dz: Inj. i.m. sau i.v. (în bolus sau perfuzie), în funcție de afecțiunea tratată: câte 15 mg de 1-3 ori pe săptăm. sau 30 mg o dată/săpt., până la doza totală de 225-500 mg pentru vârste sub 60 de ani, mai puțin pentru vârstele înaintate.

Cind: Sarcină și perioada de alăptare, infecții pulmonare acute, insuficiență pulmonară marcată; prudență și doze mici la bolnavii cu IR.

RA: Reacții imediate: febră, oboseală, anorexie, greață, rar hTA, tromboflebită locală. Reacții tardive: stomatită, leziuni cutanate, alopecia trecătoare, pneumonie interstițială, care poate evolua către fibroză pulmonară gravă; rar: hiperpirexie, chiar moarte, după injectarea intracavitară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

APOMORFINUM
APROTININUM
ARGININUM
ARIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYL DAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01XX32

VELCADE 3,5 mg JANSSEN PHARMACEUTICA; Liof. pt. sol. inj. 3,5 mg; ct. × 1 fl. × 3,5 mg (**P-6L**)

Ind: Monoterapie la pacienții cu mielom multiplu progresiv care au primit anterior cel puțin un tratament și care au fost deja supuși unui transplant de măduvă osoasă sau nu au indicație de transplant.

Dz: Doza inițială recomandată este de 1,3 mg borteomib/m² de suprafață corporală de două ori pe săptămână, timp de două săptămâni (zilele 1, 4, 8 și 11), urmată de o perioadă de pauză de 10 zile (zilele 12 - 21).

Cind: Hipersensibilitate. IH severă.

Al: Hemograma completă, inclusiv numărul de trombocite, trebuie frecvent monitorizată în timpul tratamentului. Pacienții care suferă de constipație trebuie atent monitorizați. Pacienții trebuie să fie atent monitorizați pentru simptome de neuropatie cum sunt senzația de arsură, hiperestezia, hipoestezia, parestesia, disconfortul sau durerea neuropatică.

RA: Foarte frecvente: trombocitopenie, anemie, neutropenie, scăderea apetitului, neuropatie senzorială periferică, cefalee, paretezii, dispnee, greață, diaree, vărsături, constipație, erupții cutanate, mialgii, oboseală, febră. Frecvente: herpes zoster, pneumonie, bronșită, sinuzită, nazofaringită, herpes simplex, leucopenie, limfopenie, deshidratare, hiperglicemie, hipokaliemie, insomnie, anxietate, confuzie, depresie, amețeli (excluzând vertijul), disgeuzie, agravarea neuropatiei periferice, polineuropatie, disestezie, hipoestezie, tremor, vedere încetșată, dureri oculare, vertij, hipotensiune arterială ortostatică, hipotensiune arterială, flebită, hematoame, epistaxis, dispnee de efort, rinoree, tuse, dureri abdominale, dispepsie, scaune diareice, dureri la nivelul abdomenului superior, flatulență, distensie abdominală, sughiț, ulceratii bucale, dureri faringolaringiene, stomatită, gură uscată, prurit, eritem, edeme periorbitale, urticarie, erupții cutanate pruriginoase, hipersudorație, piele uscată, eczemă, dureri la nivelul membrelor, crampe musculare, artralгии, dureri osoase, edeme periferice, hipotonie musculară, dureri de spate, dureri musculoscheletice, disurie, slăbiciune, rigiditate musculară, indispoziție, sindrom influenza-like, edeme periferice, durere, letargie, edem, dureri toracice, astenie, scădere ponderală, creșterea lactatdehidrogenazei plasmatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01EC04

APROTININUM
 ARGININUM
 ARIPIRAZOLUM
 ASPARAGINAZUM
 ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 BARI SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM

AZOPT ALCON; Picături oculare, susp. 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)

Ind: Scăderea presiunii intraoculare crescute în: hipertensiune intraoculară, glaucom cu unghi deschis.

Dz: 1 picătură sol. de 1-3 ori/zi, în sacul conjunctival al ochiului/ochilor afectat/ afectați de două ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componente sau la sulfonamide. IR severă. Acidoză hipercloremică. Perioada de alăptare.

Al: Nu se recomandă utilizarea produsului la pacienți sub 18 ani sau la pacienți cu IH. Atenție în cazul pacienților care poartă lentile de contact. Se recomandă monitorizarea atentă în alte cazuri de cornee compromise (ex: la pacienți cu diabet zaharat). Atenție în cazul asocierii cu: ketoconazolul, itraconazolul, clotrimazolul, ritonavirul și troleandomicina. Prudență în timpul sarcinii. Poate afecta capacitatea de a conduce mașina sau de a manipula utilaje.

RA: Efecte oculare: încetșarea vederii, disconfort ocular, senzație de corp străin, hiperemie oculară, uscăciunea ochiului, durere oculară, hipersecreții oculare, prurit ocular, keratită, blefarită, conjunctivită, cruste ale marginii pleoapelor, senzație de vâscozitate, keratopatie, foliculi conjunctivali, vedere anormală, eroziune corneană. Efecte sistemice: tulburarea percepției gustative, uscăciunea gurii, grețuri, dispepsie, dureri toracice, alopecie, reacții de hipersensibilitate (dermatită), cefalee, parestezii caracterizate prin amorțirea extremităților și

furnicături, depresie, amețeli, rinită, dispnee, faringită, bronșită, epistaxis, hemoptizie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ARGININUM
ARIPRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIUM SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM

Cod ATC: J05ABN1**BRIVAL®** BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. 125 mg; ct. × 1 blist. × 1 sau 7 cpr. (P-RF)**Ind:** Tratamentul precoce al herpes zoster acut la pacienții adulți fără deficit imun.**Dz:** 1 cpr/zi, timp de 7 zile.**Cind:** Hipersensibilitate. Pacienți aflați sub tratament chimioterapic, în special la cei tratați cu 5-fluorouracil. Pacienți cu deficit imun. Sarcină, alăptare.**Al:** Brivudina nu trebuie administrată în asociere cu 5-fluorouracil, inclusiv preparatele topice sau prodrogurile corespunzătoare (de exemplu capecitabina, tegafur și floxuridina) sau combinații conținând aceste substanțe active sau alte 5-fluoropirimidine (de exemplu flucitozina) și se impune o pauză de minim 4 săptămâni înaintea începerii tratamentului cu medicamente de tipul 5-fluoropirimidină. Ca o precauție suplimentară, la pacienții care au primit recent brivudină, trebuie monitorizată activitatea enzimatică a dihidropirimidin dehidrogenazei (DPD) înaintea începerii tratamentului cu medicamente de tip 5-fluoropirimidină.**RA:** Frecvent greață. Mai puțin frecvent tulburări sanguine (granulocitopenie, eozinofilie, anemie, limfocitoză, monocitoză), anorexie, insomnie, cefalee, amețeli, vertij, somnolență, astenie, fatigabilitate, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ARIPIRAZOLUM
ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM

Cod ATC: N05BA08

BROMAZEPAM LPH® 1,5 mg; BROMAZEPAM LPH® 3 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 1,5 mg, 3 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

BROMAZEPAM 1,5 mg; BROMAZEPAM 3 mg TERAPIA SA; Cpr. 1,5 mg, 3 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

BROMAZEPAM 3 mg SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 3 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

CALMEPAM® GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 1,5 mg, 3 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

LEXOTANIL® HOFFMANN LA ROCHE ambalat de TERAPIA SA; Cpr. 3 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

LEXOTANIL® (LEXOTAN) HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. 3 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Anxietate și stări tensionale, dispoziție depresivă, tensiune nervoasă, agitație și insomnie.

Dz: *Adulți:* oral: 1,5-3 mg, de până la trei ori pe zi. Cazuri severe: 6-12 mg, de două sau trei ori pe zi. La *copii* se ajustează dozele în funcție de greutatea corporală. Pacienții *vârstnici* necesită doze scăzute.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la benzodiazepine. Pacienții cu dependență cunoscută sau presupusă față de alcool, medicamente sau droguri. În perioada de alăptare.

Al: Precauții la pacienții cu miastenia gravis. Poate produce dependență fizică și psihică. Dacă dependența fizică s-a creat deja, întreruperea bruscă a trat. va fi însoțită de simptome de sevraj. Atenție în cazul asocierii cu: alcool, neuroleptice, tranchilizante, antidepresive, hipnotice, analgezice și anestezice. Atenție în caz de: sarcină, șoferi, activități de precizie. Se recomandă controlarea nr. elementelor figurate sanguine și a funcției hepatice.

RA: Oboseală, somnolență, slăbiciune musculară. Unii pacienți pot dezvolta dependență. Reacții paradoxale: anxietate acută, halucinații, insomnie sau excitație.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R05CB02

ASPARAGINAZUM
ATAZANAVIRUM
ATENOLOLUM
ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIU SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM

BISOLVON® BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 8 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)
BISOLVON® BOEHRINGER INGELHEIM; Sol. uz. int. 0,2%; ct. × 1 fl. × 40 ml + măsură dozatoare (OTC)
BISOLVON® BOEHRINGER INGELHEIM; Sirop 8 mg/5 ml sau 4 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
BROMHEXIN ANTIBIOTICE SA; Cpr. 8 mg; ct. × 2 sau 200 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
BROMHEXIN ANTIBIOTICE SA; Sol. orală 0,2%; ct. × 1 fl. × 50 g (OTC)
BROMHEXIN 8 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 8 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
BROMHEXIN TIS FARMACEUTIC; Sol. orală 0,2%; fl. × 30 g (OTC)
BROMHEXIN SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 8 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
BROMHEXIN 12 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 12 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (OTC)
BROMHEXIN 8 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 8 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
BROMHEXIN 8 mg AC HELCOR SRL; Cpr. 8 mg; ct. × 20 cpr. (OTC)
BROMHEXIN 8 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 8 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)
BROMHEXIN 10 BC; **BROMHEXIN** 12 BC BERLIN-CHEMIE AG; Sol. orală. 0,2%, 1,2%; ct. × 1 fl. × 100 ml (0,2%), ct. × 1 fl. × 30 sau 50 ml (1,2%) (OTC)
BROMHEXIN CLORHIDRAT TERAPIA SA; Sol. orală 0,2%; ct. × 1 fl. × 50 g (OTC)
BROMHEXIN EEL BIO EEL SRL; Cpr. 12 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (OTC)
BRONHOSOLV LAROPHARM SRL; Cpr. 8 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
BROMHEXIN 0,2% LAROPHARM SRL; Sol. orală 0,2%; ct. × 1 fl. × 50 ml (OTC)

Ind: Fluidifiant al secrețiilor bronșice în cursul afecțiunilor bronho-pulmonare acute și cronice.

Dz: Oral. *Copii sub 2 ani:* 1 mg de 3 ori pe zi. *Copii 2-6 ani:* 2-4 mg de 3 ori pe zi. *Copii între 6 și 14 ani,* precum și pacienții care au greutatea sub 50 kg: 8 mg de 3 ori pe zi. *Adulți și tineri peste 14 ani:* 8-16 mg de 3 ori pe zi. În caz de IR sau LH doza trebuie redusă sau trebuie crescut intervalul dintre adm.

Cind: Hipersensibilitate la oricare din componente. Sarcină și alăptare. Afecțiuni bronșice cu acumulare masivă de secreții. Ulcer gastric acut.

Al: Preparatele cu dozaj mare nu sunt recomandate copiilor sub 14 ani sau pacienților cu o greutate sub 50 kg. Nu se asociază cu antitusive. Unele preparate conțin alcool etilic; prudență la bolnavii cu afecțiuni hepatice, epilepsie sau leziuni cerebrale, alcoolici, șoferi sau persoane cu activități de precizie. Prudență în IR, afecțiuni hepatice severe, copii sub 2 ani. Atenție în cazul asocierii cu medicamente iritante gastric. Nu se recomandă adm. în timpul sarcinii și pe durata alăptării.

RA: Tulburări gastrointestinale, reacții alergice, rar șoc anafilactic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ATAZANAVIRUM
 ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 Barii SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM

Cod ATC: N04BC01, G02CB01

BROCRIPITIN BIOFARM SA; Dj. 2,5 mg; ct. × 2 blist. × 20 dj. (P-6L/P-RF)

BROMOCRIPTINA DOROM 5 mg, 10 mg POLI IND. CHIMICA; Cps. 5 mg, 10 mg; ct. × 4 sau 6 blist. × 10 cps. (P-RF)

Ind: Endocrinologice - Tulburări de ciclu menstrual și infertilitate, induse de prolactină, la femei. Hiperprolactinemie la bărbați. Prolactinom. Acromegalie. Inhibiția lactației. Afecțiuni benigne ale sânului. Neurologice - Boală Parkinson idiopatică sau post-encefalică.

Dz: Oral, în timpul mesei. În hipogonadism, galactoree și/sau amenoree, tulburări ale ciclului menstrual: 1,25 mg de 2-3 ori/zi. Pentru suprimarea lactației: 2,5 mg de 2 ori/zi, timp de 14 zile. În sindrom premenstrual: 1,25 mg/zi din a 14-a zi a ciclului, cu creștere treptată a dozei, până se ajunge la 2,5 mg de 2 ori/zi la menstruație. În boala Parkinson: 1,25 mg în prima zi, la masa de seară, 2,5 mg a doua zi, crescând doza progresiv până la 20-40 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la bromocriptină sau la alți alcaloizi ai ergotului. HTA în timpul sarcinii sau perinatal.

Al: Nu trebuie adm. post-partum femeilor cu HTA, cardiopatie ischemică sau cu manifestări și/sau antecedente de tulburare psihotică majoră. Nu se recomandă adm. concomitentă cu alți alcaloizi din ergot. La bolnavele cu indicație de trat. pentru mastodinie sau modificări nodulare și/sau chistice ale sânului, trebuie mai întâi să se excludă malignitatea. Prudență la bolnavii cu antecedente de tulburări psihotice, afecțiuni cardiovasc. severe, ulcer sau hemoragie digestivă. Modificările pleuropulmonare neexplicate trebuie investigate atent. Adm. Se întrerupe când s-au diagnosticat sau se suspectează modificări de fibroză retroperitoneală. Atenție în cazul asocierii cu eritromicină sau josamicină. Atenție în cazul: femeilor însărcinate, șoferi, persoane cu activități de precizie.

RA: Greață, amețeală, astenie, vărsături, hTA ortostatică, constipație, tulburări de echilibru, cefalee, excitație psihomotorie, halucinații, tulburări diskinetice, uscăciunea gurii, crampe ale musculaturii gambelor, reacții alergice cutanate, paloare reversibilă a degetelor indusă de frig. Rar, cazuri de fibroză pleuropulmonară sau retroperitoneală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A07EA06

ATENOLOLUM
 ATOMOXETINUM
 ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 Barii SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM

BUDENOFALK® DR. FALK PHARMA; Cps. gastrorez. 3 mg; ct. × 10 blist. × 10 cps. (P-RF)

PULMICORT® 0,125 mg/ml; PULMICORT® 0,25 mg/ml; PULMICORT® 0,5 mg/ml ASTRAZENECA; Aerosol nazal 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml; fl. × 2 ml susp. pt. nebulizare (P-RF)

PULMICORT TURBUHALER ASTRAZENECA; Pulb. inhal. 200 µg/doză; ct. × 1 fl. × 100 sau 200 doze (P-RF)

RHINOCORT® AQUA ASTRAZENECA; Susp. nazală 32 µg/doză; fl. × 10 ml × 120 doze + pompă dozatoare (P-RF)

TAFEN® NASAL LEK PHARMACEUTICALS; Susp. nazală 50 µg/doză; fl. × 200 doze (P-RF)

TAFEN® NOVOLIZER 200 µg LEK PHARMACEUTICALS; Pulb. inhal. 200 µg/doză (P-RF)

Ind: Adm. inhal.: profilaxia crizelor de astm bronșic. Oral: Colită ulcerativă care afectează rectul, sigmoidul și colonul descendent. Spray nazal: Rinita alergică și non-alergică, prevenirea apariției polipilor nazali după polipectomie.

Dz: Adm. inhalator: **Adulți:** inițial, 400-1600 µg în 2-8 inhalatii/zi; trat. întreținere, 200-400 µg repartizat în 1-4 inhalatii/zi. **Copii:** 50-400 µg repartizat în 2-8 inhalatii/zi. Se recomandă utilizarea de spacer. Oral: **Adulți:** curativ: 9 mg/ zi timp de 8 săptăm., profilactic: 6 mg/zi, înainte de micul dejun. Spray nazal: **Adulți și copii peste 6 ani:** inițial, 200-400 µg/zi, în 1-2 prize. Doza de întreținere trebuie redusă la doza minimă care controlează simptomele.

Cind: Afonie. Infecții bacteriene, fungice sau virale sistemice sau locale. Hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente.

Al: Nu este recomandat în cazul crizelor terminale de astm. Poate duce la inhibarea axului hipofizo-suprarenalian și la apariția tulburărilor de creștere la copii. Trat. nu trebuie întrerupt brusc. Precauții în cazul pacienților cu tbc pulmonar, infecții pulmonare micotice și infecții virale ale tractului respirator, în cazul pacienților care folosesc glucocorticoizi adm. sistemic din cauza atrofiei renale, pacienților cu HTA, diabet zaharat, osteoporoză, ulcer peptic, glaucom sau cataractă. În situațiile în care pacienții sunt supuși unei intervenții chirurgicale sau altor situații de stres, se recomandă suplimentarea pe cale sistemică cu un glucocorticoid. Varicela și pojarul pot avea o evoluție severă la pacienții tratați cu glucocorticosteroizi orali. Funcția hepatică redusă poate afecta eliminarea glucocorticosteroizilor. Atenție în cazul asocierii cu: ketoconazol sau cu cimetidină. Atenție în cazul adm. la femei însărcinate sau în perioada de alăptare.

RA: Adm. inhal. produce candidozele cavității bucale și faringelui, spasmul bronșic paradoxal. Adm. int. poate determina: efecte adverse tipice glucocorticosteroizilor sistemici, dispepsie, crampe musculare, tremor, palpitații, nervozitate, vedere tulbură, reacții cutanate, tulburări menstruale. După folosirea spray-ului pot apărea: uscăciunea mucoasei și strănut, secreție hemoragică ușoară și epistaxis; reacții cutanate, rar, ulceratie a mucoasei, perforarea septului nazal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10BA03

ATOMOXETINUM
ATORVASTATINUM
ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARIUM SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM

SILUBIN RETARD GRUNENTHAL; Dj. ret. 100 mg; ct. × 4 blist. × 15 dj. **(P-6L)**

Ind: Diabetul zaharat de tip II.

Dz: Oral: 200-300 mg, în 2 prize, la pacienții cu glicemia de 200 mg/dl. Doza de întreținere: 100-200 mg/zi.

Cind: Comă și precomă diabetică, acidoză diabetică, IR și IH, insuficiență cardiovasculară gravă, sarcină, diabet zaharat tip I netratat corect cu insulină.

RA: Fenomene dispeptice, astenie, scădere în greutate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N01BB01

ATORVASTATINUM
 ATRACURIUM
 ATROPINUM
 AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
 AZATHIOPRINUM
 AZELASTINUM
 AZITROMYCINUM
 BACLOFENUM
 BARIU SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
BUPIVACAINUM

BUPIVACAINĂ 25 mg TERAPIA SA; Sol. inj. 0,25%; ct. × 5 f. × 10 ml (S)
BUPIVACAINĂ 50 mg TERAPIA SA; Sol. inj. 0,5%; ct. × 5 f. × 10 ml (S)
MARCAINE ASTRAZENECA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 fl. × 20 ml (S)
MARCAINE SPINAL 0,5% ASTRAZENECA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 4 ml (S)
MARCAINE SPINAL HEAVY 0,5% ASTRAZENECA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 4 ml (S)

Ind: Pentru realizarea blocului subarahnoidian (rahianestezie).

Dz: Doza variază cu procedeul anestezic, regiunea care trebuie anesteziată, vascularizația țesuturilor, numărul de segmente neuronale care trebuie blocate, profunzimea anesteziei și gradul de relaxare musculară necesar, durata anesteziei, toleranța individuală și starea fizică a pacientului. *La pacienții vârstnici* și debilitați și la pacienții cu afecțiuni cardiace și/sau hepatice dozele vor fi reduse. Dozele uzuale: 6-12 mg.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la bupivacaină sau la oricare alt anestezic local amidic. Hemoragie gravă, hTA marcată sau șoc, aritmii, bloc cardiac complet cu debit cardiac mult redus; infecție la nivelul locului propus pentru puncția lombară; septicemie.

Al: Se monitorizează: gradul anesteziei, semnele cardiovasculare, respiratorii și starea de conștiență a pacientului. Va fi utilizată doza cea mai mică de anestezic local care determină efectul dorit. Anestezicele spinale nu vor fi inj. în timpul contracțiilor uterine. Prudență la pacienții cu tulburări severe ale ritmului cardiac, șoc sau bloc cardiac, afectare hepatică, funcție cardiovasculară alterată. Dozele recomandate pentru rahianestezie sunt mult mai mici decât cele recomandate pentru alte blocuri majore. Prudență în caz de: afecțiuni preexistente ale SNC; afecțiuni hematologice care predispun la coagulopatii sau pacienți care primesc trat. anticoagulant; rahialgii cronice și cefalee preoperatorie; hTA și HTA; probleme ale inj.; artrite sau deformări ale coloanei vertebrale; vârste extreme; psihoze sau alte cauze de cooperare scăzută din partea pacientului. Atenție în cazul asocierii cu: anestezice locale care conțin adrenalină sau noradrenalină, cu IMAO, antidepressive triciclice, medicamente vasopresoare și medicamente ocitocice. Atenție în cazul utilizării la femei însărcinate (exclusiv utilizarea pentru anestezia grăvidelor la termen) și la femei care alăptează. Rahianestezia poate diminua contractilitatea uterină sau efortul de expulzie. Adm. bupivacainei la pacienții sub 18 ani nu se recomandă.

RA: Sistemul respirator: paralizie respiratorie sau hipoventilație. Sistemul cardiovascular: hTA, greața și voma sunt frecvent asociate, deprimare miocardică. SNC: excitație și/sau deprimare, agitație, anxietate, amețală, tinitus, vedere încețoșată, tremor, convulsii. Excitația poate fi rapid urmată de somnolență până la pierderea stării de conștiență și stop respirator. Reacții neurologice: pierderea sensibilității perineale și a funcției sexuale, anestezie persistentă, parestezii, slăbiciune și paralizie a membrelor inferioare și pierderea controlului sfincterian, bloc spinal înalt sau total, retenție urinară, dureri de spate, meningite septice, meningism, arahnoidite, prelungirea travaliului,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ATRACURIUM
ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM

Cod ATC: N06AX12, N07BA02**WELLBUTRIN SR** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. elib. prel. 150 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (P-RF)**ZYBAN®** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. elib. prel. 150 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)**Ind:** Trat. bolilor depressive. Trat. dependenței de nicotină (ca suport al renunțării la fumat).**Dz:** *Adulți:* Trat. inițial: 150 mg, în priză unică, maxim 300 mg/zi, fracționat în mai multe prize la un interval de minim 8 ore. Trat. de întreținere: doza minimă efecă.**Cind:** Hipersensibilitate la oricare din componentele preparatului, pacienții cu crize convulsive, pacienții cu diagnostic anterior sau actual de bulimie sau anorexie nervoasă. Asocierea cu IMAO. Perioada de alăptare.**Al:** Prezintă risc convulsivant în funcție de doză. Precauție la pacienții care prezintă condiții predispozante la praguri joase convulsivante sau circumstanțe clinice asociate unui risc crescut convulsivant. Trat. trebuie întrerupt la pacienții care prezintă reacții de hipersensibilitate sau anafilactice. La pacienți cu afecțiuni renale sau hepatice se adm. doze reduse. Există riscul să precipite episoadele maniacale la pacienții cu afectare bipolară și poate activa o psihoză latentă la pacienții susceptibili. Atenție la asocierea cu alte medicamente cu efect asupra izoenzimei CYP2B6, cu medicamente biotransformate cu implicarea CYP2D6, cu medicamente care induc sau inhibă metabolismul hepatic, cu levodopa, cu Nicotine Transdermal System (NTS). Atenție în cazul utilizării: în timpul sarcinii, la șoferi sau la persoane cu activități de precizie.**RA:** Febră, dureri toracice, astenie, tahicardie, vasodilatație, hTA posturală, hTA, înroșirea feței, sincope, crize convulsive, insomnie, tremor, perturbarea concentrării, amețeală, depresie, confuzie, agitație, anxietate, acufene, afectarea vederii, afectarea gustului, anorexie, pierdere în greutate, uscăciunea gurii, greață și vărsături, durere abdominală, constipație. Artralgie, mialgie și febră în asociere cu rash-ul și alte simptome care sugerează hipersensibilitatea de tip IV. Rar: eritem multiform și sindromul Stevens-Johnson.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ATROPINUM
AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARII SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM

Cod ATC: N05BE01**SPITOMIN 5 mg; SPITOMIN 10 mg** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (P-RF)**STRESS SIGNAL** ANFARM HELLAS; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**Ind:** Trat. tulburărilor de anxietate și a perioadelor scurte cu simptome de anxietate însoțite sau nu de depresie.**Dz:** Oral. Doza inițială: 5 mg de 3 ori/zi. Doza se poate crește cu 5 mg/zi la fiecare 2-3 zile. Doza zilnică maximă nu trebuie să depășească 60 mg/zi. La pacienții cu IH sau IR trebuie folosite doze mai mici.**Cind:** La pacienții hipersensibili față de acest medicament, la pacienții cu convulsii în antecedente, la pacienții epileptici, la cei tratați cu IMAO.**A!:** Pacienții trebuie avertizați să nu conducă autovehicule sau să nu utilizeze aparatură complexă. A se evita utilizarea concomitentă cu alcool. Posibile reacții de sevraj la pacienții dependenți de medicamentele anxiolitice/hipnotice/sedative. Atenție în cazul asocierii cu: alte medicamente active asupra SNC, digoxină. Precauție în cazul utilizării la femei însărcinate sau în perioada de alăptare.**RA:** Cefalee, amețeli, stare de nervozitate, stări de greață și somnolență datorate discontinuității trat.: amețeli, insomnie, nervozitate, somnolență, stări de greață, cefalee și oboseală. Tendință de abuz sau dependență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AZAPENTACEN (POLISULFONAT DE SODIU)
AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM

Cod ATC: L01AB01**MYLERAN** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 2 mg; ct. × 1 fl. × 25 cpr. (S/P-RF)

Ind: Paleativ în leucemia granulocitară cronică, în absența transformării blastice. În obținerea remisiunilor în policitemia vera, în special în cazurile cu trombocitoză marcată. În anumite cazuri de trombocitemie esențială și mielofibroză.

Dz: *Leucemia granulocitară cronică: Adulți:* Inducție: 0,06 mg/kg/zi, max. 4 mg/zi, obișnuit în priză unică, până ce numărul total de leucocite scade între $15-25 \times 10^9/l$. Întreținere: 0,5-2 mg/zi. *Policitemia vera:* inducție: uzual: 4-6 mg/zi; întreținere: se pot folosi jumătate din dozele de inducție *Mielofibroza:* Doza inițială: 2-4 mg/zi. *Trombocitemie esențială:* Doza uzuală: 2-4 mg/zi. Hemoleucograma trebuie efectuată periodic.

Cind: Pacienții care au prezentat rezistență. Pacienții cu hipersensibilitate.

Al: Adm. trebuie întreruptă dacă apar semne de toxicitate pulmonară. În general busulfanul nu se adm. concomitent cu sau imediat după radioterapie. Hiperuricemia și/sau hiperuricozuria trebuie corectate înaintea începerii trat. Atenție la potențialul carcinogenic al medicamentului. Pe durata trat., hemoleucograma trebuie monitorizată atent. Tabletele nu trebuie înjumătățite. Poate apărea supresie ovariană și amenoree cu simptome de menopauză. Atenție în cazul asocierii cu tioguanină sau cu alte medicamente citotoxice ce produc toxicitate pulmonară. Trebuie evitat în sarcină, în special în primul trimestru. În timpul trat. mamele nu trebuie să alăpteze.

RA: Depresia măduvei osoase. Reacții gastrointestinale (greață, vărsături și diaree). Efecte pulmonare: fibroză pulmonară interstițială difuză cu dispnee și tuse, osificări pulmonare și calcificări distrofice. Reacții cutanate: hiperpigmentare, urticarie, eritem multiform, eritem nodos, alopecie, porfirie cutanată, rash, uscăciune și fragilitate a pielii cu anhidroză completă, sindrom Sjögren. Reacții hepatice: icter colestatic, hiperbilirubinemie, ocluzia venei hepatice, fibroză centrolobulară sinusoidală cu atrofie hepatocelulară și necroză. Efecte oculare: modificări ale cristalinului și cataractă, deteriorarea corneei. Altele: convulsii, tamponadă cardiacă, ginecomastie, miastenia gravis, cistită hemoragică, displazie generalizată cu afectarea epitelului colului uterin, bronhiolar și a altora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

AZATHIOPRINUM
AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYL DAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM

Cod ATC: R05DB13

SINECOD® NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Sirop 1,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 200 ml; Sol. orală 5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml (OTC)
TUSO SEDAL® TERAPIA SA; Sol. orală 7,5 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml; Sol. orală 5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml (OTC)

Ind: Tuse acută. Tuse convulsivă.

Dz: *Picături: copii între 2 luni - 1 an: 10 picături de 4 ori/zi; copii 1-3 ani: 15 picături de 4 ori/zi; copii peste 3 ani: 25 picături de 4 ori pe zi. Sirop: copii 3-6 ani: 5 ml de 3 ori/zi; copii 6-12 ani: 10 ml de 3 ori/zi; copii peste 12 ani: 15 ml de 3 ori/zi; adulți: 15 ml de 4 ori/zi. Adm. preferabil înaintea meselor.*

Cind: Hipersensibilitate la butamirat.

Al: A se evita în sarcină și în perioada de alăptare.

RA: Greață, diaree, eritem cutanat, vertij.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03BB01

AZELASTINUM
AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

BUSCOPAN BOEHRINGER INGELHEIM; Dj. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj. (OTC)
BUSCOPAN BOEHRINGER INGELHEIM; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 5 sau 6 f. × 1 ml (P-RF)
FARCORELAXIN PHARCO PHARM.; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 3 f. × 1 ml (P-RF)
SCOBUNORD NORDFARM PRODUCT; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)
SCOBUSAL 10 mg SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)
SCOBUTIL® 10 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (OTC)
SCOBUTIL® 10 mg/ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml (S/P-RF)
SCOPANTIL ANTIBIOTICE SA; Cpr. 10 mg; ct. × 2 sau 200 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
SCOPANTIL ANTIBIOTICE SA; Sup. 10 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (P-6L)
USCOSIN SINTOFARM SA; Sup. 10 mg; ct. × 2 folii × 3 sau 5 sup. (P-6L)

Ind: Colici intestinale, biliare, ureterale, spasm piloric sau de cardia, ulcer gastro-duodenal, colită mucomembranoasă, dismenoree, retenție de lohii; pentru efectuarea duodenografiei hipotone și diagnosticul diferențial radiologic între spasmele funcționale și stenoza organică.

Dz: *Adulți*, oral: 10-20 mg sau i.r. 7,5-20 mg de 3-5 ori/zi; i.m. sau i.v. lent, 10-20 mg la nevoie. *Copii 6-12 ani*: 10 mg de 3 ori/zi.

Cind: Glaucom, adenom de prostată cu retenție urinară, ileus paraltic, megacolon, obstacol mecanic la nivelul tubului digestiv, hernie hiatală cu reflux esofagian, tahiaritmii supraventriculare.

Al: Prudență în cardiopatia ischemică gravă și la bolnavii cu hipertiroidism marcat (nu se injectează). Prudență la asocierea cu chinidină, amantadină, antidepresive triciclice.

RA: Uscăciunea gurii, tulburări de vedere, tahicardie, constipație, dificultate în urinare; inj. i.v. poate provoca sedare, tahicardie, hTA ortostatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N04BC06

AZITROMYCINUM
BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM

DOSTINEX PHARMACIA & UPJOHN; Cpr. 0,5 mg; ct. × 1 fl. × 2 sau 8 cpr. (P-RF)

Ind: Prevenirea sau suprimarea lactației. Tulburări determinate de hiperprolactinemie.

Dz: Oral. Prevenirea lactației: Doză unică, 1 mg în prima zi după naștere. Suprimarea lactației: 0,25 mg la fiecare 12 ore timp de 2 zile. Trat. hiperprolactinemiei: 0,25-0,5 mg/săpt. în 1-2 prize.

Cind: În caz de reacții alergice la cabergolină. IH. Sarcină toxică. Psihoză post-partum. A nu se asocia cu antipsihotice.

Al: În caz de boli cardiovasculare, sindrom Raynaud, IR, ulcer peptic, hemoragii gastrointestinale, boli psihice, HTA sau trat. cu antihipertensive. În sarcină și în perioada de alăptare. Pe durata trat. este recomandată evaluarea ginecologică regulată, incluzând citologia cervicală și endometrială. Atenție la asocierea cu: antiemetice, antihipertensive, psihotrope și antibiotice macrolide. Precauție în cazul șoferilor și a celor cu activități de precizie.

RA: Greață, cefalee, scăderea TA, amețală, vertij, dureri abdominale, dispepsie, gastrită, slăbiciune/oboseală, constipație, vomă, dureri la nivelul sânilor, bufeuri, depresie sau agitație.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BACLOFENUM
BARI SULFAS
BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENZAEPRIUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYLAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS

Cod ATC: A12AA04

CALCIU MASTICABIL NYCOMED; Cpr. mast. 500 mg; ct. × 20, 60 sau 100 cpr. (OTC)

ANTACID EUROPHARM SA; Cpr. mast. 500 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)

Ind: Antiacid: în gastroduodenite sau reflux gastroesofagian. Supliment oral de calciu: Prevenirea deficiențelor de calciu.

Dz: Antiacid: Oral, 500-1000 mg la nevoie, maxim 8 g în 24 h. Supliment oral de Ca: oral, 500-1000 mg calciu de 1-2 ori pe zi.

Cind: Hipercalcemie.

Al: Atenție în caz de: funcție renală afectată, nefrocalcinoză, hipercalcemie, hipofosfatemie. A se adm. lichide în cazul trat. îndelungate. Atenție în cazul asocierii cu: vitamina D, anumiți agenți diuretici, glicozide cardiace, săruri de aluminiu și bismut, antibiotice (tetraciline, ciprofloxacina, norfloxacina, cefpodoxin axetil, cefuroxim axetil), estramustină. Atenție în IR.

RA: Constipație. Hipercalcemie și alcaloză metabolică (greați, vărsături, oboseală). Sindrom Burnett.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BARI SULFAS
 BASILIXIMABUM
 BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM

Cod ATC: A12AA07

CLOROCALCIN BIOFARM SA; Sol. uz int. 0,18 g/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml (OTC)

Ind: Stări care necesită aport sporit de calciu: sarcină, alăptare, perioada de creștere rapidă, vârstnici. Rahitism (în asociere cu vitamina D). Tetanie calciprivă, spasmofilie. Boli ale sistemului osos: osteoporoză, osteomalacie. Stări hemoragice. Manifestări alergice: urticarie, edem Quincke, boala serului.

Dz: *Adulți:* inj. i.v. lent 10 ml; oral, ca recalcifiant 10 pic. de 2 ori/zi, ca hemostatic 20 pic. de 4 ori/zi, ca antialergic 20 pic. de 4 ori/zi. *Copii:* inj. i.v. lent 5-10 ml sau oral, ca recalcifiant 1 pic. pe an de vârstă și zi, ca hemostatic 5 pic. pe an de vârstă și zi, ca antialergic 15-45 pic./zi.

Cind: IR gravă, nefrolitiază calcică, hiperparatiroidism, hipercalcemie, hipervitaminoză D, plasmocitom, metastaze osoase, ulcer gastro-duodenal.

RA: Pentru sol. orală: constipație, iritație gastrică, cu greață și dureri epigastrice. Pentru sol. inj.: flebită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BASILIXIMABUM
BECLOMETASONUM
BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS

Cod ATC: C05CXN2

DOXILEK LEK PHARMACEUTICALS; Cps. 500 mg; ct. × 1 fl. × 30 cps. (P-6L)

DOXIUM® OM PHARMA; Cpr. 250 mg; ct. × 2, 6 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)

DOXIUM® 500 OM PHARMA; Cps. 500 mg; ct. × 3 sau 6 blist. × 10 cps. (P-6L)

Ind: Microangiopatii, ca adjuvant în trat. tromboflebitelor superficiale, sindromului posttrombotic, edemelor, dermatozelor de stază, tulburărilor circulatorii de origine arterio-venoasă, în sindromul hemoroidal și în tulburările circulatorii datorate unei microcirculații perturbate.

Dz: Oral, 500-750 mg/zi, la mese.

Cind: Hipersensibilitate la dobesilatul de calciu.

A!: În timpul primului trimestru al sarcinii.

RA: Tulburări gastrice, greață, diaree, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V03AF03

BECLOMETASONUM
 BENAZEPRILUM
 BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZDAMINUM
 BENZYLPENICILLINUM
 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS

CALCIUM FOLINAT EBEWE PHARMA; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 5 fl. × 3, 5 sau 10 ml; ct. × 1 fl. × 10, 20, 35 sau 80 ml (S/P-RF)
CALCIUM FOLINAT EBEWE PHARMA; Sol. inj. 3 mg/ml; ct. × 10 fl. × 1 ml (S/P-RF)
CALCIUM FOLINAT EBEWE PHARMA; Cps. 15 mg; ct. × 20 cps. (S/P-RF)
FOLCASIN® 15 mg SINDAN SRL; Cpr. 15 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (S/P-RF)
FOLCASIN® 100 mg/10 ml SINDAN SRL; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-RF)
FOLCASIN® 30 mg/10 ml SINDAN SRL; Sol. inj. 3 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-RF)
FOLCASIN® 30 mg/3 ml SINDAN SRL; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 3 ml (S/P-RF)
LEUCOVORIN CA-25 LACHEMA; Liof. pt. sol. inj./perf. 25 mg; ct. × 1 sau 10 fl. (S/P-RF)
LEUCOVORIN-TEVA 50 mg/5 ml; LEUCOVORIN-TEVA 100 mg/10 ml PHARMACHEMIE; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 sau 10 ml (S/P-RF)

Ind: Carcinom colorectal, în asociere cu 5-fluorouracil.

Dz: 200 mg/m²/zi, 5 zile consecutiv, la interval de 3-4 săptămâni. Sol. inj. se adm. i.v. lent în 10 min.

Cind: Sarcină și alăptare.

A!: Trebuie adm. înaintea 5-fluorouracilului, pe cale i.v. Atenție în cazul asocierii cu: metotrexat, fenobarbital, primidonă, fenitoină. Potențează efectele citostatice și reacțiile adverse ale 5-fluorouracilului.

RA: Diaree, stomatită, mucozită, uscăciunea pielii, eritem, conjunctivită, lăcrimare și toxicitate hematologică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BENAZEPRILUM
BENCYCLANUM
BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS

Cod ATC: A12AA02

CALCIU-SANDOZ® FORTE 500 mg NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Cpr. eferv. 500 mg calciu elemental; ct. × 1 tub × 10 cpr. (OTC)

Ind: Supliment nutritiv: în timpul perioadei de creștere a dinților, în copilărie, în adolescență, în sarcină și lactație, la femei în perioada de postmenopauză și la vârstnici. Tratamentul hipocalcemiei din: rahitism și osteomalacie, osteoporoză (senilă, postmenopauză, consecutiv gastrectomiilor, imobilizare prelungită sau utilizarea prelungită a corticosteroizilor), tetanie latentă, ca supliment al terapiei parenterale cu calciu în diferite stări hipocalcemice (ca tetania manifestă), consecutiv tiroidectomiei, paratiroidectomiei și în hipoparatiroidismul idiopatic.

Dz: Se administrează înainte sau în timpul meselor. Ca supliment nutritiv: la *sugari*: 1 linguriță de sirop de 3 ori pe zi; *copii sub 4 ani*: 2 lingurițe de sirop de 3 ori pe zi; *adulți și copii peste 4 ani*: 1 lingură de sirop de 3 ori pe zi; *gravide și în timpul lactației*: 1 lingură de sirop de 4 ori pe zi. Ca antihipocalcemic: (în rahitism, osteomalacie și osteoporoză): 1-2 linguri de sirop de 3 ori pe zi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BENCYCLANUM
 BENFOTIAMINUM
 BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS

Cod ATC: A12AA03

GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 10%; ct. × 5, 10 sau 50 f. × 10 ml

Ind: Tetania hipocalcemică gravă; hipoparatiroidism postoperator, convulsii hipocalcemice la nou-născuți cu hipoparatiroidism.

Dz: I.v. lent, 10-20 ml soluție 10%; în continuare, în perf. i.v. 6-8 g/1000 ml sol. de glucoză 5% sau inj. i.m. sol. 10%. În convulsii hipocalcemice la nou-născutul cu hipoparatiroidism, se introduce i.v. lent, în sol. 5% gluconat de calciu 300-500 mg/kg/zi.

Cind: Hipercalcemie, IR severă, hipercalciurie, nefrocalcinoză, litiază renală calcică, osteoporoză acută prin imobilizare. Nu se asociază cu digitalice sau în condiții de hiperexcitabilitate cardiacă.

Al: Nu se va inj. i.m. la copii. Inj. i.v. impune multă prudență. Prudență în caz de hemoragie cerebrală recentă.

RA: Abcese la locul inj. i.m.; inj. i.v. rapidă poate provoca: greață, vomă, senzație de căldură, sudorație, paloarea feței, hTA.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BENFOTIAMINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS

Cod ATC: A12AA05**CALCIU LACTIC 500 mg ZENTIVA ROMANIA;** Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)**Ind:** Hipocalcemii; TBC; rahitism; tetanie; stări hemoragice; hemofilie. Afecțiuni alergice; sarcină, alăptare. Hipertiroidii. Diabet.**Dz:** 0,5-1 g lactat de calciu, de 3-4 ori pe zi, după mesele principale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BENZALKONII CHLORIDUM
 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM

Cod ATC: D05AX02

DAIVONEX® LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; Unguent 50 µg/1 g; cremă 50 µg/1 g; ct. × 1 tub × 30 g (**P-6L**)

DAIVONEX® LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; Sol. capilară 50 µg/ml; ct. × 1 fl. × 30 ml (**P-6L**)

SOREL® LEK PHARMACEUTICALS; Ung. 0,005%; ct. × 1 tub × 30 sau 100 g (**P-6L**)

SOREL® LEK PHARMACEUTICALS; Sol. cut. 0,005%; ct. × 1 fl. × 60 ml (**P-6L**)

Ind: Psoriazis al scalpului, psoriazis vulgar, forme uşoare şi moderate, interesând până la 40% din suprafaţa cutanată.

Dz: Se aplică pe zonele afectate de 2 ori pe zi (dimineaţa şi seara). Maxim 5 mg pe săptămână.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului. Stări de hipercalcemie.

Al: Nu trebuie aplicat pe faţă. După utilizare se recomandă spălarea mâinilor.

RA: Irritaţie locală la nivelul pielii scalpului şi feţei, prurit, dermatită, inclusiv dermatită facială.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
 BENZOYLIS PEROXIDUM
 BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM

Cod ATC: H05BA01**MIACALCIC®** NOVARTIS PHARMA; Sol. inj. 50 UI/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (**P-RF**)**MIACALCIC® NASAL 200** NOVARTIS PHARMA; Spray nazal 200 UI/ doză; ct. × 1 fl. sol. pt. 14 doze (**P-RF**)**NYLEX®** PROEL E.P. CORONIS; Aerosol nazal 1100 UI/ml (100 UI/ doză), 2200 UI/ml (200 UI/doză); ct. × 1 fl. × 2 ml (**P-RF**)**NYLEX®** PROEL E.P. CORONIS; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (**P-RF**)**TONOCALCIN® 50; TONOCALCIN® 100** SCHIAPPARELLI; Sol. inj. 50 UI/ ml sau 100 UI/ml; ct. × 5 f. (**P-RF**)**TONOCALCIN®** spray SCHIAPPARELLI; Sol. pt. spray nazal; ct. × 1 fl. × 3,5 ml (**P-RF**)

Ind: Osteoporoză. Dureri osoase asociate cu osteoliză sau osteopenie. Boala Paget osoasă. Hipercalcemie și crize de hipercalcemie. Tulburări neurodistrofice. Pancreatita acută.

Dz: Osteoporoză: Inj.: 50-100 UI zilnic sau la 2 zile, s.c. sau i.m. Spray nazal: 100-200 UI zilnic sau la 2 zile, în doză unică sau divizată. Dureri osoase asociate cu osteoliză și/sau osteopenie: Inj.: 100-200 UI/zi, perf. i.v. lentă sau inj. s.c. sau i.m. în doze divizate pe tot parcursul zilei. Spray nazal: 200-400 UI/zi (max. 200 UI/ doză). Boala Paget: Inj.: 100 UI zilnic sau la 2 zile, s.c. sau i.m. Spray nazal: 200 UI zilnic, în doză unică sau divizată (max. 400 UI/ zi în doze divizate). Hipercalcemie: Trat. de urgență: Inj.: 5-10 UI/kg/zi prin perf. i.v. în 500 ml ser fiziologic normal, timp de cel puțin 6 ore, sau prin inj. i.v. lentă, în 2-4 doze divizate. Hipercalcemie cronică: Inj.: 5-10 UI/kg/zi, inj. s.c. sau i.m. Spray nazal: 200-400 UI/zi (max. 200 UI/ doză). Tulburări neurodistrofice: Inj.: 100 UI/zi, s.c. sau i.m., 2-4 săpt., apoi 100 UI la 2 zile, 6 săptămâni. Spray nazal: 200 UI/zi în doză unică, 2-4 săpt., apoi 200 UI la 2 zile, timp de 6 săpt. Pancreatita acută: Inj.: 300 UI prin perf. i.v., max. 6 zile consecutiv.

Cind: Hipersensibilitate la calcitonină.

Al: La copii. Pacienți cu rinită cronică care primesc calcitonină intranasal. La pacienți predispuși la reacții alergice. Nu se recomandă alăptarea în timpul trat.

RA: Greață, vărsături, amețeală, eritem facial însoțit de senzație de căldură; poliurie și frisoane; reacții de tip anafilactic cu tahicardie, hTA și colaps.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A11CC04

BENZOYLIS PEROXIDUM
BENZYDAMINUM
BENZYL PENICILLINUM
BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM

CALCIJEX® ABBOTT; Sol. inj. 1 µg/ml, 2 µg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (**P-RF**)

OSTEO D TEVA PHARM.; Cps. moi 0,25 µg, 0,50 µg; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cps. (**P-6L**)

ROCALTROL® HOFFMANN LA ROCHE; Cps. 0,25 µg, 0,5 µg calcitriol sintetic; ct. × 1 fl. × 100 cps. (**P-6L**)

Ind: Trat. hipocalcemiei la pacienții sub dializă cronică renală, în osteoporoza postmenopauzală stabilă; osteodistrofie de origine renală, hipoparatiroidism postchirurgical; hipoparatiroidism idiopatic; pseudohipoparatiroidism; rahitism dependent de vitamina D; rahitism hipofosfatemice vitamin-D-rezistent.

Dz: Doza trebuie stabilită în funcție de nivelul calciului seric: 0,5-3 µg (0,01-0,05 µg/kg de trei ori pe săptăm.) adm. în bolus i.v. În cazul apariției hipercalcemiei se oprește imediat trat.

Cind: Hipercalcemie sau intoxicație cu vitamina D. Nu se vor mai adm. alte forme de vitamina D. Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Femei care alăptează.

Al: Dozele excesive induc hipercalcemia uneori asociată cu hipercalcemie. Prudență la pacienții digitalizați și la cei cu rahitism vitamin-D-rezistent. Atenție în cazul asocierii cu: preparate care conțin calciu, diuretice tiazidice, corticosteroizi, magneziu, agenți care chelatează fosfatul, inductori enzimatici, colestiramină. Precauție la femei însărcinate.

RA: Simptome precoce: slăbiciune, cefalee, somnolență, anorexie, grețuri, uscarea gurii, constipație, dureri musculare și osoase, gust metalic în gură. Simptome tardive: poliurie, polidipsie, deshidratare, pierdere în greutate, conjunctivite, pancreatită, fotofobie, rinoree, prurit, hipertermie, scăderea libidoului, creșterea uremiei, albuminurie, hipercolesterolemie, creșterea transaminazelor serice, apariția calcifierilor ectopice, aritmii cardiace. Rar: dureri osoase la locul injectării, distrofie, tulburări senzoriale, apatie, oprirea creșterii, infecții urinare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C09CA06

BENZYDAMINUM
 BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL

ATACAND ASTRAZENECA; Cpr. 8 mg sau 16 mg; ct. × 1 fl. × 28 cpr. *(P-6L)*

Ind: HTA.

Dz: Oral, 8-16 mg candesartan o dată pe zi. La pacienții cu IR severă se începe cu doze mai mici.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. Sarcină.

Al: În caz de: stenoza a arterei renale, depleția volumului intravascular, asociere cu diuretice care economisesc potasiul, perioadă de alăptare.

RA: Cefalee, infecții ale căilor respiratorii superioare, dureri de spate și vertij. Creșteri ale transaminazelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BENZYL PENICILLINUM
 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM

Cod ATC: L01BC06

XELODA 150 mg; XELODA 500 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 150 mg, 500 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (150 mg), ct. × 12 blist. × 10 cpr. (500 mg) (S/P-RF)

Ind: Monoterapie de primă alegere în cancerul colorectal metastatic.

Dz: 1250 mg/m² de două ori pe zi (dimineața și seara) timp de 14 zile, urmată de o perioadă de 7 zile de pauză. La pacienții cu IR moderată se recomandă o reducere la 75% a dozei inițiale.

Cind: Antecedente de reacții adverse severe și neașteptate la trat. cu fluoropirimidine. Sensibilitate cunoscută la capecitabină, fluorouracil sau oricare dintre excipienți. Deficiență cunoscută de dihidropirimidin dehidrogenază. Sarcină și alăptare. La pacienții cu leucopenie, neutropenie sau trombocitopenie severe. IH sau IR severă. În caz de trat. cu sorivudina sau analogii structurali (brivudina).

Al: Toxicitatea limitativă pentru doză include diaree, dureri abdominale, greață, stomatită, sindromul mână - picior. Pacienții cu diaree severă trebuie supravegheați și li se adm. fluide și electroliți dacă sunt deshidratați. Sindromul mână-picior, dacă se manifestă gradul 2-3 trat. trebuie întrerupt până la dispariția simptomelor sau până ce acestea scad până la gradul 1. Prudență la pacienții cu antecedente de boli cardiace, aritmii și angină pectorală; în caz de hipo- sau hipercalcemie preexistentă; la pacienții cu afecțiuni ale SNC sau periferic; la pacienții cu diabet zaharat sau tulburări electrolitice; IH sau IR ușoară sau moderată. Precauție în cazul asocierii cu: anticoagulante cumarinice, fenitoină, acid folinic, sorivudină și analogi, antiacide, allopurinol, interferon alfa. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: *Gastrointestinale:* diaree, greață, vărsături, dureri abdominale, stomatită, constipație, dispepsie, gură uscată, flatulență, scaune moi, esofagită, gastrită, duodenită, colită, hemoragie gastro-intestinală. *Cutanate:* sindromul mână - picior sau eritrodisestezie palmo-plantară, dermatită, alopecie, uscăciune a pielii, erupții cutanate eritematoase, hiperpigmentare cutanată, prurit, modificări ale unghiilor, exfoliere locală, reacții de fotosensibilitate, recăderea sindromului de radiație, onicoliză. *RA generale:* oboseală, febră, slăbiciune, astenie, letargie, dureri ale membrelor. *Neurologice:* cefalee, parestezii, modificări de gust, amețeli, insomnie, hiperestezie, encefalopatie, confuzie, ataxie, disartrie, tulburări de echilibru și coordonare. *Cardiovasculare:* edeme, dureri toracice, angină pectorală, IM, IC, stop cardiac, cardiomiopatie, moarte subită, tahicardie, aritmii atriale inclusiv fibrilație atrială, extrasistole ventriculare. *Hepatobiliare:* teste funcționale hepatice anormale, icter, IH, hepatită colestatică. *Hematologice:* scăderea hemoglobinei, neutropenie, trombocitopenie, depresia măduvei osoase și pancitopenie. Evenimente legate de depresia măduvei osoase, compromiterea sistemului imun și/sau leziuni ale mucoaselor în cadrul unor infecții locale sau sistemice fatale (de etiologie bacteriană, virală sau fungică) și sepsis. Modificări ale testelor biochimice de laborator: creșteri ale bilirubinei, fosfatazei alcaline, hiperglicemie. *Altele:* anorexie,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
 BENZYLUM BENZOICUM
 BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM

Cod ATC: C09AA01**CAPOCARD® 25; CAPOCARD® 50** DAR AL DAWA; Cpr. 25 mg, 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)**CAPTOPRIL MCC 12,5 mg; CAPTOPRIL MCC 25 mg; CAPTOPRIL MCC 50 mg** MAGISTRA C&C; Cpr. 12,5 mg, 25 mg, 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)**CAPTOPRIL 25 mg; CAPTOPRIL 50 mg** TERAPIA SA; Cpr. 25 mg, 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)**CAPTOPRIL 12,5 mg; CAPTOPRIL 25 mg; CAPTOPRIL 50 mg** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd; Cpr. 12,5 mg, 25 mg, 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (12,5 mg, 25 mg), ct. × 2 blist. × 10 cpr. (50 mg) (P-6L)**CAPTOPRIL 25; CAPTOPRIL 50** BIO EEL SRL; Cpr. 25 mg, 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)**CAPTOPRIL 25 mg** LAROPHARM SRL; Cpr. 25 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (P-6L)**CAPTOPRIL 25 mg; CAPTOPRIL 50 mg** ARENA GROUP SA; Cpr. 25 mg, 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)**CAPTOPRIL LPH® 25 mg; CAPTOPRIL LPH® 50 mg** LABORMED PHARMA SA; Cpr. 25 mg, 50 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (25 mg); ct. × 2, 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (50 mg) (S/P-6L)**CAPTOPRIL 25 mg** SINTOFARM SA; Cpr. 25 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)**CAPTOPRIL 25 mg** FARMEX COMPANY; Cpr. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)**EUOPRIL** EUOPHARM SA; Cps. 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (S/P-6L)**MINITEN 25; MINITEN 50** THE UNITED PHARMA.; Cpr. 25 mg, 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)**RILCAPTON-25** MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)**Ind:** HTA; IC congestivă; post-IMA; nefropatia diabetică.**Dz:** 6,25-25 mg de 2-3 ori/zi, maxim 450 mg/zi, cu o oră înaintea meselor principale. Doza de întreținere se stabilește astfel încât TA sistolică în ortostatism să nu scadă sub 90 mmHg. În IR dozele se calculează în funcție de clearance-ul creatininei.**Cind:** Hipersensibilitate la captopril. Antecedente alergice după adm. altor IEC. Sarcină și alăptare. Stenoza bilaterală de arteră renală sau pe rinichi unic funcțional. Hipertensiune. Nu se asociază cu săruri de litiu.**Al:** În caz de asocieri medicamentoase multiple este necesară supravegherea funcției renale și hematopoieza. La pacienții imunodeprimați. Bolnavi dializați. Pacienți tratați cu diuretice. În IR. Bolnavii cu ateroscleroză cunoscută, cu cardiopatie ischemică și insuficiență circulatorie cerebrală. La copii. La vârstnici. Inițial se adm. medicamentului în doze mici. Prudență în cazul asocierii cu: diuretice antialdosteronice, săruri de potasiu, la pacienții diabetici tratați cu insulină sau sulfamide antidiabetice, AINS, antidepresive triciclice, neuroleptice, medicamente imunosupresoare, glucocorticoizi.**RA:** hTA, tuse uscată, obstrucție nazală, disgeuzie, cefalee, astenie, gastralgii, anorexie, greață, dureri abdominale, reacții alergice (prurit, erupții cutanate, edem angioneurotic), IR funcțională, proteinurie, hipertensiune, neutropenie sau agranulocitoză, anemie aplastică, colagenoze.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01EB02

BENZYLUM BENZOICUM
BETAALANINUM
BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM

MIOSTAT® ALCON; Sol. oft. 0,1 mg/ml; ct. × 12 fl. × 1,5 ml (S)

Ind: Inducerea miozei în timpul unor intervenții chirurgicale oftalmologice.

Dz: Se instilează 0,5 ml sol. în camera anterioară a globului ocular. Se adm. în doză unică.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului; irite acute.

Al: Exclusiv pt. adm. intraoculară. Prudență la pacienții cu IC acută, astm bronșic, ulcer gastro-duodenal activ, hipertiroidism, spasm al tractului gastrointestinal, obstrucție la nivelul tractului urinar, Parkinson. La copii. A nu se adm. concomitent cu alcaloizi de beladonă, ciclopentolat sau flurbiprofen. În timpul sarcinii și alăptării. Influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

RA: Oculare: opacifiere corneană, keratopatie buloasă persistentă, irită postoperatorie, dezlipire de retină. Sistemice: crize de astm, aritmie cardiacă, hiperemie, transpirație, disconfort epigastric, crampe abdominale, senzație de micțiune frecventă, hTA, sincopă, cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N03AF01

BETAALANINUM
 BETAHISTINUM
 BETAMETHASONUM
 BETAXOLOLUM
 BEVACIZUMABUM
 BEZAFIBRATUM
 BICALUTAMIDUM
 BIFONAZOLUM
 BIPERIDENUM
 BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM

CARBAMAZEPIN SC SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CARBAMAZEPIN EEL BIO EEL SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 1 blist. × 16 cpr. (P-6L)
CARBAMAZEPINA OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CARBAMAZEPINA ARENA GROUP SA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)
CARBAMAZEPINA LPH® 200 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CARBAMAZEPINA 200 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CARBAMAZEPINE TEVA 200 TEVA PHARM.; Cpr. 200 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CARBAVIM VIM SPECTRUM SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CARBEP SIL 200, 400 AC HELCOR SRL; Cpr. 200 mg, 400 mg; ct. × 50 cpr. (P-6L)
FINLEP SIN® AWD PHARMA; Cpr. 200 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FINLEP SIN® 200 RETARD; FINLEP SIN® 400 RETARD AWD PHARMA; Cpr. ret. 200 mg, 400 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
NEUROTOP® GEROT; Cpr. 200 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
NEUROTOP® RETARD 300 mg; NEUROTOP® RETARD 600 mg GEROT; Cpr. elib. prel. 300 mg, 600 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
STAZEPINE POLPHARMA; Cpr. 200 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
TAVER MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 200 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
TEGRETOL® 200; TEGRETOL® 400 NOVARTIS PHARMA; Cpr. 200 mg, 400 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (200 mg), ct. × 3 blist. × 10 cpr. (400 mg) (P-6L)
TIMONIL DESITIN; Sirop 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 250 ml (P-6L)
TIMONIL 150 RETARD; TIMONIL 300 RETARD; TIMONIL 600 RETARD DESITIN; Cpr. ret. 150 mg, 300 mg, 600 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Epilepsie. Nevralgie de trigemen sau de glosofaringian. Psihoză maniaco-depresivă. Stări algice din neuropatia diabetică. Sindrom de abstință la alcoolici. Scleroză multiplă.

Dz: Stabilirea dozei optime se va realiza prin monitorizarea conc. plasmatice a carbamazepinei care trebuie menținută la 4-12 µg/ml, ceea ce corespunde unei doze zilnice de 400-1200 mg, fracționată în 3-4 prize. Doza max. zilnică este de 1600 mg. Dozele se stabilesc în funcție de patologie. Trat. se începe cu doze mici. Doza inițială se crește lent, până la atingerea dozei eficace terapeutic și apoi se continuă cu doza de întreținere. Durata trat. se stabilește în funcție de natura afecțiunii și reactivitatea individuală. La pacienții cu afecțiuni cardio-circulatorii severe, afecțiuni hepatice și renale ca și la vârstnici se recomandă reducerea dozelor. La copii, dozele folosite se stabilesc în funcție de vîrstă și greutate corporală. Preparatele retard nu se adm. copiilor sub 6 ani.

Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului sau la antidepressive triciclice. BAV. Antecedente de hipoplazie medulară. Porfirie acută intermitentă. Afecțiuni hepatice grave. Asocierea cu saquinavir.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BETAHISTINUM
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCROMI SALICYLAS

Cod ATC: B02BX02

ADRENOSTAZIN® TERAPIA SA; Sol. inj. 0,3 mg/ml, 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml, respectiv ct. × 3 f. × 10 ml (S/P-RF)

Ind: Prevenirea și trat. hemoragiilor chirurgicale sau medicale.

Dz: I.m., s.c. sau i.v. *Adulți:* 1,5 mg de 1-3 ori/zi. În caz de hemoragii intense se utilizează perfuzii a 50 mg adrenostazin în 500 ml sol. izotonică. *Copii sub 15 ani:* 1/2 din doza adultului.

Cind: Hemoragii masive prin ruptură de vase mari.

Al: Sol. i.v. se poate asocia cu sânge, plasmă, substituenți de plasmă. Este incompatibil cu vitamina C. Crește activitatea fibrinolitică a acidului nicotinic. Prudență în perioada de sarcină și alăptare.

RA: Durere la locul injectării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BETAMETHASONUM
BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM

Cod ATC: J01CA03**CARBENICILINĂ** ANTIBIOTICE_SA; Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 5 g (S)

Ind: Trat. infecțiilor produse de Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Escherichia coli, Proteus indol-pozitiv și Proteus mirabilis, Morganella.

Dz: Inj. i.m., i.v. lent sau perf. i.v. *Adulți:* 100-600 mg/kg/zi, la 4-6 ore. În IR se folosesc doze mai mici sau se crește intervalul dintre adm. *Copii:* în funcție de greutate, 16,7-75 mg/kg fracționat la 4-8 ore.

Cind: Hipersensibilitate la carbenicilină și alte peniciline.

Al: Poate provoca reacții alergice, inclusiv șoc anafilactic. Trat. îndelungat poate provoca suprainfecții cu germeni rezistenți. În IR se recomandă reducerea dozei și/sau mărirea intervalului dintre doze. Prudență la pacienții cu accidente hemoragice în antecedente. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină, IC, HTA și IR. A se evita asocierea cu: antibiotice/ chimioterapice bacteriostatice, gentamicină și alte aminoglicozide, metotrexat, anticoagulante orale, heparină, trombolitice, antiagregante plachetare. Adm. concomitentă de probenecid determină concentrații plasmatice crescute și prelungite de antibiotic. Poate interfera dozarea glucozei în urină și testul Coombs. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.

RA: Reacții alergice, prelungirea TS, neutropenie, creșterea transaminazelor, nefrită interstițială, convulsii, hipernatriemie, hipokaliemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BETAXOLOLUM
BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM

Cod ATC: H03BB01**CARBIMAZOLE 5 REMEDICA**; Cpr. film. 5 mg; ct. × 1 fl. × 100 sau 500 cpr. **(S/P-6L)****Ind:** Hipertiroidism; pregătirea tiroidectomiei în hipertiroidism; pregătirea/tratament concomitent iradierii cu iodo-radioactiv.**Dz:** *Adulți:* 30-60 mg/zi, la 8 ore. Dacă apar îmbunătățiri ale stării (observate după 1-3 săpt.), doza este redusă treptat, la cea mai mică cantitate, care va controla boala. Dozele uzuale de întreținere: 5-15 mg/zi. *Copii:* Doza inițială 1,75-1 mg/kg/zi, în doze divizate.**Cind:** La mamele care alăptează și la pacienții cu antecedente ale RA.**Al:** Pacienții trebuie avertizați să raporteze apariția ulcerărilor bucale, durerilor în gât, febrei sau înroșirii pielii, simptome care apar în timpul terapiei și care indică anormalități sanguine. În acest caz, tratamentul trebuie oprit și se cere imediat sfatul medicului. Prudență în timpul sarcini: doze ridicate pot cauza gușa fătului și hipertiroidism. Se recomandă întreruperea adm. cu 3-4 săptămâni înaintea nașterii. Dacă apar simptome care sugerează depresia măduvei osoase, adm. se întrerupe. Poate denatura unii parametri ai funcției tiroidiene; se recomandă stabilirea nivelului hormonilor liberi și TSH.**RA:** Greață, vomă, dureri gastrice, cefalee, artralgie, înroșirea pielii și prurit. Depresia măduvei osoase, agranulocitoză.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A07BA01

BEVACIZUMABUM
BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS

NORIT NORIT NV; Cps. 200 mg; ct. × 2 blist. × 15 cps. (OTC)

Ind: Gastroenterite, dispepsii, flatulență, diarei fetide, intoxicații cu fosfor, arsen, cu alcaloizi și ciuperci, colite de fermentație.

Dz: Oral, 1-2 cpr. de 3-5 ori pe zi, după mese.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R05CB

BEZAFIBRATUM
BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINIUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM

CARBOCISTEINA TERAPIA SA; Sirop 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (**P-RF**); Sirop 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (**OTC**);

ESTIVAL SPECIFAR SA; Sirop 5%; ct. × 1 fl. × 120 ml (**OTC**)

FLUIDOL TIS FARMACEUTIC; Sol. orală 2%; ct. × 1 fl. × 110 g (**P-RF**); Sol. orală 5%; ct. × 1 fl. × 110 g (**OTC**)

HUMEX EXPECTORANT sirop pentru adulți LAB. URGO SA; Sirop 5 g/ 100 ml; ct. × 1 fl. × 125 ml (**OTC**)

HUMEX EXPECTORANT sirop pentru copii și sugari LAB. URGO SA; Sirop 2 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 125 ml (**P-RF**)

MUCOSOL CTS CHEMICAL IND.; Cps. 375 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. (**OTC**)

MUCOSOL CTS CHEMICAL IND.; Sirop 5%; ct. × 1 fl. × 110 ml (**OTC**)

MUCOTREIS ECOBI FARMACEUTICI; Sirop 2 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 150 ml (**P-RF**); Sirop 5 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 150 ml (**OTC**)

RHINATHIOL® 2% SANOFI~SYNTHELABO; Sirop 2 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 125 ml (**P-RF**)

RHINATHIOL® 5% SANOFI~SYNTHELABO; Sirop 5 g/100 ml; ct. × 1 fl. × 125 ml (**OTC**)

Ind: Trat. tulburărilor secreției bronșice, îndeosebi în afecțiuni bronho-pulmonare acute.

Dz: Adulți: 750 mg de 3 ori pe zi. Copii: în funcție de vârstă, max. 100 mg de 2-3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului. Siropul 5% este Cind. la copii sub 15 ani.

Al: Prudență la pacienții cu ulcer gastric sau duodenal. Nu se asociază cu antitusive și/sau cu substanțe antisecretoorii. La pacienții cu diabet zaharat se va ține cont de conținutul de zahăr din sirop. Prudență în timpul sarcinii.

RA: Intoleranță digestivă (epigastralgie, greață, diaree).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BICALUTAMIDUM
BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINIUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM

[Cod ATC: L01XA0Z](#)

CARBOPLATINE "EBEWE" EBEWE PHARMA; Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 5, 15 sau 45 ml (S)
CARBOPLATIN SINDAN 50 SINDAN SRL; Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (S); Liof. pt. sol. perf. 50 mg (S)
CARBOPLATIN SINDAN 150 SINDAN SRL; Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (S); Liof. pt. sol. perf. 150 mg (S)
CARBOPLATIN SINDAN 450 SINDAN SRL; Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 45 ml (S); Liof. pt. sol. perf. 450 mg (S)
CICLOPLATIN LACHEMA; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5, 15 sau 45 ml (S)

Ind: Cancer ovarian avansat, de origine epitelială.

Dz: *Adulți* cu funcție renală normală: 400 mg/m² în perf. i.v., 15-60 de minute. Terapia nu va fi repetată decât după patru săpt. La pacienții cu factori de risc doza inițială va fi redusă cu 20-25%. Se va efectua hemoleucograma săpt. La pacienții cu afectare renală dozele se stabilesc în funcție de clearance-ul de creatinină. *Copii:* Dozele se ajustează în funcție de regimul ales și de rezultatele monitorizării hematologice.

Cind: Afecțiuni renale severe. Mielosupresie severă. Hipersensibilitate la carboplatină sau la alți compuși de platină. Sarcină și lactație. Este Cind. folosirea de echipamente ce conține aluminiu.

Al: Trat. se va face numai când pot fi luate toate măsurile adecvate controlului eventualelor complicații ca: mielosupresie (în particular trombocitopenia), nefrotoxicitate, neurotoxicitate, ototoxicitate, mutagenitate și carcinogenitate. În cazul contactului accidental al pielii sau mucoasei cu soluția deja preparată, zona va fi spălată imediat cu apă și săpun. Atenție în cazul asocierii cu antibiotice aminoglicozidice sau alte medicamente nefrotoxice.

RA: Mielosupresia (leucopenie, trombocitopenie și anemie). Nefrotoxicitatea (reducerea clearance-ului de creatinină, creatinină serică crescută, uree serică și acid uric urinar crescute). Efecte gastrointestinale (greață, vomă, diaree, constipație). Hepatotoxicitate (modificarea testelor hepatice). Ototoxicitate (tinitus și pierderea auzului în banda de frecvențe înalte). Reacții alergice (rash eritematos, febră și prurit). Neurotoxicitate (parestezii și scăderea reflexelor osteotendinoase). Tulburări electrolitice (scăderi de calciu, magneziu și potasiu). Altele: alopecie, sindrom pseudogripal, reacții la locul injectării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A16AA01

BIFONAZOLUM
BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM

CARNIL® ANFARM HELLAS; Sol. orală 10%; ct. × 10 fl. × 10 ml (**P-6L**)

MIOCOR ECOBI PHARMACEUTICI; Sol. orală 10%; ct. × 10 fl. × 10 ml (**P-6L**)

Ind: Deficiențe primare și secundare. Deficiențe nutriționale. Deficiențe secundare hemodializei cronice. Afecțiuni cardiovasculare. Supliment energetic la sportivi.

Dz: Dozele se stabilesc în funcție de afecțiune. *Adulți:* 2-6 g/zi, fracționat în 2 doze. *Copii,* în funcție de vîrstă: 75-150 mg/kg/zi. La adult se începe cu doza de 1 g/zi, iar la copii cu 50 mg/kg/zi. Doza se poate crește apoi lent.

Cind: Hipersensibilitate la produs.

Al: Atenție, în cazul adm. comprimatelor masticabile, la diabeticii tratați cu insulină. Precauție în sarcină.

RA: Tulburări gastrointestinale (grețuri, vărsături, crampe, diaree). Simptome ale miasteniei la pacienții uremici. Reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01ED05

BIPERIDENUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINIUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM

CARTEOL S.I.F.I.; Sol. oft. 1%, 2%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)**Ind:** Hipertensiune intraoculară; glaucom cronic cu unghi deschis.**Dz:** Inițial o picătură sol. oft. 1% de 2 ori pe zi. Dacă nu se obține efectul terapeutic dorit, se trece la sol. 2%, câte o picătură de 2 ori pe zi. Când se înlocuiește un alt medicament antiglaucomatos, carteololul se adm. împreună cu acesta, timp de o zi, după care celălalt medicament se întrerupe.**Cind:** Astm bronșic și BPOC; IC decompensată; șoc cardiogen; BAV de grad II sau III (fără pacemaker); angină pectorală vasospastică; boală sinusală; bradicardie marcată (frecvența < 50/min); afecțiuni vasospastice periferice; feocromocitom netratat; hTA. În caz de hipersensibilitate la oricare din componentele produsului. Perioadă de alăptare.**Al:** La copii. La vârstnici. La pacienții tratați cu blocante beta-adrenergice sistemice. La cei cu diabet zaharat tratați cu antidiabetice. La hipertiroidieni. La pacienții cu glaucom cu unghi închis carteololul trebuie adm. în asociere cu miotice. Nu se recomandă utilizarea lentilelor de contact pe durata trat. Este inclus în lista medicamentelor dopante la sportivi. Atenție în cazul asocierii cu: a-blocante, anestezice generale, antiaritmice, antihipertensive, antidiabetice. Precauție la femei însărcinate, la șoferi și la persoane cu activități de precizie.**RA:** Locale: Diminuarea secreției lacrimale; iritație oculară cu senzație de arsură și înțepături, fenomene de conjunctivită, blefarită și keratită; tulburări vizuale, diplopie, ptoză palpebrală. Sistemice: bradicardie, dispnee, cefalee, oboseală, greață, scăderea libidoului, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BISACODYLUM
 BISMUTHI SUBCITRAS
 BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINIUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM

Cod ATC: C07AG02

ATRAM 6,25 mg; ATRAM 12,5 mg; ATRAM 25 mg ZENTIVA AS; Cpr. film. 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 15 cpr. (P-6L)

CARVEDIGAMMA 3,125 mg; CARVEDIGAMMA 6,25 mg; CARVEDIGAMMA 12,5 mg; CARVEDIGAMMA 25 mg WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg și 25 mg; ct. × 3 sau 5 blist. × 10 cpr., ct. × 5 blist. × 20 cpr. (P-6L)

CARVEDILOL 6,25 mg; CARVEDILOL 12,5 mg VIM SPECTRUM SRL; Cpr. 6,25 mg, 12,5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

CARVEDILOL 12,5 mg; CARVEDILOL 25 mg AC HELCOR SRL; Cpr. 12,5 mg, 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

CARVEDILOL LPH 6,25 mg; CARVEDILOL LPH 12,5 mg; CARVEDILOL LPH 25 mg LABORMED PHARMA; Cpr. 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 15 cpr. (S/P-6L)

CORYOL® KRKA; Cpr. 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (6,25 mg, 12,5 mg), ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

DILATREND® HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

TALLITON® 6,25 mg; TALLITON® 12,5 mg; TALLITON® 25 mg EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. film. 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)

Ind: IC, asociat medicației de bază.

Dz: 25 mg dimineața și seara. Trat. se începe cu doze mici (3,125 mg dimineața și seara) care se cresc treptat. Trat. nu trebuie întrerupt brusc.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții preparatului, tulburări de ritm cardiac cu excepția pacienților având pace-maker, tulburări cardiace severe cu insuficiență în stare de repaus, hTA, bradicardie, șoc cardio-vascular, angină instabilă, hipertensiune arterială pulmonară și hipertrofie atrio-ventriculară dreaptă consecutivă, tulburări pulmonare cu insuficiență respiratorie, tulburări funcționale hepatice grave, adm. simultană a IMAO, verapamil, diltiazem. La copii și tineri sub 18 ani.

Al: Atenție în caz de: deteriorare a funcției renale, bronhospasm, intervenții chirurgicale, diabet, purtători de lentile de contact. Atenție în cazul asocierii cu: glicozide digitalice, nitrați organici, antiaritmice, antagoniști de calciu, parasimpatomimetice, simpatomimetice, narcotice și tranchilizante, antidepresive, alcool, anestezice, antimigrenoase, aminofilină, teofilină, anumite antialgice și AINS, preparate hormonale (pe bază de estrogeni), insulină, hipoglicemizante orale, rifampicină, curarizante și cimetidină. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Sistem nervos (amețeală, dureri de cap, oboseală, stări depresive, tulburări de somn). Sistem cardiovascular (puls scăzut, hTA, edeme, tulburări ale ritmului cardiac, angină pectorală, tulburări de irigare a membrelor, agravarea IC). Sistem respirator (IR, crize astmatiforme, nas înfundat). Tract digestiv (grețuri, diaree, dureri abdominale, vărsături, constipație). Piele (reacții alergice, descuamare fină). Altele: tulburări de vedere, dureri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BISMUTHI SUBCITRAS
BISOPROLOLUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BORTEZOMIBUM
BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINIUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM

Cod ATC: J02AX04**CANCIDAS® 50 mg; CANCIDAS® 70 mg** MERCK SHARP & DOHME; Pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 50 mg, 70 mg; ct. × 1 fl. (S)**CANCIDAS® 50 mg** MERCK SHARP & DOHME; Pulb. pt. sol. perf. 50 mg; ct. × 1 fl. + set transfer (S)

Ind: Trat. aspergilozei invazive la pacienți adulți refractari sau cu intoleranță la amfotericina B, formulări lipidice ale amfotericinei B și/sau itraconazol. Lipsa de răspuns la tratament a fost definită ca progresie a infecției sau lipsa ameliorării consecutive administrării anterioare timp de minimum 7 zile de dz. terap. dintr-o terapie antifungică efecă.

Dz: După reconstituire și diluare, se administrează în perfuzie i.v. cu ritm lent cu durată de aproximativ 1 oră. Caspofungin nu trebuie amestecat sau perfuzat simultan cu alte medicamente. **NU TREBUIE UTILIZAȚI DILUANȚI CARE CONȚIN GLUCOZĂ.** O doză de încărcare unică de 70 mg trebuie administrată în ziua 1, urmată în continuare de 50 mg/zi. La pacienții cu greutate corporală peste 80 kg, după doza inițială de încărcare de 70 mg, se recomandă administrarea de Caspofungin 70 mg zilnic tratamentul trebuie continuat pentru încă 7 zile după dispariția simptomelor.

Cind: Hipersensibilitate la acetatul de caspofungină. Pacienții sub 18 ani.

Al: Administrarea asociată a Caspofungin cu ciclosporină trebuie limitată doar la acei pacienți pentru care beneficiul potențial depășește riscul potențial. În IH medie se scade dz. În IH severă trebuie folosit cu precauție la acești pacienți.

RA: Febră, cefalee, dureri abdominale, durere, greață, diaree, vărsături, valori crescute ale ALAT, ASAT, fosfatazei alcaline, anemie, flebită/tromboflebită, complicații la nivelul venei perfuzate, erupții cutanate, prurit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA

BISOPROLOLUM
 BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINIUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSKOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
CEFACTORUM

CEC® HEXAL FORTE HEXAL AG; Pulb. pt. susp. orală 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 60 ml (*P-RF*)
CECLODYNE® 250 mg; CECLODYNE® FORTE 500 mg LEK PHARMATECH; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (*P-RF*)
CECLODYNE® 125 mg/5 ml; CECLODYNE® 250 mg/5 ml LEK PHARMATECH; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. gran. pt. 60 sau 100 ml susp. (*P-RF*)
CECLODYNE® MR 375 mg; CECLODYNE3 MR 500 mg; CECLODYNE3 MR 750 mg LEK PHARMATECH; Cpr. film. elib. modif. 375 mg, 500 mg, 750 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)
CECLOR3 MR ELI LILLY; Cpr. retard 375 mg, 500 mg, 750 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)
CECLOZONE MR 375 mg; CECLOZONE MR 750 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. cu elib. prel. 375 mg, 750 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)
CEFACTOR 250 mg; CEFACOLOR 500 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 blist. × 15 cps. (*P-RF*)
CEFACTOR 250 mg EUROPHARM; Cps. 250 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (*S/P-RF*)
CEFAKLOR 125/5 ml; CEFALOR 250/5 ml HEMOFARM; Pulb. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 60 ml susp. (*P-RF*)
CLORACEF® 250; CLORACEF® FORTE 500 DAR AL DAWA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cps. (*P-RF*)
CLORACEF® 125, CLORACEF® 250 DAR AL DAWA; Pulb. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 75 ml susp. (*P-RF*)
MEDOCLOR 250, MEDOCLOR 500 MEDOCHEMIE Ltd.; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cps. (*P-RF*)
VERCEF 250 mg; VERCEF 500 mg RANBAXY LAB.; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 5 blist. × 3 cps. (*P-RF*)
VERCEF MR 375; VERCEF MR 750 RANBAXY LAB.; Cpr. elib. prel. 375 mg, 750 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: În trat. infecții ORL, infecții bronho-pulmonare, infecții ale tractului urinar, infecții cutanate și ale țesuturilor moi, infecții osteoarticulare, septicemii produse de germeni sensibili. Infecțiile respiratorii și otita medie supurată cu H. influenzae precum și în infecțiile urogenitale cu E. coli și Proteus mirabilis.

Dz: *Adulți:* 250-500 mg la 8 ore. Doza poate fi crescută fără a depăși 4 g/zi. *Copii:* 20-40 mg/kg/zi, fracționat în 3 prize, fără a depăși 1 g/zi. În IR doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei.

Cind: Alergie la cefalosporine sau la oricare dintre componentii produsului.

Al: Prudență la persoanele alergice la peniciline. La bolnavii cu IR, doza trebuie adaptată în funcție de clearance-ul creatininei. Prudență în cazul bolnavilor cu antecedente de colită pseudomembranoasă după trat. cu antibiotice cu spectru larg. Poate da o reacție fals pozitivă la dozarea glucozei în urină. Poate pozitivă testul Coombs. Probenecidul îi favorizează reținerea în organism. A se evita asocierea cefactorului cu antibiotice aminoglicozidice sau cu diuretice cu acțiune intensă. Se va evita folosirea în timpul sarcinii și în perioada alăptării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BLEOMYCINUM SULFAS
 BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSKOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLOLUM
 CEFADROXILUM

Cod ATC: J01DA09

CEFORAN® ANTIBIOTICE SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)

CEXYL® 500 mg; CEXYL® 1000 mg LEK PHARMATECH; Cps. 500 mg, 1000 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)

CEXYL® LEK PHARMATECH; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml; ct. × 1 fl. gran. pt. 60 ml susp. (P-RF)

Ind: Infecții ale tractului respirator superior și inferior, ale tractului urinar, ale pielii și țesuturilor moi, infecții osteo-articulare produse de microorganisme sensibile.

Dz: Oral. *Copii* cu funcție renală normală: 25-50 mg/kg/zi, max. 100 mg/kg/ zi, în doză unică sau fracționată în două doze egale. *Adulți și adolescenți* cu funcție renală normală: 1-2 g/zi în doză unică sau fracționată în două adm. egale. În caz de infecții severe doza poate fi crescută sau chiar dublată. În IR dozele și intervalul dintre adm. se adaptează în funcție de clearance-ul la creatinină. Trat. trebuie adm. minim 7-10 zile sau încă 2-3 zile după regresia simptomelor acute.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.

Al: Precauție în cazul pacienților cu antecedente de alergie la peniciline, la pacienții cu IR gravă, la persoane cu antecedente de alergie severă sau astm. Se recomandă verificarea frecventă a valorilor hemoleucogramei, precum și efectuarea în mod regulat de teste funcționale renale și hepatice. În cazul prezenței de diaree severă și persistentă trebuie suspectată colita pseudomembranoasă. Pot apărea suprainfecții cu fungi, ca și simptome ale deficitului de vitamina K sau ale deficitului de vitamina B. Pacienții cu afectare gastrointestinală severă nu trebuie tratați cu cefadroxil. Atenție în cazul asocierii cu: antibiotice/chimioterapice bacteriostatice, probenecid, aminoglicozide, polimixina B, colistin, doze mari de diuretice de ansă, anticoagulante, inhibitori ai agregării plachetare. Este posibilă falsa pozitivare a rezultatelor testului Coombs și la determinarea glucozuriei. Prudență în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.

RA: Tulburări gastrointestinale (greață, vărsături, diaree, durere abdominală), simptome dermatologice (prurit, exantem alergic sau eritem, urticarie, febră medicamentoasă, dureri articulare sau, rar, angioedem), glosită, vertij, nervozitate, somnolență, reacție alergică imediată, sindrom Stevens-Johnson, eritem multiform, modificări hematologice (eozinofilia, trombocitopenia, leucopenia și neutropenia), creșterea transaminazelor serice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA01

BORTEZOMIBUM
 BRINZOLAMIDUM
 BRIVUDINUM
 BROMAZEPAMUM
 BROMHEXINUM
 BROMOCRIPTINUM
 BUDESONIDUM
 BUFORMINUM
 BUPIVACAINIUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSKOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
CEFALEXINUM

CEFALEXIN LEK PHARMATECH; Cps. 250 mg; 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
CEFALEXIN LEK PHARMATECH; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × gran. pt. 60 ml susp. (P-RF)
CEFALEXIN OZONE LABORATORIES Ltd.; Cps. 250 mg; 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
CEFALEXINĂ ANTIBIOTICE SA; Cps. 250 mg; 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
CEFALEXINA ARENA GROUP SA; Cps. 250 mg; 500 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (250 mg), ct. × 2 sau 100 blist. × 5 cps. (500 mg) (S/P-RF)
CEPHALEXIN EUROPHARM SA; Cps. 250 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 12 cps. (S/P-RF)
CEFALIN 500 mg EUROPHARM SA; Cps. 500 mg; ct. × 1 blist. × 12 cps. (P-RF)
OSPEXIN® SANDOZ GmbH; Cps. 250 mg; ct. × 1 blist. × 12 cps. sau ct. × 100 blist. × 10 cps. (P-RF/S)
OSPEXIN® SANDOZ GmbH; Cpr. film. 500 mg; 1000 mg; ct. × 1 blist. × 12 cpr. sau ct. × 100 blist. × 10 cpr. (P-RF/S)
OSPEXIN® SANDOZ GmbH; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. gran. pt. 60 ml susp. (P-RF)

Ind: Infecții ale aparatului uro-genital, infecții cutanate și ale țesuturilor moi, infecții osteo-articulare, infecții respiratorii, infecții ORL, infecții stomatologice produse de microorganisme sensibile.

Dz: Oral, cu o oră înaintea meselor. *Adulți:* 500 mg la 6 ore fără a depăși

6 g/zi. *Copii:* oral, 25-50 mg/kg/zi, fracționat în 2-4 adm. La sugari și la copii sub 6 ani doza zilnică nu trebuie să depășească 100 mg/kg/zi. Trat. trebuie continuat 2-5 zile după dispariția simptomatologiei. La pacienții cu IR, doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei.

Cind: Alergie la cefalosporine.

A!: În caz de: alergice la peniciline, IR, diaree severă și persistentă apărută în timpul trat., la pacienții diabetici. Folosirea necorespunzătoare poate duce la suprainfecții bacteriene sau fungice cu germeni rezistenți. Se recomandă efectuarea antibiogrammei înaintea începerii trat. precum și supravegherea hemogramei și funcției hepatice. Atenție la asocieri cu: antibiotice bacteriostatice, probenecid, aminoglicozide, diuretice cu acțiune intensă (furosemid, acid etacrinic). Pot pozitivă testul Coombs și rezultatele dozării glucozei. Pot crește nivelul plasmatic al transaminazelor. Precauție în primul trimestru de sarcină.

RA: Reacții alergice: erupții cutanate, febră, șoc anafilactic, prurit genital cu sau fără candidoză. Tulburări digestive: diaree, greață, vărsături, colită pseudomembranoasă. Alterarea funcției renale. Manifestări hematologice: eozinofilie, trombocitopenie, leucopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

BRINZOLAMIDUM
BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSKOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA03

CEFALOTINĂ ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 1 g cefalotină; ct. × 50 sau 100 fl. (S/P-RF)

Ind: Infecții bronhopulmonare, ORL și stomatologice, urogenitale, cutanate, osteoarticulare, la nivelul seroaselor, septicemie, endocardită, produse de germeni sensibili.

Dz: *Adulți:* 0,5-1 g la 4-6 ore, în inj. i.m. sau i.v. lent, maxim 12 g/zi. La pacienții cu IR doza se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei. *Copii:* 50-100 mg/kg/zi în inj. i.m., fracționat la 4-6 ore, maxim 120 mg/kg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.

Al: Prudență la pacienții alergici la peniciline, la bolnavii cu IR. Se recomandă supravegherea funcției renale când este necesară asocierea cu antibiotice aminoglicozidice, diuretice cu acțiune intensă sau cu alte medicamente cu potențial nefrototoxic. Folosirea necorespunzătoare poate determina selecționarea unor tulpini rezistente. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină. Poate modifica rezultatele dozării glucozei în urină și poate pozitiva testul Coombs. Precauție în sarcină și alăptare.

RA: Manifestările alergice (erupții maculo-papuloase, urticarie, prurit, febră, boala serului, șoc anafilactic, eritem polimorf, excepțional sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell). Creșterea creatininemiei. Nefrită interstițială. Creștere tranzitorie a enzimelor hepatice (transaminaze, LDH, fosfataze alcaline) și bilirubinemiei. Manifestări hematologice (eozinofilie, leucopenie sau trombocitopenie reversibile). Uneori, fenomene de encefalopatie metabolică (stare confuzivă, tresăriri musculare, crize convulsive). Flebite la locul inj. i.v.; durere și indurație la locul inj. i.m.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

BRIVUDINUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA04**CEFAZOLIN "SANDOZ" 1 g** SANDOZ GmbH; Pulb. pt. sol. inj. 1 g; ct. × 50 fl. (S/P-RF)**LYZOLIN** LYKA LABS Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 1 g (S/P-RF)

Ind: Infecții cu microorganisme sensibile localizate la nivelul: aparatului respirator; tractului urogenital; pielii și țesuturilor moi; căilor biliare; sistemului osteoarticular; endocardite; septicemii; profilaxia infecțiilor chirurgicale.

Dz: Inj. i.m./i.v. *Adulți:* 0,5-1,5 g de 2-4 ori pe zi. Maxim 12 g/zi. *Copii în vârstă de peste o lună:* 25-100 mg/kg/zi, fracționat în 3-4 doze. În IR doza se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei. Adm. trebuie continuată 2-3 zile după dispariția simptomatologiei.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.

Al: Prudență la pacienții cu teren atopic, cu astm bronșic sau febra fânului; la persoanele alergice la peniciline. La pacienții cu IR se recomandă reducerea dozei sau prelungirea intervalului dintre doze. Prudență la pacienții care prezintă factori de risc pentru deficit de vitamină K. Dacă în timpul trat. apare diaree severă și persistentă, trebuie suspectată apariția colitei pseudomembranoase. Folosirea necorespunzătoare poate duce la selecționarea unor tulpini rezistente. Prudență la pacienții hipertensivi și la cei cu tendință de retenție hidrosalină. Adm. concomitentă de probenecid întârzie eliminarea renală a cefazolinei. Poate modifica rezultatele dozării glucozei în urină și poate pozitivă testul Coombs. Nu se recomandă adm. la femeile gravide sau care alăptează.

RA: Manifestări alergice: rash cutanat, febră, edem angioneurotic, prurit, urticarie, sindrom Lyell, sindrom Stevens-Johnson, prurit vulvar, eozinofilie, nefrită interstițială alergică, anafilaxie. Tulburări hematologice: leucopenie, trombocitopenie, trombocitemie și pozitivarea testului Coombs, rar hipoprotrombinemie. Tulburări renale: creșterea nivelului produșilor de retenție azotată. Tulburări hepatice: creșterea nivelului transaminazelor și fosfatazei alcaline, hepatită colestatică tranzitorie, icter. Tulburări digestive: inapetență, diaree, greață și vărsături, rar colită pseudomembranoasă. Reacții locale: durere sau indurare la locul inj. i.m., flebite la locul inj. i.v. Alte evenimente adverse: prurit genital și anal, candidoză genitală și vaginită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BROMAZEPAMUM
BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINIUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPINUM

Cod ATC: J01DA24**MAXIPIME®** BRISTOL-MYERS SQUIBB; Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 2 g (S/P-RF)**Ind:** Septicemie și bacteriemie, infecții ale tractului respirator inferior, infecții ale tractului urinar, episoade febrile la pacienții cu neutropenie, infecții biliare, produse de microorganisme sensibile.**Dz:** Inj. i.v. sau i.m. profund. *Adulți:* 1-2 g de 2-3 ori/zi. La pacienții cu IR dozele trebuie reduse.**Cind:** Alergie la cefalosporine sau la L-arginină.**Al:** Apariția oricărei reacții alergice impune întreruperea trat. Prudență la pacienții cu alergie la peniciline. Un episod de diaree poate fi indiciul unei colite pseudomembranoase. Poate determina pozitivarea testului Coombs precum și a unor teste pentru glucozurie. Prudență în cazul adm. la femei însărcinate sau care alăptează.**RA:** Diaree, rash, prurit, urticarie, febră, greață, vărsături, candidoză orală, flebită și tromboflebită după adm. i.v.; durere și inflamație la locul de inj. i.m.; cefalee, parestezii, anafilaxie, hTA, vasodilatație, dureri abdominale, colită pseudomembranoasă, ulceratii ale mucoasei bucale, artralгии cu edem, confuzie, amețeală, convulsii, alterarea gustului, tinitus, vaginită. Au fost observate creșteri ale numărului de eozinofile, ale concentrațiilor transaminazelor, modificarea timpului de protrombină și a timpului de tromboplastină parțial activată și scăderea fosfatemiei. Rar, granulocitopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

BROMHEXINUM
BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSKOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA23**EFICEF® ANTIBIOTICE SA; Cps. 200 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)**

Ind: În tratamentul infecțiilor bacteriene cu severitate diferită, produse de germeni sensibili la cefiximă dacă terapia pe cale orală este adecvată: bronșite acute și exacerbări ale bronșitei cronice; pneumonii bacteriene; angine și faringite, în special angine recidivante și/sau amigdalite cronice; sinuzite și otite acute; pielonefrite acute fără uropatie; infecții urinare joase complicate sau necomplicate, cu excepția prostatitelor; uretrite gonococice (la bărbați).

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 400 mg cefiximă (2 cps.) pe zi, administrată oral, în două prize, la interval de 12 ore. În uretritele gonococice eficacitatea maximă a fost obținută cu o doză unică de 400 mg cefiximă (2 capsule 200 mg).

Insuficiența renală severă: doza se ajustează în funcție de clearance-ul crea-tininei: clearance > 20 ml/minut: nu necesită modificarea dozei; clearance < 20 ml/minut, doza zilnică nu trebuie să depășească 200 mg cefiximă. În infecții bacteriene obișnuite durata tratamentului depinde de evoluția bolii și este, de obicei, 7-10 zile. În infecții produse de streptococi-hemolitici: tratamentul nu se întrerupe mai devreme de 10 zile pentru a preveni complicațiile (reumatism articular acut, glomerulonefrită). În infecții necomplicate ale căilor urinare inferioare: durata recomandată a tratamentului este de 1-3 zile. Suprainfecții și infecții recidivante: durata tratamentului depinde de evoluția bolii; 7-14 zile de tratament sunt considerate suficiente.

Cind: Hipersensibilitate la cefiximă, la alte cefalosporine sau la oricare dintre excipienții produsului.

Al: Se face anamneza atentă a bolnavului înainte de administrare, deoarece poate să apară hipersensibilitate încrucișată la peniciline (tratamentul se urmă-rește pentru depistarea hipersensibilizării). Dacă apare diaree în timpul tratamentului se poate suspecta apariția colitei pseudomembranoase. În cazul tratamentului cronic sau repetat, pot apărea suprainfecții micotice sau cu bacterii rezistente. Interacțiuni medicamentoase: antibiotice din grupa aminoglicozidelor, polimixina, colistina și diuretice de tipul furosemidei și acidului etacrinic (se monitorizează funcția renală), probenecid, anticoagulante (derivați dicumarinici), antiagregante (de exemplu, acid acetilsalicilic, antiinflamatoare nesteroidiene). Influențarea rezultatelor testelor de laborator: reacții fals pozitive la determinarea cetonei în urină; reacții fals pozitive la determinarea glicozuriei (dacă se utilizează metode enzimatic); test Coombs fals pozitiv pe perioada tratamentului.

Atenționări speciale: Se utilizează cu prudență la pacienții predispuși la reacții de hipersensibilitate (urticarie, erupții cutanate) sau astm bronșic. La pacienții cu tulburări gastrointestinale în antecedente (ca, de exemplu, colita ulceroasă, colita asociată antibioticelor), trebuie evaluat beneficiul tratamentului față de riscul apariției colitei pseudo-membranoase. Se va utiliza cu prudență la pacienții cu insuficiență renală; în acest caz poate fi necesară adaptarea dozei zilnice, în funcție de clearance-ul creatininei. Se întrerupe alăptatul pe parcursul tratamentului. Pacienții care conduc trebuie avertizați că poate apărea vertij.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BROMOCRIPTINUM
BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSKOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM

Cod ATC: J01DA17

MONOCID GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. adm. i.m. 1 g; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. (lidocaină 1%); Pulb. pt. adm. i.v. 1 g; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. (bicarbonat de sodiu 4%) (*S/P-RF*)

Ind: Infecții ale tractului respirator, infecții ale tractului urinar, infecții ale pielii și țesuturilor moi, infecții ale oaselor și articulațiilor, septicemii, gonoree necomplicată produse de microorganisme susceptibile. Profilaxia infecțiilor chirurgicale.

Dz: Inj. i.m. sau i.v., o singură dată pe zi. **Adulți:** Funcția renală normală: 0,5- 2 g o dată/zi. Durata trat. variază în funcție de severitatea infecției. **Copii:** Cu vârsta de 2 ani și peste: 50 mg/kg, maxim de 2 g pe 24 de ore. La pacienții cu IR se impune reducerea dozei.

Cind: Hipersensibilitate la antibiotice betalactamice.

Al: Soluțiile ce conțin lidocaină nu trebuie adm. i.v. Dozajul trebuie ajustat în IR și la vârstnici. Precauție la pacienții cu dietă hiposodată. Folosirea îndelungată poate duce la selectarea de tulpini de microorganisme rezistente. Precauție în cazul adm. concomitente cu medicamente nefrotoxice, probenecid, alcool. Nu trebuie amestecat cu produse hemoderivate, alte lichide proteice sau cu aminoglicozide. Prudență la copii sub 2 ani și la femei însărcinate.

RA: Durere la locul inoculării. Reacții gastro-intestinale: diaree, colită pseudomembranoasă. Efecte hematologice: leucopenie, pozitivare a testului Coombs și eozinofilie. Efecte hepatice: creșteri tranzitorii ale fosfatazelor alcaline, ALAT, ASAT, GGTP și LDH. Reacții de hipersensibilitate: febră, rash, prurit, eritem, reacții anafilactice și anafilactice. Efecte renale: niveluri crescute de uree sanguină și de creatinină, rar diminuarea funcției renale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA32

BUDESONIDUM
BUFORMINUM
BUPIVACAINUM
BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM

CEFOZON E.I.P.I.C.O.; Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g, 1 g (S/P-RF)**LYZONE** LYKA LABS Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 2 g (S/P-RF)**MEDOCEF** MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 2 g; ct. × 10 sau 100 fl. (S/P-RF)

Ind: Infecții ale tractului respirator; ale tractului urinar; peritonite, colecistite, colangite și alte infecții intraabdominale; septicemii; meningite; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; infecții ale oaselor și articulațiilor; afecțiuni inflamatorii pelviene, infecții ale tractului genital produse de microorganisme susceptibile. Profilaxia infecțiilor postoperatorii.

Dz: Adm. inj. i.m. sau i.v. *Adulți:* 1-4 g/zi adm. în mod egal la 12 ore; în cazuri severe doza se poate crește până la 8-16 g pe zi adm. în mod egal la 8-12 ore. În uretrita gonococică necomplicată 500 mg în doză unică. La pacienții cu IR (filtrare glomerulară sub 18 ml/min, sau creatinină serică peste 3,5 mg/dl) doza max. va fi de 4 g/zi. *Copii:* Sugari și copii mai mari: 50-200 mg/kg/zi în două administrări (la 12 ore).

Cind: La pacienți cu alergie cunoscută la cefalosporine.

Al: Precauție la pacienții cu sensibilitate cunoscută la penicilină. Prudență în caz de obstrucție biliară severă, IH gravă sau IR coexistentă. Dozele de cefoperazonă trebuie adm. după ședința de dializă. Poate determina deficiență de vitamina K. În cazul adm. prelungite se pot dezvolta microorganisme nesusceptibile. Prudență la copiii prematuri și nou-născuți. A nu se consuma alcool în timpul trat. Prudență la femei însărcinate sau care alăptează.

RA: Hipersensibilizare: rash cutanat, urticarie, eozinofilie și febră medicamentoasă. Hematologice: neutropenie, pozitivare a testului Coombs direct, scăderea Ht. sau Hb., eozinofilie tranzitorie și hipoprotrombinemie. Hepatice: creșteri tranzitorii ale nivelelor GOT și GPT și fosfatazei alcaline. Gastrointestinale: diaree. Reacții locale: durere locală în cazul adm. i.m.; flebită la locul perf. i.v.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA10

BUFORMINUM
 BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSKOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
 CEFALEXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM

CEFOTAX E.I.P.I.C.O.; Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g, 1 g; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. (P-RF)
CEFOTAX T3A T3A GROUP; Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g, 1 g; ct. × 1 fl. + 1 fl. solv. (P-RF)
CEFOTAXIM ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 1 g; ct. × 1 fl. (P-RF)
CEFOTAXIME LEK PHARMACEUTICALS; Pulb. pt. sol. inj. 1 g, 2 g; ct. × 1 sau 5 fl. (P-RF)
LYFORAN 1 g LYKA LABS Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 1 g (P-RF)
SEFOTAK 0,5 g; SEFOTAK 1 g ECZACIBASI ILAC; Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g, 1 g; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. (P-RF)

Ind: Infecții ale aparatului respirator, urinar, ORL, septicemii, endocardite, meningite, infecții ale oaselor și articulațiilor, ale pielii și țesuturilor moi, infecții abdominale și ginecologice, cauzate de microorganisme sensibile.

Dz: Inj. i.v. lent sau i.m. *Adulți și copii peste 12 ani:* 1 g la 12 ore. Doza poate fi crescută până la max. 12 g/zi. *Nou-născuți și sugari:* 50-100 mg/ kg/zi, fracționat la intervale de 6-12 ore. *Prematuri:* max. 50 mg/kg/zi. În IR doza va fi ajustată după gradul disfuncției.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.

Al: Precauție la cei cu hipersensibilitate la penicilină și alți alergeni, în timpul sarcinii, la mamele care alăptează, la pacienții cu o disfuncție renală gravă și la cei cu boli gastrointestinale.

RA: Reacții alergice cutanate, tulburări gastrointestinale (colită pseudomembranoasă), cefalee, trombocitopenie, leucopenie tranzitorie, eozinofilie și neutropenie, creșteri temporare ale valorilor GOT, GPT, fosfatazei alcaline și ale azotului ureic în sânge.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BUPIVACAINUM
 BUPROPIONUM
 BUSPIRONUM
 BUSULFANUM
 BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
 CEFALEXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM

Cod ATC: J01DA37

CEFPIROM® 1 g; CEFPIROM® 2 g LAB. AVENTIS; Pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg; 2000 mg; ct. × 1 fl. (S/P-RF)

Ind: Infecții ale tractului respirator inferior; infecții ale tractului urinar inferior și superior; infecții ale pielii și țesuturilor moi; bacteriemii/septicemii; infecții la pacienți neutropenici; infecții severe produse de germeni sensibili.

Dz: Adm. inj. i.v. sau perf. i.v. *Adulți și adolescenți:* 1-2 g la 12 ore. Doza trebuie redusă la pacienții cu funcție renală afectată. Nu trebuie amestecat în aceeași seringă cu alte antibiotice.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.

Al: Precauție în cazul diatezei alergice, în special a hipersensibilității la antibiotice betalactamice. Diareea, severă sau/și persistentă, apărută în timpul trat. poate fi simptomul unei afecțiuni cu *Clostridium difficile*, cea mai severă formă fiind colita pseudomembranoasă. Dozarea trebuie adaptată în funcție de clearance-ul creatininei. Atenție în cazul asocierii cu aminoglicozide sau cu diuretice de ansă. Se va opri trat. în caz de neutropenie. Probenecidul crește conc. plasmatică a cefalosporinelor. Nu trebuie folosit în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

RA: *Reacții anafilactice:* angioedem, bronhospasm, stare de rău, șoc anafilactic. *Cutaneate:* rash, prurit, urticarie, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necroliza epidermală toxică. *Gastrointestinale:* grețuri, vărsături, dureri abdominale, diaree, enterocolite, colită pseudomembranoasă. *Hepatice:* creșterea ALAT, ASAT, fosfatazei alcaline, LDH și a bilirubinei. *Hematologice:* neutropenie, agranulocitoză. *Renale:* ceșteri ale ureei și creatininei serice, nefrită interstițială, rar IR. *Neurologice:* encefalopatie reversibilă. *Reacții locale:* iritație inflamatorie a căii venoase și durere la locul injectării. *Altele:* cefalee, febră, perturbări ale gustului sau mirosului. *Infecții secundare:* dezvoltarea organismelor nesusceptibile, inclusiv moniliaza (candidiaza).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

BUPROPIONUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA41

CEFZIL 125 mg/5 ml; CEFZIL 250 mg/5 ml BRISTOL-MYERS SQUIBB; Pulb. pt. susp. orală. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 60 sau 100 ml (*P-RF*)

CEFZIL 250 mg; CEFZIL 500 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Trat. infecțiilor produse de bacterii sensibile la cefprozil: *Adulți:* faringite, amigdalite și sinuzite, bronșite acute și cronice și pneumonii. Infecții cutanate. Infecții necomplicate ale tractului urinar incluzând cistite acute. *Copii:* faringite, amigdalite, otite medii și sinuzite. Infecții necomplicate cutanate.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* Infecții ale tractului respirator superior: 500 mg, în priză unică. Sinuzite: 250-500 mg, în priză unică. Infecții ale tractului respirator inferior: 1000 mg, fracționat în două prize. Infecții necomplicate ale tractului urinar: 500 mg, în priză unică. *Copii între 6 luni și 12 ani:* Otite medii: 15 mg/kg la 12 ore. Faringite și amigdalite: 20 mg/kg la 24 ore. Sinuzite: 7,5-15 mg/kg la 12 ore. Infecții cutanate: 20 mg cefprozil/kg la 24 ore. Trat. inf. produse de streptococul a-hemolitic se va face 10 zile. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu I.H. *Pacienți cu I.R.:* Nu este necesară o ajustare a dozei la pacienții cu clearance-ul creatininei > 30 ml/min. Pentru pacienții cu clearance al creatininei = 30 ml/min, după administrarea primei dz. std. se administrează în continuare doze reduse la ½ față de pacienții cu funcție renală normală.

Cind: Hipersensibilitate la cefprozil, alte cefalosporine, sau la oricare dintre excipienții produsului.

A!: Dacă acest medicament se administrează la pacienții alergici la penicilină, este necesară prudență deoarece există alergii încrucișate între antibioticele beta-lactamice. În cazul apariției unei reacții alergice la Cefprozil, se va întrerupe imediat administrarea produsului și se va institui tratamentul necesar. Trat. poate duce la apariția colitei pseudomembranoase, a cărei gravitate poate fi variabilă; existența unei colite pseudomembranoase trebuie avută în vedere la pacienții care prezintă diaree ca urmare a administrării agenților antibacterieni. Trebuie administrat cu prudență la pacienții care primesc un tratament concomitent cu diuretice de ansă, deoarece acestea pot fi nefrotoxice. Atenție la pacienții cu antecedente de tulburări gastrointestinale. Siguranța și eficacitatea la copii sub 6 luni nu au fost stabilite.

RA: Diaree, greață, vărsături și dureri abdominale, amețeală, rash și suprainfecții, prurit genital și vaginite.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA11

BUSPIRONUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM

CEFTAMIL® ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g, 1 g, 2 g; ct. × 1 sau 50 fl. (S/P-RF)

CEFTIDIN 1 g LYKA LABS Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 1 g (S/P-RF)

CETAZIME 1 g T3A PHARMA GROUP; Pulb. pt. sol. inj. 1 g; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 5 ml (S/P-RF)

CETAZIME 2 g T3A PHARMA GROUP; Pulb. pt. sol. perf. 2 g (S/P-RF)

FORTUM® GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg, 1 g (S/P-RF)

Ind: Infecții ale tractului respirator inferior, infecții ale pielii, infecții ale tractului urinar, infecții osoase și articulare, infecții ginecologice, infecții intraabdominale, infecții ale SNC, cauzate de tulpini susceptibile ale unor germeni patogeni.

Dz: Inj. i.v. *Adulți:* 1-6 g/zi adm. fracționat la 8-12 ore. *Nou-născuți* (0-4 săptămâni): 30 mg/kg, la 12 ore. *Sugari și copii* (1 lună-12 ani): 30-50 mg/kg, max. 6 g/zi, i.v., fracționat la fiecare 8 ore. În cazul pacienților cu IR se recomandă ca dozele să fie reduse.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.

Al: Precauție la pacienții cu hipersensibilitate de tip I la penicilină și cefalosporine. Poate determina apariția colitei pseudomembranoase. Precauție în cazul asocierii cu medicamente nefrotoxice (aminoglicozide sau diuretice puternice). Poate determina pozitivarea testului Coombs precum și rezultate fals pozitive la determinarea glucozei urinare. Precauție la femei însărcinate sau care alăptează.

RA: Prurit, eritem, febră, flebite și inflamație la locul inj., diaree, greață, vărsături, dureri abdominale, cefalee, amețeli, paretezii, candidoze și vaginite, angioedem și reacții anafilactice. Eozinofilii și trombocitoze tranzitorii, creșterea ASAT, ALAT, LDH și fosfatazei alcaline. Creșteri ale valorilor serice ale ureei, azotului și creatininei. Rar, leucopenie, neutropenie, agranulocitoză, trombocitopenie și limfocitoză.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA39

BUSULFANUM
BUTAMIRATUM
BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM
CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM

CEDAX SCHERING PLOUGH EUROPE; Cps. 400 mg; ct. × 5 blist. × 1 cps. (P-RF)

CEDAX SCHERING PLOUGH EUROPE; Pulb. pt. susp. orală 36 mg/ml; ct. × 1 fl. pulb. + 1 linguriță dozatoare dublă gradată la 45, 90 și 135 mg + capac dozator gradat la 25 ml (P-RF)

Ind: Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, infecții ale tractului urinar, enterite și gastroenterite, cauzate de microorganisme sensibile.

Dz: *Adulți:* 400 mg zilnic, în priză unică sau fracționat la 12 ore. În caz de IR cu clearance creatininic mai mic de 50 ml/min doza trebuie redusă. *Copii (vârste sub 10 ani):* 9 mg/kg/zi (max. 400 mg/zi), oral, în doză unică sau fracționat la fiecare 12 ore.

Cind: Alergie la cefalosporine sau la oricare din componente.

Al: Necesită ajustarea dozei la pacienții cu IR precum și la cei supuși dia-lizei. Precauție la pacienții cu istoric de boală gastrointestinală complicată, în special la cei cu colită cronică. Precauție la pacienții cu alergie la peniciline. Poate induce alterarea florei intestinale și apariția diareei inclusiv colita pseudomembranoasă datorată toxinei Clostridium difficile. Siguranța și eficacitatea la sugarii mai mici de șase luni nu a fost stabilită. Prudență la femeia însărcinată sau pe perioada nașterii.

RA: Greață, diaree, dispepsie, gastrită, vomă, durere abdominală, cefalee, manifestări clinice asemănătoare bolii serului; foarte rar diaree asociată cu Clostridium difficile; convulsii; modificări de laborator: scăderea hemoglobinei, leucopenie, eozinofilie și trombocitoză; creșteri ale AST, ALT și LDH; hiperbilirubinemie, test Coombs direct pozitiv. Reacții alergice, incluzând anafilaxie, sindrom Stevens-Johnson, eritem multiform, epidermoliză necrotică toxică, suprainfecție, disfuncție renală, nefropatie toxică, anemie aplastică, anemie hemolitică și hemoragie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DA13

BUTAMIRATUM
 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLOLUM
 CEFADROXILUM
 CEFALOXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPINUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDINUM
 CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM

CEFORT® ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 500 mg, 1 g, 2 g; ct. × 1 fl. (P-RF) și ct. × 50 fl. sau ct. × 100 fl. (S)
CEFOTRIX 1 g T3A PHARMA GROUP; Pulb. pt. sol. perf. 1 g (S/P-RF)
CEFTRIAXONE/GENEFHARM 1 g GENEHARM SA; Pulb. pt. sol. inj. 1000 mg (S/P-RF)
CEFTRIAXONE SANDOZ SANDOZ; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg, 1 g; ct. × 1 sau 50 fl. (S/P-RF)
CEFTRIAXON TORREX TORREX PHARMA; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg, 1 g, 2 g (S/P-RF)
LENDACIN® LEK PHARMACEUTICALS; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 1 g; ct. × 5 fl. (S/P-RF)
MEDAXONE 1 g; MEDAXONE 2 g MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. sol. inj. 1 g, 2 g; ct. × 10, 25, 50 sau 100 fl. (S/P-RF)
NOVOSEF® 0,5 g i.m. ECZACIBASI ILAC; Pulb. pt. sol. inj. i.m. 500 mg; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 2 ml (S/P-RF)
NOVOSEF® 1 g i.m. ECZACIBASI ILAC; Pulb. pt. sol. inj. i.m. 1 g; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 3,5 ml (S/P-RF)
NOVOSEF® 0,5 g i.v. ECZACIBASI ILAC; Pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. i.v. 500 mg; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 5 ml (S/P-RF)
NOVOSEF® 1 g i.v. ECZACIBASI ILAC; Pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. i.v. 1 g; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 10 ml (S/P-RF)
OFRAMAX 250 mg; OFRAMAX 1 g RANBAXY LAB.; Pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v. 250 mg, 1 g; ct. × 50 fl. (S/P-RF)
RACEXON 1 g GLAXO SMITHKLINE.; Pulb. pt. sol. parent. 1 g; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 10 ml (S/P-RF)
ROCEPHIN HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg, 1 g (S/P-RF)

Ind: Infecții ale tractului respirator, infecții ORL, infecții ale pielii și ale țesuturilor moi, ale tractului urinar, gonoree necomplicată, infecții pelvine, infecții intraabdominale, infecții osteo-articulare, septicemie, meningită, produse de microorganisme sensibile. Profilaxia infecțiilor chirurgicale.

Dz: Inj. i.m. sau i.v. *Adulți:* 1-4 g/zi, într-o singură inj. (sau fracționat în 2 doze egale). În infecțiile gonococice necomplicate, se recomandă o doză unică de 250 mg. *Copii:* 50-100 mg/kg/zi, fără a depăși 4 g, adm. o dată sau fracționat în 2 inj., la interval de 12 ore. Tratamentul trebuie continuat cel puțin 2 zile după dispariția semnelor de infecție. În IR severă, sau la cei cu IR și IH, doza nu trebuie să depășească 2 g/zi.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine; hipersensibilitate la anestezice locale de tip amidic, porfirie, BAV, șoc cardiogen.

Al: Prudență la pacienții alergici la peniciline. Diareea severă și persistentă apărută în timpul tratamentului impune întreruperea administrării antibioticului; trebuie suspectată colita pseudomembranoasă. Poate determina scăderea timpului de protrombină. Poate determina selecționarea unor tulpini rezistente. Nu trebuie administrată la nou-născuții cu hiperbilirubinemie. Prudență la pacienții care au tendință la retenție hidrosalină. Prudență în cazul asocierii cu: diazepam, furosemid, ciclofosamidă, dexametazonă, cloramfenicol. Pozitivează rareori testul Coombs și determinarea galactozemiei. Prudență la femeile gravide sau care alăptează.

RA: La locul inj. i.m. pot să apară durere și indurație. Au fost raportate: reacții de hipersensibilitate, diaree, creșterea nivelului transaminazelor și a ureei plasmatice; tulburări hematologice - eosinofilie, trombocitoză și leucopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
 CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
 CEFALEXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM

Cod ATC: J01DA06, (C1, G)**AXETINE** MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 750 mg, 1,5 g; ct. × 1, 10, 50 sau 100 fl. (S/P-RF)**AXYCEF® 125 mg; AXYCEF® 250 mg; AXYCEF® 500 mg** LEK PHARMATECH; Cpr. acoperite 125 mg, 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)**AXYCEF® 125 mg/5 ml** LEK PHARMATECH; Pulb. pt. susp. orală; ct. × 1 fl. pulb. pt. 70 ml susp. (P-RF)**CEFUROXIMA** ARENA GROUP SA; Cps. 250 mg; ct. × 1 fl. × 10 sau 1000 cps. (S/P-RF)**CEFUROXIME "SANDOZ"** SANDOZ GmbH; Pulb. pt. sol. inj./perf. 750 mg sau 1500 mg; ct. × 1, 5, 10, 25, 50 sau 100 fl. (S/P-RF)**CEFUROXIME PANPHARMA** PANPHARMA; Pulb. pt. sol. inj. 750 mg, 1500 mg; ct. × 1, 10, 25, 50 fl. (S/P-RF)**CEROXIME** RANBAXY; Cpr. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)**MAXIL 750 LAB. FOURNIER**; Pulb. pt. sol. inj. 750 mg; ct. × 1 sau 10 fl. (S/P-RF)**MAXIL 1500 LAB. FOURNIER**; Pulb. pt. sol. perf. 1500 mg; ct. × 1 sau 10 fl. (S/P-RF)**ZINACEF** GLAXO SMITHKLINE; Pulb. inj. 750 mg; 1,5 g (S/P-RF)**ZINNAT® 125 mg; ZINNAT® 250 mg; ZINNAT® 500 mg** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 125 mg; 250 mg; 500 mg cefuroxim axetil; ct. × 10 cpr. film. (P-RF)**ZINNAT** GLAXO SMITHKLINE; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 50 ml susp. (P-RF)

Ind: Adm. int.: angine, faringite, amigdalite, otite medii acute la copii. Adm. inj.: infecții ale tractului respirator, tractului urinar, infecții ORL, infecții ale pielii și ale țesuturilor moi, infecții osteo-articulare, infecții obstetricale și ginecologice, gonoree, septicemie, meningite produse de microorganisme sensibile. Profilaxia infecțiilor chirurgicale.

Dz: Oral: Copii și sugari mai mari de 3 luni: 20-30 mg/kg/zi (max. 500 mg/ zi) în două prize; după mese. Inj.: Adulți și adolescenți (peste 12 ani): 750- 1500 mg la intervale de 8 ore, inj. i.m. sau i.v. (soluția); max. 6 g zilnic. Sugari și copii: 30-240 mg/kg/zi, fracționat în 3-4 injecții. Nou-născuți: 30-100 mg/kg/zi, fracționat în 2-3 adm. Gonoree: inj. i.m. o doză unică de 1500 mg. Trat. trebuie continuat cel puțin 3 zile după scăderea febrei și dispariția celorlalte simptome. La pacienții cu IR doza trebuie redusă.

Cind: Hipersensibilitate la cefalosporine.

Al: Prudență la pacienții alergici la peniciline. La bolnavii cu IR doza se adaptează în funcție de clearance-ul creatininei. Se recomandă supravegherea funcției renale când se asociază cu antibiotice aminoglicozidice, diuretice cu acțiune intensă sau cu alte medicamente cu potențial nefrototoxic. Poate determina selecționarea de tulpini bacteriene rezistente. În timpul trat. poate să apară diaree severă și persistentă (impune întreruperea adm.); trebuie suspectată colita pseudomembranoasă. Prudență la pacienții cu tendință la retenție hidrosalină, la pacienții diabetici și la copii sub 3 luni. Atenție în cazul asocierii cu: blocante H1, antiacidele, antibiotice bacteriostatice,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CABERGOLINUM
 CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLOLUM
 CEFADROXILUM
 CEFALOXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM

Cod ATC: M01AH01

CELEBREX 100; CELEBREX 200 PFIZER; Cps. 100 mg, 200 mg; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 10 cps. (P-RF)

Ind: Trat. simptomatic al bolii artrozice și poliartritei reumatoide.

Dz: *Int.:* Boală artrozică: 200 mg de 1-2 ori/zi. Poliartrita reumatoidă: 200-400 mg/zi, în 2 prize. La pacienții cu IH moderată trat. trebuie inițiat cu 1/2 din doza recomandată.

Cind: Hipersensibilitate la celecoxib sau la oricare dintre componentele produsului; hipersensibilitate la sulfonamide; pacienții cu astm bronșic, rinită acută, polipoză nazală, edem angioneurotic, urticarie sau alte reacții alergice după adm. de acid acetilsalicilic sau alte AINS; ulcer gastroduodenal activ sau hemoragii gastrointestinale; boli inflamatorii intestinale; IC congestivă severă; IH severă; IR; sarcină; alăptare; femei aflate la vârsta fertilă, în lipsa unei metode contraceptive eficiente.

Al: Prudență la pacienții cu antecedente de boli gastrointestinale sau la pacienții cu risc de apariție a acestor tulburări; la pacienții cu antecedente de IC, disfuncție ventriculară stângă, HTA, edeme preexistente; la pacienții tratați cu diuretice sau care prezintă risc de hipovolemie; la vârstnici. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să utilizeze metode contraceptive alternative contraceptivelor orale. Precauție în cazul asocierii cu: anticoagulante cumarinice, diuretice, anti-HTA, IEC, ciclosporină sau tacrolimus, dextrometofan, antidepresive, neuroleptice, antiaritmice, metotrexat, litiu, fluconazol, rifampicină, carbamazepină, barbiturice. Precauție la șoferi și persoane cu activități ce necesită precizie.

RA: Generale: edem periferic/retenție hidrosalină. Gastrointestinale: dureri abdominale, diaree, dispepsie, flatulență, ulceratii duodenale, gastrice și esofagiene, disfagie, perforatii intestinale, esofagită, melenă, hemoragii gastrointestinale, pancreatită acută, constipație, eructații, gastrită, stomatită, vărsături. Hepatice: disfuncție hepatică, creșterea TGO și TGP, hepatită, icter. Sistem nervos: amețeli, insomnie, hipertonie, parestezie, ataxie. Organe de simț: tulburări de vedere, alterarea gustului. Psihiatrice: anxietate, depresie, confuzie. Respiratorii: faringită, rinită, sinuzită, infecții ale tractului respirator superior, tuse, dispnee, bronhospasm. Cutanate: rash, urticarie, alopecie, fotosensibilitate, cazuri izolate de afecțiuni cutanate exfoliative, cum sunt sindromul Stevens-Johnson, necroliza epidermică, eritemul multiform. Sanguine: anemie, leucopenie, trombocitopenie, pancitopenie. Cardiovasculare: HTA, palpații, IC, IM. Tulburări renale și urinare: disfuncție renală (creșterea creatininemiei și uremiei, hiperpotasemie), IRA. Reacții alergice: reacții alergice severe, șoc anafilactic, angioedem, vasculită, miozită. Altele: crampe ale membrelor inferioare, tinitus, oboseală, infecții urinare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CALCII CARBONAS
 CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
 CEFALOXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPINUM
 CEFIXINUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDINUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM

Cod ATC: C07AB08

CELIPRES® RANBAXY LAB.; Cpr. film. 100 mg, 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: HTA, în monoterapie sau în asociere cu alte antihipertensive; profilaxia crizelor de angină pectorală.

Dz: 200 mg/zi, în priză unică. Doza zilnică poate fi crescută după câteva săptămâni la 400 mg sau, treptat, până la maximum 600 mg, în funcție de răspunsul terap. În IR dz. trebuie redusă la 100 mg/zi. Tratamentul este de lungă durată. Se recomandă administrarea medicamentului dimineața pe stomacul gol, cu cel puțin 30 min înainte de mese sau la cel puțin 2 ore după mese. Cpr. film. trebuie înghițite întregi, cu apă.

Cind: Hipersensibilitate la celiprolol sau la oricare dintre excipienții produselor; BAV de grad mare (II sau III); șoc cardiogen; bradicardie (sub 45-50 bătăi/min); boală de nod sinusal; bloc sinoatrial; insuficiență cardiacă care nu răspunde la tratamentul specific; angină Prinzmetal; HTA; formele severe de astm bronșic și bronhopneumopatie cronică obstructivă; formele severe de sindrom Raynaud și afecțiuni vasculospastice; feocromocitom netratat; antecedente de reacții anafilactice. Nu se recomandă adm. la copii.

Asocieri Cind: Floctafenină, sultopridă.

Al: Nu se recomandă utilizarea medicamentului în tratamentul HTA secundare provocată de feocromocitom (necesită monitorizarea tensiunii arteriale). Este posibilă administrarea de beta-blocante în feocromocitom după realizarea alfa-blocării. Pacienții cu I.R. necesită ajustarea dozelor în funcție de clearance-ul creatininei. Tratamentul nu trebuie întrerupt brusc la bolnavii cu insuficiență coronariană. Întreruperea bruscă a trat. cu beta-blocante la pacienții cu cardiopatie ischemică poate agrava angina, poate declanșa aritmii severe sau chiar poate provoca infarct miocardic acut sau moarte subită. La întreruperea trat. dz. trebuie redusă treptat pe o perioadă de 1-2 săpt. La nevoie, este necesară adm. concomitentă a unui alt antianginos. La pacienții diabetici tratați cu insulină sau antidiabetice orale și cu celiprolol este necesară prudență datorită riscului crescut de reacții hipoglicemice. Există riscul de apariție a unor reacții alergice severe la pacienții hipersensibili.

Asocieri care necesită prudență: cu amiodaronă, anestezice generale inhalatorii halogenate, blocante ale canalelor de calciu, clonidină, antiaritmice, baclofen, insulină și antidiabetice orale, lidocaină, antiacide gastrice, substanțe de contrast iodate.

RA: Oboseală, cefalee, tulburări de somn, amețeli, reacții alergice cutanate (prurit), agravarea psoriazisului sau apariția de exaneme psoriaziforme, greață, vărsături, diaree sau constipație, dureri abdominale, astenie musculară, tremor, parestezii, extremități reci. Este posibilă apariția brohospasmului la pacienții cu boli bronhopulmonare obstructive grave. Stări depresive, coșmaruri, scăderea libidoului, impotență, pneumonii interstițiale, tulburări de vedere, reducerea secreției lacrimale - gravă pentru purtătorii lentilelor de contact, creșterea nivelului anticorpilor antinucleari și, în mod excepțional, sindrom lupoid.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R06AE07

CALCII CHLORIDUM
 CALCII DOBESILAS
 CALCII FOLINAS
 CALCII GLUBIONAS
 CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
 CEFALEXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM

ALERID 10 mg CIPLA/TERAPIA SA; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
CELERG 10 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
CETIRIZIN 10 mg LAROPHARM; Cpr. film. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
LETIZEN® 10 mg KRKA; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
LETIZEN KRKA; Sol. orală 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 120 ml (P-6L)
ZYRTEC U.C.B. S.A.; Cpr. film. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
ZYRTEC U.C.B. S.A.; Sol. orală 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 sau 20 ml (P-6L)

Ind: Rinite alergice, conjunctivite alergice, iritații, urticarie, dermografism, exeme cu localizare diversă, dermatite de contact, reacții alergice acute datorate unor toxiinfecții alimentare și înțepături de insecte.

Dz: Oral, 10 mg, o dată pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.

Al: La șoferi sau persoane cu activități de precizie. Nu este recomandată la copii sub 12 ani precum și la femei gravide sau care alăptează.

RA: Somnolență, cefalee, amețeală, stare de agitație, uscăciune a gurii și disconfort gastrointestinal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CALCII DOBESILAS
CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H01CC02

CETROTIDE® 0,25 mg; CETROTIDE® 3 mg SERONO EUROPE Ltd.; Liof. pt. sol. inj. 0,25 mg, 3 mg; ct. × 1 fl. + 1 seringă preumplută cu 1, resp. 3 ml solv. + 1 ac pt. inj. (dimens. 20) + 1 ac pt. inj. s.c. (dimens. 27) + 2 tampoane umezite cu alcool (P-RF)

Ind: Prevenirea ovulației premature în perioada stimulării ovariene controlate, în vederea prelevării ovocitelor din cadrul tehnicilor de reproducere asistată.

Dz: Inj. s.c. în peretele abdominal inferior. Conținutul unui fl. a 0,25 mg cetorelix se adm. o dată pe zi, la interval de 24 ore, dimineața sau seara. Trat. cu cetorelix 0,25 mg trebuie început în ziua a 5-a sau a 6-a a stimulării ovariene cu gonadotropine urinare sau recombinante. Conținutul unui fl. de 3 mg cetorelix se adm. în ziua a 7-a a stimulării ovariene cu gonadotropine. Dacă după adm. de cetorelix 3 mg, creșterea foliculară nu permite inducerea ovulației în a 5-a zi după injectare, se va adm. cetorelix 0,25 mg o dată pe zi, începând de la 96 ore de la adm. de cetorelix 3 mg, până la inducerea ovulației.

Cind: Hipersensibilitate la cetorelix, hormoni exogeni peptidici sau manitol; sarcină și alăptare; menopauză; pacienți cu afecțiuni renale sau hepatice moderate sau severe.

AI: Poate produce un sindrom de hiperstimulare ovariană care poate fi tratat simptomatic, repaus, administrare i.v. de electroliți sau soluții coloidale și heparino-terapie.

RA: Eritem, prurit și edem la locul inj.; greață și cefalee, prurit, reacție de hipersensibilitate asociată cu tuse, rash și hTA, după 7 luni de trat. al cancerului ovarian cu cetorelix. Sindromul de hiperstimulare ovariană.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CALCII FOLINAS
CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPiROMUM
CEFPiROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS

Cod ATC: C01BA01**CHINIDINA 200 mg** LAROPHARM SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**CHINIDINĂ SULFAT** ARENA GROUP SA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)

Ind: Prevenirea recurențelor de FA. Tahicardia ventriculară și supraventriculară paroxistică. Descărcări ventriculare ectopice.

Dz: Oral, 0,4-1,0 g dimineața și seara. Intervalul QT va fi verificat înainte și după trat.

Cind: Hipersensibilitate la chinidină și chinină. Bloc AV de grad II sau complet în absența unui pace-maker. Trombocitopenie. Interval QT prelungit. Intoxicație cu digitală. În timpul sarcinii.

Al: După prima doză, pacientul va fi ținut sub observație. Atenție la pacienții cu conducere AV prelungită, decompensare susținută, șoc cardiogen, hTA, bradicardie, perturbări ale echilibrului potasic, trat. asociat cu antiaritmice din clasa I și II, b-blocante și glicozizi digitalici. Precauții în cazul miocarditelor sau a afecțiunilor miocardice severe. IC și hipokaliemia vor fi corectate înainte de începerea trat. Intervalul QT poate fi prelungit. Precauție în prezența modificărilor obstructive ale tractului gastrointestinal. Precauție în cazul asocierii cu: digoxină, digitoxină, cimetidină, derivați cumarinici, rifampicină, derivați barbiturici, fenitoină, verapamil, amiodaronă, nifedipină.

RA: Tractul gastrointestinal: diaree, grețuri și vărsături. SNC: Semne de cinconism (tinitus, tulburări de vedere, cefalee și obnubilare). Cardiovascular: tulburări de ritm (tahicardie ventriculară, frecvent torsada vârfurilor, sau fibrilației ventriculare), hTA. Reacții de hipersensibilitate: urticarie, febră, hepatită, rash, trombocitopenie, pancitopenie și agranulocitoză. Fotosensibilitate și sindrom asemănător lupusului eritematos.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01AA02

CALCII GLUBIONAS
CALCII GLUCONAS
CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPiROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM

LEUKERAN GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 2 mg; ct. × 1 fl. × 25 cpr. (S/P-RF)

Ind: Boală Hodgkin; anumitor forme de limfom non-Hodgkinian; leucemiei limfocitare cronice; macroglobulinemiei Waldenström (tratament de elecție); adenocarcinomului ovarian avansat. Cancer de sân.

Dz: Oral. *Adulți:* 0,1-0,2 mg/kg/zi, timp de 4-8 săpt. Schemele terapeutice diferă în funcție de afecțiunea tratată. *Copii:* poate fi utilizat în trat. bolii Hodgkin și al limfoamelor non-hodgkiniene. Dozele sunt similare cu cele folosite la adulți.

Cind: Având în vedere importanța indicațiilor, nu există Cind absolute.

Al: Este necesară monitorizarea hematologică precum și a pacienților cu afectare funcțională renală. Nu trebuie adm. la pacienții care au făcut recent radioterapie sau au primit alți agenți citotoxici. Se reduc dozele la pacienții cu afectare hepatică gravă. Poate produce afectări ale cromatidelor și cromozomilor. S-au raportat cazuri de apariție a leucemiei acute după trat. cu clorambucil pentru leucemie limfocitară cronică. Trebuie evitat în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru, și în perioada de alăptare.

RA: Supresia măduvei osoase. Tulburări gastrointestinale: greață, vărsături, diaree, ulceratii ale mucoasei bucale. Rar, fibroză pulmonară interstițială severă. Hepatotoxicitate și icter. Febră, reacții de hipersensibilitate, neuropatia periferică, pneumonia interstițială, cistită abacteriană. La copiii cu sindrom nefrotic și uneori la adulți pot apărea crize convulsive.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CALCII GLUCONAS
 CALCII LACTAS
 CALCIPOTRIOLUM
 CALCITONINUM
 CALCITRIOLUM
 CANDESARTANUM CILEXETIL
 CAPECITABINUM
 CAPTOPRILUM
 CARBACHOLUM
 CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
 CEFALOXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDINUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM

Cod ATC: J01BA01, S01AA**CLORAMFENICOL** ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 1 g; ct. × 10 fl. (P-RF/S)**CLORAMFENICOL** ARENA GROUP SA; Cps. 125 mg, 250 mg; ct. × 2 sau 50 blist. × 10 cps. (P-RF)**SIFICETINA** S.I.F.I.; Sol. oft. 0,4%; ct. × 1 fl. × 5 ml solv. + 1 rezervor pulb. (P-RF)**SIFICETINA** S.I.F.I.; Ung. 1%; ct. × 1 tub × 5 g (P-RF)

Ind: Sistemic: în infecții grave cu germeni sensibili (febră tifoidă și paratifoidă; meningite purulente; abcese cerebrale; infecții abdominale cu anaerobi; tifoș exantematic, febra Q și bruceloză; infecții urinare rezistente la alte antibiotice. Conjunctival: în toate infecțiile oculare externe produse de germeni sensibili la cloramfenicol (conjunctivite, keratite, dacriocistite, trahom, traumatisme mecanice sau termice, infecții pre- și postoperatorii).

Dz: Sistemic, adm. int., inj. i.v. sau i.m.: Adulți și copii: 50-100 mg/kg/zi, fracționate la 6 ore. *Prematuri și nou-născuți sub 2 săpt.:* 10 mg/kg/zi, la 6 ore. *Nou-născuți peste 2 săpt.:* 20 mg/kg/zi, la 6 ore. Uzual, doza totală la adult nu trebuie să depășească 25 g și la copii 700 mg/kg, iar durata trat. nu trebuie să depășească 14 zile. Local conjunctival: 1-2 pic. sau se aplică o cantitate mică de unguent, în ochi, de 3-8 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la cloramfenicol; insuficiență medulară în antecedente.

Al: Nu se recomandă în cazurile care se pot trata cu alte antibiotice sau chimioterapice sau atunci când nu s-a stabilit diagnosticul de certitudine. Se va evita utilizarea profilactică. Este necesar controlul periodic al hemogramei. Prudență la bolnavii cu IH sau IR. Precauție la nou-născuți și la bolnavii cu deficit de G-6-PDH. În timpul trat. trebuie evitat consumul de alcool. Atenție în cazul asocierii cu: anticoagulate cumarinice, fenitoină, sulfamide antidiabetice, fenobarbital, diuretice, alte medicamente deprimă hematopoieza. Nu se recomandă adm. în timpul sarcinii și la femeile care alăptează.

RA: Deprimarea hematopoiezei, cu pancitopenie - anemie aplastică, leucopenie sau agranulocitoză și trombocitopenie. Dozele mari pot provoca fenomene toxice acute descrise sub numele de "sindrom cenușiu". Diaree și iritație perianală. Suprainfecțiile sunt relativ comune, rectocolita pseudomembranoasă apare foarte rar. Complicații neuropsihice: nevrită optică, rar polinevrită, confuzie și delir. Pot să apară reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CALCII LACTAS
CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM

Cod ATC: A01AB03

CORSODYL MINT MOUTHWASH GLAXO SMITHKLINE; Sol. bucofaringiană 1%; ct. × 1 fl. × 300 ml (OTC)

PLAK OUT SANTA N BALANOS; Sol. bucală 0,12%; ct. × 1 fl. × 250 ml (OTC)

Ind: Gingivită, tulburări periodontale la bolnavi cu imunitate redusă, îngrijirea zilnică a dinților și a gurii, igienizarea gurii înaintea intervențiilor chirurgicale. Ulcerații aftoase. Candidoza orală.

Dz: Spălături bucale cu 10 ml sol. 0,1-0,2%, de 2-3 ori/zi, timp de 1 minut.

Cind: Alergie la una din componente.

RA: Irritații locale, modificarea culorii limbii, a dinților, a materialelor stomatologice protetice, tulburări de gust, senzație de arsură la nivelul limbii, inflamația parotidelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CALCIPOTRIOLUM
CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFTPIROMUM
CEFTPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM

Cod ATC: R06AB04**CLORFENIRAMIN 4 mg** LABORMED PHARMA SA; Cpr. 4 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: În dermatologie: urticarie acută și cronică, eczeme, dermatită atopică și de contact, prurit, eritem solar, înțepături de insecte. În medicina internă: boala serului, edem Quincke, migrenă, colită ulceroasă, alergii medicamentoase. În oftalmologie: procese alergice oculare. În O.R.L.: rinită alergică, coriză de fân.

Dz: *Adulți:* 2-4 mg de 3-4 ori/zi. *Copii:* 0,35 mg/kg/zi, divizat în 4 prize.

Cind: Hipersensibilitate la clorfenamină, IR și IH avansată, stări depresive. La pacienți cu risc de retenție urinară. La pacienți cu risc de glaucom cu unghi închis.

Al: Prudență la pacienții cu presiune intraoculară crescută, tulburări cardiovasculare, HTA, astm bronșic, la copii și la pacienții în vârstă. A nu se asocia cu: alcool, cu medicamentele depresive ale SNC, cu atropina și alte substanțe atropinice (antidepresive, antiparkinsoniene, anticolinergice, spasmolitice, disopiramidă, neuroleptice fenotiazinice). Nu este recomandată utilizarea de către femeile însărcinate și în perioada de alăptare. Nu se recomandă șoferilor sau celor cu activități de precizie.

RA: Somnolență, oboseală, iritație gastrică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CALCITONINUM
CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM

Cod ATC: N05AA07**NEURIPLEGE® 25 mg** SICOMED SA în colaborare cu LAB. GENEVRIER; Cpr. film. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Reumatologie: lumbago acut, cronic, lombosciatică, reumatism abarticular, artroze cu contracturi musculare. Balneofizioterapie și recuperare medicală: lombalgii, dursalgii. Medicină sportivă: contracturi, elongații, crampe, rupturi fasciculo-musculare. Neurologie: spasticitatea din bolile neurologice, dar nu și boala Parkinson. Ginecologie: dismenoree. Alte maladii însoțite de contractură (torticolis).

Dz: *Adulți:* 25-75 mg/zi, în 2 prize. *Copii:* 25-50 mg/24 ore.

Cind: Miastenie, HTA severă, alergii la clorproetazină.

Al: A nu se asocia cu: antidepresive triciclice, barbiturice, deprimante centrale SNC, alcool. Prudență la gravide.

RA: HTA ortostatică, somnolență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AA01

CALCITRIOLUM
CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM

CLORDELAZIN SICOMED SA; Sol. inj. 25 mg/5 ml; ct. × 5 f. × 5 ml (**P-RF**)**PLEGOMAZIN®** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 5 ml (**P-RF**)

Ind: Stări de agitație din psihoze. Stări de greață și vomă. Preanestezie și potențarea anesteziei generale. Adjuvant în trat. tetanosului. Dureri de diferite etiologii. Porfirie acută intermitentă. Trat. mișcărilor coreice din cadrul bolii Huntington. Trat. sughițului rebel.

Dz: Adm. inj. i.m.: **Adulți:** 25-200 mg, max. 1000 mg/zi, în funcție de indicație. **Copii:** 0,5-1 mg/kg/zi, divizate în 2-3 prize, max. 40 mg la copii între 1-5 ani, respectiv 75 mg la copii peste 5 ani. **Oral:** **Adulți:** inițial 25-50 mg/ zi, mărirându-se treptat doza până ce se ajunge la 75-150 mg/zi, în 3 prize. **Copii:** 1-3 mg/kg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la clorpromazină, la alte fenotiazine și la celelalte componente ale produsului; coma indusă de barbiturice și alcool; stări de deprimare ale SNC; glaucom cu unghi închis; risc de retenție urinară; mielodepresie; feocromocitom. Este Cind asocierea cu IMAO sau cu L-dopa.

Al: În caz de hipertermie de etiologie necunoscută; parkinson; epilepsie; afecțiuni cardiovasculare grave, insuficiență respiratorie, ateroscleroză gravă, accidente cerebrovasculare în antecedente, diabet zaharat, hipotiroidism și miastenia gravis; la vârstnici, la pacienții cu afecțiuni renale sau hepatice grave (prudență și administrarea unor doze mai mici). Se recomandă control medical periodic. Precauție în cazul asocierii cu: anestezice generale, sedative, tranchilizante, analgezice opioide, litiu, antidepressive triciclice, anticolinergice, antihipertensive, antidiabetice, antiacide. A se evita consumul de alcool în timpul trat. Nu se recomandă adm. în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Neurologice: sedare, somnolență, diskinezii precoce, sindrom extrapiramidal, diskinezii tardive. Vegetative: hTA ortostatică, întârzierea ejaculării; efecte de tip atropinic. Endocrine și metabolice: impotență, frigiditate; amenoree, galactoree, ginecomastie, hiperprolactinemie; creștere în greutate. Alte RA: erupții cutanate alergice, fotosensibilizare, pigmentarea tegumentelor, depozite pigmentare la nivelul polului anterior al ochiului, icter colestatic, leucopenie sau agranulocitoză.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CANDESARTANUM CILEXETIL
CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM

Cod ATC: A07AXN1, P01AA04

CLORCHINALDOL SICOMED SA; Cpr. film. 100 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (OTC)

CLORCHINALDOL 100 mg ARENA GROUP SA; Dj. 100 mg; ct. × 1 fl. × 30 dj. (OTC)

SAPROSAN® 100 mg SINTOFARM SA; Dj. 100 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 dj. (OTC)

Ind: Disbacterioze intestinale, enterocolite recidivante sau trenante, dispepsii, tulburări intestinale consecutive folosirii antibioticelor, schimbării alimentației sau climei; diaree estivală, dizenterie amebiană (forme ușoare), candidoză și giardioză, pemfigusul nou-născutului și alte piodermite ale vârstei copilăriei, plăgi de decubit, abcese infectate, micoze ale pielii, infecții microbiene locale ușoare.

Dz: Oral. *Adulți:* Curativ, 100-200 mg de 3 ori pe zi; profilactic, 100 mg de 3 ori pe zi. *Copii:* 10 mg/kg/zi.

Cind: Alergie la produs, IR sau IH severă, IC gravă, sarcină în primul trimestru.

Al: Atenție la supradozare; în cazurile acute trat. se adm. cel mult o săpt., în cele cronice cel mult o lună. În cazul asocierii cu alte preparate halochinice, nu se vor depăși 750 mg/zi la adult și 400 mg/zi la copii.

RA: Greață, vărsături, dureri abdominale, cefalee, amețeli, erupții cutanate alergice; nevrită periferică, nevrită optică, mielopatie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CAPECITABINUM
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM

Cod ATC: M03BB03

CLORZOXAZON 250 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

CLORZOXAZONĂ SINTOFARM SA; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. **(P-6L)**

CLORZOXAZONĂ 250 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 25 cpr. **(P-6L)**

Ind: Spasme reactive ale musculaturii striate de natură traumatică, inflamatorie sau reflexă. Contuzii, tenosinovite, artrite, mialgii, lumbago, torticolis, contracturi datorate ischemiei etc.; contractură cronică de origine piramidală.

Dz: *Adulți:* 250-500 mg de 3-4 ori/zi, în funcție de gravitatea sindromului doza se poate mări la 500-750 mg de 3-4 ori/zi, la nevoie până la 750-1250 mg/zi după mese. *Copii:* sub 2 ani - 62,5-125 mg de 3-4 ori/zi; 2-6 ani - 125-187,5 mg de 3-4 ori/zi; 6-10 ani - 250 mg de 3-4 ori/zi.

Cind: Alergie la clorzoxazonă, IH, IR, litiază biliară.

A!: Precauție în timpul sarcinii.

RA: Greață, vomă, pirozis, sângerări intestinale, somnolență; excitație și anxietate, cefalee, amețeli; rar erupții cutanate alergice, echimoze, edem angioneurotic sau reacții anafilactice, icter colestatic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS

Cod ATC: A01AD11

CHOLINEX GLAXO SMITHKLINE; Cpr. de supt 150 mg; ct. × 2 blist. × 8 cpr. (OTC)

Ind: Inflamația mucoasei bucale (stomatită), faringită. În stomatologie, pentru tratamentul gingivitelor și periodontitei.

Dz: *Adulți:* 1 cpr. de supt de 4-6 ori/zi. *Copii 6-12 ani:* cel mult 4 cpr. de supt/zi.

Cind: Hipersensibilitate. Varice esofagiene, din cauza riscului apariției sângerării. Fenilcetonurie, din cauza conținutului în aspartam.

Al: Pacienții cu afecțiuni inflamatorii ale tractului gastro-intestinal, ulcer gastric și duodenal, astm bronșic, trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a utiliza medicamentul. La copii cu vârsta mai mică de 12 ani salicilații trebuie administrați la recomandarea medicului datorită riscului de apariție a sindromului Reye.

RA: Rar, tulburări gastro-intestinale: dureri abdominale, vărsături, hemoragii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM

Cod ATC: G01AX12, D01AE14

DAFNEGIN POLI IND.; Cremă vaginală 1%; ct. × 1 tub × 78 g (*P-RF*)
DAFNEGIN POLI IND.; Sup. vag. 100 mg; ct. × 1 blist. × 6 sup. vag. + 6 aplicatoare (*P-RF*)
DAFNEGIN POLI IND.; Sol. uz ext. 0,2%; ct. × 5 fl. × 150 ml + 5 canule (*P-RF*)
DERMOPIROX TERAPIA SA; Sol. cut. 1%; ct. × 1 fl. × 20 ml (*P-RF*)

Ind: *Adm. cutanată:* infecții cutanate provocate de dermatofiți, infecții cutanate mixte fungi + bacterii sau fungi + mycoplasme/chlamydii, erytrasmă, Pitiriasis versicolor, Tinea versicolor, Tinea pedis, eczeme interdigitale macerative, eczemă seboreică, candidoze etc. *Adm. vaginală:* infecții vulvovaginale și perianale cu germeni sensibili (mai ales Candida).

Dz: *Adm. cutanată:* aplicații locale de 2 ori/zi până la dispariția simptomatologiei (în medie 2 săptăm.). *Adm. vaginală:* 1 ovul/zi, timp de 3-6 zile, consecutiv sau 5 g cremă vaginală/zi, 6-14 zile sau spălături vaginale cu soluția 0,2%, o dată/zi, dimineața.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului.

Al: Nu se recomandă utilizarea la copii. Se va evita contactul cu ochii. Prudență în per. de sarcină și alăptare.

RA: Prurit și iritație la locul adm.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CARBAMAZEPINUM
 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
 CARBENICILLINUM
 CARBIMAZOLUM
 CARBO MEDICINALIS
 CARBOCISTEINUM
 CARBOPLATINUM
 CARNITINUM
 CARTEOLOLUM
 CARVEDILOLUM
 CASPOFUNGINUM
 CEFACLOLUM
 CEFADROXILUM
 CEFALEXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM

Cod ATC: L04AA01

CICLORAL® HEXAL 25; CICLORAL® HEXAL 50; CICLORAL® HEXAL 100 HEXAL AG; Cps. moi 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 10 blist. × 5 cps. (S/P-RF)

EQUORAL® IVAX PHARMACEUTICALS; Cps. moi 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 1, 3 sau 5 blist. × 10 cps. (S/P-RF)

EQUORAL® IVAX PHARMACEUTICALS; Sol. orală 100 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml (S/P-RF)

SANDIMMUN NEORAL® NOVARTIS PHARMA; Sol. orală 100 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml + kit de administrare (S/P-RF)

SANDIMMUN NEORAL® NOVARTIS PHARMA; Cps. moi 25 mg, 50 mg; ct. × 10 blist. × 5 cps. (S/P-RF)

Ind: Transplant (prevenirea respingerii grefei în transplanturi alogenice, prevenirea respingerii grefei după transplant de măduvă osoasă; prevenirea sau trat. reacției grefă-contra-gazdă). Boli autoimune (uveita endogenă; sindromul nefrotic; artrita reumatoidă; psoriazisul).

Dz: Transplant: este necesară monitorizarea nivelului plasmatic al ciclosporinei. Inițial: doză unică orală de 10-15 mg/kg cu 4-12 ore înaintea int. chir.; aceasta va fi menținută 1-2 săptăm. postoperator, apoi va fi redusă treptat, până la o doză de întreținere de 2-6 mg/kg/zi. Transplant de măduvă: 12,5-15 mg/kg/zi. Trat. de întreținere se continuă cel puțin 3 luni (de preferat 6 luni). Boli autoimune: în funcție de indicație, pentru inducerea remisiunii, inițial 2,5-5 mg/kg/zi, în doză unică sau divizată, până se obține remisiunea. Doza poate fi crescută până la 5-7 mg/kg în cazuri refractare, pentru o scurtă perioadă de timp. La pacienții cu funcția renală afectată, doza inițială nu trebuie să depășească 2,5 mg/kg/zi. Pentru trat. de întreținere, doza trebuie redusă până la nivelul minim eficient, max. 5 mg/kg/zi. Ciclosporina poate fi adm. în asociere cu corticosteroizi sau AINS în doze mici.

Cind: Hipersensibilitate la ciclosporină. Perioada de alăptare.

Al: Trebuie monitorizat: nivelul creatininemiei, TA, parametrilor adecvați pentru evaluarea funcțiilor renală și hepatică, potasemiei. Se recomandă determinarea lipidelor înaintea trat. și după prima lună de tratament. Se recomandă întreruperea trat. dacă HTA apărută în timpul terapiei nu poate fi controlată printr-un trat. corespunzător. Unii pacienți pot prezenta modificări histopatologice renale. A se evita ingerarea de cantități mari de potasiu. Leziunilor pielii atipice pentru psoriazis trebuie să li se facă biopsie înaintea începerii trat. Se recomandă biopsie renală la pacienții cu nefropatie cu leziuni minime dependentă de steroizi, la care ciclosporina se adm. mai mult de 1 an. Ciclosporina nu trebuie adm. împreună cu alți agenți imunosupresori, cu excepția corticosteroizilor. Precauție la pacienții cu hiperuricemie. Folosirea vaccinurilor cu virus viu atenuat trebuie evitată. Atenție în cazul asocierii cu: aminoglicozide, amfotericină B, ciprofloxacina, melfalan, trimetoprim, AINS, lovastatină, colchicină, ketoconazol, eritromicină și josamicină, doxiciclină, anticoncepționale orale, propafenonă, barbiturice, carbamazepină, fenitoină, metamizol, rifampicină, nafcilină, sulfadimidina și trimetoprimul adm. i.v., prednisolon, metilprednisolon.

RA: Hipertricoza, tremorul, afectarea funcției renale, HTA, disfuncția hepatică, oboseala, hipertrofia gingivală, tulburările gastrointestinale (anorexie, greață, vărsături, diaree), senzație de arsură la mâini și picioare. Rar:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C09AA08

CARBAZOCHROMI SALICYLAS
CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM

INHIBACE HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 5 mg; ct. × 30 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. HTA esențiale și renale.

Dz: Int., o dată pe zi, înainte sau în cursul unei mese. HTA esențială: 2,5-5 mg. HTA renovasculară: inițial 0,5 mg sau mai puțin. La pacienții cu IR, dozele se stabilesc în funcție de clearance-ul creatininei. La cei tratați și cu diuretice se adm. doze mai mici.

Cind: Hipersensibilitate la cilazapril sau la alți IEC. Pacienții cu ascită. Sarcină și alăptare.

Al: hTA simptomatică. Ciroza hepatică. IR. Nivelul potasemiei trebuie monitorizat frecvent, în raport cu funcția renală. La copii. Atenție în cazul asocierii cu: alte medicamente hipotensoare, diuretice care economisesc potasiu, AINS, anestezice.

RA: Cefalee, amețală, oboseală, hTA, dispepsie, greață, rash, tuse, edem angioneurotic, alterări ale parametrilor de laborator (creșteri ale creatininei serice și ureei, modificări ale Hb, Ht, elementelor figurate sanguine, potasemiei).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A02BA01

CARBENICILLINUM
CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM

CIMETIDINĂ ARENA GROUP SA; Cps. 200 mg; ct. × 1 fl. × 30 cps. (P-6L)

Ind: Trat. profilactic sau curativ în: ulcer duodenal, ulcer gastric, ulcere postoperatorii, esofagita peptică de reflux. Profilaxia sindromului de aspirare acidă (Mendelson-Syndrom) în cazul intervențiilor chirurgicale. Sindrom Zollinger-Ellison. Trat. adjuvant în cazuri de hemoragii și eroziuni sau ulcere gastrice și/sau intestinale. În sindromul de ansă intestinală scurtă. În insuficiența pancreatică.

Dz: Adm. int. *Adulți:* Curativ: 800-1000 mg/zi, fracționat. Trat. se continuă cel puțin 4 săptăm. Profilactic: 400-800 mg/zi, int., înainte de culcare. Durata trat. nu trebuie să depășească în general 12 săptăm. Profilaxia sindromului de aspirare acidă în cazul intervențiilor electiv: 400 mg, în seara precedentă intervenției. Sindromul Zollinger-Ellison: 1-2 g/zi (3 ori 200-400 mg la mese și 400-800 mg înainte de culcare). *Copii și tineri la pubertate:* 15-30 mg/ kg/zi, max. 1600 mg/zi, în 4 doze. La pacienții cu funcție renală redusă se recomandă adaptarea dozei în funcție de clearance-ul de creatinină.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de compus. Copii și tineri în perioada de creștere.

Al: În afecțiuni gastroduodenale ușoare. Înaintea trat. de ulcer gastric se va verifica eventuala existență a unei leziuni maligne. La pacienți cu IR se va reduce doza. Precauție în cazul asocierii cu: medicamente care provoacă neutropenie, anticoagulante orale, b-blocante, benzodiazepine, antiepileptice, antidepresive triciclice, derivații xantinici, antiaritmice, antagoniști de calciu, ketoconazol, antiacide. În sarcină și alăptare. La șoferi și persoane cu activități de precizie. Potențează efectul alcoolului.

RA: Diaree, dureri articulare și musculare, edeme, amețeli, mâncărimi. Rar: erupții cutanate, căderea părului, creșterea creatininei și transaminazelor, ginecomastie reversibilă, dereglări în comportamentul sexual, confuzie și neliniște, cefalee, dereglări de somn, imagini duble, halucinații și spasme musculare, depresii și polineuropatii, leucopenie, trombocitopenie, pancitopenie, anemie aplastică; senzație de vomă, greață și dureri gastrice, febră, colestaza interhepatică, inflamații ale ficatului, pancreasului și ale rinichilor, bradicardie, tahicardie și tulburări de conducere.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N07CA02

CARBIMAZOLUM
CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM

CEREBRAL ALEXANDRIA CO; Cpr. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

CINARIZINĂ 25 mg ARENA GROUP SA; Cps. 25 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. (P-6L)

CINARIZINA ALKALOID AD; Cpr. 75 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-6L)

CINARIZIN 25 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 25 mg; ct. × 3 blist. × 20 cpr. (P-6L)

STUGERON 25 mg TERAPIA SA; Cpr. 25 mg; ct. × 4 blist. × 10 cpr. (P-6L)

STUGERON FORTE JANSSEN PHARMACEUTICA; Cps. 75 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 20 cps. (P-6L)

Ind: Trat. simptomelor de dereglare labirintică (vertigo, amețeală, tinitus, nistagmus, greață, vărsături); de origine cerebrovasculară (amețeală, acufene, cefalee vasculară, nesociabilitate, iritabilitate, pierderea memoriei, lipsa de concentrare); de tulburare a circulației periferice (fenomenul Raynaud, acrocianoza, claudicația intermitentă, tulburările trofice, ulcerele trofice și varicoase, parestezia, crampe nocturne, extremități reci). Profilaxia răului de transport. Profilaxia migrenei.

Dz: *Adulți:* preferabil după mese, 25 mg de 3 ori/zi (75 mg/zi). *Copii:* jumătate din doza pentru adulți.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la medicament.

Al: La pacienții cu boala Parkinson. Precauție în cazul asocierii cu: alcool, depresive SNC, antidepresive triciclice. În sarcină și alăptare. La șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Somnolență, tulburări gastrointestinale, cefalee, uscăciunea gurii, creștere ponderală, transpirație, reacții alergice, lichen plan, simptome lupoide; la pacienții vârstnici au fost descrise cazuri de agravare sau apariție a simptomelor extrapiramidale, uneori asociate cu senzații depresive.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CARBO MEDICINALIS
CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM

Cod ATC: N05CDN1

GERODORM® GEROT PHARMAZEUTIKA; Cpr. 40 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Tulburări de somn.

Dz: Int., cu aproximativ 30 minute înainte de ora dorită pentru declanșarea somnului. *Adulți:* 40 mg; *vârstnici:* doza inițială este de 20 mg.

Cind: Hipersensibilitate la benzodiazepine; intoxicație acută cu alcool, hipnotice, analgezice, neuroleptice, antidepressive sau litiu; abuz sau dependență față de alcool și medicamente. În timpul sarcinii și alăptării. Nu a fost stabilită siguranța adm. la copii.

Al: Se poate instala dependența fizică și psihică. Precauții în caz de miastenia gravis, disfuncții hepatice și renale, insuficiență cardiovasculară, la pacienții cu afecțiuni cerebrale, în vârstă sau cu debilitate fizică avansată. Întreruperea trat. trebuie făcută prin reducerea progresivă a dozei. Sensibilitatea la cinolazepam poate fi accentuată. Precauție în cazul asocierii cu: sedative, antidepressive, anestezice, analgezice centrale, antihipertensive, miorelaxante, alcool, opioide, hipnotice. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Pierderea capacității de concentrare, somnolență, modificări în activitatea motorie, agitație, stări depresive, confuzie, uscăciunea gurii, greață, vărsături, diaree, lipotimie, amețeli, hipotensiune, tahicardie, dureri de cap, prurit, senzație de foame, agitația picioarelor, somnolență la trezire, amnezie anterogradă, efect de „rebound” la întreruperea bruscă a adm. medicamentului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CARBOCISTEINUM
CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM

Cod ATC: C10AB08**LIPANOR® 100 mg** SANOFI~SYNTHELABO; Cps. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)**Ind:** Reducerea nivelului crescut de colesterol și trigliceride în sânge, asociat cu restricții în dietă.**Dz:** Oral. *Adulți:* max. 100 mg/zi. În caz de afectare moderată a funcției renale, 100 mg la 2 zile.**Cind:** Afectare renală sau hepatică gravă. Copii. Perioada de sarcină și alăptare.**Al:** Prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice, renale sau cu hipotiroidie. Este recomandată supravegherea funcției hepatice sau nivelurile plasmatiche ale trigliceridelor și colesterolului. Prudență în cazul asocierii cu: anticoagulante orale, anticoncepționale, hipoglicemiente orale sau cu alte hipolipemiente.**RA:** Cefalee, amețală, rash cutanat, urticarie sau prurit și simptome gastrointestinale (greață, vărsături, diaree și dureri de stomac). Efecte adverse musculare. Pneumopatii, impotență, căderea părului, somnolență, oboseală. Alterări ale testelor hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CARBOPLATINUM
CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM

Cod ATC: J01MA02, S01AX13, S03AA07

ALCON CILOXAN ALCON; Sol. oft./auriculară 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)
ALCON CILOXAN ALCON; Ung. oft. 0,3%; ct. × 1 fl. × 3,5 g (P-RF)
ARISTIN-C ANFARM HELLAS; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIFRAN RANBAXY LAB.; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPLOX CIPLA; Sol. oft./auric. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)
CIPLOX CIPLA; Ung. oft. 0,3%; ct. × 1 tub × 5 g (P-RF)
CIPRINOL 250 mg; CIPRINOL 500 mg; CIPRINOL 750 mg KRKA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg, 750 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPRINOL KRKA; Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (S); Conc. pt. sol. perf. 100 mg/10 ml; ct. × 5 sau 50 f. × 10 ml (S/P-RF)
CIPROBAY® BAYER AG; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPROBAY® 100; CIPROBAY® 200; CIPROBAY® 400 BAYER AG; Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 50, 100 sau 200 ml (S)
CIPROCIN E.I.P.I.C.O.; Cpr. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPRODAR® DAR AL DAWA; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPROFLOXACIN 250 mg LAROPHARM; Cpr. film. 250 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPROFLOXACINĂ 100 mg/10 ml SICOMED SA; Conc. pt. sol. perf. 100 mg/10 ml; ct. × 5 sau 10 f. × 10 ml (S)
CIPROFLOXACINĂ 250 mg; CIPROFLOXACINĂ 500 mg SICOMED SA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 1 fl. × 10 cpr. (P-RF)
CIPROFLOXACINĂ LPH® 250 mg; CIPROFLOXACINĂ LPH® 500 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
CIPROLEN 250; CIPROLEN 500 AC HELCOR SRL; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPRO QUIN® ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPROXIN 5%; CIPROXIN 10%, BAYER AG; Microcaps. + diluant, 50 mg/ml, 100 mg/ml; ct. × 1 fl. microcaps. + 1 fl. diluant (P-RF)
CIPROZONE 250 mg; CIPROZONE FORTE 500 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPRUM® PLIVA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg, 750 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CIPRUM 10 mg/ml PLIVA; Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml (S)
CUMINOL 250 mg; CUMINOL 500 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1, 2 sau 200 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 1 sau 200 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
EUCIPRIN EUROPARM SA; Cps. 250 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. (P-RF)
GRENIS-CIPRO GENEPHARM SA; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
LOXACIL TERAPIA SA; Cpr. 250 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01XA01

CARNITINUM
CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM

CISPLATIN "EBEWE" EBEWE PHARMA; Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20, 50 sau 100 ml (S)

CISPLATIN INJECTABIL 10 mg/10 ml; CISPLATIN INJECTABIL 50 mg/50 ml PHARMACIA & UPJOHN; Conc. pt. sol. perf. 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 sau 50 ml (S)

CISPLATIN TEVA PHARMACHEMIE; Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 sau 100 ml (S)

PLATIDIAM PLIVA-LACHEMA; Conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml; fl. × 20, 50 sau 100 ml (S)

SINPLATIN 10; SINPLATIN 50 SINDAN SRL; Pulb. liof. 10 mg sau 50 mg; ct. × 1 fl. (S)

Ind: Terapie paliativă în: tumori testiculare metastatice, tumori ovariene metastatice, cancer avansat al vezicii, cancer al capului și gâtului.

Dz: Adm. doar i.v., în perf. lentă, în sol. conținând cel puțin 0,3% NaCl. Tumori testiculare metastatice: (cisplatină + sulfat de bleomicină + vinblastină) cisplatină: 20 mg/m² timp de 5 zile consecutive (ziua 1-5) repetate la fiecare 3 săpt., timp de 3 cicluri. Tumori ovariene metastatice: (cisplatină + adriamicină) cisplatină: 50 mg/m² la fiecare 3 săpt. (ziua 1); ca agent terapeutic unic, cisplatina trebuie adm. în doză de 100 mg/m², repetată la fiecare 4 săpt. Cancer avansat al vezicii urinare: agent chimioterapic unic: 50-70 mg/m² la fiecare 3-4 săpt.

Cind: Antecedente de reacții alergice la cisplatină sau alte produse conținând platină.

Al: A nu se folosi dispozitive din aluminiu pt. prepararea sau injectarea sol. Induce nefrotoxicitate, mielodepresie și ototoxicitate. Trebuie efectuate teste audiometrice înaintea și în timpul trat. Examenele hematologice trebuie efectuate săpt. Funcția hepatică trebuie monitorizată periodic. Trebuie efectuate examene neurologice periodice. Trebuie măsurate înaintea începerii trat. și înaintea fiecărei cure de cisplatină: creatinina serică, ureea, clearance-ul creatininei, nivelele de potasiu, magneziu și calciu. Trebuie așteptată normalizarea funcției renale înainte de readm. Adm. concomitentă de antibiotice aminoglicozide poate potența nefrotoxicitatea cisplatinei. Compuși cu mecanism similar de acțiune și activitate mutagenă similară sunt considerați carcinogeni.

RA: Nefrotoxicitate: IR, microhematurie, alterări tubulare renale. Ototoxicitate: tinnitus și/sau pierderea auzului la frecvențele înalte. Hematologice: leucopenie, trombocitopenie, anemie. Gastrointestinale: grețuri, vărsături, anorexie. Electroliții serici: hipomagneziemie, hipocalcemie, hipofosfatemie, hiperuricemia survine cu aceeași frecvență ca și creșterea ureei sanguine și creatininei serice. Neurotoxicitate: neuropatii periferice, pierderea gustului și a percepției spațiale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06AB04

CARTEOLOLUM
CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPRIOMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM

CIPRAMIL H. LUNDBECK; Cpr. film. 20 mg; ct. × 1, 2, 4 sau 7 blist. × 14 cpr. (P-RF)

CITALOMERCK 10; CITALOMERCK 20 GENERICS Ltd.; Cpr. film. 10 mg, 20 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 14 cpr. (P-RF)

CITALOPRAM 10 mg; CITALOPRAM 20 mg; CITALOPRAM 30 mg; CITALOPRAM 40 mg; CITALOPRAM 60 mg HEXAL AG; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr., ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

CITALOSTAD 10; CITALOSTAD 20; CITALOSTAD 40 STADA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cpr., ct. × 2 sau 4 blist. × 14 cpr. (P-RF)

Ind: Afecțiuni depresive, atacuri de panică asociate sau nu cu agorafobie.

Dz: Depresie: 20 mg, o dată pe zi, dimineața sau seara, cu sau fără alimente. Atacuri de panică: 10 mg pe zi, în prima săptămână, apoi 20 mg pe zi. Doze maxime: 60 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la citalopram, asociere cu IMAO, alăptare.

Al: Diabetici: poate fi necesară ajustarea dozelor de insulină sau de antidiabetice orale. Manie.

RA: Sunt mai frecvente la începutul tratamentului. Pot să apară: greață, uscăciunea gurii, somnolență, hipersudorație, tremor. Se poate produce sindrom de abstință la oprirea bruscă a tratamentului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01BB04

CARVEDILOLUM
CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM

LITAK® HAUPT PHARMA; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 5 ml (S)

Ind: Leucemia cu celule păroase; afecțiuni limfoproliferative cu grad redus de malignitate, recurente sau refractare, cum sunt limfomul non-hodgkinian difuz sau folicular, leucemia limfatică cronică și macroglobulinemia Waldenström (ca trat. de linia a doua).

Dz: Leucemia cu celule păroase: un singur ciclu de trat. cu 0,14 mg/kg/zi, adm. s.c., 5 zile consecutiv sau un singur ciclu de trat. cu 0,10 mg/kg/zi, adm. în p.i.v., 7 zile consecutiv. Limfomul non-hodgkinian, leucemia limfatică cronică și macroglobulinemia Waldenström: cicluri de trat. cu 0,10 mg/kg/zi, adm. s.c. sau i.v., 5 zile consecutiv; în medie, se vor adm. 3 cicluri.

Cind: Hipersensibilitate la cladribină; sarcină și alăptare; pacienți HIV-pozitivi. A nu se asocia cu fenitoină și cu vaccinul contra febrei galbene.

Al: Sunt de așteptat reacții adverse toxice cum sunt mielo- și imunosupresia, limfocitopenia pe termen lung și infecțiile oportuniste. Prudență și evaluarea atentă a raportului risc/beneficiu în cazul adm. pacienților cu infecții acute, risc crescut de infecție, mielosupresie manifestă sau infiltrare medulară, trat. mielosupresive prealabile, precum și pacienților cu IR și IH. În primele 2-4 luni după tratament, este esențială monitorizarea atentă a hemogramei. Evaluări periodice ale funcțiilor renale și hepatice. În cazul complicațiilor infecțioase, este necesară instituirea trat. antibiotic adecvat. La pacienții cu masă tumorală mare se adm. profilactic alopurinol, monitorizând atent funcția renală. Precauție în cazul asocierii cu: vaccinuri vii; ciclosporină, tacrolimus și alte medicamente cu risc de mielosupresie. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Cele mai frecvente RA sunt mielosupresia, mai ales anemia, trombocitopenia și neutropenia, precum și imunosupresia, infecțiile și febra. Au mai fost raportate următoarele RA: febră, oboseală, frisoane, astenie, diaforeză, letargie, scăderea apetitului, constipație, dureri abdominale, purpură, peteșii, epistaxis, hemoragii, cefalee, parestezii, slăbiciune musculară, depresie, edem, tahicardie, ischemie miocardică, respirație și zgomote anormale, tuse, dispnee, eritem localizat, tumefacție, durere, flebită, prurit, mialgii, artralгии, dureri osoase.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CASPOFUNGINUM
CEFACLORUM
CEFADROXILUM
CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM

Cod ATC: J01FA09

CLAR 250 mg; CLAR 500 mg LYKA LABS Ltd.; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 5 blist. × 4 cpr. (P-RF)
CLARITROMICINĂ 250 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. film. 250 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
FROMILID® 250; FROMILID® 500 KRKA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 7 cpr. (P-RF)
FROMILID® 125 mg/5 ml KRKA; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 60 ml susp. (P-RF)
FROMILID® UNO KRKA; Cpr. film. elib. prel. 500 mg; ct. × 1 blist. × 5 cpr., ct. × 1 sau 2 blist. × 7 cpr. (P-RF)
KLABAX RANBAXY LAB.; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (P-RF)
KLABAX MR RANBAXY LAB.; Cpr. film. elib. modif. 500 mg; ct. × 1 blist. × 7 cpr. (P-RF)
KLABAX RANBAXY LAB.; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. gran. pt. 60 sau 100 ml susp. (P-RF)
KLACID® ABBOTT; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 sau 14 cpr. (250 mg); ct. × 1 blist. × 14 cpr. (500 mg) (P-RF)
KLACID® SR ABBOTT; Cpr. film. elib. prel. 500 mg; ct. × 1 blist. × 5, 7 sau 14 cpr. (P-RF)
KLACID® I.V. ABBOTT; Pulb. liof. pt. sol. perf. 500 mg; ct. × 1 fl. (S/P-RF)
KLACID® ABBOTT; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml; ct. × 1 fl. gran. pt. 60 sau 100 ml susp. (P-RF)
KLERIMED® 250; KLERIMED® 500 MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 7 cpr. (P-RF)
LEKOKLAR® 250 mg; LEKOKLAR® 500 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 5 sau 7 cpr. (250 mg), respectiv ct. × 2 blist. × 7 cpr. (500 mg) (P-RF)
LEKOKLAR® XL 500 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 folie × 5 sau 7 cpr. (P-RF)
LEKOKLAR® LEK PHARMACEUTICALS; Gran. pt. susp. orală 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml; ct. × 1 fl. gran. pt. 60 sau 100 ml susp. (P-RF)

Ind: Infecții medii și severe ale tractului respirator și infecții cutanate cu germeni sensibili.

Dz: *Adulți:* Int.: Susp. uz int.: 15 mg/kg/zi, fracționată la 12 ore. Cpr. film.: 250-500 mg la 12 ore, 6-14 zile. Inj. i.v.: 8-16 mg/kg/zi, timp de 2-5 zile. Imediat ce starea pacientului o permite, se trece la terapia orală. Dozele pediatrice se stabilesc funcție de greutatea corporală. În situația unei afectări renale grave, este necesară micșorarea dozelor sau prelungirea intervalelor de adm.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la claritromicină sau alte macrolide. A nu se asocia cu: cisaprid, pimoizid sau terfenadină. În caz de hipokaliemie. IH severă. Femei gravide sau în perioada de alăptare.

Al: La pacienții cu funcție hepatică alterată adm. se face sub supravegherea testelor hepatice. La pacienții cu tulburări medii ale funcției renale este necesară prudență. Poate determina apariția de germeni rezistenți sau micoze. În cazul unor diarei severe și trenante trebuie suspectată o colită pseudomembranoasă. Precauție în cazul asocierii cu: warfarină, lovastatin, disopiramidă, fenitoină, ciclosporină, carbamazepină, teofilină, digoxină, midazolam, astemizol, dihidroergotamină, alte macrolide, omeprazol, zidovudină, ritonavir.

RA: Tract gastrointestinal: greață, vărsături, dispepsie, dureri gastrice sau intestinale, diaree, glosită, stomatită, colorări ale mucoasei bucale, limbii și dinților. Reacții de hipersensibilitate: urticarie, exantheme ușoare, sindrom

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R06AA04

CEFACLORUM
 CEFADROXILUM
 CEFALEXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM

CLEMASTIN 1 mg TERAPIA SA; Cpr. 1 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

TAVEGYL® NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Cpr. 1 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Febra fânului și alte rinopatii alergice. Urticarie de diferite cauze. Prurit, dermatoze pruriginoase. Adjuvant în eczeme acute și cronice, dermatite de contact și erupții provocate de medicamente. Înțepături și mușcături de insecte.

Dz: Int., înainte de mese. *Adulți și copii peste 12 ani:* 1 mg dimineața și seara, max. 6 mg. *Copii sub 12 ani:* 1/2-1 mg dimineața și seara.

Cind: Hipersensibilitate la clemastină. Copii sub 1 an.

Al: Precauție la pacienții cu glaucom cu unghi îngust, ulcer peptic stenozant, obstrucție piloroduodenală, hipertrofie prostatică cu retenție urinară și disectazia colului vezicii urinare. Potențează efectele sedativelor, hipnoticelor, IMAO și alcoolului. În timpul sarcinii și al alăptării. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Oboseală, sedare; ocazional, stimularea SNC; uscăciunea gurii, cefalee, erupții cutanate, greață, dureri epigastrice și constipație.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFADROXILUM
 CEFALEXINUM
 CEFALOTINUM
 CEFAZOLINUM
 CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDINUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM

Cod ATC: G01AA10, J01FF01

CLINDAMYCIN HEMOFARM; Sol. inj. i.m., i.v. 300 mg/2 ml; ct. × 10 f. × 2 ml (S/P-RF)

DALACIN® C 150 mg, DALACIN® C 300 mg PHARMACIA & UPJOHN; Cps. 150 mg, 300 mg; ct. × 2 blist. × 8 cpr. (P-RF)

DALACIN C PHARMACIA & UPJOHN; Sol. inj. 150 mg/ml; ct. × 1 sau 10 f. × 4 ml (S/P-RF)

DALACIN V® PHARMACIA & UPJOHN; Cremă vaginală 2%; ct. × 1 tub × 20 sau 40 g (P-RF)

Ind: Adm. sist.: infecțiile grave cu anaerobi, infecții pulmonare, abdominale și pelvine, septicemii, deosebit de eficace în septicemii cu Bacteroides fragilis. În actinomicoză. În infecții streptococice și pneumococice. În stafilococii severe, ca și în infecțiile cu stafilococi rezistenți la benzilpenicilină și meticilină. Pentru profilaxia chirurgicală. Pneumonia cu Pneumocystis carinii. Infecții cu protozoare (malaria falciparum, babesiază, toxoplasmoză - asociată cu alte antiprotozoare).

Adm. tegumentară: Trat. acneei.

Adm. vaginală: Trat. vaginitelor bacteriene, produse de Haemophilus, Gardnerella, Corynebacterium, anaerobi, precum și în vaginitele nespecifice.

Dz: Adm. sist.: oral; adulți: 150-450 mg la 6 ore; copii: 3-6 mg/kg la 6 ore; inj.: adulți: 600 mg - 4,8 g/zi fracționat; copii: 15-40 mg/kg/zi (fracționat). Adm. tegumentar: se folosește în soluție 1%. Adm. vaginal: 5 g cremă vaginală, seara la culcare, timp de 3-7 zile consecutiv la pacientele negravidă și de 7 zile consecutiv la pacientele gravide.

Cind: Hipersensibilitate la clindamicină, lincomicină sau la oricare dintre componentii produsului; antecedente de enterită regională, colită ulceroasă. În perioada de alăptare.

Al: S-au semnalat colite pseudomembranoase. Poate determina dezvoltarea microorganismelor rezistente, îndeosebi a fungilor. În timpul trat. cu cremă vaginală, pacientele trebuie instruite să evite relațiile sexuale și să nu folosească tampoane sau să facă irigații vaginale. Crema vaginală conține ulei mineral care poate afecta produsele din latex sau cauciuc, cum sunt prezervativele sau diafragmele vaginale. Precauție în cazul asocierii cu blocante neuromusculare. Precauție în primul trimestru de sarcină.

RA: După adm. sistemică: dureri abdominale, esofagită, greață, vărsături, diaree, colită pseudomembranoasă, rash maculopapular, urticarie, eritem multiform, uneori asemănător cu sindromul Stevens-Johnson, reacții anafilactice, glosită, stomatită, neutropenie tranzitorie (leucopenie), eozinofilie, agranulocitoză, trombocitopenie, afectare hepatică (uneori cu icter), poliartrită, disfuncții renale (creșterea azotemiei, oligurie, proteinurie). După adm. vaginală: Candidoză vaginală, vulvovaginită, vaginită cu Thricomonas, tulburări vulvovaginale, dureri vaginale, metroragie, infecții urinare, endometrioza, durere abdominală, halenă, cefalee, infecții bacteriene, fungice, candidoză sistemică, greață, vărsături, constipație, dispepsie, flatulență, diaree, tulburări gastrointestinale, hipertiroidie, amețeală și vertij, epistaxis, prurit, rash maculopapular, eritem, urticarie, tulburări ale gustului, disurie, metroragie, infecții ale tractului respirator superior, travaliu anormal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D07AD01

CEFALEXINUM
CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM

CLOBETASOL MK MARK PHARMACEUTICS SRL; Ung. 0,05%; ct. × 1 tub × 20 g (*P-RF*)
DERMOVATE GLAXO SMITHKLINE; Cremă 0,05%; Ung. 0,05%; ct. × 1 tub × 25 g (*P-RF*)
DERMOVATE GLAXO SMITHKLINE; Loțiune 0,05%; ct. × 1 fl. × 25 ml (*P-RF*)

Ind: Dermatoze rebele la corticoterapie. Cazuri severe de psoriazis și dermatite eczematoase.

Dz: 2-3 aplicații pe zi în funcție de severitatea leziunii, cure de câteva zile, până la o săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la clobetazol, alți corticosteroizi sau orice alt component. Leziuni infectate ale pielii. Infecții virale și fungice ale pielii, inclusiv herpes simplex și varicelă. Sarcină și alăptare. Leziuni tbc ale pielii. Nu se va folosi cu pansament ocluziv.

A!: A se evita contactul cu mucoasa conjunctivală. Se va utiliza doar pe perioade scurte de câteva zile până la maximum o săptăm. Se recomandă evitarea utilizării la copii. Se va aplica cu precauție pe leziunile feței, ale abdomenului sau ale axilelor.

RA: Reacții locale: arsură, prurit, atrofie, striatii, modificări ale pigmentației, infecții secundare și hipertricoză. Reacții sistemice: supresia reversibilă a axului adreno-hipotalamo-hipofizar, manifestări ale sindromului Cushing, hiperglicemie și glicozurie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R05DB03

CEFALOTINUM
CEFAZOLINUM
CEFEPIUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM

TUSSAMED sirop HEXAL AG; Sirop 0,4%; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)

Ind: Trat. simptomatic pentru tusea neproductivă.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 40-80 mg de 3 ori/zi; *copii între 7 și 12 ani:* 30-40 mg de până la 3 ori/zi; *copii între 4 și 6 ani:* 20-30 mg de până la 3 ori/zi; *copii între 2 și 3 ani:* 20 mg de până la 3 ori/zi; *copii sub 2 ani:* 10-20 mg de până la 3 ori/zi. Durata trat.: max. 5-7 zile. Se adm. int. nediluat. La pacienții cu IR este necesară ajustarea dozei în funcție de gradul afectării renale.

Cind: Hipersensibilitate la produs; tuse la pacienții astmatici; insuficiență respiratorie; intoleranță ereditară la fructoză. La pacienții cu risc de tulburări neuropsihice. Primul trimestru de sarcină.

Al: Nu se adm. la pacienții cu tuse productivă. Precauție la diabetici. Precauție în cazul asocierii cu: alcool etilic, antidepresive, neuroleptice, teofilină, penicilină în doze mari, analgezice, opioide, antihistaminice H1 sedative, barbiturice, benzodiazepine, alte anxiolitice, clonidină și derivați. Precauție în sarcină și alăptare. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Vertij, greață, vărsături, somnolență sau insomnie, tremor, dispnee, dureri gastrointestinale, diaree. Reacții de hipersensibilitate (anafilaxie): reacții alergice, convulsii, edem angioneurotic, urticarie, vărsături, prurit, halucinații, anxietate, sincopă, tahicardie, sindrom Stevens-Johnson.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFAZOLINUM
CEFEPIMUM
CEFIXIMUM
CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFTPIROMUM
CEFTPROZILUM
CEFTAZIDINUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM

Cod ATC: G03GB02**CLOSTILBEGYT** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 50 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)**OVA-MIT** REMEDICA; Cpr. 50 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. insuficienței ovulatorii la pacientele care doresc să rămână însărcinate și care corespund următoarelor condiții: funcție hepatică normală; estrogenii endogeni în limite fiziologice.

Dz: Trat. va trebui inițiat cu 50 mg/zi timp de 5 zile. Terapia poate fi inițiată în orice moment dacă pacienta nu a avut metroragii recente. Dacă ovulația nu pare să se fi produs după primul ciclu de trat., se va începe un al doilea ciclu cu 100 mg/zi timp de 5 zile; cel mai devreme la 30 zile de cel anterior.

Cind: Afecțiuni hepatice. Metroragii anormale. Chist ovarian. Suspiciune de sarcină.

Al: Examen ginecologic complet va fi efectuat înaintea fiecărei serii terapeutice. Biopsia endometrială va trebui să excludă întotdeauna cancerul endometrial. În caz de metroragii, diagnosticul impune investigații complete. Pacientele care acuză dureri pelviene puternice în urma adm., vor fi examinate cu multă atenție. Dacă se produce mărirea de volum a ovarului, trat. va fi întrerupt până când ovarul revine la dimensiunea inițială. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: Eriteme vasomotorii, disconfort abdominal, metroragii, tumefacția ovarelor, mastodinii, simptome vizuale, greață și vărsături, nervozitate și insomnie, cefalee, poliurie, depresie și astenie, urticarie și dermatită alergică, câștig ponderal, alopecie reversibilă. S-a raportat o retenție mai mare de bromosulfoftaleină (BSP). Posibil anomalii congenitale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFEPIMUM
 CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM

Cod ATC: N06AA04

ANAFRANIL® 10 mg; ANAFRANIL® 25 mg NOVARTIS PHARMA; Dj. 10 mg, 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (P-RF)
CLOMIPRAMIN TERAPIA SA; Dj. 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (P-RF)

Ind: Stări depresive cu etiologie și simptomatologie variate. Sindroame obsesiv-compulsive. Fobii și atacuri de panică. Catalepsie acompaniind narcolepsia. Stări dureroase cronice. Enurezis nocturn.

Dz: Depresii, sindroame obsesiv-compulsive și fobii: Oral: Inițial 25 mg de 2-3 ori/zi, sau 75 mg preparat retard (preferabil seara). Doza se crește progresiv (25 mg la fiecare câteva zile) până la 100-150 mg, sau 150 mg preparat retard în timpul primei săpt. de trat; max. 250 mg/zi. Doză de întreținere: 50-100 mg. Boli cronice dureroase: 10-150 mg/zi. Enurezis nocturn (doar la copiii peste 5 ani): inițial pentru *copiii între 5-8 ani*: 20-30 mg; pentru cei între 9-12 ani: 25-50 mg; pentru copiii peste 12 ani: 25-75 mg. Doza este unică, după masa de seară. Dacă se obține răspunsul dorit, trat. continuă circa 1-3 luni, cu scăderea progresivă a dozei.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la antidepresivele tricyclice din grupul dibenzazepinelor. Tratament concomitent cu IMAO. IMA. Perioada de alăptare.

Al: Insuficiență circulatorie, BAV (gr. I-III), aritmii. Monitorizarea și ECG se indică în astfel de cazuri. Glaucom cu unghi îngust. Tulburări de micțiune datorită unui obstacol. Prag scăzut de convulsie. Boli severe hepatice și renale. Tumori ale medulo-suprarenalei. La bolnavii sub terapie anticonvulsivantă. Poate accentua hTA la cei cu circulație labilă sau hTA. La pacienți hipertiroidieni sau sub tratament cu preparate tiroidiene. Monitorizare cardiacă în cazul în care apar febră, dureri în gât sau alte simptome care sugerează o infecție virală (au fost semnalate câteva cazuri de agranulocitoză). Este necesară monitorizarea funcțiilor hepatică și renală. Determină creșterea incidenței cariei dentare. Dacă există risc suicidal, pacientul trebuie strict supravegheat. Înaintea intervențiilor chirurgicale, anestezistul trebuie să țină cont de faptul că pacientul este sub terapie cu clomipramină. Atenție în cazul asocierii cu: clonidină, guanetidină, rezerpină, metil-dopa, adrenalină, noradrenalină, amfetamină, alcool, barbiturice, benzodiazepine, anestezice generale, anticolinergice, chinidină, fenitoină, nicotină, fenotiazine, cimetidină, metilfenidat, alprazolam, disulfiram, estrogeni. Precauție la femei însărcinate, șoferi, persoane cu activități de precizie.

RA: Uscăciunea gurii, transpirații, constipație, tulburări ale acomodării vizuale și vedere încețoșată, tulburări de micțiune, înroșirea feței, midriază, glaucom, somnolență, bulimie, confuzie, dezorientare, halucinații, stări anxioase, agitație, tulburări de somn, manii, hipomanii, agresivitate, tulburări de memorare, depersonalizare, insomnie, coșmaruri, agravarea depresiei, incapacitate de concentrare, activarea simptomelor psihotice, amețeală, tremor, mioclonii, delir, tulburări de vorbire, parestezii, slăbiciune sau hipertonie musculară, convulsii, ataxie, modificări EEG, hiperpirexie, hTA posturală, tahicardie sinusală și modificări ECG, palpitații, aritmii, creșterea TA, tulburări de conducere, precum lărgirea complexului QRS, modificări PQ, blocuri de ramură, greață, vomă, tulburări abdominale,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFIXIMUM
 CEFONICIDUM
 CEFOPERAZONUM
 CEFOTAXIMUM
 CEFPIROMUM
 CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM

Cod ATC: N03AE01

RIVOTRIL HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. 0,5 mg, 2 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (0,5 mg), ct. × 1 fl. × 30 cpr. (2 mg) (P-6L)

Ind: Epilepsia sugarilor și a copiilor. Epilepsia adulților și în crizele focale.

Dz: Dozele se cresc treptat. Oral: *inițial: sugari și copii până la 10 ani:* 0,01-0,03 mg/kg/zi; copii de peste 10 ani și adulți: 1-2 mg/zi. *Întreținere: sugari și copii până la 10 ani:* 0,05-0,1 mg/kg/zi; *copii de 10-16 ani:* 1,5-3 mg/zi, *adulți:* 2-4 mg/zi. Doza zilnică se poate adm. seara, într-o priză unică. Doza max. la adult: 20 mg/zi.

Cind: Nou-născuți, în special la prematuri. Perioada de alăptare.

A!: La bolnavi cu afecțiuni renale sau hepatice. Atenție în situația asocierii cu: alcool, barbiturice, hidantoină. Precauție la femei însărcinate, șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Oboseală, somnolență, ataxie, tulburări de comportament (excitație, iritabilitate și agresivitate), depresie respiratorie, incontinență urinară, hipotonie musculară, tulburări vizuale și de coordonare, la sugari sau la copii mici poate crește cantitatea secrețiilor salivare sau bronșice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFONICIDUM
CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFTPIROMUM
CEFTPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM

Cod ATC: C02AC01**CLONIDINĂ** SINTOFARM SA; Cpr. 0,15 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (S/P-RF)**CLONIDINĂ 0,15 mg** ARENA GROUP SA; Cpr. 0,15 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-6L)**Ind:** HTA, forme moderate și severe. Profilaxia migrenei și a altor forme de cefalee vasculară recurentă, trat. bufeurilor vasomotorii de menopauză.**Dz:** 0,100-0,150 mg o dată și 0,200-0,300 mg/zi. Pt. profilaxia migrenei: 0,050-0,100 mg/zi, în două prize.**Cind:** Sarcină. Psihoză depresivă în antecedente. *oferi și persoane cu activități de precizie.**Al:** Precauție în IR și IH, scleroză cerebrală, cardiopatie ischemică, IM recent.**RA:** Hiposalivație cu uscăciunea gurii, somnolență, bradicardie, constipație, amețeli, cefalee, hipoxie, greață, vărsături.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFOPERAZONUM
CEFOTAXIMUM
CEFTPIROMUM
CEFTPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM

Cod ATC: B01AC04

PLAVIX® SANOFI PHARMA în colaborare cu BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC; Cpr. film. 75 mg; ct. × 28, 50, 84 sau 100 cpr. (P-RF)

Ind: Reducerea evenimentelor aterosclerotice la pacienții cu antecedente de boală aterosclerotică simptomatică, definită prin accident vascular cerebral ischemic, infarct miocardic sau arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită.

Dz: *Adulți și vârstnici:* 75 mg/zi, priză unică.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre componentele produsului. Afectare hepatică severă. Hemoragie activă. Sarcină și alăptare.

Al: La pacienții cu IMA, trat. nu trebuie început în primele câteva zile consecutive infarctului. Nu este recomandat în angina instabilă, angioplastia coronariană, stenting și by-pass coronarian, în accidentul vascular cerebral ischemic acut (mai recent de 7 zile). Prudență la pacienții cu risc de sângerare: traumatisme, leziuni gastrointestinale și intraoculare, int. chir. sau alte stări patologice. Clopidogrelul va fi întrerupt cu 7 zile înainte de int. chir. Prudență în IR, IH. Precauție în cazul asocierii cu: warfarină, AINS, heparină, trombolitice, medicamente care pot induce leziuni gastrointestinale.

RA: Manifestări hemoragice: hemoragii digestive, purpură, echimoză, hematom, epistaxis, hematurie, hemoragie oculară, hemoragii intracraniene. Manifestări hematologice: neutropenie, anemie aplastică, trombocitopenie. Manifestări gastrointestinale: dureri abdominale, dispepsie, gastrită, constipație, diaree, grețuri, dureri dentare, vărsături, ulcere peptice, gastrice sau duodenale. Anomalii cutanate și ale fanerelor. Tulburări ale SNC și periferic: cefalee, amețeli, vertij, parestezii. Reacții de hipersensibilitate: reacții cutanate (rash maculo-papular sau eritematos, urticarie) și/sau prurit, bronhospasm, angioedem, reacții anafilactoide.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFOTAXIMUM
CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII

Cod ATC: N05BA05

TRANXENE® 5 mg; TRANXENE® 10 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cps. 5 mg, 10 mg; ct. × 1 fl. × 30 cps. (P-RF)

Ind: Stări de anxietate reactivă; crize de anxietate; delirium tremens; sindrom de abinență la alcoolici.

Dz: *Adulți:* 5-30 mg/zi, oral. *Copii peste 2 1/2 ani:* numai în cazuri excepționale, 0,5 mg/kg/zi, fracționat. La vârstnici și în IR este recomandată reducerea dozelor. Durata trat.: cât mai scurtă posibil, max. 4-12 săptăm. Întreruperea trat. se face progresiv.

Cind: Hipersensibilitate la clorazepat, la alte benzodiazepine sau la oricare dintre componentele produsului; insuficiență respiratorie gravă; sindromul de apnee în timpul somnului; IH gravă; glaucom cu unghi închis; copii sub 2 1/2 ani. Asocierea cu alcool.

Al: Folosirea repetată și îndelungată poate determina dezvoltarea toleranței și dependenței. Nu trebuie utilizat pentru trat. depresiilor și al psihozelor, deoarece poate să mascheze simptomele acestor afecțiuni. La copii durata trat. trebuie să fie scurtă și raportul risc/beneficiu trebuie evaluat cu atenție. La vârstnici, pacienți cu IR sau IH este necesară reducerea dozelor. Precauție la pacienții cu insuficiență respiratorie și la cei cu miastenia gravis. Prudență în cazul asocierii cu: antidepressive triciclice, antihistaminice H1, anxiolitice - altele decât benzodiazepinele, neuroleptice, clonidină, cisapridă, clozapină, opioide, barbiturice, curarizante, miorelaxante centrale. Se va evita adm. în timpul sarcinii sau alăptării. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Amețeli, somnolență, astenie, bradipsihie, hipotonie musculară, reducerea performanțelor psihomotorii, slăbiciune, ataxie, cefalee, tulburări de vedere, greață, vomă, modificări ale gustului, disconfort epigastric, diaree, creștere în greutate, diminuarea libidoului și tulburări menstruale, rash cutanat, dureri articulare, amnezie anterogradă, reacții paradoxale (iritabilitate, agitație motorie, convulsii, agresivitate, stări confuzionale), sindrom de rebound cu exacerbară anxietății la întreruperea bruscă a trat. Utilizarea prelungită și în doze mari poate determina dezvoltarea toleranței și dependenței. Întreruperea bruscă a trat. poate provoca sindrom de abinență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D02AC01

CEFPIROMUM
CEFPROZILUM
CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM

CANESTEN BAYER AG; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 20 g (OTC)
CANESTEN® GYN 3 BAYER AG; Cpr. vag. 200 mg; ct. × 1 blist. × 3 cpr. (OTC)
CLOTRIMAZOL ANTIBIOTICE SA; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15 sau 35 g (OTC)
CLOTRIMAZOL BIOFARM SA; Sol. cut. 1 g/100 ml; fl. × 30 ml (OTC)
CLOTRIMAZOL HYPERION; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 20 g (OTC)
CLOTRIMAZOL MK MARK PHARMACEUTICS SRL; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 35 g (OTC)
CLOTRIMAZOL TERAPIA SA; Sol. cut. 1%; ct. × 1 fl. × 50 ml (OTC)
CLOTRIMAZOL 100 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. vag. 100 mg; ct. × 2 blist. × 6 cpr. (OTC)
CLOTRIMAZOL 100 mg MAGISTRA C&C; Cpr. vag. 100 mg; ct. × 2 blist. × 6 cpr. (OTC)
DERMATIN PHARCO PHARM; Sol. cut. sau pulb. cut. 1%; ct. × 1 fl. × 20 ml, respectiv ct. × 1 fl. × 10 g (OTC)

Ind: Dermatomicoze provocate de: dermatofiti (Trichophyton infecțios, tipuri de Microsporium, Epidermophyton floccosum); levuri (Candida albicans și alte tipuri de Candida); mucegaiuri și alte ciuperci (Malassezia furfur). În afecțiunile cutanate provocate de ciuperci și suprainfectate: micoze interdigitale (Tinea pedum, Tinea manuum); micoze ale pielii (Tinea corporis, Pityriasis versicolor); micoze ale plicilor cutanate (Tinea inguinalis, Eritrasma); paronichii în onicomicoze (Tinea unguium). În plus în: sicoza bărbii, Favus, vaginita micotică (mai ales cu Candida), vaginita cu Trichomonas, vaginită bacteriană nespecifică.

Dz: Crema și soluția se aplică local, de 2-3 ori/zi, până la 4 săptăm. Cpr. se introduc intravaginal, unul, seara la culcare, timp de 6 zile (la nevoie 2/zi, dimineața și seara, 6-12 zile). Pudră: se aplică de 1-2 ori/zi în zona afectată. Durata terapiei: dermatomicoze: 3-4 săptăm.; eritasmă, pitiriasis: 3 săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la clotrimazol.

Al: Nu trebuie folosit în regiunea ochilor și mucoaselor. Măsuri igienice sunt foarte importante în vindecarea dermatomicozelor interdigitale. Crema vaginală nu se aplică în perioada menstruală. Crema și cpr. vaginale pot reduce eficacitatea și siguranța produselor din latex ca prezervativele și diafragmele, precum și a spermicidelor vaginale. Prudență în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru.

RA: Irritație locală, uscăciunea pielii, eritem, prurit, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFPROZILUM
 CEFTAZIDIMUM
 CEFTIBUTENUM
 CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM

Cod ATC: N05AH02

LEPONEX® 25 mg; LEPONEX® 100 mg NOVARTIS PHARMA; Cpr. 25 mg, 100 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Schizofrenia rezistentă la trat.; pacienți care nu răspund la neurolepticele clasice sau care nu le tolerează.

Dz: Oral: Doza inițială: 12,5 mg de 1-2 ori în prima zi, apoi 25 mg de 1-2 ori a doua zi. Doza zilnică va fi crescută treptat 25-50 mg/zi. Domeniul dozelor terapeutice: 300-450 mg/zi, divizate în mai multe doze. Unii pacienți pot necesita doze de până la 600 mg/zi. Doza max.: 900 mg pe zi. Doza de întreținere: se va folosi doza minimă eficientă. Trat. trebuie menținut minim 6 luni. Oprirea trat. se face prin reducerea gradată a dozei într-o perioadă de 1-2 săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la clozapină, antecedente de granulocitopenie/agranulocitoză induse de medicament, funcție deficitară a măduvei osoase, psihoze alcoolice sau alte psihoze toxice, intoxicații medicamentoase, comă, colaps circulator și/sau deprimarea SNC, IH, IR sau IC gravă. Perioada de alăptare.

Al: Poate provoca agranulocitoză. Utilizarea se va limita la pacienții schizofrenici care nu reacționează la trat. clasic, care au inițial leucogramă normală și la care se poate face numărarea regulată a leucocitelor. Se va acorda atenție specială oricărui semn care poate sugera neutropenie. Medicamentele care au un potențial de deprimare a funcției măduvei osoase nu vor fi folosite concomitent cu clozapină. Va fi evitată folosirea concomitentă de antipsihotice cu acțiune prelungită. Înaintea începerii trat. trebuie efectuată formula leucocitară, nr. de leucocite trebuie monitorizat săptăm., timp de 18 săptăm. și ulterior cel puțin lunar. Dacă în timpul trat. apar infecții și/sau numărul de leucocite scade sub 3000/mm³ și/sau numărul absolut de granulocite neutrofile scade sub 1500/mm³, trat. va fi întrerupt imediat. În cazul creșterii rapide a dozelor poate apărea hTA ortostatică, cu sau fără sincopă. Pacienții care încep trat. cu clozapină necesită o supraveghere medicală atentă. La pacienții cu convulsii în antecedente sau cu tulburări cardiovasculare, renale sau hepatice, doza inițială va fi de 12,5 mg, adm. o dată în prima zi, creșterea dozei va fi lentă și în trepte. În caz de disfuncție hepatică, funcția ficatului trebuie monitorizată regulat. Este indicată supravegherea atentă la pacienții cu hipertrofie prostatică și glaucom cu unghi îngust. Pacienții cu febră vor fi examinați, pentru a exclude posibilitatea unei infecții sau apariția agranulocitozei. În prezența febrei mari se va lua în considerare posibilitatea unui sindrom malign neuroleptic. La vârstnici, se începere trat. cu o doză foarte mică și limitarea creșterii dozelor ulterioare la 25 mg/zi. Atenție în cazul asocierii cu: medicamente cu potențial de deprimare a funcției măduvei osoase, alcool, IMAO, deprimante SNC (narcotice, antihistaminice, benzodiazepine); medicamente cu efecte anticolinergice, hipotensoare sau deprimante respiratorii; medicamente ce se fixează în proporție mare pe proteine plasmatice; cimetidină; fenitoină; litiu; adrenalina și derivați (efectul de creștere a presiunii sanguine poate fi inversat). Precauție la femei însărcinate, șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Hematologice: agranulocitoză, leucocitoză și/sau eozinofilie. SNC: somnolență, amețeală, cefalee, modificări EEG, scade pragul de apariție a convulsiilor, simptome extrapiramidale, sindrom malign neuroleptic. SNV:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R05DA04

CEFTAZIDIMUM
CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM

CODEINĂ FOSFAT 15 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 15 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (P-RF)
CODEINĂ OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CODEINĂ FOSFORICĂ BIO EEL SRL; Cpr. 15 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (P-RF)
CODEINĂ FOSFORICĂ 15 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CODEINĂ FOSFORICĂ 15 mg FABIOL SA; Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CODEINE PHOSPHATE ICN HUNGARY CO Ltd.; Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
FOSFAT DE CODEINĂ TERAPIA SA; Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
FOSFAT DE CODEINĂ SINTOFARM SA; Cpr. 15 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-RF)
FOSFAT DE CODEINĂ 15 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Tuse iritativă neproductivă; dureri de intensitate moderată; diaree acută.

Dz: Adult: 15 mg o dată, se repetă la nevoie, nu înainte de 4 ore. Copii între 7-15 ani: 15-30 mg/zi. Copii între 3-6 ani: 7,5-15 mg/zi.

Cind: IC, IH, IR, alergii sau intoleranță la codeină, insuficiență respiratorie marcată; la copiii sub 3 ani; în prezența hipersecreției traheobronșice, la bolnavii cu diaree acută toxiinfecțioasă. Nu se asociază cu: fenotiazine, antidepresive triciclice, IMAO. Femei care alăptează.

A!: La bolnavii cu astm bronșic și emfizem pulmonar. Dozele mai mari de 0,3 mg/kg pot produce convulsii la copii. Nu se adm. timp îndelungat din cauza riscului dependenței. La doze mari poate surveni deprimarea respiratorie. Atenție în cazul asocierii cu: antihistaminice, tranchilizante, sedative, hipnotice, antiHTA, alcool; caolin. Prudență la femei însărcinate, mai ales în primele 3 luni. Figurează în lista substanțelor dopante.

RA: Constipație, greață, amețeli, disforie, somnolență; dozele mari deprimă respirația, la copiii mici pot provoca convulsii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C04AE01

CEFTIBUTENUM
CEFTRIAXONUM
CEFUROXIMUM
CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM

CO-DERGOCRIN TERAPIA SA; Sol. orală 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 sau 50 ml (**P-6L**)

ERGOCEPS ANTIBIOTICE SA; Sol. orală 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml (**P-6L**)

HYDERGIN MIPHARM SPA; Sol. orală 0,1%; ct. × 1 fl. × 50 ml (**P-6L**)

REDERGIN LEK PHARMACEUTICALS; Sol. orală 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml (**P-6L**)

REDERGIN LEK PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 0,3 mg/ml; ct. × 50 f. × 1 ml (**P-RF**)

SANTAMIN SANTA N BALANOS; Cpr. 1,5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (**P-6L**)

SANTAMIN SANTA N BALANOS; Sol. orală 0,1%; ct. × 1 fl. × 20 ml (**P-6L**)

SECATOXIN IVAX PHARMACEUTICALS; Sol. orală 1 mg/1 ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (**P-6L**)

Ind: Simptome și semne de deteriorare psihică, în special cele legate de îmbătrânire; boală cerebrovasculară acută; migrene și cefalee vasculare (trat. preventiv); tulburări vasculare periferice. Simptome subiective asociate cu HTA.

Dz: *Oral:* 3-6 mg/zi, în mai multe prize, înainte de mese. Se recomandă trat. prelungit (3 luni sau mai mult) și chiar repetarea lui. *Parenteral:* 0,3 mg codergocrină în p.i.v. sau inj. i.v. lentă, de 1-2 ori/zi. Alternativ, poate fi adm. 0,3 mg i.m. sau s.c., o dată sau de mai multe ori pe zi. În cazuri grave, 0,3-0,6 mg i.m. sau s.c., de 1-2 ori/zi, asociat cu trat. oral. Poate fi adm. și în inj. intraarteriale: 0,3-0,6 mg, diluată în 10-20 ml ser fiziologic.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la medicament.

Al: În caz de bradicardie severă. După adm. inj., trebuie controlată TA, deoarece ar putea să scadă.

RA: Congestie nazală, greață, disconfort abdominal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M04AC01

CEFTRIAXONUM
 CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUICILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
COLCHICINUM

COLCHICINĂ BIOFARM SA; Cpr. 1 mg; ct. × 2 blist. × 20 cpr. (P-RF)
COLCHICINĂ FABIOL SA; Cpr. 1 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. accesului de gută, profilaxia acceselor la începutul trat. gutei cronice cu uricozurice sau uricoinhibitorii, poliartrită reumatoidă, sclerodermie, maladie periodică și alte boli inflamatorii cronice.

Dz: În criza acută de gută: inițial 1 mg, apoi 0,5 mg din 2 în 2 ore până la dispariția durerii. Max.: 6 mg/zi. În următoarele 10 zile doza se reduce, treptat, până la 1 mg/zi. Pentru prevenirea unei crize acute posibile: 0,5-1 mg/zi sau la 2 zile, timp de 3-6 luni.

Cind: IH și IR grave. Ulcer gastroduodenal. În sarcină și în perioada de alăptare.

Al: Prudență la bătrâni, debilitați, cardiaci, hepatici, renali și la cei cu suferințe gastrointestinale. Dacă apar fenomene dispeptice este necesar să se întrerupă trat. Se va evita la femeia în perioada fertilă.

RA: Fenomene de gastroenterită acută (greață, vomă, diaree, colici). Urticarie, erupții morbiliforme, anemie megaloblastică, leucopenie, neutropenie, agranulocitoză, anemie aplastică, azoospermie, nevrită periferică, alopecie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CEFUROXIMUM
 CELECOXIBUM
 CELIPROLOLUM
 CETIRIZINUM
 CETRORELIXUM
 CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM

Cod ATC: A11CC05, A11CC01**SICOVIT® D₃ 200.000 UI/ml S/COMED SA;** Sol. inj. 200000 UI/ml; ct. × 5 f. × 1 ml, ct. × 10 f. × 1 ml (*P-RF*)**VIGANTOL® OIL MERCK KGaA;** Sol. orală în picături 0,5 mg/1 ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (*P-6L*)**VIGANTOLETTEN® 500; VIGANTOLETTEN® 1000 MERCK KGaA;** Cpr. 12,5 mcg (echivalent cu 500 UI vitamina D), respectiv cpr. 25 mcg (echivalent cu 1000 UI vitamina D); ct. × 1 blist. × 30 cpr. (*P-6L*)**Ind:** Profilaxia rahitismului, spasmofilie și osteomalacie; în trat. osteoporozei.**Dz:** Oral: *Copii:* 500-5000 U.I./zi sau la 2 zile. *Adulți:* 500-7500 U.I./zi. În trat. hipoparatiroidismului și pseudohipoparatiroidismului se adm. 10000-200000 U.I./zi (se va controla nivelul seric al calciului). *Inj.:* Rahitism și tetanie hipocalcemică: profilactic, 200000-400000 U.I. la fiecare 6 luni, până la vârsta de 5 ani; curativ, 200000 U.I., o dată pe săpt., 2 săpt.; osteomalacie/ osteoporoză: 200000 U.I. la fiecare 15 zile, timp de 3 luni.**Cind:** Hipercalcemie, hipercalciurie, sarcoidoză, litiază renală, hipersensibilitate la vitamina D. În sarcină și alăptare.**Al:** Prudență în IR, la bătrâni, la bolnavii imobilizați, în hipercolesterolemie, în hipotiroidism. În trat. cu doze mari repetate, se supraveghează calcemia și calciuria și se va întrerupe adm. când calcemia depășește valoarea normală, iar calciuria depășește valoarea de 300-400 mg/24 ore. Atenție în cazul asocierii cu: barbiturice, fenitoină, diuretice tiazidice, digitalice, blocante ale canalelor de calciu.**RA:** Hipercalcemie și/sau hipercalciurie cu hipersensibilitate la vitamina D. Persistența nivelului seric crescut al calciului se poate manifesta prin simptome acute (aritmii, greață, vomă, simptome psihice, tulburări ale stării de conștiență) și cronice (scădere ponderală, formare de calculi renali, nefrocalcinoză, calcificări ale țesuturilor moi, lipsa poftei de mâncare, sete intensă, poliurie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CELECOXIBUM
CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM

Cod ATC: J01XB01**COLISTIN** ANTIBIOTICE SA; Pulb. inj. 1000000 UI; ct. × 50 sau 100 fl. (S/P-RF)**Ind:** Trat. infecțiilor cu microorganisme sensibile la colistină: renale, urogenitale, meningeale; septicemie.**Dz:** Adm. inj.: *Adulți și copii:* 50000 U.I. colistină/kg/zi. *Nou-născuți la termen, prematuri și sugari:* 50000-100000 UI/kg/zi. Adm. în 2-3 inj. i.m. sau în p.i.v. lente (1 oră). Adm. int.: *Prematuri și nou-născuți:* 50000 UI/kg/zi, în 3-4 prize. *Sugari:* 100000-150000 UI/kg/zi, în 3-4 prize. *Copii între 1 și 12 ani* de 3-4 ori pe zi câte 1000000 UI. *Copii peste 12 ani și adulți* de 4 ori pe zi câte 2000000 UI. În caz de IR doza trebuie ajustată în funcție de valorile clearance-ului la creatinină sau al creatininemiei.**Cind:** Hipersensibilitate la polimixine. Miastenia gravis. Sarcină și alăptare.**Al:** Prezența IR impune ajustarea dozelor și supravegherea atentă a pacientului pentru a observa eventuala apariție a paresteziilor peribucale. Aceeași supraveghere atentă trebuie efectuată și în cazul unui trat. de lungă durată. A nu asocia cu alte produse medicamentoase nefrotoxice. Colistina potențează efectul curarizantelor.**RA:** IR, reversibilă la întreruperea trat. Reacții alergice. Blocul neuromuscular, la pacienții cu IR.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CELIPROLOLUM
CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A

DESCRIERE

INFO

ACECLOFEN

Cod ATC: M01AB55

ANTIBIOTICE SA; Sup. cu paracetamol 500 mg, diclofenac sodic 50 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (**P-6L**)

Ind: Boli reumatismale inflamatorii sau degenerative: artrită reumatoidă, artrită reumatoidă juvenilă, spondilită ankilopoietică, osteoartrită și spondilartrită, sindroame dureroase ale coloanei vertebrale, reumatism abarticular, reumatism psoriazic, atacuri acute de gută. Afecțiuni dureroase și/sau inflamatorii în ginecologie, de exemplu, dismenoree primară sau anexită.

Dz: *Adulți:* 1-2 supozitoare: în afecțiuni reumatismale acute, o doză inițială de 100-150 mg diclofenac sodic, în 2-3 prize; la pacienții cu afecțiuni gastro-intestinale în antecedente se recomandă 1 supozitor de 2 ori pe zi (dimineața și seara), asociat cu 50 mg diclofenac sodic administrat oral; la pacienții cu sensibilitate a mucoasei rectale, în antecedente, pentru a se evita iritațiile locale, se recomandă un supozitor seara, asociat cu 50-100 mg diclofenac sodic administrat oral.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului; hipersensibilitate la alte AINS (inclusiv criză de astm, urticarie sau rinită acută). Ulcer gastro-duodenal; insuficiență hepatică severă; insuficiență renală severă; insuficiență cardiacă severă sau necontrolată terapeutic; antecedente recente de rectită sau rectoragii; ultimul trimestru de sarcină (după luna a VI-a).

Al: Se monitorizează funcția hepatică. Prudență la pacienții cu deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază. Asocieri nerecomandate: alte antiinflamatoare nesteroidiene incluzând salicilați, anticoagulante orale, heparină și ticlopidină, dispozitive intrauterine: posibilitatea diminuării eficacității dispozitivelor intrauterine; litiu, metotrexat, diuretice, antihipertensive (și blocante, captopril, lizinopril, diuretice), interferon alfa. Prudență și sub supraveghere la pacienții cu afecțiuni gastro-intestinale în antecedente (ulcer duodenal, colită ulcerohemoragică, boală Crohn) și la cei cu antecedente de tulburări hematologice sau tulburări de coagulare (se recomandă examene hematologice periodice și pe parcursul tratamentului). Se monitorizează funcția renală la pacienții cu insuficiență cardiacă, ciroză sau nefropatie cronică, la pacienții tratați cu diuretice, după o intervenție chirurgicală majoră care antrenează o hipovolemie. La pacienții vârstnici și subponderali se recomandă utilizarea celei mai mici doze eficace. Nu se recomandă conducerea autovehiculelor sau utilajelor.

RA: Greață, vărsături, dureri epigastrice, diaree, crampe abdominale, dispepsie, flatulență, anorexic; rare cazuri de ulcer gastro-duodenal, hemoragie digestivă sau perforate, exacerbară colitei ulcerohemoragice; iritații locale sau agravarea bolii hemoroidale, ocazional cefalee, amețeli și somnolență; pot să apară în cazuri izolate parestezii, tulburări de memorie, dezorientare, tulburări de vedere și auz, insomnie, iritabilitate, depresie, anxietate; ocazional

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CETIRIZINUM
CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B

DESCRIERE

INFO

BANEOCIN

[Cod ATC: D06C](#)

SANDOZ GmbH; Pulbere cu bacitracină 250 UI/g, neomicină sulfat 3500 UI/g; fl. × 10 g; unguent cu bacitracină 250 UI/g, neomicină sulfat 5000 UI/g; tub × 20 g (P-RF)

Ind: Infecții provocate de germeni patogeni sensibili la neomicină și/sau la bacitracină. *Baneocin pulbere:* - infecții bacteriene ale pielii de mică extindere, de ex: Herpes simplex, Herpes zoster/vezicule de varicelă, impetigo contagios supurant, ulcere infectate ale gambei, eczeme infectate, dermatite fesiere (la nou-născuți) infectate cu bacterii. Prevenirea infecțiilor ombilicale la nou-născuți. După intervenții chirurgicale (dermatologice) ca adjuvant în îngrijirea postoperatorie (excizii și cauterizări, tratarea ragadelor, ruptură perineală, episiotomie, răni și cicatrice supurante). *Baneocin ung.:* Infecții bacteriene focale ale pielii: Furuncule, antrax (după trat. chirurgical), foliculita bărbiei, foliculita profundă, hidrosadenite supurative, periorite. Infecții ale pielii de extindere limitată: Impetigo contagios, ulcere infectate ale gambei, eczeme secundare infectate, răni și tăieturi infectate secundar, arsuri, operații estetice și grefe cutanate. Infecții ale canalului auditiv extern, răni sau escare chirurgicale.

Dz: Se aplică un strat subțire de pulbere sau ung. pe rană, acoperit eventual cu un pansament, 2-4 aplicații cu pulb. sau 2-3 cu ung./zi. La pacienții cu arsuri care acoperă mai mult de 20% din suprafața corpului aplicații o singură dată/zi.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la bacitracină sau/și neomicină sau la alte antibiotice aminoglicozidice. Leziuni severe extinse ale pielii. Pacienți cu tulburări excretorii grave de origine cardiacă sau renală cât și cei cu leziuni vestibulare sau/și cohleare. Timpan perforat. Aplicații pe mucoasa oculară. Adm. simultană de cefalosporine sau alte aminoglicozide.

Al: Urmărirea semnelor de nefrotoxicitate sau/și ototoxicitate. Pacienți cu funcție hepatică sau/și renală redusă. Otită medie cronică veche. Timpan perforat. Acidoză, miastenia gravis sau alte boli neuromusculare - risc de bloc neuromuscular, antagonizat de calciu și neostigmină, potențat de anestezice, miorelaxante. Sarcină și alăptare.

RA: Rar, descuamări, uscăciunea pielii, congestia tegumentelor pielii și prurit, alergie încrucișată cu celelalte aminoglicozide. Aplicat în dermatoze cronice și otită medie cronică, favorizează sensibilizarea față neomicină. La aplicarea de doze mari - leziuni vestibulare și cohleare, nefrotoxicitate și blocaj neuromuscular.

BEN-GAY EXTRA STRENGTH SPORTS

[Cod ATC: M02AX10](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CETRORELIXUM
CHINIDINI SULFAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C

CAL-C-VITA

Cod ATC: A12AXN1

HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. eferv. cu 1000 mg acid ascorbic, 250 mg calciu, 300 UI vit. D₃, 15 mg vit. B₆; ct. × 1 tub × 10 cpr. eferv. (OTC)

Ind: Necesități nutriționale crescute, în timpul bolilor și convalescenței, la vârstnici, în perioadele de creștere, efort psihic și fizic, în perioadele cu probabilitate crescută de a răci. Creșterea rezistenței la infecții; în cazurile de oboseală fizică rapidă. Favorizarea vindecării rănilor și fracturilor; prevenirea deficitului de vitamine și de calciu și a osteomalaciei.

Dz: Un cpr. eff./zi.

Cind: Alergie, hipervitaminoză D, hipercalcemie, litiază renală, litiază urinară sau IR.

RA: Vit. C poate influența metodele de dozare a glicozuriei.

CALCIU-D₃ COMPRIMATE MASTICABILE

Cod ATC: A12AX

NYCOMED PHARMA SA; Cpr. masticab. cu carbonat de calciu corespunzător pentru 500 mg calciu, concentrat de colecalciferol (pudră) corespunzător pentru 5 micrograme = 200 UI colecalciferol (vitamina D₃); fl. × 20, 60 sau 100 de cpr. (OTC)

Ind: Femei cu nevoi crescute de calciu și vitamina D în timpul sarcinii, alăptării și după menopauză, și pentru vârstnici.

Dz: Adulți: una sau două tablete pe zi. Tableta poate fi mestecată, suptă, înghițită întreagă sau administrată dizolvată într-un pahar cu apă. Copii: doar la indicația medicului.

Cind: În cazul unor nivele mult mărite de calciu în sânge sau în urină, tendință de a forma pietre la rinichi, hipersensibilitate la vitamina D, disfuncție a rinichilor.

Al: În timpul tratamentului pe termen lung cu doze mari sau în cazul insuficienței renale, trebuie monitorizată apariția hipercalcemiei sau calciuriei. Produsul conține aspartam și nu trebuie administrat pacienților cu fenilketonurie. Se recomandă administrarea tabletelor de calciu cu trei ore înainte sau după administrarea orală a tetraciclinelor, bifosfaților și a florurii de sodiu. Nivelul calciului poate să crească dacă se administrează concomitent diuretice. Absorbția de calciu poate fi diminuată de administrarea concomitentă de fenitoină sau

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CHINIDINI SULFAS
 CHLORAMBUCILUM
 CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D

DAIVOBET

Cod ATC: D05AX52

LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS; Ung.; 1 g conține 0,05 mg calci -potriol și 0,5 mg betametazonă (dipropionat); tub × 15, 30, 60, 100, 120 g (*P-RF*)

Ind: Trat. psoriazisului vulgar.

Dz: *Adulți:* ung. se aplică o dată/zi, pe zona afectată, timp de până la 4 săptămâni. Doza maximă: 100 mg pe săptămână.

Cind: Alergie la oricare din componentii produsului. Infecții netratate ale pielii. Pacienții cu tulburări ale metabolismului calciului (datorită conținutului în calcipotriol).

Al: Nu se aplică pe față. Nu se utilizează pentru aplicații pe suprafețe întinse, și/sau sub pansamente ocluzive sau la nivelul pliurilor. Precauție la pacienții diabetici, la cei cu afecțiuni hepatice sau renale. Sarcină și alăptare.

RA: Poate produce mâncărimi ușoare și trecătoare, iritație locală tranzitorie, dermatite, eritem, uneori agravarea psoriazisului. Rar: foliculite, hipertricoză, dermatită periorală, dermatită alergică de contact sau depigmentări. Foarte rar apar RA sistemice: hipercalcemie datorată calcipotriolului sau inhibarea axului hipofizo-cortico-suprarenalian de către glucocorticoid.

DALERON C

Cod ATC: N02BE51

KRKA; Gran. pt. susp. orală; 5 g granule conțin 500 mg paracetamol și 20 mg acid ascorbic; ct. × 10 plicuri (*OTC*)

Ind: Scăderea febrei care acompaniază variate infecții bacteriene și virale, ameliorarea durerilor musculare și articulare din răceală și gripă, ameliorarea durerilor ușoare și moderate de origine neinflamatorie (cefalee, dureri dentare), în special la pacienții cu afecțiuni gastrice, ameliorarea durerilor consecutive traumatismelor și procedurilor medicale.

Dz: *Adulții și copiii peste 12 ani:* 1 plic de granule, de 4-6 ori/zi. Intervalul dintre doze va fi de cel puțin 4 ore. Nu se recomandă adm. a mai mult de 8 plicuri în 24 ore. Goliți conținutul unui plic într-un pahar, turnați peste granule 150 ml apă caldă sau ceai, amestecați și beți conținutul cât timp este cald.

Cind: Hipersensibilitate la paracetamol, acid ascorbic, sau oricare dintre ingredientii medicamentului, sau disfuncții severe renale și hepatice

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E

DESCRIERE

INFO

ECOCAIN 2% CU ADRENALINĂ 1:100000**Cod ATC: N01BB52**

MOLTENI DENTAL; Sol. inj. de uz dentar; 1 cartuş conţine 36 mg clorhidrat de lidocaină şi 18 mcg L-adrenalină (sub forma de bitartrat); ct. × 5 blist. × 10 cartuşe × 1,8 ml (**S**)

Ind: Anestezic local pentru orice tip de intervenţie stomatologică, când se doreşte o prelungire a duratei efectului anestezicului sau când e necesară obţinerea unei ischemii locale.

Dz: 1-2 ml sol. inj. sau mai mult, în funcţie de tipul intervenţiei, pentru infiltraţii sau bloc nervos periferic. Doza maximă de lidocaină este de 300 mg/24 ore. La adulţi sănătoşi, netrataţi cu sedative, doza maximă pentru o singură adm. sau pentru adm. repetate într-un interval mai mic de 120 minute este de 300 mg lidocaină şi de 0,2 mg adrenalină, echivalent cu 5,5 cartuşe. Sol. se inj. în doze mici, cu o viteză de 1 ml/min, după aspiraţie. La copii, dozele se scad în funcţie de greutate şi vârstă.

Cind: Hipersensibilitate la lidocaină, adrenalină sau la oricare dintre excipienţii produsului; tulburări de conducere atrioventriculare, insuficienţă coronariană, aritmii ventriculare, HTA severă, cardiomiopatie obstructivă; migrenă; hipertiroidie; epilepsie necontrolată prin tratament; porfirii.

Al: Prudenţă la pacienţii cu IH, IC, diabet zaharat, adenom de prostată, glaucom acut şi nevroze. Înainte de utilizare, trebuie controlată TA şi alura ventriculară. Este indicată folosirea dozei minime pentru obţinerea efectului dorit. Pacientul trebuie monitorizat cu atenţie; la primul semnal de alarmă, adm. trebuie întreruptă. Sunt necesare dotare corespunzătoare şi personal calificat pentru a interveni în cazul apariţiei reacţiilor adverse grave. Nu se adm. în regiunile inflamate şi infectate, precum şi la pacienţii trataţi cu anticoagulante. Produsul poate produce o reacţie pozitivă la testele de control antidoping. Prudenţă la asocierea cu guanetidină, anestezice generale inhalatorii halogenate, IMAO şi antidepresive triciclice sau cu fenol.

RA: Nervozitate, agitaţie, tremor, dezorientare, nistagmus, logoree, cefalee, greaţă, convulsii; tahipnee, apoi apnee; tahicardie, bradicardie, hTA, tulburări de ritm; reacţii alergice. Adrenalina poate determina, în special la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare: anxietate, transpiraţie, insuficienţă respiratorie, aritmii, HTA, cefalee, fotofobie, dureri retrosternale sau faringiene, vărsături.

ECOCAIN 2% CU ADRENALINĂ 1:50000**Cod ATC: N01BB52**

MOLTENI DENTAL; Sol. inj. de uz dentar. 1 cartuş conţine 36 mg clorhidrat de lidocaină şi 36 mcg L-adrenalină (sub

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CHLORAMPHENICOLUM
 CHLORHEXIDINUM
 CHLORPHENAMINUM
 CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F

FARAGEL FORTE**Cod ATC: M02AX10**

FARAN LAB.; 100 g gel conțin 5 g camfor, 1,5 g mentol, 1 g nicotinat de metil, 1 g ulei de eucalipt, 0,5 g ulei de terebentină, 45 g etanol, excipienți ad 100 g; ct. × 1 tub × 80 g (*OTC*)

Ind: În forme acute de artralгии, mialгии, entorse și luxații, inflamații ale sistemului osos și muscular, osteite și miozite. Aplicat în strat subțire pe piept, gât, umeri, are o acțiune puternic decongestivă la nivelul sinusurilor și a căilor respiratorii superioare.

Dz: Aplicații locale în strat subțire de 3-4 ori pe zi, pe locul dureros.

Cind: Copii în primele luni de viață, aplicarea la nivelul mucoaselor și în zone ale pielii ce prezintă ulcerații.

Al: Se evită în cazul pacienților alergici la camfor.

FARCOVIT-B₁₂**Cod ATC: A05BAN2**

PHARCO PHARM.; Cps. cu fosfolipide esențiale 10 mg, vit. B₁ 2 mg, vit. B₂ 1 mg, vit. B₆ 2 mg, vit. B₁₂ 10 μg, extract de cynara 50 mg, pantotenat de calciu 5 mg, nicotinamidă 10 mg, inositol 50 mg, ac. orotic 20 mg, ac folic 0,5 mg, biotină 0,1 mg; ct. × 2 blist. × 12 cps. (*OTC*)

Ind: Tulburări hepatice din: intoxicații, hepatite infecțioase, parazitism intestinal, alcoolism cronic; tulburări metabolice: diabet, hipotiroidism, tireotoxicoză, sarcină, Kwashiorkor; ca adjuvant în: HTA, ATS, obezitate, boli de piele.

Dz: 1-2 cps. de 3 ori/zi

FASCONAL P**Cod ATC: N02BA51**

GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. cu ac acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, cafeină 25 mg, codeină fosfat 10 mg, fenobarbital 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (*P-6L*)

Ind: Cefalee, nevralгии, mialгии, febră, gripă.

Dz: *Adulți:* 1 cpr. la nevoie; 3-5 cpr. pe zi. *Copii:* 1/4-1/2 cpr. de 1-3 ori/zi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CHLORHEXIDINUM
CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G

DESCRIERE

INFO

GARASONE

Cod ATC: S01CA05

SCHERING PLOUGH EUROPE; Sol. oft./otică; 1 ml conține 3 mg genta- micină și 1 mg betametazonă; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)

Ind: Inflamații oculare; afecțiunile canalului auditiv ext., cum sunt otita ext. acută și cronică, dermatita eczematiformă, dermatita seboreică și dermatita de contact suprainfectată cu germeni sensibili la gentamicină.

Dz: Oftalmic: 1-2 pic. instilate de 3-4 ori/zi în sacul conjunctival al ochiului afectat. Otic: 3-4 pic de 2-4 ori/zi.

Cind: Keratite epiteliale cu herpes simplex, vaccinia, varicela, afecțiunile virale ale corneei și conjunctivei, infecțiile micobacteriene sau fungice ale ochiului sau urechii, corpi străini, trahom, perforația timpanului, hipersensibilitate. Copii sub 8 ani.

Al: Monitorizarea presiunii intraoculare. Glaucom cu unghi deschis, grad înalt de miopie, diabet. Sarcină și alăptare.

RA: Senzație de usturime la adm., creșterea presiunii intraoculare, glaucom, afectarea (rară) a nervului optic, tulburări ale acuității vizuale și ale câmpului vizual, apariția unor cataracte posterioare subcapsulare, întârzierea în vindecarea unor răni, apariția unor flictene cu lichid clar după intervențiile chirurgicale pentru cataractă, infecții oculare secundare produse de agenți patogeni inclusiv herpes simplex, uveite acute anterioare și perforații ale globului ocular, midriază, pierderi ale acomodării și ptoză. Alergie.

GARASONE

Cod ATC: S01CA05

SCHERING PLOUGH EUROPE; Ung. oftalmic; 1 g conține 3 mg de gentamicină și 1 mg de betametazonă; ct. × 1 tub × 5 g (P-RF)

Ind: Inflamații oculare: blefaroconjunctivita stafilococică, keratoconjunctivita flictenulară, keratoconjunctivita microbiană și alergică, conjunctivita alergică, bacteriană nepurulentă, catarală, vernală; cheratită; episclerită; dacriocistită; orjelet; meibomită; și traumatisme ale segmentului anterior ocular cauzate de corpi străini, radiații, factori termici, chimici sau postoperator.

Dz: Aplicații la nivelul sacului conjunctival al ochiului afectat, de 3-4 ori/zi.

Cind: Keratite epiteliale cu herpes simplex, vaccinia, varicela, afecțiuni virale ale corneei și conjunctivei, infecții

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CHLORPHENAMINUM
CHLORPROETHAZINUM
CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H

DESCRIERE

INFO

HAES-STERIL 6%; HAES-STERIL 10%**Cod ATC: B05AA07**

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND; Sol. perf. 1 l conține 60/100 g poli(O-2-hidroxietil) amidon și 9 g clorură de sodiu; fl. × 250 ml sau 500 ml (**S**)

Ind: Tratamentul și profilaxia hipovolemiei și șocului, în caz de: intervenții chirurgicale (șoc hemoragic); traumatisme (șoc traumatic); infecții (șoc septic); arsuri (șoc termic). Pentru realizarea hemodiluției terapeutice isovolemice sau hipervolemice în tulburările microcirculației periferice, cerebrale, retiniene, otice și în tulburările circulației placentare. Pentru realizarea hemodiluției normovolemice acute (HNA) în scopul reducerii necesarului de sânge de la donatori în timpul intervenției chirurgicale.

Dz: Trat. și profilaxia hipovolemiei și a șocului (substituție de volum): perfuzie i.v. maxim 33 ml/kg/zi (aprox. 2500 ml/75 kg/zi). Viteza maximă a perfuziei este de 20 ml/kg/oră (aprox. 1500 ml/75 kg/oră). Hemodiluția limitează utilizarea terapeutică. Durata trat. este în funcție de durata și gradul hipovolemiei. *Hemodiluția terapeutică.* Aceasta se face pentru scăderea hematocritului, în condițiile de izovolemie sau hipervolemie. Dozele și vitezele maxime de perfuzare recomandate sunt de: 250 ml sol. 6% în 0,5-2 ore (doză mică), 500 ml sol. 6% în 4-6 ore (doză medie), 2 × 500 ml sol. 6% în 8-24 ore (doză mare). Durata tratamentului este de până la 10 zile. *Hemodiluția normovolemică acută (HNA).* În cazul în care nu există alte indicații, se recomandă ca înaintea intervenției chirurgicale să se înlocuiască o parte din sângele pacientului cu Haes-steril 6% în raport de 1:1. Înlocuirea este limitată de valoarea hematocritului, care nu trebuie să fie mai mic de 30% (după HNA). Dacă nu s-a recomandat altfel, se scot de 2-3 ori câte 500 ml sânge; acest volum se înlocuiește cu Haes-steril 6% în doză de 500 ml soluție perfuzabilă, introduși de 2-3 ori/zi. Viteza perfuziei este de 1000 ml în 15-30 min.

Cind: IC severă, IR, coagulopatii (cu excepția cazurilor care pun viața în pericol), supraîncărcare circulatorie, hiperhidratare, deshidratare, hemoragie intracraniană; hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului.

Al: Datorită riscului de reacții anafilactice, o doză inițială de 10-20 ml Haes-steril 6%, trebuie perfuzată încet, în acest timp pacientul fiind supravegheat atent. În cazul în care soluția se perfuzează prea rapid sau în doză prea mare, există risc de supraîncărcare circulatorie. Utilizarea substituenților polimerici de plasmă la pacienții fără riscuri cardiovasculare sau pulmonare, este permisă numai dacă hematocritul este mai mare de 30%. La începutul trat. se controlează valoarea creatininei serice. Dacă este la limita pragului fiziologic (1,2-2,0 mg/dl sau 106-177 mol/l, ceea ce indică IR compensată), echilibrul hidric și parametri de retenție renală trebuie verificați zilnic. În cazul în care valorile creatininei serice sunt normale, dar sumarul de urină prezintă modificări, trebuie suspectată o IR compensată; în asemenea cazuri, creatinina serică trebuie determinată zilnic. În timpul trat. pacienții trebuie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CHLORPROETHAZINUM
 CHLORPROMAZINUM
 CHLORQUINALDOLUM
 CHLORZOXAZONUM
 CHOLINI SALICYLAS
 CICLOPIROXUM
 CICLOSPORINUM
 CILAZAPRILUM
 CIMETIDINUM
 CINNARIZINUM
 CINOLAZEPAMUM
 CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I

DESCRIERE

INFO

IDEOS

Cod ATC: A11JB

INNOTECH INTERNAT.; Cpr. mast cu carbonat de calciu 1250 mg și colecalciferol 400 UI; ct. × 2 sau 4 tuburi × 15 cpr. mast. (**P-6L**)

Ind: Corecția deficitelor de vit. D și calciu la vârstnici. Terapie adjuvantă în osteoporoză.

Dz: 1 cpr. de 2 ori/zi; cpr. se vor mesteca.

Cind: Hipersensibilitate. Hipercalcemie, hipercalciurie, litiază calcică.

Al: În cazul trat. simultan cu un alt preparat de vit. D, trebuie calculată doza totală de vit. D primită. Se monitorizează calcemia și funcția renală la pacienții vârstnici. În caz de IR, dozajul va fi adaptat în funcție de clearance-ul creatininei. Imobilizarea prelungită este însoțită de hipercalcemie sau/și hipercalciurie; trat. cu vit. D și calciu trebuie inițiat doar în momentul în care pacienții pot fi mobilizați. Prudență la asocierea cu: digitalice, diuretice tiazidice, tetraciclină, bifosfonați, fluorură de sodiu, fenitoină, barbiturice, glucocorticoizi. Sarcina și alăptarea.

RA: Constipație, flatulență, greață, epigastralgie, diaree; hipercalciurie și hipercalcemie.

INFECTOFLAM

Cod ATC: S01CA07

NOVARTIS OPHTHALMICS A.G.; Sol. oft.; 1 ml conține 1 mg fluorometolonă, 3 mg gentamicină; ct. × 1 fl. × 5 ml; Ung. oft.; 1 g conține 1 mg fluorometolonă, 3 mg gentamicină; ct. × 1 tub × 4 g (**P-RF**)

Ind: Conjunctivite bacteriene cu germeni sensibili; inflamații ale segmentului anterior ocular cu risc crescut de infecție bacteriană (în special postoperator).

Dz: Sol.: infecții bacteriene (conjunctivite bacteriene): 1 pic. de 5 ori/zi în sacul conjunctival al ochiului afectat. În cazuri severe, 1 pic./oră, 1-2 zile. Tratam. postoperator: 1 pic. de 4 ori/zi, o săpt. în sacul conjunctival al ochiului operat. Ung: se aplică 5 mm de ung. de 3-4 ori/zi în sacul conjunctival al ochiului afectat.

Cind: Hipersensibilitate. Leziuni sau ulcerări corneene; infecții virale (Herpes simplex, Vaccinia) sau micoze; tbc oftalmic, glaucom.

Al: Controlul periodic al presiunii intraoculare. Evitarea utilizării lentilelor de contact. Sarcină și alăptare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CHLORPROMAZINUM
CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J

DESCRIERE

INFO

JEANINE

Cod ATC: G03FA15

SCHERING AG; Dj. cu 2 mg dienogest și 0,03 mg etinilestradiol; ct. × 1 sau 3 blist. × 21 dj. (P-RF)

Ind: Terap. de substituție hormonală pentru trat. simptomelor deficienței de estrogeni la femeia la care menopauza a apărut de cel puțin un an și care are uter.

Dz: 1 dj./zi. Un ciclu de tratament se desfășoară pe o perioadă de 28 zile. Tratamentul este continuu, ceea ce înseamnă că următoarea folie se începe imediat, fără pauză. La pacientele care nu au mai făcut terapie de substituție hormonală sau la cele care au trecut de la un produs de terapie de substituție hormonală combinată continuă, trat. poate fi început în orice zi. La pacientele care trec de la o terapie de substituție hormonală secvențială, trat. se începe în ziua următoare terminării tratamentului anterior. Dacă se uită să se ia dj. la ora obișnuită, acesta trebuie luat cât mai curând posibil, dar fără să treacă peste 24 ore. Dacă trat. este întrerupt pentru mai multă vreme, poate apărea sângerare vaginală.

Cind: Sângerare vaginală de etiologie nediagnosticată. Cancer mamar, suspiciune de cancer mamar sau antecedente de cancer mamar. Stări premaligne sau maligne, cunoscute sau suspectate, dacă sunt dependente de hormonii sexuali steroidieni. Afecțiuni hepatice acute sau cronice sau antecedente de boli hepatice la care valorile testelor hepatice nu au revenit la normal. Tromboembolism venos activ (TEV) confirmat în ultimii 2 ani. Antecedente de tromboembolism venos recurent sau boli trombotice cunoscute la pacientele care nu mai iau anticoagulante. Eveniment tromboembolic arterial activ sau recent. Hipertrigliceridemie severă. Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componentele produsului.

Al: Înainte de a începe sau de a reîncepe terapia de substituție hormonală, se va face o examinare completă a antecedentelor personale și heredocolaterale, precum și examen general și ginecologic, având în vedere contraindicațiile și precauțiile de utilizare ale produsului. Înainte de începerea trat. trebuie exclusă posibilitatea unei sarcini. La pacientele tratate cu estro-progestative trebuie evaluată în permanență balanța risc/beneficiu. Trebuie avut în vedere faptul că aceste condiții pot, în cazuri rare, să reapară sau să se agraveze în timpul terapiei: tumori estrogen-dependente în antecedente; leiomiom, endometrioză, hiperplazie de endometru; antecedente sau factori de risc pentru afecțiuni tromboembolice; HTA; afecțiuni hepatice (porfirie, adenom hepatic); diabet zaharat cu implicare vasculară; litiază biliară; otoscleroză; migrenă sau cefalee severă; afecțiuni benigne ale sânelui. Utilizarea terapiei de substituție hormonală la pacientele cu antecedente de TEV recidivant sau cu predispoziție pentru tromboze, aflate deja în tratament cu anticoagulante, necesită o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc la utilizatorii terapiei de substituție hormonală. Antecedentele personale sau heredocolaterale de tromboembolism

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CHLORQUINALDOLUM
CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K

DESCRIERE

INFO

KABIVEN

[Cod ATC: B05BA10](#)

FRESENIUS KABI AB; Emulsie perf. cu glucoză 19%, aminoacizi și electroliți, emulsie lipidică; saci × 1026, 1540, 2053 sau 2566 ml (**S**)

Ind: Nutriție parenterală la adulți și copii cu vârstă peste 2 ani, atunci când alimentația orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.

Dz: Doza și viteza de perfuzare se stabilește individual. La copii cu vârsta de peste 10 ani se recomandă aceleași doze ca la adulți.

Cind: Copii sub 2 ani. Hipersensibilitate cunoscută la ouă, proteine din soia. Hiperlipemie severă, IH severă, coagulopatii severe, tulb. congenitale ale metabolismului proteic, IR severă dacă hemofiltrarea sau dializa nu sunt posibile, șoc acut, hiperglicemie când sunt necesare mai mult de 6 UI insulină/oră, contraindicațiile generale ale perfuzării.

Al: Monitorizarea capacității de eliminare a lipidelor. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.

RA: Componentă lipidică poate provoca hipertermie, tremor, frisoane, greață, vărsături. Creșteri temporare ale enzimelor hepatice. La adm. în vene periferice există riscul de tromboflebite. Alte efecte extrem de rare: hipersensibilitate (reacții anafilactice, rash cutanat, urticarie), tahipnee, hTA sau HTA, hemoliză, reticuloză, dureri abdominale, cefalee, priapism, oboseală, sindromul supraîncărcării grase (hiperlipemie, febră, infiltrare grasă, hepatomegalie, splenomegalie, anemie, leucopenie, trombocitopenie, coagulopatii, comă). Toate simptomele sunt de obicei reversibile la întreruperea perfuziei.

KABIVEN PERIPHERAL

[Cod ATC: B05BA10](#)

FRESENIUS KABI AB; Emulsie perf. cu glucoză 11%, aminoacizi și electroliți, emulsie lipidică; saci × 1440, 1920 sau 2400 ml (**S**)

Ind: Nutriție parenterală la adulți și copii cu vârstă peste 2 ani, atunci când alimentația orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.

Dz: Doza și viteza de perfuzare se stabilește individual. La copii cu vârsta de peste 10 ani se recomandă aceleași doze ca la adulți.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CHLORZOXAZONUM
CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L

LACRISIFI

Cod ATC: S01XA20

S.I.F.I.; Sol. oft. hidroxiopropil-metilceluloză 4000 cps. 0,50 g; fosfat de sodiu monobazic H₂O 0,80 g; fosfat de sodiu dibazic 12 H₂O: 1,80 g; clorură de benزالconiu 0,01 g; edetat de sodiu 0,10 g; clorură de sodiu 0,20 g; apă distilată până la 100,00 ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (*OTC*)

Ind: Adjuvant în sindroamele "sicca", de origine endogenă (excesul sau deficitul de mucopolizaharide) și exogenă (purători de lentile de contact, factori de mediu). Iritații oculare produse de smog, praf, vânt, apă de mare; facilitează eliminarea corpi străini și a substanțelor toxice.

Dz: Se instilează 1-2 pic. de 4-8 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate.

LACRYVISC

cod atc: s01xa20

ALCON; Gel. oft. cu 3 mg carbomer, manitol, 0,04 mg thiomersal (conservant antimicrobian), hidroxid de sodiu și apă purificată; ct. × 1 tub × 10 g (*OTC*)

Ind: Substituent de lacrimi pentru ameliorarea simptomelor uscăciunii și iritației oculare care pot să apară ca urmare a poluării mediului înconjurător sau umidității insuficiente a aerului.

Dz: Se instilează în sacul conjunctival câte o pic. de 2-4 ori/zi sau la nevoie.

Cind: Hipersensibilitate.

Al: Purătorii de lentile de contact. Șoferi și activități de precizie.

RA: Tulburări de vedere ocazionale și temporare, alergie de contact.

LASONIL N

Cod ATC: C05BA01

BAYER AG PHARMA; 100 g ung. conțin: 5000 HDB-E (Heparinoid Bayer Unit = 0,5 g) și 15000 U.I. hialuronidază; tub × 40 g (*OTC*)

Ind: Entorse, contuzii, hematoame, acumulări sau tumefieri la nivelul articulațiilor, cicatrice, hemoroizi, flebite

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CHOLINI SALICYLAS
CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M

DESCRIERE

INFO

MAALOX

[Cod ATC: A02AD01](#)

LAB. THERAPLIX; Cpr. mast. cu hidroxid de aluminiu 400 mg, hidroxid de magneziu 400 mg. Susp. orală; 100 ml conțin hidroxid de aluminiu 3,5 g, hidroxid de magneziu 4 g; ct. × 4 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 1 fl. × 250 ml (*OTC*)

Ind: Tulburări datorate hiperacidității gastrice. Gastrită, hernie hiatală, dispepsie, ulcer gastroduodenal, esofagită de reflux.

Dz: Cpr: 1-2 cpr. la nevoie sau la 90 de minute după masă. Flacon, susp. int.: 1-2 linguri la nevoie sau la 90 de minute după masă.

Cind: IR severă.

Al: Pacienți cu dializă renală cronică. Alte medicamente pot fi adm. după aproximativ 2 ore de la adm. antiacidului.

RA: Constipație, diaree.

MACMIROR COMPLEX

[Cod ATC: G01AX05](#)

DOPPEL FARMACEUTICI; Ung. vag.; 100 g ung. conțin: 10 g nifuratel și 4.000.000 U.I. nistatin; ct. × 1 tub × 30 g + aplicator (*P-RF*)

Ind: Afecțiuni vulvo-vaginale cu microorganisme patogene: Candida, Trichomonas, bacterii.

Dz: 2,5 g ung. de 1-2 ori/zi, seara și/sau dimineața.

Cind: Hipersensibilitate.

Al: Se va evita contactul sexual în timpul trat.

MACMIROR COMPLEX-500

[Cod ATC: G01AX05](#)

DOPPEL FARMACEUTICI; Ovule 500 mg nifuratel, 200.000 U.I. nistatin; ct. × 12 ovule (*P-RF*)

Ind: Afecțiuni vulvo-vaginale cu microorganisme patogene: Candida, Trichomonas, bacterii.

Dz: 1 ovul/zi profund în vagin, o dată pe zi înainte și după masă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CICLOPIROXUM
CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N

DESCRIERE

INFO

NAPHCON-A

[Cod ATC: S01GA51](#)

ALCON; Sol. oft. 1 ml conține: maleat de feniramină 3 mg, clorhidrat de nafazolină 0,25 mg; ct. × 1 fl. × 15 ml (OTC)

Ind: Afecțiuni oculare alergice sau inflamatorii.

Dz: 1-2 pic. la 3-4 ore sau mai rar, în ambii ochi, până la dispariția simptomelor.

Cind: Hipersensibilitate. Glaucom cu unghi închis.

RA: Oculare: rar, senzație de arsură sau înțepătură, mai ales la începutul tratamentului; dilatarea pupilei, creșterea tensiunii intraoculare. Sistemice, consecutive absorbției: hipertensiune arterială, tulburări cardiace, hiperglicemie.

NAPODOREN 30; NAPODOREN 60

[Cod ATC: N02AA59](#)

TERAPIA SA; Cpr. cu 30 mg sau 60 mg fosfat de codeină și 500 mg paracetamol; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Afecțiuni dureroase severe la adult, inclusiv primele faze ale durerilor neoplazice.

Dz: Doza se individualizează în funcție de severitatea durerii și de răspunsul individual al pacienților. În general, doza zilnică nu trebuie să depășească 200 mg fosfat de codeină. Comprimatele se administrează la intervale de 4-6 ore.

Cind: Hipersensibilitate la codeină și/sau paracetamol, insuficiență hepatică, insuficiență respiratorie, copii sub 15 ani, sarcină și alăptare, consumul de alcool etilic pe parcursul tratamentului.

Al: Prudență la vârstnici, pacienți cu traumatisme cranio-cerebrale, hipertensiune intracraniană, abdomen acut, insuficiență renală, hipertiroidism, boala Addison, hipertrofie de prostată, stricturi uretrale. Se poate dezvolta dependența de codeină, la administrare timp îndelungat. Codeina se află pe lista substanțelor dopante (interzisă la sportivi).

RA: Codeina: risc scăzut de dependență la dozele recomandate, timp limitat. Relativ frecvent au fost semnalate somnolență, cefalee ușoară, constipație, greață și vărsături. Paracetamol: rar, erupții cutanate alergice.

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5%

[Cod ATC: B05BB02](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CICLOSPORINUM
CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O

OCTENISEPT

[Cod ATC: G01AX66](#)

SCHULKE & MAYER; Sol. ext. cu octenidin 0,1% și fenoxietanol 2% (fl. × 50, 250 sau 1000 ml) (OTC)

Ind: Antiseptic în infecții vulvo-vaginale, cateterism al vezicii urinare, cavitatea bucală.

Dz: Aplicații locale.

OMEGAVEN

[Cod ATC: B05BA02](#)

FRESENIUS KABI; Emulsie perf. 100 ml conțin: ulei de pește înalt purificat 10,0 g, fosfatide purificate din ou 1,2 g, glicerol 2,5 g; ct. × 10 fl. × 50 sau 100 ml) (P-RF)

Ind: Nutriție parenterală ca aport exogen de acizi grași cu lanț lung omega-3 (mai ales ac. eicosapentanoic și docosahexanoic), când alimentația orală sau enterală este imposibilă, insuficientă sau contraindicată.

Dz: Doza zilnică 1-2 ml omegaven/kg și zi. Viteza max. de perfuzare 0,5 ml/ kg și oră.

Cind: Hipersensibilitate, tulb. ale metab. lipidic, boli hemoragice severe, diabet zaharat dezechilibrat, colaps cardiovascular, șoc, infarct miocardic recent, accident vascular cerebral, embolism, stare comatoasă nedefinită. IH și IR severe. Hipokaliemie, hiperhidratare, deshidratare hipotonă, stare metabolică instabilă, acidoze.

A!: Monitorizarea zilnică a nivelului trigliceridelor.

RA: Prelungirea timpului de sângerare, inhibarea agregării plachetare, hipertermie, frisoane, hiperemie, cianoză, scăderea apetitului, greață, vărsături, dispnee, cefalee, dureri toracice, dureri lombare, dureri osoase, priapism (foarte rar), HTA sau hTA, reacții anafilactice (eritem).

OPHTAME SONE-N

[Cod ATC: S01CA05](#)

DAR AL DAWA; Sol. oft. fosfat sodic de betametazonă B.P. 0,1% WV și neomicină sulfat 0,5% WV; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-RF)

Ind: Alergii și afecțiuni neinfecțioase sau infecțioase ale ochilor.

Dz: 1-2 picături 3-4 ori pe zi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CILAZAPRILUM
CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P

DESCRIERE

INFO

PANADOL EXTRA

[Cod ATC: N02BE51](#)

GLAXO SMITHKLINE; Cpr. cu paracetamol 500 mg, cofeină 65 mg; ct. × 1 blist. × 12 cpr. (OTC)

Ind: Analgezic mediu, antipiretic.

Dz: *Adulți inclusiv vârstnici:* 2 cpr. la 4 ore; max. 8 cpr. în 24 ore. Nu se recomandă copiilor sub 12 ani.

Cind: Copii sub 12 ani. Hipersensibilitate la paracetamol, cofeină sau excipienți.

Al: IR sau IH severă, hepatopatii alcoolice. Asocierea cu cafea sau ceai poate determina stări de excitabilitate nervoasă. Pozitivarea testelor antidoping.

RA: Hipersensibilitate, erupții cutanate, greață, insomnie, neliniște.

PANANGIN

[Cod ATC: A12BA30](#)

GEDEON RICHTER Ltd.; Cpr. film. aspartat de magneziu anhidru 175 mg și aspartat de potasiu anhidru 166 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (OTC)

Ind: medicație ajutătoare în trat. anginei pectorale. Controlul aritmiilor, în caz de infarct miocardic și în trat. stărilor post-infarct. Aritmii cauzate de intoleranță la digitalice, intoxicația cu digitalice. Aritmii: tahiaritmii, extrasistole ventriculare.

Dz: *Tulb. de circulație coronariană:* 2 cpr. film. de 3 ori pe zi. *Profilactic:* 3 cpr. film. pe zi.

Cind: IR acută și cronică.

PANZCEBIL

[Cod ATC: A09AA02](#)

BIOFARM SA; Dj. cu complex de enzime pancreatice 0,2 g, bilă de bou uscată 0,025 g, lichenază și hemicelulază 0,005 g; ct. × 2 blist. × 10 dj. (OTC)

Ind: Insuficiență secretorie digestivă pancreatică, în pancreatita cronică și în fibroza chistică pancreatică (la copii); dispepsii cu steatoree, tulburări digestive prin exces alimentar la persoane (profilactic și curativ), sprue, intoleranță la lactoză. Antidot în intoxicația cu alcool etilic sau sulfonamide, sau antibiotice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CIMETIDINUM
CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q

QUARELIN

Cod ATC: N02BB52

CHINOIN - Membru al SANOFI~SYNTHELABO GROUP; Cpr. cu metamizol 400 mg, cafeina 60 mg, drotaverină 40 mg; ct. × 1 blister × 10 cpr. (OTC)

Ind: Migrene (faza inițială a atacului migrenos) de intensitate ușoară și moderată, dureri de cap de origine hipertensivă forme episodice sau cronice), dureri de cap simptomatice (după traumatisme craniene, maladii intracraniene de origine vasculară și non-vasculară), manevre de introducere sau extragere a unor sonde din organism, infecții, tulburări metabolice, dureri în afecțiuni ale capului, gâtului, gurii, ochilor, nasului, urechilor, sinusurilor, dinților, altor părți ale capului și feței.

Dz: *Adulți*, doza medie: 1/2-1 cpr. de 2-3 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la pirazolone, porfirie hepatică, deficiență G-6-PDH, granulocitopenii, IH severă, IR severe, IC. Copii. Sarcină și alăptare.

Al: După adm. prelungite controlul hemogramei.

RA: Mai importante sunt cele induse de metamizol (agranulocitoză, leucocitopenie, trombocitopenie, anemie hemolitică, șoc anafilactic, erupții pe piele și mucoase).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CINNARIZINUM
CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R

DESCRIERE

INFO

REFORTAN; REFORTAN PLUS

[Cod ATC: B05AA07](#)

BERLIN CHEMIE AG; Sol. perf. 6% și 10%; 1000 ml sol. perf. conțin 60 g, respectiv 100 g poli (0-2-hidroxietil) amidon și 9,0 g clorură de sodiu; ct. × 10 fl. de sticlă sau pungi × 250 sau 500 ml (S)

Ind: Tratamentul și profilaxia hipovolemiei și șocului în intervenții chirurgicale, traumatisme, infecții, arsuri. Hemodiluție terapeutică.

Dz: Perfuzie i.v. continuă lentă. Doza și viteza de perfuzare depind de volumul de sânge pierdut și de valoarea hematocritului.

Cind: Hiperhidratare, hipervolemie, IC gravă, IR cu oligurie sau anurie, pacienți tratați prin dializă, hipersensibilitate la amidon, edem pulmonar, hemoragie intracraniană, coagulopatii severe, nou-născuți, sugari, copii.

Al: Administrarea se face numai sub supraveghere medicală de specialitate.

RA: Foarte rar reacții anafilactice (reacții cutanate, tahicardie, hTA, greață, vărsături, șoc, bronhospasm, stop cardiorespirator).

RENNIE

[Cod ATC: A02AC10](#)

HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. mast. cu carbonat de calciu 0,68 g carbonat de magneziu 0,08 g; ct. × 4 blist. × 6 cpr. mast. (OTC)

Ind: Hiperaciditate gastrică, pirozis, dispepsie.

Dz: *Adulți:* 1-2 cpr. mast. de 2-3 ori/zi, (maximum 12 cpr./zi) după mese sau în momentul durerii. *Copii de peste 6 ani:* 1 cpr. mast. de 2-3 ori/zi.

Cind: Tulburări renale grave.

Al: Poate reduce efectul altor medicamente adm. concomitent.

RA: Hipercalcemie la doze mari.

REPARIL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CINOLAZEPAMUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINUM
CISPLATINUM
CITALOPRAMUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S

DESCRIERE

INFO

SALIFORM FORTE[Cod ATC: M02ACN2](#)

ANTIBIOTICE SA; Cremă cu salicilat de metil 15 g, mentol 10 g și exci- pienti la 100 g; ct. × 1 tub × 25 g (*OTC*)

Ind: Înainte și după eforturi fizice susținute, pentru relaxarea musculaturii sau reducerea durerii de origine musculo-tendono-ligamentară.

Dz: Masaj local de 3-4 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate, plăgi deschise, iritații cutanate.

SALMET-T[Cod ATC: M02ACN1](#)

TIS FARMACEUTIC SA; Sol. ext. mentol 500 mg, salicilat de metil 500 mg, ulei de pin 150 mg, alcool 53 g, apă 45,85 g; fl. × 90 g (*OTC*)

Ind: Antireumatic, antiinflamator în dureri articulare sau musculare.

Dz: Masaj local de 3-4 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate.

SANA-SOL[Cod ATC: A11JAN1](#)

NYCOMED; Sirop cu vit. A 1000 UI, nicotinamidă 16,0 mg, vit. D₃ 400 UI, vit. B₆ 1,2 mg, vit. E 10,0 mg, vit. B₁₂ 2,5 g, vit. B₁ 1,1 mg, ac. pantotenic 4,0 mg, vit. B₂ 1,2 mg, vit. C 60,0 mg per 10 ml; ct. × 1 fl. × 250 ml (*OTC*)

Ind: Carențe vitaminice.

Dz: 10 ml (2 lingurițe) pe zi, după vârsta de 6 săpt.

SANADOR EXTRA[Cod ATC: N02BE51](#)

LAROPHARM SRL; Cpr. paracetamol 250 mg, propifenazonă 150 mg, cafeină 50 mg; ct. × 2 blist. × 6 cpr. (*OTC*)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CIPROFIBRATUM
 CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T

TACHOCOMB

[Cod ATC: B02BC01](#)

NYCOMED; Burete de collagen învelit în fibrinogen uman, trombină, aprotinină, riboflavină (pansament × 9,5 × 4,8 × 0,5 sau 2,5 × 3,0 × 0,5) **(S)**

Ind: Hemostază și alipire tisulară, mai ales în chirurgia organelor parenchimotoase: ficat, splină, pancreas, rinichi, plămâni, suprarenale, tiroidă, ganglioni limfatici; poate fi folosit și pentru oprirea hemoragiilor în intervențiile ORL, ginecologie, urologie, chirurgie vasculară sau ortopedică, traumatologie etc. Tratamentul profilactic al fistulelor biliare, limfatice și meningeale.

TACHOSIL

[Cod ATC: B02BC01](#)

NYCOMED; Burete căptușit absorbabil adeziv cu fibrinogen uman, trombină umană; ct. × 1 burete de 9,5 × 4,8 cm sau 3,0 × 2,5 cm; ct. × 2 bureți de 4,8 × 4,8 cm **(S)**

Ind: În chirurgie, pentru tratamentul suportiv al hemostazei, acolo unde tehnicile chirurgicale standard sunt insuficiente sau pot duce la rezultate clinice nesatisfăcătoare.

TARDYFERON FOL

[Cod ATC: B03AD03](#)

PIERRE FABRE; Dj. ret. cu 159 mg sulfat feros (50 mg fier), 0,35 mg acid folic, 50 mg mucoprotează, 30 mg acid ascorbic; ct. × 3 blist. × 10 dj. **(P-6L)**

Ind: Anemie feriprivă. Carență latentă în fier la femei fertile, în timpul sarcinii, post-partum în timpul perioadei de alăptare.

Dz: Anemii feriprive ușoare și carență latentă în fier: 1 cpr./zi dimineața. Anemii feriprive grave: 1 cpr. de 2 ori/zi, dimineața și seara.

TARKA

[Cod ATC: C09BB01](#)

ABBOTT; Cps. elib. modif. cu trandolapril 2 mg, verapamil 180 mg; ct. × 2 blist. × 14 cps. **(P-6L)**

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Toate](#)

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CIPROFLOXACINUM
 CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U

UBISTESIN

[Cod ATC: N01BB58](#)

ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH; Sol. inj. articaină clorhidrat 40 mg, adrenalină 5 µg/ml; ct. × 5 f.-cartuş × 1,7 ml (S)

UBISTESIN FORTE

[Cod ATC: N01BB58](#)

ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH; Sol. inj. articaină clorhidrat 40 mg, adrenalină 10 µg/ml; ct. × 5 f.-cartuş × 1,7 ml (S)

Ind: Anestezie locală sau locoregională dentară. Intervenții clasice: extracții simple fără complicații, extracții multiple, extracții de dinți incluși, trepanații, rezecții apicale, chiste, alveolectomii, prepararea cavităților, biopulpectomii, intervenții în țesuturi infectate, chirurgie maxilo-facială. Intervenții muco-gingivale.

UFT

[Cod ATC: L01BC53](#)

BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. cu 100 mg tegafur și 224 mg uracil; ct. × 7 blist. × 3, 4, 5 sau 6 cps. (S/P-RF)

Ind: Trat. cancerului de colon/rect, sân, stomac, cancere ORL, ficat, veziculă biliară, căi biliare, pancreas, vezică urinară și col uterin.

Dz: Doza zilnică standard este echivalentă cu 300-600 mg tegafur/zi (3-6 cps.), oral, în 2-3 doze pe zi. Cancere ORL: 600 mg/zi (6 cps.), oral, în 2-3 prize. Aceste recomandări pentru dozare vor fi de asemenea urmate în cazul în care UFT se adm. în combinație cu alți agenți antineoplazici. Ca și în cazul altor citostatice, dozele UFT pot fi crescute (fără a se depăși 600 mg pe zi) sau scăzută, funcție de toleranța pacientului.

Cind: Antecedente de hipersensibilitate. În asociere cu sau la mai puțin de 4 săpt. după trat. cu un agent antiviral halogenat, ca sorivudina. Sarcină și alăptare.

Al: Pacienți cu: mielodepresie, tulburări hepatice, tulburări renale, boli infecțioase, varicelă, ulcer gastric și/sau duodenal simptomatic, toleranță scăzută la glucoză. Se vor efectua cu regularitate teste funcționale hepatice, hemograma. Utilizarea sa, ca și a altor pirimidine fluorurate ca: tegafur, fluorouracil, floxuridina, doxofluridina și flucitozina, în combinație cu agenți antivirali halogenați, ca sorivudina, inhibă metabolismul pirimidinei fluorurate, crescând concentrația plasmatică. Concentrațiile crescute de pirimidină fluorurată pot avea efect toxic asupra sistemului nervos și mielodepresia cu sfârșit letal. Se asociază cu precauție, cu următoarele medicamente:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CISPLATINUM
 CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V

VAGOSTABYL

[Cod ATC: N07XX](#)

LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM; Dj. ce conțin extract hidroalcoolic uscat de păducel [extractum Crataegi (HA) siccum] 50 mg, extract hidroalcoolic uscat de melisă [extractum Melissa (HA) siccum] 45 mg, lactat de calciu pentahidrat 50 mg, tiosulfat de magneziu 10 mg; ct. × 1 tub × 40 dj. **(OTC)**

Ind: Adulți: tratamentul hiperexcitabilității cardiace, în absența oricărei afecțiuni cardiace. Copii și adulți: tratamentul simptomatic al stărilor de agitație psihică, în special în cazurile de tulburări ușoare ale somnului.

Dz: Adulți: hiperexcitabilitate cardiacă: 2 dj. de 1-3 ori pe zi, înainte de masă; tulburări ușoare ale somnului: 2 dj. la masa de seară și 2 drajeuri înainte de culcare. Copii mai mari de 6 ani: tulburări ușoare ale somnului: 1 dj. la masa de seară, 1 dj. înainte de culcare.

Cind: Hipersensibilitate (alergie) la oricare dintre componentii produsului; copii cu vârsta sub 6 ani.

Al: În sarcină și alăptare se adm. numai după evaluarea raportului beneficiu matern/risc potențial pentru făt sau sugar. Datorită efectului slab sedativ, poate influența negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

VENOTON

[Cod ATC: C05CA54](#)

EUROPHARM SA; Cps. cu troxerutin 200 mg, ac. ascorbic 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. **(OTC)**

Ind: Dureri și edeme ale membrelor inferioare cauzate de boli cronice ale venelor sau de origine traumatică. Ameliorarea durerilor cauzate de tratamentul varicelor cu injecții sclerozante. Hemoroizi, flebite, tromboflebite superficiale, stări postflebitice, tulburări trofice, dermite varicoase. Entorse, dureri și crampe musculare. Afecțiuni însoțite de fragilitate capilară: hemoragiile retiniene din ateroscleroză, HTA și diabet.

Dz: Oral, doza de atac: 1 cps. de 2-3 ori/zi în timpul meselor. Doza de întreținere este 1 cps./zi, 2-4 săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la una din componentele produsului.

Al: Dozele excesive pot favoriza formarea de calculi urinari. Bolnavi cu hemocromatoză, talasemie, anemie sideroblastică, bolnavi care primesc frecvent transfuzii de sânge, alcoolici cu deficit de folat. Sarcină și alăptare.

VAGOSTABYL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CITALOPRAMUM
 CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W

WICK INHALER; WICK VAPORUB**Cod ATC: R01AX10, R05XN01**

PROCTER & GAMBLE; Creion nazal (aplicator nazal); Ung. 100 g conțin: camfor 5,46 g, mentol 2,82 g, ulei de eucalipt 1,35 g, ulei de turpentine 4,71 g; fl. × 12, 40 sau 90 g (*OTC*)

Ind: Acțiune decongestivă în infecții respiratorii ale căilor superioare.

Dz: Se aplică un strat gros de unguent pe fața anterioară a toracelui și pe gât de 2-3 ori pe zi.

WO BENZYM**Cod ATC: M09AX**

MUCOS PHARMA; Dj. gastrorez. cu pancreatină 100 mg, tripsină 24 mg, chimotripsină 1 mg, bromelină 45 mg, papaină 60 mg, amilază 10 mg, lipază 10 mg, rutozid trihidrat 50 mg; ct. × 2 blist. × 20 dj. (*OTC*)

Ind: medicație adjuvantă în diferite afecțiuni cu componentă inflamatorie: tromboflebită și sindrom posttrombotic, inflamații ale tractului urogenital, boli reumatice; stări inflamatorii de natură traumatică sau consecutive intervențiilor chirurgicale stomatologice și altor intervenții minore; inflamații provocate de iradiere.

Dz: *Adulți:* 2-3 dj. de 3 ori/zi, cu 1-1½ oră înainte meselor de dimineață, prânz și seară. Doza maximă este de 10 dj. de 3 ori/zi.

Al: Prudență în caz de deficit de coagulare congenital sau dobândit, IH avansată, afecțiuni renale, intervenții chirurgicale planificate sau tendință la reacții alergice. Sarcină și alăptare.

RA: Senzație de plenitudine, flatulență, ocazional, greață; consistența, culoarea și mirosul scaunelor pot fi modificate. Rar, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLADRIBINUM
 CLARITHROMYCINUM
 CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X

XALCOM**Cod ATC: S01ED51**

PHARMACIA & UPJOHN; Sol. oft. 1 ml conține latanoprost 50 µg și maleat de timolol 5 mg; ct. × 1 fl. × 2,5 ml (*P-6L*)

Ind: Scăderea presiunii intraoculare crescute la pacienți cu hipertensiune oculară sau glaucom cu unghi deschis, care prezintă intoleranță sau răspund insuficient la alte medicamente ce scad presiunea intraoculară.

Dz: 1 pic. o dată pe zi, în ochiul afectat, de preferință dimineața.

Cind: Hipersensibilitate la latanoprost, timolol sau la oricare din componentele produsului. Astm bronșic sau antecedente de astm bronșic, bronhopneumopatie cronică obstructivă severă. Bradicardie sinusală, bloc atrio-ventricular de gradul II sau III, insuficiență cardiacă insuficient controlată prin tratament, șoc cardiogen.

Al: *Xalcom* conține clorură de benzalconiu care se poate depune în lentilele de contact moi, de aceea *Xalcom* nu trebuie administrat în timpul folosirii acestor lentile. Lentilele trebuie îndepărtate înaintea administrării picăturilor și nu trebuie reaplicate mai devreme de 15 minute. *Xalcom* poate modifica treptat culoarea ochilor prin creșterea numărului de melanozomi (granule de pigment) în melanocite. Șoferi și activități de precizie.

RA: Hiperpigmentarea irisului, iritație oculară cu senzație de înțepătură, arsură și prurit, hiperemie conjunctivală, keratită, conjunctivită, blefarită, durere oculară, cefalee și erupție cutanată.

XILINĂ CU ADRENALINĂ**Cod ATC: N01BB52**

SICOMED SA; Sol. inj.; f. × 2 ml conținând 0,04 g de clorhidrat de lidocaină și 0,00001 g adrenalină; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 2 ml (*S/P-RF*)

Ind: Anestezie de infiltrație, spinală, de conducere în chirurgie generală, buco-maxilo-dentară.

Dz: Infiltrații locale, uzual 1-2 f. Eventual se poate crește doza, nu mai mult de 4 fiole.

Cind: Alergie la lidocaină, IC gravă și tireotoxicoză. Nu se utilizează în anestezia degetelor, a urechilor, a nasului, a penisului sau a scrotului, deoarece poate produce necroze ischemice.

Al: Prudență sau se evită la bolnavii cu HTA, ASC avansată, tulburări grave de conducere intracardiacă, cardiopatie ischemică. Prudență la copii sau bolnavi cu stare generală alterată. Șoferi și activități de precizie.

RA: Lidocaina provoacă relativ frecvent somnolență și amețeli, uneori reacții alergice. Supradozarea poate produce hipotensiune, paloare, sudorație, greață, vomă, fasciculații, convulsii, depresie respiratorie, tulburări de ritm și/sau

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLARITHROMYCINUM
CLEMASTINUM
CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y

YASMIN**Cod ATC: G03AA12**

SCHERING AG; Cpr. film. cu drospirenonă 3 mg, etinilestradiol 0,03 mg; ct. × 1 blist. × 21 cpr. (P-6L)

Ind: Contraceptiv sistemic.

Dz: Câte 1 dj. pe zi începând din prima zi a ciclului (după calendar).

Cind: Tromboflebită acută, procese tromboembolice, condiții de apariție a infarctului de miocard sau a accidentului vascular cerebral, diabet zaharat cu deteriorarea vaselor sanguine, boli hepatice grave, icter, tumori estrogen-dependente, hiperplazie endometrială, neoplasm mamar, sângerări vaginale nediagnosticate, sarcină și alăptare, hipersensibilitate.

Al: Femeile după 30 de ani. Fumatul. Femei supraponderale. HTA. Migrene.

RA: Tromboză, creșterea frecvenței apariției neoplasmului cervical, sensibilitate a sânilor, dureri și secreții, dureri de cap, modificări ale libidoului, stări depresive, intoleranță la lentilele de contact, greață, vărsături, modificări ale secreției vaginale, diverse reacții ale pielii, retenție hidrică, modificări ale greutateii corporale, reacții de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLEMASTINUM
 CLINDAMYCINUM
 CLOBETASOLUM
 CLOBUTINOLUM
 CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z

ZALDIAR

[Cod ATC: N02AX52](#)

GRUNENTHAL; Cpr. film. cu 37,5 mg tramadol și 325 mg paracetamol; ct. × 1, 2, 3 sau 5 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Tratamentul durerii de intensitate moderată sau severă.

Dz: Adulți și adolescenți peste 12 ani. Doza inițială: 2 cpr. film. Dacă este necesar, alte comprimate pot fi administrate la intervale de timp de cel puțin 6 ore. Totuși, nu trebuie să utilizați mai mult de 8 comprimate pe zi (echivalente cu o doză zilnică de 300 mg clorhidrat de tramadol și 2600 mg para-cetamol). Perioada de tratament trebuie să fie cât mai scurtă posibil.

Cind: Hipersensibilitate la tramadol sau paracetamol, sarcină și alăptare, asocierea cu alcool, medicamente deprimante SNC (hipnotice, tranchilizante, alte analgezice cu acțiune centrală), administrarea în ultimele două săptămâni a antidepressivelor sau antiparkinsonienelor inhibitoare ale monoaminoxidazei, boli hepatice grave, boală epileptică, în cazul în care convulsiile nu sunt controlate terapeutic în mod adecvat.

Al: Trebuie evitată administrarea concomitentă a altor medicamente ce conțin tramadol sau paracetamol. Se impune prudență mare în caz de: afectare hepatică, tulburări biliare, boli renale, insuficiență respiratorie, presiune intracraniană crescută, administrarea analgezicelor buprenorfină, nalbupină sau pentazocină.

RA: Foarte frecvente: greață, amețeli, somnolență. Frecvente: vărsături, tulburări digestive (constipație, accelerarea tranzitului intestinal, diaree, gastralgii), prurit, transpirații, uscăciunea gurii, durere de cap, tremor, confuzie, tulburări ale somnului, tulburări nervos centrale (anxietate, nervozitate, euforie). Mai puțin frecvente: tulburări cardiace, creșterea frecvenței pulsului sau a tensiunii arteriale, dificultăți sau durere la micțiune, reacții cutanate (de exemplu erupții cutanate), parestezii, tinitus, depresie, coșmaruri, halucinații, dificultate în deglutiție, sânge în materiile fecale, bufeuri, durere în piept, greutate în respirație, contracții musculare involuntare. Rare: convulsii, tulburări de coordonare a mișcărilor, dependență, vedere neclară.

ZINCOMETIL

[Cod ATC: S01AX03](#)

FARMILA FARMACEUTICI; Sol. oft. cu sulfat de zinc 0,02 mg, clorură de benalconiu 0,01 g, excipienți: clorură de sodiu, citrat de sodiu, ac. citric, monooleat de polioxietilensorbitan, blue patent V, apă distilată per 100 ml; ct. × 1 fl. cu dop picător × 15 ml (*OTC*)

Ind: Soluție dezinfectantă pentru uz oftalmic

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLINDAMYCINUM
CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z

COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT

Cod ATC: B03AB04

FERRUM HAUSMANN VIFOR; Sol. orală, 1 ml sol. conține 50 mg fer (III), sub formă de complex hidroxid de fer (III)-polimaltozat 178,6 mg; ct. × 1 flac. × 30 ml sol. orală (**P-6L**)

FERRUM HAUSMANN VIFOR; Sirop, 1 ml conține 10 mg fer (III), sub formă de complex hidroxid de fer (III)-polimaltozat 35,7 mg; ct. × 1 flac. × 150 ml (**P-6L**);

FERRUM HAUSMANN VIFOR; Sol. inj. i.m., 2 ml conțin 100 mg fer sub formă de complex hidroxid de fer (III)-polimaltozat 318 mg; ct. × 5 f. × 2 ml (**P-RF**)

PHARMA-FERRUM® TERAPIA SA; Sol. orală 5%; ct. × 1 fl. × 30 sau 50 ml (**P-6L**)

Ind: *Sirop:* Tratamentul carenței latente de fer și al anemiei feriprive (carența de fer manifestă). Profilaxia carenței de fer în timpul sarcinii. *Sol. orală:* Profilaxia carenței de fer pentru a acoperi aportul zilnic recomandat femeilor în timpul sarcinii și alăptării, precum și la copii, adolescenți, femei fertile, adulți (ex. vege-tarieni și vârstnici). *Sol. inj.:* Tratamentul carenței de fer când preparatele orale cu fer nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate: pacienți care nu tolerează sau nu răspund la terapia orală cu fer, cu malabsorbție, pacienți non-complianți la terapia orală cu fer, afecțiuni gastro-intestinale (ex. colita ulceroasă) care pot fi agravate de o terapie orală cu fer. Administrarea la copii sub 4 luni nu este indicată.

Dz: *Sirop, Sol. orală:* Anemie feriprivă (carența de fer manifestă): tratamentul durează aproximativ 3-5 luni, până la normalizarea valorilor hemoglobinei. Tratamentul trebuie continuat câteva săptămâni sau, în cazul femeilor gravide, cel puțin până la sfârșitul sarcinii, cu un dozaj asemănător celui descris în cazul carenței latente de fer, pentru refacerea depozitelor de fer. Carența latentă de fer: tratamentul durează aproximativ 1-2 luni. Administrarea se face în timpul mesei sau imediat după masă și se poate amesteca cu sucuri de fructe și legume sau cu alimente administrate cu biberonul. Se utilizează flacoanele dozatoare, doza putând fi divizată sau nu în mai multe prize.

Sirop: Carența de fer manifestă clinic: *copii până la 1 an*, 2,5-5 ml/zi (25-50 mg fer); *copii 1-12 ani*, 5-10 ml/zi (50-100 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează*, 10-30 ml/zi (100-300 mg fer); *gravide*, 20-30 ml/zi (200-300 mg fer). Carența latentă de fer: *copii 1-12 ani*, 2,5-5 ml/zi (25-50 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează*, 5-10 ml/zi (50-100 mg fer); *gravide*, 10 ml/zi (100 mg fer). *Profilaxie:* *gravide*, 5-10 ml/zi (50-100 mg fer).

Sol. orală: Anemie feriprivă: *copii până la 1 an*, 10-20 picături/zi (25-50 mg fer); *copii 1-12 ani*, 20-40 picături/zi (50-100 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează*, 40-120 picături/zi (100-300 mg fer); *gravide*, 80-120 picături/zi (200-300 mg fer), *prematuri*, 1-2 picături/kg și zi timp de 3-5 luni (2,5-5 mg fer). Carența latentă de fer: *copii până la 1 an*, 6-10 picături/zi (15-25 mg fer); *copii 1-12 ani*, 10-20 picături/zi (25-50 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează*, 20-40 picături/zi (50-100 mg fer); *gravide*, 40 picături/zi (100 mg fer). *Profilaxie:* *copii până la 1 an*, 2-4 picături/zi (5-10 mg fer); *copii 1-12 ani*, 4-6 picături/zi (10-15 mg fer); *copii peste 12 ani, adulți, femei care alăptează*, 4-6 picături/zi (10-15 mg fer); *gravide*, 20-40 picături/zi (50-100 mg fer).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLOBETASOLUM
CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA

Cod ATC: B03AC

VENOFER® VIFOR; Sol. inj./perf. i.v. 20 mg/ml fer (III); ct. × 5 f. × 5 ml (S/P-RF)

Ind: Trat. carenței de fer când preparatele orale cu fer nu sunt suficient de eficiente, sunt ineficiente sau nu pot fi utilizate.

Dz: Adm. inj., exclusiv i.v., doza trebuie calculată pentru fiecare pacient în funcție de gradul carenței de fier. Posologie obișnuită: *Adulți*: 100 mg fier/zi, *copii*: dozare în funcție de greutate. Doza max. zilnică: *copii* < 5 kg: 25 mg, *copii* între 5 și 10 kg: 50 mg, *adulți*: 200 mg. Înaintea adm. primei doze se poate efectua un test de toleranță adm. 1/4-1/2 fer polimaltozat (25-50 mg fier) la adulți și jumătate din doza zilnică la copii.

Cind: Hipersensibilitate la produs; anemia necauzată de carența de fier; supraîncărcare cu fier; tulburări în utilizarea fierului; sindrom Osler-Rendu-Weber; poliartrită cronică; astm bronșic; afecțiuni renale infecțioase în fază acută; hiperparatiroidism necontrolat; ciroză hepatică decompensată; hepatită infecțioasă; primul trimestru de sarcină; adm. i.v.

Al: Adm. parenteral poate cauza reacții alergice și anafilactoides. Se va acorda atenție sporită pacienților cu alergii, IR și IH. Incidența efectelor nedorite la pacienții cu angiocardioapie poate crește complicațiile cardiovasculare. Pacienții cu astm bronșic, pacienții cu capacitate de legare a fierului scăzută și/sau deficiență de acid folic sunt, în mod particular, predispuși la reacții alergice sau anafilactice. Adm. parenteral, preparatele cu fier pot influența nefavorabil evoluția infecțiilor la copii. Adm. concomitentă a IEC poate crește efectul sistemic al preparatelor parenterale cu fier.

RA: Dureri articulare, inflamarea ganglionilor limfatici, febră, cefalee, ame- țeală, tulburări abdominale, greață, vomă, foarte rar reacții alergice sau anafilactoides, o tehnică de inj. necorespunzătoare determină pigmentarea pielii, durere și inflamație la locul adm.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLOBUTINOLUM
CLOMIFENUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM

Cod ATC: B03BA

SICOVIT® B₁₂ 50 µg/ml; SICOVIT® B₁₂ 1000 µg/ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 50 µg/ml, 1000 µg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml (P-RF)

Ind: Anemii pernicioase și parapernicioase. Anemie megaloblastică după gastrectomie sau asociată cu tulburări gastrointestinale. Anemii ale hepaticilor; anemii toxiinfecțioase, debilitate, convalescență, astenie, prematuri. Anorexie, denutriție. Osteoporoză, osteoartrită. Polinevrite alcoolice, diabetice, nevrite, nevralgii cervicobrahiale și faciale, Zona zoster. Ciroze hepatice, hepatite cronice, oliguria hepaticilor.

Dz: I.m., în anemia pernicioasă 100-1000 µg/zi, 2 săptăm., apoi o dată pe lună; în nevrite 1000 µg/zi.

Cind: Policitemii, boli precanceroase.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLOMIFENUM
 CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM

Cod ATC: L01AA01

ENDOXAN® 200 mg; ENDOXAN® 500 mg; ENDOXAN® 1 g SINDAN SRL/BAXTER ONCOLOGY; Pulb. pt. sol. perf./inj. i.v. 200 mg, 500 mg, 1000 mg; ct. × 1 fl. (S)

ENDOXAN® 50 mg BAXTER ONCOLOGY; Dj. 50 mg; ct. × 5 blist. × 10 dj. (S/P-RF)

Ind: Ca medicație anticanceroasă (leucemii limfatice sau mieloide acute și cronice, limfoame maligne hodgkiniene și nonhodgkiniene, plasmocitom, tumori maligne solide, inclusiv metastaze - carcinom ovarian și testicular, carcinom mamar, carcinom bronșic, neuroblastom, sarcom Ewing). Ca medicație imunodepresivă (evitarea rejektului transplantelor de măduvă și alte organe; trat. în unele boli autoimune severe - poliartrită reumatoidă, artropatie psoriazică, lupus eritematos diseminat, sclerodermie, vasculite sistemice, nefropatii autoimune corticorezistente, miastenia gravis, anemii hemolitice autoimune, siclemie).

Dz: Dozele de ciclofosamidă, intervalele între doze, durata trat. și schemele derapeutice (monoterapie, polichimioterapie) sunt în funcție de indicații. Adm. numai i.v., de preferință în perf.: 3-5 mg/kg/zi, ca trat. de întreținere; 10-15 mg/kg la intervale de 2-5 zile; 20-40 mg/kg la intervale de 21-28 zile După ce s-a obținut o remisiune satisfăcătoare, terapia de întreținere cu dj: 50-200 mg/zi, dimineața cu cantități mari de lichide.

Cind: Hipersensibilitate la ciclofosamidă sau la oricare dintre componentii produsului, aplazie medulară, infecții acute, cistită hemoragică. Sarcină și alăptare.

Al: În prezența mielodepresiei și în funcție de severitatea acesteia, adm. ciclofosamidei se întrerupe, se crește intervalul între doze sau dozele se micșorează. Este necesar controlul regulat al hemogramei. Înainte de începerea trat. este necesară combaterea eventualelor infecții. Pentru pacientele de vârstă fertilă sunt necesare măsuri contraceptive în timpul trat. și cel puțin 3 luni după oprirea acestuia. Prudență și reducerea dozelor la pacienții debilitați și în caz de IH sau IR. Înainte de începerea trat. trebuie măsurată diureza pacientului și se efectuează examenul urinei. Este necesar controlul periodic al sedimentului urinar. Este necesară hidratarea corespunzătoare și asocierea de mesna pt. prevenirea cistitei hemoragice. Precauție în cazul asocierii cu: alți agenți care pot afecta măduva hematopoietică, alopurinol, hidroclorotiazidă, antracicline (doxorubicină, daunorubicină etc.), antidiabetice, suxametoniu, indometacină, inductoare enzimatic (fenobarbital, fenitoină, rifampicină), inhibitoare enzimatic (cloramfenicol, cimetidină), vaccinuri vii atenuate. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Deprimarea hematopoiezei (îndeosebi granulopoieza și limfopoieza), hematurie, cistită hemoragică sterilă, azoospermie, amenoree, afectarea gonadelor în perioada prepuberală, afectarea inimii manifestată prin tahiaritmii și IC, alopecie, greață, vărsături, ulceratii ale mucoasei digestive, diaree, anorexie; rar, hepatotoxicitate cu modificări ale valorii testelor de laborator (LDH, SGOT, CPK, fosfataza alcalină, bilirubină); tulburări ale metabolismului glucidic - hiperglicemie; retenție hidrică cu hiponatremie și fenomene de intoxicație cu apă, are proprietăți carcinogene (risc de dezvoltare a unor tumori secundare - carcinoame ale căilor urinare, modificări mielodisplazice,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLOMIPRAMINUM
 CLONAZEPAMUM
 CLONIDINUM
 CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM

HELPOCERIN HELP PHARM.; Cps. 250 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (S/P-RF)

Ind: În trat. tuberculozei active pulmonare și extrapulmonare, când trat. cu antituberculoase majore (streptomicină, izoniazidă, rifampicină, etambutol) s-a dovedit a fi inefficient. Cicloserina trebuie adm. în asociere cu o chimioterapie eficientă și nu ca agent terapeutic unic. Cicloserina este eficientă în tratarea infecțiilor urinare acute produse de specii sensibile de bacterii gram-negativ și gram-pozitiv, îndeosebi *Enterobacter* sp. și *Escherichia Coli*.

Dz: 0,5-1 g cicloserină/zi, po în 2 prize. Se recomandă ca la inițierea trat. (în primele 2 săptăm.) să se adm. oral 0,5 g de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la cicloserină; epilepsie; depresie, anxietate; psihoze; IR severă; alcoolism cronic.

Al: Înainte de începerea trat. cu cicloserină trebuie stabilită sensibilitatea organismului la med. și se vor realiza culturi. În cazul inf. tuberculoase trebuie testată sensibilitatea la alte antituberculoase din aceeași grupă. Adm. med. trebuie întreruptă sau dz. redusă dacă pacientul prezintă dermatite alergice sau convulsii, psihoze, somnolență, depresii, confuzie, hiperreflexie, cefalee, tremor, amețală, parestezii, dizartrie. Indicele terapeutic în tuberculoză este mic. Există un risc mai mare de convulsii la alcoolici. Pacienții trebuie monitorizați d. p. d. v. hematologic, al funcțiilor hepatice și renale. Med. anticonvulsivante sau sedativele pot fi eficiente în controlarea simpt. de toxicitate asupra SNC cum ar fi convulsiile, anxietatea sau tremorul. Pacienții cărora li s-a administrat o doză de cicloserină mai mare de 500 mg pe zi trebuie monitorizați din acest punct de vedere. Administrarea cicloserinei și a altor antituberculoase a fost asociată în unele cazuri cu deficiența vitaminei B₁₂ și/sau cea a acidului folic, cu anemie megaloblastică și anemie sideroblastică. Dacă semnele anemiei apar în timpul tratamentului, trebuie aplicată o terapie adecvată. Se recomandă determinarea conc. plasm. a cicloserinei cel puțin o dată pe săptămână la pacienții cu IR, care primesc doze zilnice mai mari de 500 mg. Dz. trebuie ajustată astfel încât conc. plasm. să nu depășească 30 μg/ml.

Inter. med.: S-a demonstrat că administrarea concomitentă a etionamidelor are efecte neurotoxice. Alcoolul și cicloserina sunt incompatibile, în special când cicloserina este administrată în doze mari. Alcoolul mărește riscul de apariție a convulsiilor. Administrarea concomitentă a izoniazidei poate duce la creșterea efectelor asupra SNC (amețală sau somnolență).

RA: SNC: convulsii, somnolență, cefalee, tremor, amețală, confuzie, stări depresive, pierderi de memorie, manifestări psihotice, posibil însoțite de tendințe la suicid, schimbări de caracter, hiperiritabilitate, pareze, agresivitate, parestezii, comă. **Aparat cardiovascular:** scăderea bruscă a TA la pacienții cărora li s-a adm. 1-1,5 g/zi. Reacții alergice, erupții cutanate. Creșteri ale transaminazelor serice, în special la pacienții cu afecțiuni hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLONAZEPAMUM
CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM

Cod ATC: R06AX02**CIPROHEPTADINĂ 4 mg** MAGISTRA C&C; Cpr. 4 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)**PERITOL** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 4 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)**PERITOL** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sirop 2 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-6L)

Ind: Rinită alergică și vasomotorie, dermatită de contact și alte dermatoze alergice pruriginoase, prurit în varicelă, reacții locale la înțepături de insecte, alergii medicamentoase, profilaxia reacțiilor alergice la sânge și plasmă, adjuvant în trat. șoc anafilactic; cefalee vasculară și histaminică; sindrom Dumping postgastrectomie, hipermotilitate intestinală prin carcinoid, carcinoid gastric secretor de serotonină și histamină; inapetență, mai ales la copii.

Dz: *Adulți:* 4-12 mg/zi. *Copii între 6 luni și 1 an:* - numai în mod excepțional - 0,4 mg/kg/zi; *între 3 și 6 ani:* 6 mg/zi; *între 7 și 14 ani:* 12 mg/zi.

Cind: Glaucom cu unghi îngust, stenoză pilorică, adenom de prostată, bătrâni, debilitați, copii sub 2 ani. Nu se asociază cu IMAO.

Al: Prudență în astmul bronșic, hipertiroidism, boli cardiovasculare, HTA. Prudență când se asociază cu băuturi alcoolice, deprimante centrale, antidepresive triciclice. Prudență în timpul sarcinii și alăptării. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Somnolență, uscăciunea gurii, anorexie, tulburări de micțiune, amețeli, confuzie și ataxie, fenomene de excitație la copii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLONIDINUM
CLOPIDOGRELUM
CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM

Cod ATC: G03HA01**ANDROCUR** SCHERING AG; Cpr. 50 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr.; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (*P-RF*)

Ind: Carcinom de prostată inoperabil, devieri de comportament datorate excesului de androgeni, tendință de androgenizare la femei, pubertate precoce.

Dz: Combaterea efectului androgen adrenocortical după orhiectomie - 100-200 mg/zi; fără orhiectomie - 100 mg de 2-3 ori/zi, fără întrerupere, până la realizarea efectului terapeutic dorit. Combaterea creșterii testosteronului în trat. cu antagoniști LH-RH - inițial 100 mg de 2 ori pe zi, 5-7 zile, apoi 100 mg de 2 ori/zi, 3-4 săpt., asociat cu un antagonist LH-RH. În trat. excitabilității sexuale masculine exacerbate: 50-100 mg de 2 ori/zi (pe perioade scurte: 100 mg de 3 ori/zi). Pentru întreținerea efectului se va utiliza doza minimă eficientă.

Cind: Afecțiuni hepatice, femei însărcinate sau care alăptează, depresii cronice severe, tulburări tromboembolice, modificări vasculare grave în cadrul diabetului zaharat.

RA: Tulburări de spermatogeneză și dinamică sexuală, ginecomastie, scăderea cortizolului circulant, modificări hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLOPIDOGRELUM
 CLORAZEPAS DIKALII
 CLOTRIMAZOLUM
 CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
CYTARABINUM

Cod ATC: L01BC01

ALEXAN® HEINRICH MACK; Sol. inj. 20 mg/ml, 50 mg/ml; ct. × 1, 5 sau 10 fl. × 2 sau 5 ml (20 mg/ml), ct. × 1, 5 sau 10 fl. × 10 sau 20 ml (50 mg/ml) **(S)**

CYTOSAR™ PHARMACIA & UPJOHN; Pulb. pt. sol. inj. 100 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 fl. × 5 ml solv. **(S)**

Ind: Leucemia acută non-limfocitară la adult și copil. Leucemia acută limfocitară. Leucemia mielocitară cronică (faza blastică).

Dz: *Adulți și copii:* Terapia de inducție a leucemiei acute non-limfocitare: 100 mg/m²/zi, în p.i.v. sau 100 mg/m² i.v. la interval de 12 ore (zilele 1 până la 7). Adm. intratecală în leucemia cu afectare meningeală: 5-75 mg/m², o dată/zi, timp de 4 zile sau o dată la 4 zile. Schema de tratament folosită depinde de tipul și severitatea manifestărilor clinice și de răspunsul la terapia anterioară.

Cind: Hipersensibilitate la citarabină.

Al: Atenție la pacienții cu supresie medulară indusă anterior de medicamente. Monitorizarea leucocitelor și trombocitelor. Se va lua în considerare întreruperea sau modificarea terapiei în cazul trombocitelor < 50000 sau a PMN < 1000/mm³. Nu se va folosi un diluant ce conține alcool benzilic. Tromboflebita a apărut la unii pacienți la locul de punționare venoasă. Pacienții cu afectare renală sau hepatică pot avea un risc mai mare de toxi-citate a SNC după terapia cu doze mari. Controale regulate ale măduvei spinării, ale funcției ficatului și rinichiului. Trebuie monitorizate nivelele serice de acid uric. Precauție în cazul asocierii cu: alți agenți antineoplazici sau mielosupresivi sau cu radioterapie, digoxină, gentamicină. Precauție la femei însărcinate sau care alăptează.

RA: Anemie, leucopenie, trombocitopenie, megaloblastoză, modificări morfologice celulare la nivelul măduvei spinării și pe frotiul periferic; infecții virale, bacteriene, fungice, septicemie, pneumonie; sindromul citarabină (febră, mialgie, durere osoasă, câteodată durere toracică, rash maculopapular, conjunctivită, stare de rău general); anorexie, diaree, inflamație sau ulceratie orală sau anală, durere abdominală; durere în gât, ulceratii esofagiene, esofagită, febră, rash, prurit, ulceratia pielii, tromboflebită; celulită la nivelul locului de punționare; afectare renală; toxicitate nervoasă, amețeală; anafilaxie, edem alergic; durere toracică; pericardită, dispnee, cefalee. Uneori, la doze mari, toxicitate severă uneori fatală a SNC, toxicitate corneană reversibilă și conjunctivită hemoragică; afectare cerebrală și cerebelară cu modificări de personalitate, somnolență și comă; septicemie și abces hepatic; edem pulmonar; afectare hepatică cu hiperbilirubinemie; necroză intestinală; colită necrozantă, neuropatie periferică motorie și senzitivă, pneumonie interstițială difuză, alopecie, cardiomiopatie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLORAZEPAS DIKALII
CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM

Cod ATC: L01AX04

DACARBAZIN LACHEMA 100; DACARBAZIN LACHEMA 200 LACHEMA; Liof. pt. sol. inj. 100 mg, 200 mg; ct. × 10 fl. (S)
DALTRIZEN® 200 mg SINDAN SRL; Pulb. pt. sol. perf. 200 mg; ct. × 1 fl. (S)

Ind: Melanom malign, maladia Hodgkin, leiomiosarcom, fibrosarcom, rabdomiosarcom, neuroblastom.

Dz: Soluția diluată: 10 mg/ml poate fi adm. inj. i.v. ca atare în aprox. 1 min sau p.i.v. în aprox. 30 min. *Melanomul malign:* 2-4,5 mg/kg/zi, de 10 zile, cu repetarea curei după 4 săpt. sau 250 mg/kg/zi timp de 5 zile, repetându-se după 3 săpt. (mono- sau polichimioterapie). *Maladia Hodgkin:* adulți: 150 mg/m²/zi timp de 5 zile, cura repetându-se la 4 săpt.

Cind: Hipersensibilitate la dacarbazină, nr. de leucocite < 3000/ mm³ și trombocite < 100000/mm³, sarcină și alăptare.

Al: Monitorizare hematologică: controlul nr. de leucocite, trombocite și eritrocite; asocierea cu fenobarbital și fenitoină.

RA: Greață, vărsături, anorexie, diaree, stomatită; rash, eritem; leuco- și trombocitopenie; parestezii faciale tranzitorii, alopecie, creșterea valorilor TGO și TGP, simptome asemănătoare gripei - febră, mialgii și indispoziție.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AA08

CLOTRIMAZOLUM
CLOZAPINUM
CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM

ZENAPAX® HOFFMANN LA ROCHE; Conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 1 sau 3 fl. × 5 ml (S)

Ind: Profilaxia rejecției acute de organ în transplantul renal alogen de novo, asociat cu un trat. cu imunosupresive, incluzând ciclosporină și glucocorticoizi, la pacienții care nu sunt hiperimunizați.

Dz: *Adulți:* 1 mg/kg. Concentratul se diluează în 50 ml soluție salină izotonă și se adm. i.v. timp de 15 min. Inițial, trebuie adm. în cele 24 h înainte de transplant. Dozele următoare trebuie adm. la intervale de 14 zile, până la un total de 5 doze.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la daclizumab sau la componentii produsului; sarcină și alăptare.

A!: Nu există experiență privind utilizarea daclizumabului la pacienții hiperimunizați. Se vor lua precauții pentru combaterea reacțiilor severe de hipersensibilitate. Pacienții tratați cu imunosupresive după transplant, prezintă risc crescut de dezvoltare a afecțiunilor limfoproliferative și a infecțiilor oportuniste. Nu există experiență la copii.

RA: Tulburări gastrointestinale (constipație, greață); edeme ale membrelor, tulburări ale SNC și periferic, tulburări ale aparatului urinar, durere posttraumatică, HTA, tulburări ale aparatului respirator, tulburări ale pielii și anexelor, tulburări musculo-scheletice, episoade infecțioase, tulburări limfoproliferative post-transplant, reacții severe de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CLOZAPINUM
 CODEINUM
 CODERGOCRINUM
 COLCHICINUM
 COLECALCIFEROLUM
 COLISTINUM
 COMBINATII - LIT.A
 COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM

Cod ATC: B01AB04

FRAGMIN 2500 UI/0,2 ml PFIZER; Sol. inj., 0,2 ml conțin 2500 UI (anti-Xa); ct. × 10 seringi preumplute × 0,2 ml (S/P-RF)
FRAGMIN 5000 UI/0,2 ml PFIZER; Sol. inj., 0,2 ml conțin 5000 UI (anti-Xa); ct. × 10 seringi preumplute × 0,2 ml (S/P-RF)
FRAGMIN 7500 UI/0,3 ml PFIZER; Sol. inj., 0,3 ml conțin 7500 UI (anti-Xa); ct. × 10 seringi preumplute × 0,3 ml (S/P-RF)
FRAGMIN 10000 UI/1 ml PFIZER; Sol. inj., 1 ml conține 10000 UI (anti-Xa); ct. × 10 seringi preumplute × 1 ml (S/P-RF)
FRAGMIN 15000 UI/0,6 ml PFIZER; Sol. inj., 0,6 ml conțin 15000 UI (anti-Xa); ct. × 5 seringi preumplute × 0,6 ml (S/P-RF)

Ind: Trat. trombozei venoase profunde acute și al emboliei pulmonare. Prevenirea coagulării în circuitul extracorporal în timpul hemodializei și hemofiltrării în IRA sau IRC. Tromboprofilaxia intervențiilor chirurgicale. Angina instabilă și IM non-Q.

Dz: Trat. trombozei venoase acute profunde și al emboliei pulmonare: adm. în p.i.v. continuă sau s.c. în doza unică sau de 2 ori/zi. Doza max.: 18000 UI. S.c.: inițial, 100 UI/kg/12 h sau 200 UI/kg/24 h. P.i.v.: inițial, 100 UI/kg, în interval de 12 h. Trat. se continuă timp de 5 zile. Prevenirea coagulării în timpul hemodializei și hemofiltrării: IRC, pacienți fără risc de hemoragie; hemodializă și hemofiltrare cu durata de max. 4 h: Aceeași posologie ca mai jos, sau numai o inj. i.v. cu 5000 UI; hemodializă și hemofiltrare cu durata de peste 4 h: Un bolus i.v. cu 30-40 UI/kg, urmat de adm. în p.i.v. a 10-15 UI/kg/h. IRA, pacienți cu risc crescut de hemoragie: Un bolus i.v. cu 5-10 UI/kg, urmat de adm. în p.i.v. a 4-5 UI/kg/h. Tromboprofilaxia int. chir.: 2500- 5000 UI s.c. cu 1-2 h înainte de int. chir., apoi 2500-5000 UI s.c. în fiecare dimineață, până când pacientul se mobilizează (5-7 zile sau mai mult). Angina instabilă și IM non-Q: 120 UI/kg s.c. de două ori/zi. Doza max.: 10000 UI/12 h. Trat. se continuă cel puțin 6 zile.

Cind: Hipersensibilitate la dalteparină (sau alte heparine cu masa moleculară mică). Ulcer gastro-duodenal acut și hemoragie cerebrală. Forme grave de coagulopatii. Endocardită septică. Leziuni și int. chir. la nivelul SNC, ochilor și urechilor. Este CI anestezia regională datorită riscului crescut de hemoragie.

Al: Nu se adm. i.m. Atenție în caz de trombocitopenie și deficiențe plachetare, în IH și IR gravă, în HTA necontrolată, în retinopatia hipertensivă sau diabetică. Precauții la cei ce au suferit recent o int. chir. Precauții speciale sunt necesare în cazul trombocitopeniei cu evoluție rapidă sau al trombocitopeniei severe, asociate cu un rezultat pozitiv sau necunoscut al testelor de depistare in vitro a anticorpilor antiplachetari în prezența dalteparinei sau a altor heparine cu masă moleculară mică și/sau heparine. Nivelurile de Xa la pacienții aflați sub dializă acută trebuie monitorizate. Precauție în cazul asocierii cu: medicamente ce afectează hemostaza (AINS, antagoniști ai vitaminei K, dextranul).

RA: Hemoragie, hematoame subcutanate la locul inj. și ușoară trombocitopenie (tip I), creștere tranzitorie, ușoară/moderată a transaminazelor hepatice; necroza cutanată, reacțiile alergice. Rar, reacții anafilactoidice, trombocitopenie severă mediată imunologic (tip II) asociată cu tromboza arterială și/sau venoasă sau trombembolism.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CODEINUM
CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEOETINUM ALFA

Cod ATC: B03XA02

ARANE SP® AMGEN; Sol. inj. 40 micrograme/ml; ct. × 1 sau 4 fl. (S/P-RF)

Ind: Anemia din insuficiența renală cronică la adulți și copii cu vârstă mai mare de 11 ani. Anemia la adulți cu neoplazii non-mieloide care urmează chimioterapie.

Dz: Tratamentul se inițiază numai de către un medic experimentat în tratarea bolilor mai sus menționate. În insuficiență renală: tratament de corectare - doza inițială 0,45 micrograme/kg, injecție unică s.c. sau i.v., o dată pe săptămână; tratament de întreținere - doză unică, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, cu ajustarea dozei în funcție de valoarea hemoglobinemiei. În neoplasm: doza inițială recomandată 6,75 micrograme/kg, o dată la trei săptămâni, cu modificare în funcție de răspunsul clinic.

Cind: Hipersensibilitate, hipertensiune arterială insuficient controlată.

Al: Monitorizarea valorii sideremiei, putând fi necesar un aport de fier. Atenție la factorii care pot compromite răspunsul eritropoietic: deficitul de fier, acid folic sau vitamina B12, infecțiile intercurrente, episoadele inflamatorii sau traumatice, sângerările oculte, hemoliza, toxicitatea aluminică severă, bolile hematologice subiacente, fibroza medulară. Prudență în caz de afecțiuni hepatice, siclemie sau epilepsie. Sarcină

RA: Reacții alergice (erupții cutanate, urticarie), cefalee, hipertensiune arterială, tromboze ale locului de abord vascular, dureri la locul administrării. La pacienții cu neoplasm s-au mai constatat artralгии și edeme periferice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CODERGOCRINUM
COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM

COD ATC: L01DB02

DAUNOBLASTINA PHARMACIA & UPJOHN; Pulb. pt. sol. inj. 20 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 fl. solv. × 10 ml (S)

Ind: Leucemia acută mieloblastică sau limfoblastică; neuroblastom și rabdomiosarcom.

Dz: Adm. i.v. Doza unică poate varia între 0,5 și 3 mg/kg. Dozele între 0,5-1 mg/kg se pot repeta la una sau mai multe zile; dozele de 2 mg/kg se vor adm. la 4 sau mai multe zile. Dozele de 2,5-3 mg/kg, mai rar utilizate, se vor adm. la 7-14 zile. Doza totală maximă este 20 mg/kg. La pacienții cu alterarea funcției hepatice doza se va reduce.

Cind: Boli cardiace severe sau preexistente. Infecții severe.

Al: Monitorizare intraspitalicească în perioada de inducție a remisiunii leucemiei acute. Controlul acidului uric și ureei în sânge de 3 - 4 ori pe săptăm. în cursul primei săptăm. de trat. Se recomandă aport crescut de lichide și alopurinol. Număratoarea eritrocitară, formula leucocitară și nr. trombocitelor vor fi evaluate zilnic în cursul primei săptăm. de trat. Se va monitoriza funcția hepatică (GOT, GPT, fosfataza alcalină, bilirubina, BSP). Efectuarea ECG înainte și după fiecare ciclu de trat.

RA: Mielosupresie, cardiotoxicitate, alopecie, stomatită, grețuri, vărsături, diaree; dacă extravazează în timpul adm., determină leziuni tisulare grave până la necroză severă. Au fost raportate cazuri de fleboscleroză.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COLCHICINUM
COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V03AC01**DESFERAL** NOVARTIS PHARMA; Liof. pt. sol. inj./perf. 500 mg; ct. × 10 fl. (S/P-RF)

Ind: Trat. supraîncărcării cronice cu fier din: hemosideroză posttransfuzională; hemocromatoză idiopatică; supraîncărcare cu fier asociată cu porfirie cutanată tardă. Trat. intoxicației acute cu fier. Trat. supraîncărcării cronice cu aluminiu. Pt. diagnosticul supraîncărcării cu fier sau aluminiu.

Dz: Trat. în supraîncărcarea cronică cu fier: *copii și adulți*: doză inițială 0,5 g/ zi, apoi crescând doza până se atinge o excreție de fier în platou. Terapia este considerată satisfăcătoare când nivelul feritinei serice este apropiat de valorile normale (300 g/ml). Doza zilnică este de 20-40 mg/kg. P.i.v. sunt mai eficiente decât adm. s.c., dar adm. s.c. lentă pe o perioadă de 8-12 ore este considerată a fi eficientă și convenabilă pentru pacienții din ambulator. Perf. se poate adm. de 3-7 ori/săpt. Pentru eliminarea fierului deja absorbit se adm. i.m. sau i.v., o singură doză de 2 g pentru adulți și 1 g pentru copii. Rata max. de adm. i.v. este de 15 mg/kg/oră, până la o doză totală i.v. de 80 mg/ kg/zi. Trat. supraîncărcării cu aluminiu la pacienții cu IR terminală: 1-4 g/ săptăm., adm. i.m., sub formă de p.i.v. sau s.c. ori intraperitoneal.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la substanța activă, cu excepția cazurilor în care desensibilizarea se dovedește a fi posibilă.

Al: Dacă pacienții acuză febră însoțită de enterite/enterocolite acute, durere abdominală difuză sau faringite, se întrerupe temporar trat. și se recomandă efectuarea de teste bacteriologice și antibioterapie. Trebuie efectuate examene oftalmologice și ORL înainte începerii trat., precum și la intervale de aproximativ 3 luni, pe durata trat. Atenție sporită la pacienții cu IR severă. La pacienții cu encefalopatie determinată de încărcarea cu aluminiu poate să exacerbeze disfuncția neurologică (crize comițiale). Trebuie adm. numai în p.i.v. lentă, căci injectarea i.v. rapidă poate duce la colaps. Asocierea cu proclorperazina poate duce la tulburări temporare ale stării de conștiință. Asocierea cu vit. C (100-150 mg/zi) poate intensifica excreția chelaților. Se recomandă monitorizarea funcției cardiace pe perioada acestui trat. combinat. Prudență pe perioada sarcinii (în primele 3 luni).

RA: Reacții alergice ale pielii, manifestări anafilactice, iritație locală la locul adm., tulburări ale vederii și auzului, opacifieri ale cristalinului, tulburări ale funcției renale și hepatice; trombocitopenie; tulburări cardiovasculare (HTA, aritmii cardiace), tulburări neurologice (convulsii, confuzie mintală), crampe ale gambelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COLECALCIFEROLUM
COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM

Cod ATC: R06AX27**AERIUS** SCHERING PLOUGH EUROPE; Cpr. film. 5 mg; ct. × 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50 sau 100 cpr. **(P-RF)****AERIUS** SCHERING PLOUGH EUROPE; Sirop 0,5 mg/ml; fl. × 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 sau 300 ml + linguriță dozatoare **(P-RF)****Ind:** Ameliorarea simptomelor asociate cu rinita alergică și urticaria idiopatică cronică.**Dz:** Cpr.: *Adulți și adolescenți (12 ani și peste):* 5 mg/zi, cu sau fără alimente. *Sirop: Copii 2-5 ani:* 2,5 ml (1,25 mg) o dată/zi, cu sau fără alimente. *Copii 6-11 ani:* 5 ml (2,5 mg) o dată/zi, cu sau fără alimente. *Adulți și adolescenți (12 ani și peste):* 10 ml (5 mg) o dată pe zi, cu sau fără alimente.**Cind:** Hipersensibilitate la substanța activă, la oricare dintre excipienți sau la loratadină. Femeile care alăptează.**A!:** Cpr.: Nu au fost stabilite eficacitatea și siguranța adm. la copii sub 12 ani. Prudență în IR. Sirop: Nu au fost stabilite eficacitatea și siguranța adm. la copii sub 2 ani. Prudență în IR.**RA:** Cefalee, uscăciunea gurii, oboseală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H01BA02

COLISTINUM
COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DAKLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM

ADIURETIN® FERING-LECIVA; Sol. nazală 0,1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml + aplic. nazal (**P-RF**)
MINIRIN 0,1 mg; MINIRIN 0,2 mg FERRING AB; Cpr. 0,1 mg, 0,2 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (**P-RF**)
MINIRIN FERRING AB; Spray nazal sol. 10 µg/doză; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-RF**)

Ind: Diabet insipid neurogen.

Dz: Instilație nazală, 1-4 picături de 1-2 ori/zi în funcție de gradul de poliurie și sete (doza zilnică *adulti*: 10-40 µg; *copii*: 5-30 µg)

Cind: Alergie specifică; cardiopatia ischemică; epilepsia. Nu se adm. înainte și în timpul anesteziei cu ciclopropan.

Al: Prudență în timpul sarcinii, în eclampsie și alte situații în care trebuie evitată creșterea TA; prudență la copii. Efectul antidiuretic poate fi potențat de clorpropamidă, carbamazepină.

RA: Irritația mucoasei nazale, cefalee, conjunctivită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01BA11

COMBINATII - LIT.A
COMBINATII - LIT.B
COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM

PRENACID S.I.F.I.; Sol. oft. 0,25%; ct. × 1 fl. × 10 ml (*P-RF*)**PRENACID** S.I.F.I.; Ung. oft. 0,25%; ct. × 1 tub × 10 g (*P-RF*)

Ind: Trat. inflamațiilor segmentului anterior al ochiului și ale anexelor acestuia, conjunctivite alergice, blefarite scuamoase, episclerite, irite, iridociclite. Reacții inflamatorii postoperatorii și traumatice.

Dz: *Soluție:* 1-2 pic. de 3-4 ori/zi. *Unguent oft.:* se aplică de 3-4 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la produs. HTA intraoculară, herpes simplex, boli virale ale corneei în stadiul ulcerăției acute. Conjunctivite cu keratită ulceroasă. tbc și micozele ochiului. Afecțiuni oftalmice acute purulente, conjunctivite purulente, blefarite purulente și herpetice. Orjelet, leziuni sau zgârieturi corneene.

Al: În cazul adm. mai mult de 2 săpt. se recomandă verificarea tonusului ocular (stimulează apariția cataractei). Trat. patologiei combinate cu slăbirea corneei necesită precauții. În conjunctivite bacteriene, virale sau fungice adm. topică a corticoizilor poate masca extinderea **infecției**. **Precauție la copii și femei gravide.**

RA: Senzație de arsură sau înțepături.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.B
 COMBINATII - LIT.C
 COMBINATII - LIT.D
 COMBINATII - LIT.E
 COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
DEXAMETHASONUM

Cod ATC: H02AB02, S01BA01**DEXAGRANE** LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM; Sol. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)**DEXAMED** MEDOCHEMIE Ltd.; Sol. inj. 4 mg/1 ml; ct. × 10 sau 100 f. × 2 ml (S/P-RF)**DEXAMETHASONE SODIUM PH** E.I.P.I.C.O.; Sol. inj. 4 mg/ml; ct. × 5 sau 100 f. × 2 ml (S/P-RF)**MAXIDEX®** ALCON; Sol. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)**MAXIDEX®** ALCON; Ung. oft. 0,1%; ct. × 1 tub × 3,5 g (P-RF)

Ind: Adm. sistemică: Boli reumatice și colagenoze: cardită reumatică, poliartrită reumatoidă, LED, sclerodermie, periarterită nodoasă, dermatomiozită. Boli alergice: astm bronșic, alergii medicamentoase, alimentare sau la polen, boala serului, edem angioneurotic, șoc anafilactic. Boli digestive: necroză hepatică, hepatită cronică activă, hepatită alcoolică acută, ciroză, boala Crohn, colită ulceroasă și ulcero-hemoragică. Boli renale: glomerulonefrită acută cu oligurie marcată sau anurie, nefroză. Boli pulmonare: sarcoidoză, fibroză pulmonară. Boli hematologice: anemie hemolitică dobândită, purpură trombopenică idiopatică, leucemie limfatică, limfosarcom. Boli infecțioase și toxice grave. Boli dermatologice: dermite alergice și eczeme, eritrodermie exfoliativă, pemfigus, psoriazis. Boli oftalmologice: episclerite, sclerite, keratite, irite, iridociclite. Boli ORL: laringite acute alergice sau inflamatorii. Boli neurologice: polinevrite acute toxice. Este de preferat în testarea diagnostică pentru hiperfuncția CSR, mai ales pentru secreția de ACTH și în hiperplazia suprarenală congenitală. Adm. locală: inflamații articulare, abarticulare, ale țesuturilor moi, afecțiuni oculare: uveită anterioară acută sau cronică, iridociclită, irită, ciclită, herpes zoster oftalmic; kerato-conjunctivita flictenulară, conjunctivita nepurulentă inclusiv cea sezonieră, catarală, alergică; ulceratii marginale recurente de cauză toxică sau alergică; arsuri termice sau chimice; postoperator, pt. reducerea inflamațiilor.

Dz: Adm. p.o: **Adulți:** inițial 3-15 mg/zi, se scade treptat până la doza de întreținere 0,5-1,5 mg/zi. **Copii:** doza de atac 1-3 mg/zi, apoi se scade la doza minimă activă de întreținere. Adm. inj.: doza inițială: 0,5-20 mg; max. 80 mg/zi. Adm. local conj.: 1-2 pic. în sacul conjunctival, inițial, la fiecare 30-60 de min, răbind apoi adm. la 2-4 h. Trat. se va reduce ulterior la 1 pic. de 3-4 ori/zi. În inflamația cronică, alergii sau inflamații minore: adm. la fiecare 3-6 h, până când se obține efectul dorit.

Cind: Ulcer gastro-duodenal, psihoze, osteoporoză, cetoacidoză diabetică, sindrom Cushing. Adm. conj. este Cind în herpes simplex acut, vaccină, varicelă și cele mai multe afecțiuni virale ale corneei și conjunctivei, tbc, afecțiuni micotice, infecții acute purulente netratate. În perioada de alăptare.

Al: Prudență în diabet zaharat, miastenia gravis, boli convulsivante, IR și uremie, HTA, IC, tromboze vasculare, boli infecțioase, tbc, infecții fungice sistemice, herpes zoster și herpes simplex, varicelă, poliomielită. În cazul în care nu răspund la trat. în intervalul de timp scontat, se vor institui alte forme de trat. Dacă apar fenomene de sensibilitate la produs, se va întrerupe adm. Utilizarea topică prelungită a steroizilor poate cauza RA sistemice. Prudență în cazul asocierii cu: antidiabetice orale, anticoagulate cumarinice, diuretice saluretice, salicilați.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.C
COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AE17

TADOR BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. film. 25 mg; ct. × 1, 3 sau 5 blist. × 10 cpr.; (P-6L)

Ind: Trat. simptomatic de scurtă durată al durerilor musculo-scheletice, dismenoree, durerile dentare.

Dz: 25 mg la 8 ore. Doza zilnică max. 75 mg. Nu trebuie folosit timp îndelungat. Se recomandă adm. cu cel puțin 30 de min. înaintea meselor. *Vârstnici:* doza zilnică max. 50 mg. Doza poate fi crescută dacă există o toleranță generală bună. *IH:* doza zilnică max. 50 mg, cu monitorizare atentă clinică și biologică. *IR:* doza inițială max. 50 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la dextetoprofen, orice alt AINS sau la excipienții produsului; antecedente de crize de bronhospasm, rinită acută, urticarie sau edem angioneurotic la acid acetilsalicilic; ulcer gastroduodenal activ sau în antecedente dispepsie cronică; boli hemoragice, tratament concomitent cu anticoagulante; boală Crohn sau colită ulceroasă; antecedente de astm bronșic; IR moderată - gravă; IH gravă; sarcină și alăptare; copii.

Al: Se va adm. cu prudență la pacienții cu afecțiuni alergice în antecedente. Pacienții care au simptome gastrointestinale sau antecedente de afecțiuni gastrointestinale trebuie monitorizați pentru a detecta semnele unei eventuale hemoragii gastrointestinale. Dacă apare hemoragie sau ulcer gastrointestinal în timpul tratamentului, se întrerupe adm. și este instituită terapie adecvată. În cazul unei creșteri importante a TGO și TGP, tratamentul trebuie oprit. Se adm. cu atenție la pacienții cu afecțiuni ale măduvei hematopoetice, LES sau boală mixtă de țesut conjunctiv. Produsul trebuie adm. cu prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice, renale sau cardiace, ca și în alte boli care predispun la retenție hidrosalină sau la cei tratați cu diuretice și la cei cu hipovolemie, deoarece au risc crescut de nefrotoxicitate. Pacienții vârstnici au risc crescut de insuficiență renală, cardiacă sau hepatică. Asocieri Cind: alte AINS, doze mari de salicilați, anticoagulante orale, heparină și ticlopidină, litiu, metotrexat în doze mari (> 15 mg metotrexat/săptămână), hidantoine și sulfonamide. Asocieri care necesită precauții: - diuretice, IEC. Asocieri care necesită supraveghere: beta-blocante, ciclosporină și tacrolimus, trombolitice, probenecid. Atenție la persoanele care conduc vehicule sau folosesc utilaje.

RA: greață și/sau vărsături, dureri abdominale, diaree, dispepsie. RA mai puțin frecvente: tulburări de somn, anxietate, cefalee, amețeli, vertij, palpitații, gastrită, constipație, uscăciunea gurii, flatulență, eritem cutanat. Rar pot apărea: parestezii, HTA, edeme periferice, bradipnee, ulcer peptic, hemoragie sau perforație, anorexie, creșterea enzimelor hepatice, urticarie, acnee, hipersudorație, poliurie, tulburări menstruale, tulburări în sfera prostatei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D03AX03

COMBINATII - LIT.D
COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DAKLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM

BEPANTHEN HOFFMANN LA ROCHE; Ung. 5%; ct. × 1 tub × 30 g (OTC)

CORNEREGEL HOFFMANN LA ROCHE; Gel oft. 5%; ct. × 1 tub × 5 sau 10 g (P-6L)

PANTHENOL ANKERPHARM GROUP CHAUVIN; Spray cut. susp. 5%; ct. × 1 fl. × 140 ml (OTC)

Ind: Adjuvant în trat. unor leziuni cutanate superficiale acute și cronice: excoriații, leziuni postoperatorii cu vindecare întârziată, arsuri, eritem solar, ulceratii, fisuri, dermatite buloase și veziculare, herpes labial.

Dz: Se aplică pe suprafețele afectate o dată sau de câteva ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la dexpanthenol sau la oricare dintre componentele produsului.

RA: Reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.E
COMBINATII - LIT.F
COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DESKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V03AF02**CARDIOXANE®** CHIRON B.V.; Liof. pt. sol. inj. 500 mg; ct. × 1 fl. (S)**Ind:** Profilaxia efectelor cardiotoxice produse de citostatice antraciclince.**Dz:** P.i.v. de scurtă durată (15 min), cu aproximativ 30 de min înainte inj. antraciclinelor. Doza recomandată este de 20 de ori mai mare decât cea de doxorubicină. Obişnuit se adm. 1 g/m² la fiecare 21 de zile. Trat. trebuie început simultan cu prima doză de doxorubicină (sau altă antraciclină) şi trebuie repetat la fiecare doză următoare.**Cind:** Hipersensibilitate la dexrazoxan. Sarcină şi alăptare.**Al:** Se adm. doar pacienţilor trataţi cu citostatice cu structură antraciclinică, îndeosebi doxorubicină. Se impune supraveghere hematologică regulată. Pacienţii cu IR sau afecţiuni hepatice trebuie supravegheaţi atent. Dacă liofilizatului sau soluţia atinge pielea sau mucoasele, regiunea afectată se va spăla imediat cu apă. Pentru a evita apariţia tromboflebitei locale, diluarea soluţiei de dexrazoxan trebuie efectuată imediat înainte de perfuzare. Poate potenţa toxicitatea hematologică a chimioterapiei sau radioterapiei anticanceroase. Nu trebuie amestecat cu alte medicamente în timpul perfuzării.**RA:** Durere şi iritaţie la locul injectiei. Leucopenie uşoară/moderată, trombocitopenie uşoară, greţuri, vărsături, alopecie, creştere tranzitorie a enzimelor hepatice, a trigliceridelor şi amilazei serice, hipotermie, anemie, tulburări de coagulare, scăderea trecătoare a calciului seric, mărirea eliminării urinare a fierului şi zincului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R05DA09

COMBINATII - LIT.F
 COMBINATII - LIT.G
 COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM

DEXIR® COPII; DEXIR® ADULȚI BRISTOL-MYERS SQUIBB; Sol. orală 7,5 mg/5 ml, 15 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 125 ml (*P-RF*)
HUMEX LAB. URGO; Sirop 0,1%; ct. × 1 fl. × 125 ml (*P-RF*)
PULMODEXANE SANOFI; Sol. orală 15 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 125 ml (*P-RF*)
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM IVAX PHARMA; Sol. orală 7,5 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (*P-RF*)
ROBITUSSIN JUNIOR IVAX PHARMA; Sol. orală 3,75 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (*P-RF*)
ROFEDEX BIOFARM SA; Sirop 15 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (*OTC*)
TUSSIDRIL SIROP LAB. PIERRE FABRE; Sirop 15 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 125 sau 150 ml (*P-RF*)
TUSSIN; TUSSIN FORTE EUROPHARM SA; Cpr. 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)
TUSSIN SIROP EUROFARMACO SA; Sirop 0,1%; ct. × 1 fl. × 150 g (*P-RF*)

Ind: Trat. simptomatic al tusei neproductive.

Dz: *Adulți și copii peste 15 ani:* 60-120 mg/zi, fracționat în 3-4 prize. Max. 30 mg o dată și 120 mg/zi. *Copii sub 15 ani:* 1 mg/kg/zi, fracționat în 3-4 prize; *copii între 30 luni - 6 ani:* 15-20 mg/zi; *copii între 6-12 ani:* 20-35 mg/zi; *copii între 12-15 ani:* 35-50 mg/zi. Intervalul între doze trebuie să fie de min. 4 ore.

Cind: Hipersensibilitate la dextrometorfan sau la componentele produsului; insuficiență respiratorie; astm bronșic; Copii sub 15 ani în cazul preparatelor pentru adulți, respectiv copii sub 30 de luni în cazul preparatelor pentru copii. Nu se asociază cu IMAO. În perioada de alăptare.

Al: Tusea productivă nu constituie o ind. terapeutică a antitusivelor centrale. Dacă tusea nu cedează la doza uzuală trebuie reevaluată situația clinică. În IH și la vârstnici, doza va fi scăzută. În caz de diabet zaharat trebuie ținut seama de conținutul în zahăr al preparatelor. Nu se recomandă asocierea cu: alte deprimante ale SNC (analgezice opioide, antidepresive triciclice, antiH1-sedative, barbiturice, alcool, benzodiazepine și alte anxiolitice, clonidină și neuroleptice). Precauție la femei însărcinate; la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Constipație, somnolență, stări de amețeală, greață, vomă, bronhospasm, reacții alergice cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.G
COMBINATII - LIT.H
COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKETOPIROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05BA01**CALMPOSE** RANBAXY LAB.; Sol. inj. 10 mg/2 ml; ct. × 100 f. × 2 ml (S/P-RF)**DIAZEPAM 10 mg** TERAPIA SA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml (P-RF)**DIAZEPAM** TERAPIA SA; Cpr. 10 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)**DIAZEPAM 10 mg** GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**DIAZEPAM 2 mg; DIAZEPAM 10 mg** LABORMED PHARMA SA; Cpr. 2 mg, 10 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)**DIAZEPAM 10 mg** LAROPHARM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**DIAZEPAM DESITIN®** DESITIN; Sol. rectală 5 mg/2,5 ml, 10 mg/2,5 ml; ct. × 5 punji × 1 tub × 2,5 ml + canulă (P-RF)

Ind: Stări de tensiune, neliniște și agitație, labilitate emoțională, tulburări neurovegetative funcționale, insomnie, nevroze anxioase, stări reactive, boli psihosomatice: tulburări de comportament la pacienții cronici psihopatizați, sindrom acut de abținere la alcoolici, tulburări de comportament la epileptici; status epilepticus și accese convulsive severe recurente (forma injectabilă); stări de contractură a musculaturii striate de natură reflexă sau de cauză neurologică; premedicație în anestezie și intervenții chirurgicale și liniștire postoperator, iminență de abort, naștere prematură sau dirijarea travaliului în hipertonie uterină (forma injectabilă).

Dz: Oral: *Adulți:* 2-10 mg de 2-4 ori/zi. *Bătrâni:* 2 mg de 1-2 ori/zi. *Copii (> 6 luni):* 1 mg de 2 ori/zi (se poate crește cu prudență până la max. 0,30 mg/kg/zi). i.m. sau i.v. lent: *Adulți și copii mari:* 2-20 mg o dată, se poate repeta după 3-4 ore; *sugari (mai mari de 1 lună):* 1-2 mg (0,25 mg/kg) o dată; se poate repeta până la 2 mg/kg/zi.

Cind: Alergie la diazepam, miastenia gravis, șoc, comă, intoxicație acută cu alcool, sau alte deprimante centrale, glaucom. Nu se asociază cu IMAO și alte antidepresive. Nu se adm. în sarcină în primul trimestru.

Al: Prudență la bolnavii cu glaucom, doze mici la cerebro-vasculari, în insuficiență cardio-respiratorie, la bătrâni și debilitați. Precauție în cazul asocierii cu: barbiturice, alcool, analgezice opioide și alte deprimante centrale. Forma inj. nu se amestecă cu alte medicamente și nu se adaugă soluțiilor perf. i.v. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Oboseală, somnolență, amețală, ataxie, cefalee, stare confuzivă, depresie, disartrie, tremor, tulburări de vedere, diplopie, hTA, greață, greutate în micțiune, tulburări de libido, leucopenie, icter, hiperexcitabilitate. La bolnavii cu mic rău epileptic poate produce crize de mare rău sau instalarea unui status epilepticus. Adm. în doze mari, timp îndelungat induce farmacodependența. Inj. i.v. poate produce apnee și/sau sincopă cardiacă; local apar iritații și tromboze.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.H
 COMBINATII - LIT.I
 COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM

Cod ATC: M01AB05, M02AA15, S01BC03

ALMIRAL MEDOCHEMIE Ltd.; Sol. inj. 75 mg/3 ml; ct. × 5 sau 10 f. × 3 ml (P-RF)
ARTHREX CELLUGEL C.P.M. CONTRACT PHARMA GmbH & Co; Gel 1%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)
CLAFEN® ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. gastrorez. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
CLAFEN® ANTIBIOTICE SA; Sup. 100 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (P-6L)
CLAFEN® ANTIBIOTICE SA; Cremă 1%; Gel 1%; ct. × 1 tub × 20 g; ct. × 1 tub × 40 g, respectiv ct. × 1 tub × 40 g (OTC)
DICLAC® 1%; **DICLAC**® 5% gel HEXALAG; Gel 1%, 5%; ct. × 1 tub × 50 sau 100 g (1%), ct. × 1 tub × 50 g (5%) (OTC)
DICLAC® 75 ID HEXAL AG; Cpr. elib. modif. 75 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-6L)
DICLO-75 VON CT C.T. ARZNEIMITTEL; Sol. inj. 37,5 mg/ml; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 2 ml (S/P-RF)
DICLOFENAC AC HELCOR SRL; Dj. gastrorez. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj. (P-6L)
DICLOFENAC TIS FARMACEUTIC/CHIRMIS FARMIMPEX; Gel 1%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)
DICLOFENAC MK CREMĂ MARK PHARMACEUTICS SRL; Ung. 1%; ct. × 1 tub × 20, 35 sau 50 g (OTC)
DICLOFENAC MK GEL MARK PHARMACEUTICS SRL; Gel 1%; ct. × 1 tub × 25 sau 45 g (OTC)
DICLOFENAC 25 mg; DICLOFENAC 50 mg ARENA GROUP SA; Dj. gastrorez. 25 mg, 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj., resp. ct. × 2 blist. × 10 dj. (P-6L)
DICLOFENAC HYPERION SA; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 25 g (OTC)
DICLOFENAC OZONE LABORATORIES Ltd.; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 20 g sau 50 g (OTC)
DICLOFENAC SINTOFARM SA; Sup. 100 mg; ct. × 2 folii × 5 sup. (P-6L)
DICLOFENAC TERAPIA SA; Cpr. film. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
DICLOFENAC 100 mg EUROPHARM SA; Sup. 100 mg; ct. × 2 folii × 5 sup. (P-6L)
DICLOFENAC AL I.M. ALIUD PHARMA; Sol. inj. 25 ml/ml; ct. × 1, 5, 10 sau 30 f. × 3 ml (S/P-RF)
DICLOFENAC 75 mg TERAPIA SA; Sol. inj. 25 ml/ml; ct. × 5 f. × 3 ml (P-RF)
DICLOFENAC DUO BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. ret. 75 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. ret. (P-6L)
DICLOFENAC SODIC 100 mg MAGISTRA C&C; Sup. 100 mg; ct. × 2 blist. × 3 sup. (P-6L)
DICLOGESIC DAR AL DAWA; Cpr. film. gastrorez. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. (P-6L)
DICLOGESIC® 12,5; **DICLOGESIC**® 100 DAR AL DAWA; Sup. 12,5 mg, 100 mg; ct. × 2 folii × 5 sup., resp. ct. × 1 folie × 5 sup. (P-6L)
DICLOGESIC® gel DAR AL DAWA; Gel 1%; ct. × 1 tub × 30 g (OTC)
DICLOGESIC® DAR AL DAWA; Sol. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-6L)
DICLOSAL GEL SLAVIA PHARM; Gel 1%; ct. × 1 tub × 45 g (OTC)
DICLOSIN SINTOFARM SA; Gel 1%; ct. × 1 tub × 25 g sau 40 g (OTC)
DICLOTARD® 100 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
EPIFENAC E.I.P.I.C.O.; Cpr. gastrorez. 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
EPIFENAC E.I.P.I.C.O.; Sup. 100 mg; ct. × 1 blist. × 5 sup. (P-6L)
FLOGOFENAC ECOBI PHARMACEUTICI; Gel 1%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.I
COMBINATII - LIT.J
COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AF02

VIDEX EC 125 mg; VIDEX EC 200 mg; VIDEX EC 250 mg; VIDEX EC 400 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. gastrorez 125 mg, 200 mg, 250 mg, 400 mg; ct. × 3 sau 6 blist. × 10 cps. (S/P-RF)

Ind: Trat. adulților HIV - infectați și al copiilor cu imunodeficiență progresivă sau avansată, de preferință în combinație cu alți agenți antiretrovirali.

Dz: Se adm. cu cel puțin 30 de min. înainte de masă. Deși nu s-a stabilit până acum doza optimă, pot fi făcute următoarele recomandări: **Adulți:** Doza inițială este dependentă de greutate; intervalul între doze va fi de 12 ore (BID). În studiile clinice s-au utilizat doze până la 600 mg/zi. Dozele inițiale medii: *la adulții cu > 60 kg*, cpr. se dau în doze de 200 mg BID; *la adulții < 60 kg*, doze de 125 mg BID. Fiecare doză se adm. sub forma a 2 cpr., în scopul asigurării unei cantități suficiente de neutralizant pentru pacient. **Copii:** 240 mg/m²/zi (180 mg/m²/zi în combinație cu ZDV). Intervalul de adm. a dozelor este de 12 ore. Ajustarea dozei: Creșterile semnificative ale amilazei serice vor determina întreruperea promptă a terapiei și evaluarea posibilității apariției pancreatitei, chiar în absența simptomelor de pancreatită. La pacienții anurici dializați, jumătate din doza zilnică totală recomandată se adm. o dată pe zi. Doza va fi administrată după dializă.

Cind: La pacienții cu hipersensibilitate la produs.

Al: La pacienții cu pancreatită (s-a dovedit legătura între riscul de pancreatită și doza zilnică). Atunci când este justificată de condițiile clinice, adm. va fi întreruptă până la excluderea diagnosticului de pancreatită prin teste de laborator și ecografie. De asemenea, când este necesar tratamentul simultan și cu alte med. cu toxicitatea asupra pancreasului, didanosina trebuie să fie întreruptă, dacă este posibil în timpul acestei terapii concomitente. La pacienții tratați cu didanosină poate apărea neuropatia periferică toxică, caracterizată de obicei de parestezii distale bilaterale simetrice, furnicături și durere a membrilor inferioare, și mai puțin frecvent a mâinilor. Atunci când este justificată de condițiile clinice, terapia cu didanosină va fi întreruptă până la rezoluția simptomelor. Dacă în timpul tratamentului apar creșteri semnificative ale concentrațiilor de acid uric, terapia va fi întreruptă. Terapia va fi întreruptă dacă valorile enzimelor hepatice cresc peste limita normală. Terapia va fi reluată numai dacă beneficiile potențiale ale tratamentului cu didanosină depășesc net riscurile potențiale. Nu există suficientă experiență clinică pentru a recomanda modul de dozare la copii cu vârsta mai mică de 3 luni. La copiii sub tratament se recomandă examinarea extinsă a retinei la fiecare 6 luni sau atunci când apar modificări vizuale.

RA: Pancreatita și creșteri ale amilazei serice și lipazei serice, neuropatia periferică, anomalii în testele de funcționare hepatică, cu rare cazuri de IH și moarte; diaree, greață/vomă, reacții alergice, diabet zaharat, uscăciunea gurii, astenie, durere de cap și concentrațiile de acid uric mărite. Acidoza lactică. În cazuri rare s-au raportat modificări ale retinei sau ale nervului optic, leucopenie, trombocitopenie, anemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01AA05

COMBINATII - LIT.J
 COMBINATII - LIT.K
 COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
DIGOXINUM

DIGOXIN 0,25 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 0,25 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (P-RF)

DIGOXIN 0.5 mg/2 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 0,25 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml; ct. × 10 f. × 2 ml (S/P-RF)

LANOXIN GLAXO SMITHKLINE; Sol. orală 0,05 mg/ml; ct. × 1 fl. × 60 ml (P-RF)

LANOXIN GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 0,25 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml (S/P-RF)

Ind: IC acută, IC congestivă, cord pulmonar cronic, IC la copii; fibrilație și flutter atriale, tahicardie supraventriculară. Este de ales pentru digitalizare rapidă și la bolnavii cu tendință mare de acumulare a digitalicelor.

Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* i.v. lent, inițial 0,25-0,50 mg apoi, cu grijă, câte 0,25 mg la intervale de 4-6 ore până la digitalizarea deplină (obișnuit până la 1 mg doză totală) recomandabil sub control ECG; oral, inițial 0,50-0,75 mg, apoi, câte 0,25-0,50 mg la 6-8 ore până la digitalizarea deplină (obișnuit până la 1-1,5 mg doză totală). *Întreținere:* 0,125-0,50 mg/zi, oral. *Copii: nou-născuți:* 0,025-0,04 mg/kg inj. i.v. (la nevoie i.m.) sau 0,040-0,060 mg/kg, oral; *copiii de 1 lună-2 ani:* i.v., 0,035-0,050 mg/kg sau oral, 0,060-0,080 mg/kg; *copiii de 2-10 ani:* inj., 0,025-0,040 mg/kg sau oral, 0,040-0,060 mg/kg. Doza zilnică de întreținere este de 20-30% din doza digitalizantă.

Cind: Blocul cardiac complet intermitent sau în BAV de grad II, mai ales dacă există antecedente de crize Adams-Stokes. Aritmiile produse prin intoxicație cu glicozizi cardiotonici. Aritmiile supraventriculare asociate cu fascicule accesorii atrioventriculare. Dacă este cunoscută sau suspectată o cale de conducere accesorie, chiar și când nu există antecedente de aritmii supraventriculare, cardiomiopatia hipertrofică obstructivă cu excepția cazurilor în care există concomitent fibrilație atrială și IC. Hipersensibilitate la digoxin și alte digitalice glicozidice.

Al: Aritmiile pot fi precipitate prin intoxicație digitalică. Prudență în cazuri de tulburări de conducere sino-atriale. În cazurile în care s-au adm. glicozide cardiotonice în ultimele 2 săptăm., trebuie reconsiderat dozajul inițial și eventual reducerea dozei. Prudență la vârstnici. Hipopotasemia sensibilizează miocardul la acțiunea glicozizilor cardiotonici. Hipomagneziemia și hipercalcemia severă cresc sensibilitatea miocardului la acțiunea glicozizilor cardiotonici. Injectarea rapidă i.v. poate produce vasoconstricție cu HTA și/sau scăderea fluxului coronarian. Atenție în cazul pacienților cu boală tiroidiană. Pacienții cu sindrom de malabsorbție sau rezecții gastrointestinale pot necesita doze crescute. Riscul provocării unor aritmii periculoase folosind electroconversia cu curent continuu este crescut în prezența toxicității digitalice și este proporțional cu energia de electroconversie folosită. Precauție în caz de BAV incomplet, în perioada imediat următoare unui IM. Calea i.m. este dureroasă și se asociază cu necroza musculară. Prudență și/sau doze mici la bolnavii cu IR, la nou-născuții prematuri și imaturi, în stenoza subaortică hipertrofică idiopatică, cardita reumatismală, IM, bolile pulmonare grave, hipoxie, mixedem. Prudență în cazul asocierii cu: digitoxină, simpatomimetice, calciu i.v., diuretice kaliuretice, purgative (folosite abuziv), medicație cortizonică, rezerpină, hidroxid de aluminiu, trisilicat de magneziu, kaolin, acid aminosalicilic, sulfasalazină. Precauție în sarcină

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.K
COMBINATII - LIT.L
COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLOXATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKETOPIROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM

Cod ATC: N02AA08

DHC CONTINUS 60; DHC CONTINUS 90; DHC CONTINUS 120 MUNDIPHARMA; Cpr. cu elib. prel. 60 mg, 90 mg, 120 mg; ct. × 1 fl. × 56 cpr. (*P-RF*)

Ind: Tratamentul durerii acute sau cronice de intensitate medie sau puternică, asociate unor afecțiuni reumatice, ortopedice, neurologice, dermatologice, oncologice etc.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 1-2 cpr. a 60 mg la 12 ore sau 1 cpr. a 90 mg sau 120 mg la 12 ore. *Bătrâni:* Doza este mai redusă.

Cind: Depresie respiratorie, afecțiuni obstructive ale căilor aeriene superioare. Dihidrocodeina poate provoca eliberare de histamină și de aceea nu se va adm. în criza astmatiformă. De asemenea se va adm. cu precauție la bolnavii de astm. Copii sub 12 ani.

Al: Dozele vor fi reduse la bătrâni, în hipotiroidism, afecțiuni hepatice cronice și IR. Trebuie evitat la pacienții cu presiune intracraniană crescută și la cei cu traumatisme craniene. Se va evita consumul de alcool. Precauție la bolnavii ce sunt tratați cu IMAO. Este recomandat ca adm. la mamele ce alăptează să se facă numai dacă este absolut necesar. Atenție la persoanele care conduc autoturisme sau operează cu mașini și utilaje.

RA: Uneori pot apărea constipație, greață, vărsături, dureri de cap, vertij și retenție urinară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.L
 COMBINATII - LIT.M
 COMBINATII - LIT.N
 COMBINATII - LIT.O
 COMBINATII - LIT.P
 COMBINATII - LIT.Q
 COMBINATII - LIT.R
 COMBINATII - LIT.S
 COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM

Cod ATC: N04BC03

DAVERIUM POLI IND. CHIMICA; Cpr. 20 mg metilsulfonat de alfa-dihidroergocriptină; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Boală Parkinson; tratament de întreținere în cefalee și migrenă; hiperprolactinemie și inhibarea lactației.

Dz: Parkinson: Doza inițială: 5 mg p.o. de 2 ori/zi. Doza de întreținere: 60 mg/zi; poate fi crescută până la 120 mg/zi, prin creșteri succesive cu 10 mg, de două ori pe săptăm. Dacă este adm. împreună cu levodopa, cu sau fără inhibitori de decarboxilază, pot fi suficiente doze mai mici; este posibilă reducerea dozei de levodopa, care se va face gradat, până când se obține efectul terapeutic optim. Cefalee și migrenă: Doza de atac: 10 mg p.o. pe zi, seara înainte de culcare. Doza de întreținere: 10 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara. Se va adm. max. 6 luni. Hiperprolactinemie: Doza de atac: 5 mg p.o. de 2 ori/zi. Doza de întreținere: creșterea treptată a dozelor până la 10-20 p.o. de 2 ori/zi. Inh. lactației: 5 mg p.o. de 2 ori/zi, timp 5-10 zile.

N.B. Pentru doze < 10 mg vor fi folosite alte produse ce conțin alfa-dihidroergocriptină cu conc. corespunzătoare.

Cind: Hipersensibilitate la componente ale produsului; sarcină; alăptare; copii.

Al: La începutul tratamentului este recomandată monitorizarea TA. La pacienții cu migrenă sau cu Parkinson care prezintă galactoree, la cei cu amenoree prolactin-dependentă, cu tulburări menstruale sau cu acromegalie, tratamentul poate elimina sterilitatea pre-existentă. De aceea, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă ne hormonală. La pacienții cu acromegalie și antecedente de boală ulceroasă, în lipsa unor studii adecvate, se recomandă evitarea adm. Se impune prudență la pacienții cu antecedente de boli psihice, boli cardiovasculare grave, ulcer gastroduodenal și hemoragii digestive. Asocieri CI: alcaloizi din ergot și simpatomimetice, eritromicină și josamicină. Asocieri care necesită precauție: griseofulvină, levodopa, med. psihoactive sau hipotensoare. Poate fi influențată capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

RA: Greață, vărsături, gastralgii, pirozis, dispepsie, amețeli, hTA, lipotimie, astenie, somnolență, anxietate, cefalee și tahicardie. RA apar în primele zile de tratament și sunt de scurtă durată. Rar s-au observat erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.M
COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM

Cod ATC: A11CC02**A.T. 10[®] MERCK KGaA**; Sol. orală 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (**P-6L**)**TACHYSTIN AEROPHARM**; Sol. orală 0,1%; ct. × 1 fl. × 20 ml (**P-6L**)**Ind:** Hipoparatiroidie idiopatică sau postoperatorie; pseudohipoparatiroidie.**Dz:** Uzual: 0,5-1,5 mg/zi. Se poate adm. fie după mese fie pe nemâncate, cu puțin lichid.**Cind:** Hipersensibilitate la oricare din componentii produsului; hipercalcemie; hipervitaminoză D. Nu se recomandă asocierea cu: analogi sau metaboliți ai vit. D sau cu antiacide care conțin magneziu.**Al:** Prudență în cazul antecedentelor de litiază renală, arterioscleroză, IC, hiperfosfatemie, IR. Înainte de începerea trat. și în timpul acestuia se controlează calcemia. Prudență în cazul asocierii cu: diuretice tiazidice, doze mari de preparate conținând calciu, tiroxină. Prudență în timpul sarcinii și alăptării.**RA:** Hipercalcemie manifestată prin pierderea pozei de mâncare, gust metalic, greață, vărsături, diaree sau constipație, paloare facială, cefalee, palpitații, oboseală și senzație de slăbiciune, uscăciunea mucoasei bucale, sete. Afecțiuni renale, calcificări la nivelul cordului, plămânilor sau rinichilor. Dureri osoase și musculare, HTA, aritmii, urină tulbure, fotofobie, prurit, scădere în greutate. Suferință biliară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.N
COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXXETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R06AB03**FENISTIL®** NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Sol. orală 0,1%; ct. × 1 fl. × 10, 20 sau 50 ml (*P-RF*)**FENISTIL® gel** NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Gel 0,1 %; ct. × 1 tub × 30 g (*OTC*)

Ind: Trat. simptomatic al: urticarie, alergii ale căilor respiratorii superioare, alergii alimentare și medicamentoase, pruritului, înțepăturilor de insecte, eczeme și alte dermatoze pruriginoase.

Dz: *Int.: Adulți și copii peste 12 ani:* 3-6 mg/zi, divizat în 3 prize. *Copii:* 0,1 mg/kg/zi. *Topic:* 2-4 aplicații/zi.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenți. Copii sub o lună, în special copii prematuri.

AI: Glaucom. Retenție urinară asociată tulburărilor uretro-prostatice. Boli obstructive pulmonare cronice. La copii, antihistaminicele pot provoca agitație. Sub vârsta de 1 an, efectul sedativ al dimetindenului poate provoca episoade de apnee în timpul somnului. Se evită expunerea prelungită la soare a zonelor tratate. La sugari și copii mici, se evită folosirea dimetinden gel pe suprafețe întinse sau pe leziuni și inflamații cutanate. Precauție în cazul asocierii cu: deprimante ale SNC, IMAO, antidepressive triciclice, medicamente anticolinergice. Precauție, sau se evită adm., int. sau topic, în sarcină și perioada de alăptare; la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Somnolență, tulburări gastrointestinale, uscăciunea gurii și/sau a gâtului, vertij, agitație, cefalee, edem, erupții cutanate, spasme musculare, tulburări respiratorii, semne de iritație locală, reacții de hipersensibilizare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.O
COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKETOPIROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: G02AD02](#)

PROSTIN® E2 PHARMACIA & UPJOHN; Gel vaginal 1 mg, 2 mg; ct. × 1 seringă preumplută × 3 g gel (S/P-RF)

Ind: Întreruperea sarcinii. Inducerea travaliului.

Dz: Inducerea avortului și întreruperea unei sarcini patologice: Adm. locală extraamniotică, inj. în spațiul dintre peretele uterin și sacul amniotic: 3-5 mg. După 5-6 h de la prima inj. nereușită, trat. poate fi repetat cu 5-10 mg. Adm. locală intraamniotică prin metoda transabdominală sau cale de abordare vaginală: 25 mg, inj. poate fi repetată după 8-12 ore. Adm. i.v.: se adaugă 10-20 mg dinoprostona în 500 ml glucoză 5% sau ser fiziologic 0,45%; perf. trebuie începută la o rată de 0,5-1 ml/min și se crește până la max. 2 ml/min; perf. trebuie continuată max. 12 h. În caz de nereușită, poate fi repetată numai după o pauză de 12 h. Inducerea travaliului: inițial, 2-3 mg/min în p.i.v., doza poate fi crescută, la intervale de 20-30 min, în funcție de răspunsul activității uterine; max. 35-40 mg/min. Doza care se dovedește eficientă trebuie să fie menținută până la sfârșitul perioadei placentare.

Cind: Astm bronșic, faza activă a colitei ulceroase, drepanocitoză, HTA, epilepsie, uter cicatriceal.

Al: Prudență în: IC, bronșită spastică, forma activă a tbc pulmonare, faza de remisiune a colitei ulceroase, tulburări severe ale funcției hepatice, malformații congenitale uterine sau fibrom uterin. După întreruperea sarcinii este necesară o monitorizare adecvată pt. a confirma golirea completă a cavității uterine. Dacă întreruperea sarcinii a fost indusă cu dinoprostona (PGF2a), golirea cavității uterine trebuie neapărat dusă până la capăt. Adm. concomitentă de ocitocină și ergometrină potențează efectul dinoprostonei; efectele adverse pot fi, de asemenea, mai intense.

RA: Gastrointestinale (greață, vărsături, diaree, colici intestinale); crampe abdominale; tahicardie; dureri de cap, variații ale TA; bronhospasm; transpirații; slăbiciune; alergii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.P
COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKETOPIROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA

Cod ATC: A07BC05

SMECTA BEAUFOUR IPSEN; Pulb. susp. 3 g/plic; ct. × 10 sau 30 plicuri × 3,76 g pulb. (OTC)

Ind: Diareea acută a copilului. Diaree acută și cronică la adult. Sindrom de colon iritabil.

Dz: Int. *adult*: 3 plicuri/zi; *copil*: 1 plic/zi pentru 0-1 an, 2 plicuri/zi pentru 1-2 ani, 3 plicuri/zi peste 3 ani. Sindromul colonului iritabil: 3 plicuri/zi, timp de 1 săptăm., după care 2 plicuri/zi până la sfârșitul primei luni de trat. Curele se reiau la nevoie. Conținutul unui plic se suspendă în 1/2 pahar cu apă.

Al: Trat. nu înlocuiește rehidratarea. Pentru evitarea interferării cu absorbția altor substanțe adm. int., acestea se vor adm. cu o oră înaintea diosmectitei.

RA: Constipație.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AC07

COMBINATII - LIT.Q
COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM

DIPYRIDAMOL OZONE LAB.; Dj. 25 mg; ct. × 6 blist. × 10 dj. (OTC)

DIPYRIDAMOL SICOMED SA; Cpr. film. 25 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr., ct. × 6 blist. × 10 cpr. (OTC)

Ind: Cardiopatie ischemică cronică. Profilax. tromboembolismului după înlocuire de valve cardiace, în trat. diferitelor afecțiuni tromboembolice; adm. i.v. în testul de stres pentru diagnosticul scintigrafic al bolii cardiace ischemice, echocardiografie. Utilizări posibile (asociat cu aspirina): limitarea evolutivității complicațiilor diabetului zaharat; stadii inițiale ale bolii Kawasaki; profilaxia migrenei; tulburări vasculare periferice.

Dz: Int.: *adulti*: 300-600 mg/zi; *copii*: 5 mg/kg/zi, cu aproximativ 1 oră înaintea mesei. Inj. i.v.; în testul de stres pt. diagnostic scintigrafic al bolii cardiace ischemice: 560 µg/kg timp de 4 min (sau 300-400 mg p.o.) Echocardiografie: 750-840 µg/kg.

Cind: Criza de angină pectorală, IMA recent, hTA, angina instabilă, tulburări de coagulare. Sol. inj. nu se asociază cu alte preparate.

Al: Precauție în cazul asocierii cu: derivați de xantină, anticoagulante orale, penicilină, cefalosporină, cloramfenicol, tetraciclină. Prudență în sarcină, în special în trimestrul al II-lea și al III-lea.

RA: Tulburări digestive (greață, vomă, diaree), amețeli, slăbiciune, rash cutanat, dureri precordiale, aritmii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N07BB05

COMBINATII - LIT.R
COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXTETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM

ANTALCOL® SINTOFARM SA; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 30 sau 50 cpr. (S/P-RF)

Ind: Alcoolismul cronic, ca trat. adjuvant.

Dz: Prima zi 500 mg-1,5 g, zilele 2-10 câte 500 mg-1 g/zi, apoi trat. de întreținere: 500 mg la 2-3 zile.

Cind: Afecțiuni miocardice și coronariene, IH, diabet, epilepsie, psihoză, sarcină, farmacodependență. După ingestia recentă de alcool (în ultimele 24 de ore). Nu se asociază cu: anticoagulante cumarinice, fenitoină, metronidazol, izoniazidă, barbiturice, fenotiazine, haloperidol, clorprotixen, antihistaminice, ACTH.

Al: Prudență în boli ale tiroidei, leziuni cerebrale, nefrită, hepatită. Trat. se începe în spital necesitând cooperarea bolnavului.

RA: Gust neplăcut, tulburări digestive, halenă fetidă, cefalee, astenie, tulburări de memorie, somnolență, impotență, erupții alergice, polinevrite, nevrită optică, fenomene psihotice. După ingestia de alcool sunt posibile reacții grave: deprimare respiratorie, colaps, aritmii cardiace, comă, convulsii, moarte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D05AC01

COMBINATII - LIT.S
COMBINATII - LIT.T
COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DESKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM

PSORIANOL 0,5%; PSORIANOL 1% HYPERION SA; Ung. 0,5%, 1%; ct. × 1 tub × 20 g (*P-RF*)

Ind: Tratatamentul psoriazisului, inclusiv la nivelul scalpului. Alopecia areata.

Dz: Se aplică o dată/zi pe zona afectată.

Cind: Hipersensibilitate la una din componentele produsului; leziuni deschise.

Al: Nu se aplică pe mucoase. Trebuie evitată aplicarea pe față. Sarcină și alăptare.

RA: Reacții de sensibilizare. Poate modifica colorația părului și a unghiilor. Adm. dozelor crescute duce la afectare renală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.T
 COMBINATII - LIT.U
 COMBINATII - LIT.V
 COMBINATII - LIT.W
 COMBINATII - LIT.X
 COMBINATII - LIT.Y
 COMBINATII - LIT.Z
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
 COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
 CYANOCOBALAMINUM
 CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
DIVERSE

DESCRIERE

INFO

ACTOVEGIN 5% CREMĂ; ACTOVEGIN 5% UNGUENT**Cod ATC: D03AXN1**

NYCOMED; Cremă; Unguent; 1 g conține hemoderivat deproteinizat din sânge de vițel 0,05 ml (corespunzând unei mase uscate de 2 mg); ct. × 1 tub. × 20 sau 50 g (cremă), respectiv ct. × 1 tub. × 20, 30 sau 50 g (ung.) (**P-6L**)

Ind: *Cremă:* Ulcer varicos și alte ulceratii cu suprafață infectată. Pentru profilaxia și tratamentul escarelor de decubit. Pentru profilaxia și tratamentul reacțiilor provocate de iradiere. În general, în tratamentul proceselor supurative.

Ung.: Ulcer varicos și alte ulceratii cu suprafață infectată. Pentru profilaxia și tratamentul escarelor de decubit. Pentru profilaxia și tratamentul reacțiilor provocate de iradiere. În general, în tratamentul proceselor nesupurative.

Dz: *Cremă:* În ulceratii: după începerea tratamentului cu gel 20%, se aplică în strat subțire cremă 5%. Pentru prevenirea escarelor de decubit: crema se aplică și se masează pe zonele cutanate cu risc. Pentru prevenirea reacțiilor după iradiere: crema se aplică în strat subțire după radioterapie și în intervalul dintre iradiere.

Ung.: În ulceratii: unguent 5%, se aplică în strat subțire în finalul "tratamentului în trei etape", după gel 20% și cremă 5%. Pentru tratamentul și prevenirea escarelor de decubit: unguentul se masează pe zonele cutanate expuse riscului. Pentru prevenirea reacțiilor după iradiere: unguentul este aplicat în strat subțire după radioterapie și în intervalul dintre iradiere.

Cind: Alergie cunoscută la componentele lui.

RA: Reacții cutanate alergice.

ACTOVEGIN**Cod ATC: A16AXN1**

NYCOMED; Dj. 200 mg hemoderivat deproteinizat din sânge de vițel; ct. × 1 fl. × 30, 50 sau 100 dj. (**P-6L**)

Ind: În tratamentul afecțiunilor metabolice și circulatorii cerebrale. Continuarea tratamentului injectabil și a perfuziilor din afecțiunile metabolice și circulatorii cerebrale.

Dz: 1-2 drajee se iau cu puțin lichid înainte de masă; de trei ori câte două drajee pe zi. Drajeele pot fi administrate pe o perioadă de 4-6 săptămâni.

Cind: Alergie cunoscută la componentele lui.

RA: Reacții cutanate alergice

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.U
COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01CA07

DOBUTAMIN SOLVAY® 250 INFUS SOLVAY PHARMACEUTICALS; Sol. perf. 250 mg/50 ml; ct. × 1 f. × 50 ml (S)
DOBUTREX® ELI LILLY; Pulb. liof. pt. sol. perf. 250 mg; ct. × 1 fl. (S)

Ind: Stimularea inotropismului în stări de hipoperfuzie, la pacienți cu debit cardiac insuficient. Suport inotrop necesar pacienților cu presiuni ventriculare de umplere anormal de crescute (IC acută, IMA, șoc cardiogen, după int. chir. pe cord, supradozare de β-blocanți, IC cronică; stări de hipoperfuzie acută secundară traumatismelor, int. chir., septicemiilor sau hipovolemiei, când TA medie este peste 70 mmHg și presiunea pulmonară capilară este de 18 mmHg sau mai mare, cu răspuns inadecvat la volumul de umplere și presiune ventriculară de umplere crescută; debit cardiac scăzut ca urmare a ventilației mecanice cu presiune expiratorie pozitivă). Testarea în scop dia-gnostic a bolii coronariene.

Dz: Adm. în p.i.v. continuă. 2,5 și 40 μg/kg/min. Ritmul de adm. și durata terapiei trebuie ajustate pe baza următorilor indicatori clinici: parametri hemodinamici-frecvența și ritmul cardiac, TA, debitul cardiac și presiunile de umplere ventriculară și semnele congestiei pulmonare și ale irigației diferitelor organe (excreția urinară, temperatura cutanată și starea psihică).

Cind: Sensibilitate la dobutamină.

Al: Soluțiile saline nu trebuie utilizate în reconstituirea dobutaminei clorhidrat. Doza trebuie redusă sau chiar se poate opri temporar trat. dacă apar creșteri nedorite ale frecvenței cardiace sau presiunii sistolice sau dacă apar fenomene aritmice. Precauție în cazul pacienților cu flutter atrial, fibrilație atrială, IMA. Nu îmbunătățește hemodinamica la majoritatea pacienților cu obstrucții mecanice care împiedică fie umplerea, fie golirea ventriculară, sau pe amândouă. Răspunsul inotrop poate fi inadecvat în cazul pacienților cu o marcată reducere a complianței ventriculare. Trebuie monitorizate atent frecvența cardiacă, ritmul cardiac, debitul cardiac, TA și ritmul de perfuzie. Atenție în șocul cardiogen cu hTA severă. Unele efecte hemodinamice ale dobutaminei pot să difere la copii în comparație cu adulții. Copiii trebuie monitorizați cu mare atenție. Terapia cu dobutamină se va întrerupe prin reducerea gradată a dozei. Efectele dobutaminei pot fi contracarate de b-blocante. Precauție în timpul sarcinii.

RA: Creșterea excesivă a frecvenței cardiace și a presiunii sistolice, aritmii ectopice; flebită la nivelul inj. i.v.; greață, dureri de cap, durere anginoasă, dureri toracice nespecifice, palpitații, tahipnee și reacții sugestive pentru hipersensibilitate (erupții eritematoase, febră, eozinofilie și bronhospasm).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

COMBINATII - LIT.V
COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01CD02

TAXOTERE AVENTIS PHARMA/SINDAN SRL; Conc. pt. sol. perf. 40 mg/ml; ct. × 1 fl. × 0,5 ml + 1 fl. × 1,5 ml solv.; ct. × 1 fl. × 2 ml + 1 fl. × 6 ml solv. **(S)**

Ind: Trat. neoplasmului de sân, al celui ovarian, pulmonar, al capului și gâtului.

Dz: Perf. i.v. lentă, uzual 20-80 mg o dată la 3 săpt.; doza se calculează în funcție de suprafața corporală.

Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului; leucopenie; afecțiuni hepatice severe; perioadă de sarcină sau alăptare.

Al: Înaintea fiecărei adm. este necesară testarea hemoleucogramei și a funcției hepatice. Începând cu o zi înaintea adm. și continuând 2 zile după adm. este utilă asocierea unui steroid. În caz de neoplasm al capului sau gâtului, este utilă asocierea cu un antibiotic. În cazul în care concentratul sau sol. perf. vine în contact cu pielea sau mucoasele, acestea se spală imediat.

RA: Reacții alergice: eritem, prurit, senzație de constricție toracică, respirație dificilă, astenie, febră, frisoane; rar, convulsii sau pierderea temporară a cunoștinței. Între adm. pot să apară: anemie, leucopenie, trombocitopenie, creșterea enzimelor hepatice, febră, eritem la nivelul palmelor sau tălpilor, erupții buloase de tip eritem multiform sau sd. Stevens-Johnson, modificarea culorii sau căderea unghiilor, tumefierea mâinilor, a picioarelor sau creștere în greutate. Senzație de amorțeală sau dureri articulare sau musculare. Tulburări digestive; greață, vărsături, diaree, usturimi ale gurii, alopecie reversibilă, colită; rar, hepatită. Aritmii, amețeli sau senzație de slăbiciune. Durere, eritem și uscăciunea pielii, flebită și tumefiere la locul inj.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.W
COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM

Cod ATC: A04AD**ANZEMET® 100 mg/5 ml; ANZEMET® 12,5 mg/0,625 ml GRUPPO LEPETIT;** Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 1 f. (P-RF)**ANZEMET® 200 mg PATHEON;** Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 blist. × 1 sau 3 cpr.; ct. × 10 blist. × 3 cpr. (P-RF)**Ind:** Prevenirea grețurilor și vărsăturilor produse de chimioterapie sau cele postoperatorii.**Dz:** *Prevenirea grețurilor și vărsăturilor produse de chimioterapie: adulți:* 100 mg cu o oră înaintea chimioterapiei. *Copii (2-16 ani):* 1,8 mg/kg, cu o oră înaintea chimioterapiei; max. 100 mg/zi. *Prevenirea grețurilor și vărsăturilor postoperatorii: adulți:* 100 mg cu 2 ore înaintea operației. *Copii (2-16 ani):* 1,2 mg/kg, cu 2 ore înaintea operației.**Cind:** Hipersensibilitate la produs.**Al:** Modifică ECG, induce tulburări de conducere. Prudență la pacienții cu: hipokalemie, hipomagneziemie, sindrom congenital QT, la cei trat. cu antiaritmice care prelungesc QT, trat. cu antracicline.**RA:** Rash, transpirații, constipație, dispepsie, anorexie, rar pancreatită, tulburări de gust, tinnitus, fotofobie, agitație, tulburări de somn, creșteri tranzitorii ale transaminazelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03FA03

COMBINATII - LIT.X
COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM

MOTILIUM JANSSEN PHARMACEUTICA; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MOTILIUM 10 mg TERAPIA SA/JANSSEN PHARMACEUTICA; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MOTILIUM LINGUAL JANSSEN PHARMACEUTICA; Liof. oral 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 liof. orale (P-6L)

Ind: Sindromul dispeptic complex (golire gastrică întârziată, reflux gastro-esofagian și esofagite). Greață și vomă (indicație specifică este greața și voma provocată de antagoniști ai dopaminei).

Dz: Dispepsie cronică: *Adulți:* 10 mg de 3 ori/zi, cu 15-30 min înainte de mese. *Copii peste 5 ani:* 2,5 mg/10 kg de 3 ori/zi, înainte de mese. Când rezultatele nu sunt satisfăcătoare, dozajul de mai sus poate fi dublat. Stări acute și subacute (în special greață și vomă): *Adulți:* 20 mg de 3-4 ori/zi, înainte de mese și înainte de culcare. *Copii peste 5 ani:* 5 mg/10 kg, de 3-4 ori/zi, înainte de mese și înainte de culcare. La pacienții cu IR, frecvența adm. trebuie redusă.

Cind: Intoleranță cunoscută la medicament. Când stimularea motilității gastrice poate fi periculoasă. La pacienții cu prolactinom. La copii sub 5 ani.

Al: În afecțiuni hepatice și renale. Atenție în cazul adm. concomitente cu: medicamente anticolinergice, antisecretoare și antiacide. Precauție la femei însărcinate sau în perioada de alăptare.

RA: Crampe intestinale tranzitorii. Fenomenele extrapiramidale. Creștere a nivelului prolactinei care poate duce la galactoree și ginecomastie. Efecte neurologice. Reacții alergice (prurit, urticarie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06DA02

COMBINATII - LIT.Y
COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM

ARICEPT® 5 mg; ARICEPT® 10 mg PFIZER; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)

Ind: Boala Alzheimer, forme ușoare și medii.

Dz: Oral. *Adulți/vârstnici:* inițial 5 mg/zi, doză unică, seara, înainte de culcare. După o lună de trat. doza poate fi crescută la 10 mg/zi, doză unică.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la componente sau la derivați de piperidină. În sarcină și în perioada de alăptare. La copii.

Al: A se monitoriza regulat adm. medicamentului. Beneficiul clinic trebuie reevaluat periodic. Întreruperea trat. trebuie avută în vedere atunci când efectul terapeutic nu mai este evident. Este posibil să accentueze relaxarea musculară tip succinilcolină în timpul anesteziei. Precauție la pacienții cu "sick sinus syndrome" sau alte tulburări de conducere supraventriculară. Pacienții cu risc de ulcer trebuie monitorizați pt. simptomatologie activă sau ocultă de hemoragie gastro-intestinală. Precauție la pacienții cu astm sau afecțiuni pulmonare obstructive. Trebuie evitată adm. concomitentă cu alți inhibitori de acetilcolinesterază, agoniști sau antagoniști colinergici. Precauție în cazul asocierii cu: teofilină, warfarină, cimetidină, digoxină, ketoconazol, chinidinele, itraconazol, eritromicină, fluoxetină, rifampicină, fenitoină, carbamazepină, alcool, medicația anticolinergică, succinilcolină, alți agenți blocați neuromusculari sau agoniști colinergici sau b-blocanți.

RA: Diaree, crampe musculare, oboseală, greață, vărsături, insomnie, cefalee, dureri, răceală, tulburări abdominale, sincopă, bradicardie, bloc sinoatrial și atrioventricular, creșterea nivelului seric al creatinkinazei musculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMBINATII - LIT.Z
COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM

Cod ATC: C01CA04**DOPAMIN SOLVAY® 200 SOLVAY PHARMACEUTICALS;** Sol. perf. 200 mg/10 ml; ct. × 5 f. × 10 ml (S)**CLORHIDRAT DE DOPAMINĂ 0,5% ZENTIVA ROMANIA;** Conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 10 ml (S)**Ind:** Stările de șoc (cardiogen, postoperator, hipovolemic, septic, anafilactic); hTA severă; iminență de șoc sau de IR.**Dz:** P.i.v. *Adult:* 100-1500 µg/min. *Copii:* 4-6 µg/kg/min. Sol. de perf. trebuie preparată imediat înainte de adm. După stabilizarea clinică, perf. de dopamină nu trebuie întreruptă brusc. Durata perfuziei depinde de condițiile individuale.**Cind:** Hipertiroidism, feocromocitom, glaucom cu unghi închis, adenom de prostată, tahiaritmii, fibrilație ventriculară, vasoconstricție periferică cu postsarcină crescută, astm bronșic cu hipersensibilitate la sulf.**Al:** Prudență la bolnavii cu ateroscleroză sistemică, la cei cu boli vasculare și la diabetici. Simpatomimeticele figurează pe lista substanțelor dopante (este interzisă la sportivi). Prudență în cazul asocierii cu: guanetidină, IMAO, diuretice, antidepressive triciclice, anestezice, fenitoină, alcaloizi din ergot, tiamină. Prudență în timpul sarcinii.**RA:** Greață, vărsături, cefalee, agitație, tremor al degetelor, simptome de angină pectorală, palpitații, creșterea TA, tulburări de ritm cardiac (tahicardie sinusală, ritmuri ectopice supraventriculare și ventriculare), creștere a presiunii telediastolice a ventriculului stâng, necroza tegumentelor, necroză paravenoasă. Risc de hemoragie gastrointestinală din cauza redistribuției fluxului sanguin.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMPLEX DE HIDROXID DE FER POLIMALTOZAT
COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA

Cod ATC: R05CB13

PULMOZYME® HOFFMANN LA ROCHE; Sol. inhal. 1000 UI (1 mg)/1 ml; ct. × 6 f. unidoză × 2,5 ml (S)

Ind: Fibroză chistică (pacienți cu CVF mai mare de 40% sau cu vârstă peste 5 ani).

Dz: 2500 UI, în doză unică zilnică. Pacienții peste 21 ani pot beneficia de adm. a 2 prize zilnice.

Cind: Hipersensibilitate la produs sau la componenții săi. Mamele care alăptează.

Al: Nu trebuie amestecată în nebulizator cu alte medicamente sau soluții. Precauție la femei însărcinate.

RA: Faringită, alterarea vocii, laringită, eritem epidermic, cu sau fără prurit. La inițierea trat. funcția pulmonară se poate deteriora, iar expectorația poate crește cantitativ. Eritem cutanat, urticarie. La unii pacienți s-au dezvoltat anticorpi anti alfa-dornază.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COMPLEX DE HIDROXID DE FER SUCROZA
CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM

Cod ATC: S01EC03

TRUSOPT® MERCK SHARP & DOHME; Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)

Ind: Trat. hipertensiune oculară; glaucom cu unghi deschis; glaucom pseudoexfoliativ și alte glaucoame secundare cu unghi deschis.

Dz: Monoterapie: o pic. de 3 ori/zi în ochiul afectat (ochii afectați). Terapie complementară: o pic. de 2 ori/zi în ochiul afectat (ochii afectați).

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.

Al: Precauție la pacienți cu afectare renală severă; pacienți cu glaucom cauzat de închiderea acută a unghiului; pacienți cu afectare hepatică. Dacă apar semnele unor reacții severe de hipersensibilitate sau reacții adverse locale oculare (conjunctivite, reacții palpebrale) trebuie întreruptă adm. medicamentului. Nu este recomandată adm. concomitentă cu alți inhibitori ai anhidrazei carbonice. Prudență la femei însărcinate sau care alăptează.

RA: Gust amar, arzător sau usturător, greață, vedere neclară, lăcrimare, cefalee, conjunctivită, iritarea pleoapei și astenie. Iridociclita și rash-ul au fost raportate rareori. A fost raportat un caz de litiază renală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CYANOCOBALAMINUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXTETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM

COD ATC: C02CA04, G04CAN1**CARDURA XL 4 mg PFIZER**; Cpr. cu elib. prel. 4 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)**DOZASIN® 1 mg, DOZASIN® 2 mg, DOZASIN® 4 mg PROMEDIC SRL**; Cpr. 1 mg, 2 mg, 4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)**KAMIREN® KRKA**; Cpr. 1 mg, 2 mg, 4 mg; ct. × 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)**MAGUROL MEDOCHEMIE Ltd.**; Cpr. 1 mg, 2 mg sau 4 mg; ct. × 2 blist. × 7 cpr. (P-6L)**ZOXON 1; ZOXON 2; ZOXON 4 ZENTIVA AS**; Cpr. 1 mg, 2 mg sau 4 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 15 cpr. (1 mg), ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (2 mg); ct. × 3 sau 10 blist. × 10 cpr. (4 mg) (P-6L)**Ind:** HTA. Hipertrofia benignă de prostată.**Dz:** Oral. HTA: 1-16 mg/zi. Hipertrofia benignă de prostată: 2-4 mg/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la chinazoline.**A!:** Precauție la pacienții cu IH. Prudență în timpul sarcinii sau lactației; la șoferi și persoane cu activități de precizie.**RA:** Amețeală, cefalee, oboseală, greață, vertij, edem, astenie, somnolență, rinită, tulburări gastrice (dureri abdominale, diaree și vărsături), agitație, tremor, incontinență urinară, priapism și impotență, reacții alergice, epistaxis, tahicardie, palpitații, durere toracică, angor, IM, accidente cerebrovasculare, aritmii cardiace, privire încețoșată.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CYCLOPHOSPHAMIDUM
 CYCLOSERINUM
 CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
DOXEPINUM

Cod ATC: N06AA12**DOXEPIN 25 mg TERAPIA SA;** Dj. 25 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. **(P-RF)**

Ind: Sindroame depresive cu componentă anxioasă; psihoze/nevroze endogene sau de involuție; stare depresivă postpartum sau în sindromul de abținere la alcool, sedative sau hipnotice; afecțiuni somatice însoțite de anxietate; psihoză maniaco-depresivă.

Dz: 75-150 mg/zi; max. 300 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la doxepină, glaucom cu unghi îngust, retenție urinară, IH gravă, copii sub 12 ani. Asocierea cu IMAO. Perioada de alăptare.

Al: Pacienții depresivi vor fi supravegheați îndeaproape în perioada de început a trat. (risc crescut de suicid). Prudență la vârstnici, epileptici, cei cu IM recent, hipertiroidism, afecțiuni hepatice și intercurrente. În timpul trat. nu se consumă băuturi alcoolice! Prudență în cazul asocierii cu: hipnotice, tranchilizante, guanetidină, clonidină, alte antidepresive, anticolinergice, simpatomimetice directe, hormoni tiroidieni, anestezice, cimetidină. Prudență în perioada de sarcină; la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: *Anticolinergice:* uscăciunea gurii, tulburări de vedere, constipație, transpirație, retenție urinară. *Cardiovasculare:* hTA sau HTA, tahicardie, aritmii. *Gastrointestinale:* greață, vomă, indigestie, tulburări gustative, diaree, anorexie. *Endocrine:* tulburări ale libidoului, ginecomastie, tumefacția sânilor și galactoree la femei, scăderea glicemiei. *SNC:* amețeală, confuzie, dezorientare, halucinații, parestezie, ataxie, tulburări extrapiramidale, tremor, convulsii. *Hematologice:* eozinofilie, leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, purpură. *Alergice:* prurit cutanat, edem facial, fotosensibilitate, erupție.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CYCLOSERINUM
CYPROHEPTADINUM
CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXTETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM

Cod ATC: L01DB01

ADIRBLASTINA RD; ADIRBLASTINA RD 50 mg SINDAN SRL/ PHARMACIA UPJOHN; Liof. pt. sol. perf. 10 mg, 50 mg; ct. × 1 fl. (S)

ADIRBLASTINA® PFS 10 mg/5 ml; ADIRBLASTINA® PFS 50 mg/25 ml SINDAN SRL/PHARMACIA UPJOHN; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml, respectiv ct. × 1 fl. × 25 ml (S)

CAELYX SCHERING PLOUGH EUROPE; Conc. pt. sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 sau 10 fl. × 10 ml; ct. × 1 sau 10 fl. × 25 ml (S)

DOXOLEM LEMERY SA; Liof. pt. sol. inj. 10 mg, 50 mg; ct. × 1 f. liof. + 1 f. solv. × 5 ml (S)

DOXORUBICIN "EBEWE" EBEWE PHARMA; Conc. pt. perf. 10 mg, 50 mg; ct. × 1 fl. × 5 ml, resp. ct. × 1 fl. × 25 ml (S)

DOXORUBICIN TEVA TEVA; Liof. pt. sol. inj. 10 mg; ct. × 1 fl. pulb. (S)

SINDROXOCIN® 10 mg; SINDROXOCIN® 50 mg SINDAN SRL; Liof. pt. sol. perf. 10 sau 50 mg; ct. × 1 fl. (S)

Ind: Leucemie limfoblastică, leucemie mieloblastică acută, tumora Wilms, neuroblastom, osteosarcoame și sarcoame ale țesuturilor moi, carcinom de sân, pulmonar, carcinomul vezicii biliare, carcinom tiroidian, limfoame Hodgkin și non-Hodgkin, carcinomul bronșic cu celule mici și carcinomul gastric. Adm. intravezical este eficientă în tumorile vezicale superficiale. Este eficientă în cancerul ovarian în stadiu avansat, cancer de sân metastatic, sarcomul Kaposi corelat cu SIDA. Puțin eficace în: melanomul malign, cancerul renal, cancerul intestinului gros, tumorile cerebrale și metastazele de la nivelul SNC.

Dz: Adm. i.v. În monoterapie: *adulți*: 60-75 mg/m² la 21 de zile. *Copii*: 30 mg/ m²/zi trei zile consecutiv, repetată la 4 săpt. Doza cumulativă max.: 550 mg/ m². Asociat cu agenți chimioterapeutici cu acțiune mielosupresivă: 25-50 mg/ m² la 3-4 săpt.; asociat cu agenți chimioterapeutici fără acțiune mielosupresivă: 60-75 mg/m². La pacienții cu LH se reduce doza. Adm. intravezical: 30-50 mg/instilare, la o săpt. - o lună.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele preparatului. Sarcină și alăptare. În trat. SK-SIDA care poate fi trat. eficient prin adm. terapiei locale sau a alfa-interferonului sistemic. La pacienții cu mielosupresie severă. La pacienții trat. anterior cu doze cumulative de doxorubicină și/sau daunorubicină. Trat. local intravezical este Cind la pacienții cu tumori vezicale complicate cu obstruarea uretrală sau cu infecții ale tractului urinar.

Al: Pe perioada primei cure de trat. se impune o supraveghere atentă și frecventă a pacientului. O atenție particulară se va acorda cardiotoxicității induse de doxorubicină. Se recomandă efectuarea ECG înainte și după fiecare ciclu de tratament. Cardiomiopatia indusă de clorhidratul de doxorubicină este asociată în mod specific cu reducerea persistentă a voltajului undei QRS, prelungirea duratei intervalului sistolic și reducerea fracției de ejeție, evidențiate prin ECG sau prin angiografie cu nuclid radioactiv. Este necesară monitorizarea: nivelului plasmatic al acidului uric și a nr. elem. figurate. Adm. de doxorubicină poate să potențeze toxicitatea altei terapii anticanceroase. Înaintea începerii trat. și, eventual, în timpul acestuia, se recomandă efectuarea de examene de laborator de rutină pentru a controla funcția hepatică. În cazul adm. intravezicale, se recomandă spălarea atentă a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01AA02

CYPROHEPTADINUM
 CYPROTERONUM
 CYTARABINUM
 DACARBAZINUM
 DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM

DOXICICLINA ARENA GROUP SA; Cps. 100 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
DOXICICLINA EUROPHARM SA; Cps. 100 mg; ct. × 1 sau 50 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
DOXICICLINĂ LEK PHARMATECH; Cps. 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
DOXICICLINĂ ANTIBIOTICE SA; Cps. 100 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
DOXYDAR DAR AL DAWA; Cps. 100 mg; ct. × 1 blist. × 8 cps. (P-RF)
REMICYN REMEDICA; Cpr. film. 100 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
UNIDOX SOLUTAB ASTELLAS PHARMA; Cpr. disp. 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. disp. (P-RF)
VIBRAMYCIN® PFIZER; Cps. 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)

Ind: Infecții produse de microorganisme sensibile: Rickettsii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Calymmatobacterium granulomatis, Borrelia recurrentis și B. duttoni, Ureaplasma urealyticum, Plasmodium falciparum; microorganisme gram-negativ: Haemophilus ducreyi, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Bartonella bacilliformis, Bacteroides sp., Fusobacterium sp., Campylobacter fetus, Brucella. Se recomandă testarea sensibilității. Este indicată în trat. infecțiilor determinate de următoarele microorganisme gram-negativ, atunci când testarea bacteriologică indică o sensibilitate adecvată la antibiotic: Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Shigella sp., Acinetobacter sp., Haemophilus influenzae, specii de Klebsiella, Branhamella catarrhalis. Este indicată în trat. infecțiilor determinate de următoarele microorganisme grampozitiv, atunci când antibiograma indică o sensibilitate adecvată: Streptococcus sp., Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Când este Cind penicilina, doxiciclină constituie o alternativă pentru trat. infecțiilor determinate de: Treponema pallidum și treponema pertenue, Listeria monocytogenes, Clostridium sp., Bacillus anthracis, Leptotrichia buccalis, Actinomyces sp. Pt. profilaxia și trat. leptospirozelor; holerei. Este indicată în profilaxia următoarelor afecțiuni: Tifos tsutsugamushi; diareea călătorilor; malarie.

Dz: Int. *Adulți:* 200 mg în prima zi de trat. (adm. ca doză unică sau câte 100 mg la 12 ore), urmată de doze de întreținere de 100 mg o dată pe zi. În cazul infecțiilor severe, se adm. 200 mg/zi pe tot parcursul perioadei de trat. *Copii cu vârsta peste 8 ani; cu greutatea < 50 kg:* 4 mg/kg în prima zi de trat., iar în zilele următoare 2 mg/kg o dată pe zi. Pentru infecții severe se poate adm. max. 4 mg/kg. *Copii cu greutate peste 50 kg* poate fi adm. doza uzuală a adultului. Trat. trebuie continuat cel puțin 24-48 h după dispariția simptomelor și febrei.

Cind: Hipersensibilitate la doxiciclină sau alte tetraciline. Copii mai mici de 8 ani. Sarcină, începând cu luna a 2-a; alăptare. Este Cind asocierea cu penicilină; antiacide cu aluminiu, calciu sau magneziu, preparate de fer și săruri de bismut.

Al: Folosirea în timpul dezvoltării dentiției poate produce colorarea permanentă a dinților. S-a observat o diminuare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03AD02

CYPROTERONUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXXETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM

NO-SPA® CHINOIN - Membru al SANOFI~SYNTHELABO GROUP; Cpr. 40 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (OTC)

NO-SPA® FORTE CHINOIN - Membru al SANOFI~SYNTHELABO GROUP; Cpr. 80 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (OTC)

NO-SPA® 40 mg/2 ml CHINOIN - Membru al SANOFI~SYNTHELABO GROUP; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 5 sau 25 f. × 2 ml (P-RF)

NO-SPA® FORTE 80 mg/4 ml CHINOIN - Membru al SANOFI~SYNTHELABO GROUP; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 5 sau 25 f. × 4 ml (P-RF)

SPASMOCALM MAGISTRA C&C; Cpr. 40 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)

Ind: Ca antispastic în: spasme ale musculaturii netede a căilor biliare sau ale musculaturii netede a tractului urinar. Ca trat. adjuvant în: ulcerul gastric sau duodenal, gastrită, enterită, colită, spasme ale sfincterelor cardia și piloric; sindromul de intestin iritabil, constipație spastică sau meteorism, pancreatită; dismenoree, anexită, dureri intense în timpul travaliului, contracții tetanice uterine, iminență de avort.

Dz: Adm. int. *Adulți:* 120-240 mg/zi, fracționat în 2-3 prize. *Copii: între 1-6 ani:* 40-120 mg/zi, fracționat în 2-3 prize; *peste 6 ani:* 80-200 mg/zi, fracționat în 2-5 prize. Adm. inj.: 40-80 mg, inj. s.c. sau i.m. de 1-3 ori/zi. În caz de colică litiazică acută renală și/sau biliară se inj. 40-80 mg i.v. lent (în 30 de secunde).

Cind: IH, IR, IC severă, BAV de gr. II sau III. *ofatul sau folosirea utilajelor este Cind timp de o oră după adm. i.v.

Al: În cazul adm. i.v. pacienții trebuie să se aple în poziție culcată. La pacienții cu intoleranță la lactoză, cpr. pot provoca tulburări gastrointestinale. Prudență în cazul asocierii cu levodopa. Precauție în timpul sarcinii și al alăptării.

RA: Cefalee, vertij, palpitații, greață; hTA după adm. i.v.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DESKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G04CB02

AVODART® GLAXO SMITHKLINE; Cps. moi 0,5 mg; ct. × 1, 3 sau 9 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

Ind: Tratamentul simptomelor moderate-severe ale hiperplaziei benigne de prostată (HBP).

Dz: *Adulți (inclusiv vârstnici)*, 0,5 mg dutasteridă (o capsulă moale) oral, în priză unică. Capsulele moi trebuie înghițite întregi și pot fi adminis-trate cu sau fără alimente. În insuficiența renală nu se preconizează redu-cerea dozelor (după o doză de 0,5 mg dutasteridă, concentrația în urină este mai mică de 0,1%).

Cind: Sarcină (poate inhiba dezvoltarea organelor genitale externe la fătul de sex masculin), femei în perioada sexuală activă (cantități mici de dutasteridă au fost regăsite în sperma subiecților tratați, de aceea se recomandă ca pacientul să utilizeze un prezervativ), copii și adolescenți. Pacienți cu hipersensibilitate la dutasteridă, la alți inhibitori de 5-alfa reductază sau la oricare dintre excipienții produsului. Pacienți cu insuficiență hepatică se-veră.

Al: La pacienți cu HBP, tușeul rectal și alte investigații pentru cancerul de prostată trebuie efectuate înainte de începerea tratamentului și periodic după aceea. Femeile, copiii și adolescenții trebuie să evite contactul cu capsulele moi care curg (în cazul contactului cu capsulele moi care curg, aria de contact trebuie spălată imediat cu apă și săpun). Precauții la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară-moderată. În timpul tratamentului cu dutasteridă, trebuie evaluată atent orice creștere susținută a concentrațiilor plasmaticice ale antigenului prostatic specific (APS), componentă importantă în cadrul screening-ului pentru depistarea cancerului de prostată, având în vedere inclusiv lipsa complianței la tratament. Prudență la asocierea cu verapamil, diltiazem, ritonavir, indinavir, nefazodon, itraconazol, ketoconazol.

RA: Impotență, alterarea (scăderea) libidoului, tulburări de ejaculare, ginecomastie. Incidența reacțiilor adverse scade în timp.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DACARBAZINUM
DACLIZUMABUM
DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03DB01**DUPHASTON®** SOLVAY PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (P-RF)

Ind: Deficit endogen de progesteron (tulburări menstruale, endometrioză, sindrom premenstrual, infertilitate și avort habitual, terapie de substituție hormonală).

Dz: *Dismenoree:* 10 mg, de 2 ori/zi, din ziua 5 până în ziua 25 a ciclului; *Endometrioză:* 10 mg, de 2-3 ori/zi, din ziua 5 până în ziua 25 a ciclului, sau continuu; *Amenoree secundară:* un estrogen, o dată/zi, din ziua 1 până în ziua 25 a ciclului, asociat cu 10 mg didrogesteronă, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Hemoragie uterină disfuncțională:* pentru oprirea hemoragiei: 10 mg, de 2 ori/zi, împreună cu un estrogen, o dată pe zi, 5-7 zile; pentru a preveni hemoragia: un estrogen, o dată/zi, pe toată durata ciclului, asociat cu 10 mg didrogesteronă, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Sindrom premenstrual:* 10 mg, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Infertilitate cauzată de insuficiența luteală:* amenințare de avort: 40 mg o dată, apoi 10 mg la 8 ore, până la dispariția simptomelor; *Avort habitual:* 10 mg, de 2 ori/zi, până în săpt. a 20-a de sarcină; infertilitate: 10 mg, de 2 ori/zi, din ziua 11 până în ziua 25 a ciclului; *Trat. de substituție hormonală menopauză/postmenopauză:* asociat cu terapie estrogenică continuă: 10-20 mg didrogesteronă, zilnic, în ultimele 12-14 zile ale fiecărui ciclu de 28 zile; în combinație cu terapie estrogenică ciclică: 10-20 mg didrogesteronă, zilnic, în ultimele 12-14 zile ale ciclului de terapie estrogenică.

Cind: Hipersensibilitate față de unul dintre constituenții medicamentului.

RA: Sângerare de privație.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DACLIZUMABUM
 DALTEPARINUM
 DARBEPOETINUM ALFA
 DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBICINUM
 DOXYCYCLINUM
 DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM

Cod ATC: L04AA21

RAPTIVA® 100 mg/ml SERONO EUROPE Ltd.; Liof. + solv. pt. sol. inj. 100 mg/ml; ct. × 1 sau 4 fl. pulb. + 1 sau 4 seringi preumplute cu solv. + 1 sau 4 ace pt. reconstituirea sol. inj. + 1 sau 4 ace pt. injecție (**P-RF**)

Ind: Tratamentul pacienților adulți cu psoriazis cronic, în plăci, moderat până la sever, care nu răspund sau prezintă contraindicație sau intoleranță la alte tratamente sistemice incluzând ciclosporina, metotrexat și PUVA.

Dz: Se stabilește numai de către medicul dermatolog. Inițial se administrează o doză unică de 0,7 mg efalizumab/kg, apoi se administrează săptămânal o doză de 1 mg efalizumab/kg (doza maximă administrată în priză unică nu trebuie să depășească 200 mg efalizumab). Se administrează subcutanat.

Cind: Hipersensibilitate, antecedente de afecțiuni maligne, pacienți cu tuberculoză activă sau alte infecții severe, pacienți cu forme specifice de psoriazis cum sunt psoriazisul în picături, eritrodermic sau pustular ca formă unică sau predominantă de psoriazis, pacienți cu imunodeficiențe. Sarcină și alăptare.

Al: Poate favoriza apariția infecțiilor. Pacienții nu trebuie să primească vaccinuri acelulare, cu organisme vii sau parțial atenuate în timpul tratamentului cu efalizumab.

RA: Tulburări sanguine: leucocitoză, limfocitoză, trombocitopenie. Tulburări la nivelul pielii și țesuturilor subcutanate: psoriazis, urticarie. Tulburări musculo-scheletice și articulare: artralgie, artrită psoriazică. Simptome asemănătoare gripei (febră, cefalee, frisoane, mialgii).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DALTEPARINUM
DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKETOPIROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM

Cod ATC: J05AG03

STOCRIN MERCK SHARP & DOHME; Cps. 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 1 fl. × 30 cps. (50 mg, 100 mg); ct. × 1 fl. × 90 cps. (200 mg) **(S/P-RF)**

STOCRIN MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 300 mg, 600 mg; ct. × 1 fl. sau 1 blist. × 60 cpr. (300 mg); ct. × 1 fl. sau 1 blist. × 30 cpr. (600 mg) **(S/P-RF)**

STOCRIN® 30 mg/ml MERCK SHARP & DOHME; Sol. orală 30 mg/ml; ct. × 1 fl. × 180 ml **(S/P-RF)**

Ind: Trat. antiviral asociat al adulților, adolescenților și copiilor de 3 ani și peste, infectați cu HIV-1.

Dz: *Terapie antiretrovirală concomitentă: Adulți:* 600 mg o dată pe zi, oral. *Adolescenți și copii (3-17 ani):* doza variază între 200-600 mg.

Cind: Hipersensibilitate semnificativă clinic la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; IH severă; adm. concomitentă cu terfenadină, astemizol, cisapridă, midazolam sau triazolam.

Al: În monoterapie rezistența virală se dezvoltă rapid; nu previne riscul de transmitere a HIV prin contact sexual sau prin contaminare cu sânge; erupții cutanate ușoare - moderate; prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice ușoare - moderate; IR; copii sub 3 ani sau cu greutate corporală mai mică de 13 kg; sarcina și alăptarea.

RA: Erupții cutanate, amețeli, grețuri, cefalee, astenie, reacții alergice, afectarea coordonării, ataxie, confuzie, stupoare, vertij, vărsături, diaree, hepatită, concentrare deficitară, insomnie, anxietate, tulburări ale perioadei de somn cu visuri, somnolență, depresie, tulburări de gândire, agitație, amnezie, delir, labilitate emoțională, euforie, halucinații și tulburări psihotice, erupții cutanate, amețeli, tulburări de concentrare și coșmaruri.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DARBEPOETINUM ALFA
DAUNORUBICINUM
DEFEROXAMINUM
DESLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEKETOPIROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFAVIRENIZUM
EFALIZUMABUM
EMEDASTINUM

Cod ATC: S01GX06**EMADINE** ALCON; Sol. oft. 0,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (*P-RF*)**Ind:** Trat. simptomatic al conjunctivitelor alergice sezoniere.**Dz:** 1 pic. se instilează de două ori/zi în sacul conjunctival al ochiului/ochilor afectați(i).**Cind:** Hipersensibilitate la emedastină sau la oricare dintre componentii produsului.**Al:** Prudență la vârstnici, IR, IH, lentile de contact, sarcină și alăptare, șoferi și activități de precizie.**RA:** Disconfortul ocular, ochi uscat, hiperemie oculară, prurit ocular, vedere încețoșată, pătarea corneei, lăcrimare, edemul pleoapelor, senzație de corp străin, conjunctivită, keratită, infiltrate, orjelet, cruste ale marginii pleoapelor, oboseală oculară, iritație oculară, scăderea acuității vizuale, senzație de ochi lipicios, secreție oculară, edem conjunctival, rănire accidentală și fotofobie, cefalee și rinită, simptome de răceală (guturai), dureri, inclusiv dureri de spate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DAUNORUBICINUM
 DEFEROXAMINUM
 DESLORATADINUM
 DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBICINUM
 DOXYCYCLINUM
 DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
 EFALIZUMABUM
 EFAVIRENZUM
 EMEDASTINUM
ENALAPRILUM

Cod ATC: C09AA02

EDNYT® GEDEON RICHTER Ltd.; Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 1 fl. × 28 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENAHEXAL® 5 mg; ENAHEXAL® 10 mg; ENAHEXAL® 20 mg HEXAL AG; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAP E.I.P.I.C.O.; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. 5 mg, 10 mg sau 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL LPH® 5 mg; ENALAPRIL LPH® 10 mg; ENALAPRIL LPH® 20 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2, 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)
ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg TERAPIA SA; Cpr. 5 mg, 10 mg sau 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg FABIOL SA; Cpr. 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 10 mg FARMEX COMPANY; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 10 mg SLAVIA PHARM; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 folii × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 5 mg; ENALAPRIL 10 mg; ENALAPRIL 20 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (5, 10 mg) sau ct. × 2 blist. × 10 cpr. (20 mg) (P-6L)
ENALAPRIL AL 5; ENALAPRIL AL 10; ENALAPRIL AL 20 ALIUD PHARMA; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENALAPRIL 10 mg VIM SPECTRUM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENAP® 2,5; ENAP® 5; ENAP® 10; ENAP® 20 KRKA; Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
ENAP KRKA; Sol. inj. 1,25 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (S/P-RF)
ENAZIL LACHEMA; Cpr. 20 mg; ct. × 2, 6 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
EPHICORD EUROPHARM SA; Cps. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-6L)
INVORIL 5 mg; INVORIL 10 mg; INVORIL 20 mg RANBAXY LAB.; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 1 folie × 10 cpr. (5 mg, 10 mg); ct. × 2 folii × 10 cpr. (20 mg) (P-6L)
MEGAPRESS GENEPHARM SA; Cpr. 20 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-6L)
OLINAPRIL® 5 mg; OLINAPRIL® 10 mg; OLINAPRIL® 20 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
RENITEC® MERCK SHARP & DOHME; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (P-6L)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N01AB04

DEFEROXAMINUM
DESFLORATADINUM
DESMOPRESSINUM
DESONIDUM
DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM

ETHRANE ABBOTT; Lichid pt. inhalatie 100%; ct. × 1 fl. × 250 ml (S)

Ind: Inducerea și menținerea anesteziei generale (inclusiv operații cezariene), la adulți și copii.

Dz: *Inducția:* începerea inducției cu o concentrație de enfluran 0,5%, care crește treptat cu câte 0,5%, la câteva respirații. *Menținerea:* concentrații de enfluran între 0,5% și 2%. *Trezirea:* concentrația de enfluran poate fi redusă la 0,5% spre sfârșitul intervenției și adm. poate fi oprită în momentul începerii închiderii plăgii la nivelul tegumentului.

Cind: Hipersensibilitate la enfluran și la alte anestezice halogenate, icter și/sau febră inexplicabilă.

Al: Modificări electro-encefalografice, activitate motorie localizată, prudență la pacienții care din cauza unor antecedente medicale sau a unei medicații asociate, pot fi mai sensibili la efectul stimulant cortical al anestezicului, cardiaci, ușoară creștere a glicemiei, ciroză sau alte afecțiuni hepatice, sarcină, alăptare.

RA: Tresări musculare localizate reversibile, hTA, deprimare respiratorie, grețuri și vărsături la trezire; rar aritmii tranzitorii, frisoane, sughiț, hepatotoxicitate, hipertermie malignă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DES Loratadinum
Desmopressinum
Desonidum
Dexamethasolum
Dexketoprofenum
Dexpantenolum
Dexrazoxanum
Dextromethorphanum
Diazepamum
Diclofenacum
Didanosinum
Digoxinum
Dihydrocodeinum
Dihydroergocriptinum
Dihydrotachysterolum
Dimetindenum
Dinoprostolum
Diosmectita
Dipyridamolum
Disulfiramum
Dithranolum
Diverse
Dobutaminum
Docetaxolum
Dolasetronum
Domperidonum
Donepezilum
Dopaminum
Dornaza Alfa
Dorzolamidum
Doxazosinum
Doxepinum
Doxorubicinum
Doxycyclinum
Drotaverinum
Dutasteridum
Dydrogesteronum
Efalizumabum
Efavirenzum
Emedastinum
Enalaprilum
Enfluranum
Enfuvirtidum

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AX07**FUZEON** HOFFMANN LA ROCHE AG; Pulb. și solv. pt. sol. inj. 90 mg/ml; ct. × 60 fl. pulb. + 60 fl. solv. × 2 ml (S/P-RF)**Ind:** Tratamentul pacienților infectați cu HIV-1, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale.**Dz:** Fuzeon este destinat numai administrării prin injectare subcutanată. Adulți și adolescenți cu vârsta mai mare de 16 ani: Doza recomandată este de 90 mg, de două ori pe zi, injectat subcutanat în partea superioară a brațului, în zona anterioară a coapsei sau abdomen.**Cind:** Hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.**Al:** Pacienții trebuie atenționați că terapiile antiretrovirale, incluzând enfuvirtide, nu au dovedit că previn riscul transmiterii HIV altor persoane, prin contact sexual sau prin contaminarea sângelui. Acești pacienți trebuie să continue utilizarea măsurilor de precauție corespunzătoare. Pacienții trebuie, de asemenea, informați că acest medicament nu vindecă infecția HIV. La pacienții tratați cu Fuzeon s-a înregistrat o rată mai mare a incidenței unor infecții bacteriene, cel mai frecvent o rată crescută a incidenței pneumoniei.**RA:** La locul injectării: durere ușoară până la moderată sau disconfort la locul injectării, fără limitarea activităților uzuale, eritem, indurații, noduli și chisturi, prurit, echimoze. Infecții: sinuzită, papilom cutanat, gripă, pneumonii, infecții ale urechii. Tulburări hematologice și ale sistemului limfatic: limfadenopatie. Tulburări de metabolism și nutriție: scăderea apetitului, anorexie, hipertrigliceridemie, diabet zaharat. Tulburări psihiatrice: anxietate, coșmaruri, iritabilitate. Tulburări ale sistemului nervos: neuropatie periferică, hipoestezie, tulburări ale atenției, tremor. Tulburări oculare: conjunctivită. Tulburări ale urechii externe și interne: vertij. Tulburări respiratorii, la nivel toracic și la nivelul mediastinului: congestie nazală. Tulburări gastro-intestinale: pancreatită, boală de reflux gastro-esofagian. Tulburări la nivel cutanat și subcutanat: piele uscată, eczemă seboreică, eritem, acnee. Tulburări musculoscheletale, la nivelul țesutului conjunctiv și la nivelul oaselor: mialgii. Tulburări renale și urinare: calculi renali.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DESMOPRESSINUM
 DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBICINUM
 DOXYCYCLINUM
 DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
 EFALIZUMABUM
 EFAVIRENZUM
 EMEASTINUM
 ENALAPRILUM
 ENFLURANUM
 ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM

Cod ATC: B01AB05

CLEXANE® LAB. AVENTIS; Sol. inj. 1000 UI anti Xa/0,1 ml; ct. × 2 sau 10 seringi preumplute × 0,2 ml, 0,4 ml sau 0,6 ml; ct. × 2 seringi preumplute × 0,8 ml sau 1 ml (**S/P-RF**)

Ind: Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generală și/sau ortopedică. Profilaxia tromboembolismului venos la pacienții imobilizați la pat. Trat. trombozei venoase profunde (TVP) constituite, cu sau fără embolism pulmonar. Trat. anginei pectorale instabile și al IMA non-Q (subendocardic). Profilaxia coagulării în circuitul extracorporeal în timpul ședințelor de hemodializă.

Dz: Inj. s.c. profund în trat. profilactic și curativ; inj. în circuitul de hemodializă. Enoxaparina nu se inj. i.m. *Profilaxia trombozei venoase la pacienții chirurgicali:* 20 mg enoxaparină o dată/zi, adm. într-o singură inj. subcutanată. La pacienții cu risc tromboembolic mare doza este de 40 mg enoxaparină o dată/zi, adm. într-o singură injecție sc. În chirurgia generală prima inj. trebuie adm. cu 2 ore înainte de actul chirurgical. În chirurgia ortopedică prima inj. trebuie adm. cu 12 ore preoperator. Durata medie a trat. este de 7-10 zile. *Profilaxia trombozei venoase la pacienții cu afecțiuni medicale:* 40 mg enoxaparină sodică o dată pe zi, adm. într-o singură inj. sc. minimum 6, maximum 14 zile. *Trat. trombozei venoase profunde (TVP) constituite, cu sau fără embolism pulmonar:* Enoxaparina se va inj. sc. în doza unică de 1,5 mg/kg pe zi sau în doza de 1 mg/kg la fiecare 12 ore. La pacienții cu TVP complicată se recomandă doza de 1 mg/kg la fiecare 12 ore. Durata medie a trat. este de 10 zile. *Trat. anginei pectorale instabile și al infarctului miocardic non-Q:* Se inj. sc. 1 mg enoxaparină sodică/kg la fiecare 12 ore, minimum 2 zile. *Prevenirea coagulării în circuitul extracorporeal în timpul hemodializei:* 1 mg enoxaparină sodică/kg. La pacienții cu risc hemoragic doza se va reduce la 0,5 mg/kg pentru abord vascular dublu sau 0,75 mg/kg pentru abord vascular simplu.

Cind: Hipersensibilitate la enoxaparină, heparină sau alte heparine cu greutate moleculară mică; hemoragie sau risc de hemoragie legate de tulburări ale hemostazei; antecedente de trombocitopenie în cursul trat. anterior cu enoxaparină sau cu alte heparine; afecțiuni organice cu risc de hemoragie (de ex. ulcer gastrointestinal acut); endocardită infecțioasă acută cu excepția celei localizate pe proteze valvulare mecanice.

Al: Nu se inj. i.m.; prudență la afectare renală severă; IH; rahianestezia/anestezia epidurală; proceduri de revascularizare coronariană percutană; proteze valvulare cardiace; risc hemoragic crescut; antecedente de ulcer gastro-duodenal; accident vascular cerebral (AVC) ischemic recent; HTA severă necontrolată medicamentos; retinopatie diabetică; după intervenții neuro-chirurgicale sau oftalmologice recente. Se recomandă monitorizarea trombocitelor. Sarcină și alăptare.

RA: Hemoragii; trombocitopenie; dureri, iritația pielii la locul injectării; hematoame la locul injectării; rar, rash cutanat sever la locul injectării; foarte rar noduli inflamatori duri; foarte rar reacții cutanate alergice localizate (erupție

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DESONIDUM
 DEXAMETHASONUM
 DEXKETOPROFENUM
 DEXPANTHENOLUM
 DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBICINUM
 DOXYCYCLINUM
 DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
 EFALIZUMABUM
 EFAVIRENZUM
 EMEDASTINUM
 ENALAPRILUM
 ENFLURANUM
 ENFUVIRTIDUM
 ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM

Cod ATC: N04BX02

COMTAN® 200 mg NOVARTIS PHARMA; Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 fl. × 30, 60, 100 sau 500 cpr. (S/P-RF)

Ind: Adjuvant al medicamentelor standard conținând levodopa/benserazida sau levodopa/ carbidopa pentru utilizare la pacienții cu boala Parkinson și în cazul fluctuațiilor motorii la sfârșit de doză (fenomene *end-of-dose*), ce nu pot fi stabilizate prin folosirea combinațiilor standard.

Dz: *Oral:* simultan cu fiecare doză de levodopa/carbidopa sau levodopa/benserazida. Se administrează un comprimat a 200 mg împreună cu fiecare doză de levodopa/inhibitor dopa decarboxilaza. Doza maximă recomandată este de 200 mg, de zece ori pe zi, adică 2 g entacaponă. Eficacitatea preparatului entacaponă ca adjuvant levodopa/inhibitor dopa al decarboxilazei cu eliberare prelungită nu a fost dovedită. Entacaponă poate fi administrată cu sau fără alimente. Pentru a reduce reacțiile adverse dopaminergice provocate de levodopa, adică diskinezie, greață, vărsături și halucinații, este necesar adesea să se reducă dozele de levodopa în cursul primelor zile din prima săptămână, la începerea tratamentului cu entacaponă. În funcție de starea clinică a pacientului, doza zilnică de levodopa trebuie redusă cu aproximativ 10-30%, prin extinderea intervalului de administrare și/sau prin reducerea cantității de levodopa pe doză. Dacă tratamentul cu entacaponă se întrerupe, este necesară adaptarea dozelor celorlalte medicamente antiparkinsoniene, în special levodopa, pentru a controla suficient simptomele parkinsoniene.

Vârșnici: Nu este necesară modificarea dozelor de entacaponă la pacienții în vârstă. **Copii:** Deoarece nu a fost studiată administrarea de entacaponă la pacienții sub 18 ani, administrarea acestui produs sub această vârstă nu poate fi recomandată.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la entacaponă sau la oricare din excipienții acestui produs. **Afecțiuni hepatice:** Entacaponă este contraindicată la pacienții cu feocromocitom datorită creșterii riscului crizelor de hipertensiune. Este contraindicată utilizarea concomitentă cu inhibitorii neselectivi de monoaminooxidaza (MAO-A și MAO-B) (ex. phenelzina, tranilcipromina); de asemenea cu asociații inhibitor selectiv - inhibitor neselectiv. Entacaponă poate fi folosită împreună cu selegilina (inhibitor selectiv de MAO-B), dar doza de selegilină nu trebuie să depășească 10 mg. Sindrom neuroleptic malign (SNM) și/sau rabdomioliză netraumatică în antecedente.

Al: Deoarece SNM a fost semnalat rareori la pacienți cu boala Parkinson când tratamentul dopaminergic a fost întrerupt brusc, se recomandă atenție deosebită și în cazul întreruperii bruște a tratamentului cu entacaponă. Când este necesar, întreruperea tratamentului cu entacaponă trebuie făcută lent; dacă apar semne sau simptome nedorite, în această situație se impune o creștere a dozei de levodopa. Entacaponă poate agrava hipotensiunea ortostatică produsă de levodopa.

Nu se recomandă utilizarea de entacaponă în cursul sarcinii. Entacaponă se excretă prin lapte. Nu este cunoscută siguranța privind administrarea produsului la copii. Femeile nu trebuie să alăpteze în perioada tratamentului cu

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DEXAMETHASONUM
DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

Cod ATC: R03CA02**EFEDRINĂ** ARENA GROUP SA; Cpr. 50 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (**P-RF**)**EFEDRINĂ 10 mg/ml; EFEDRINĂ 50 mg/ml** SICOMED SA; Sol. inj. 10 mg/ml, 50 mg/ml; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 1 ml (**S**)**Ind:** Congestie nazală datorată virozelor, afecțiunilor respiratorii alergice sau comune. Sinuzită, rinosinuzită.**Dz:** *Adulți și copii peste 12 ani:* 50-60 mg de 3-4 ori/zi (maxim 250 mg/zi); *6-12 ani:* 30 mg de 3-4 ori/zi (maxim 120 mg/zi); *Sub 6 ani:* conform recomandării medicului.**Cind:** Afecțiuni cardiace, HTA.; diabet; adenom prostatic; afecțiuni tiroidiene; sarcină, alăptare; interacțiuni medicamentoase cu IMAO.**RA:** Nervozitate, amețeli, somnolență; creșteri ale TA; tulburări de micțiune la bolnavii cu afecțiuni de prostată.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01CA24

DEXKETOPROFENUM
DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM

ADRENALINĂ 1 mg/ml TERAPIA SA; Sol. inj. 1‰; f. × 1 ml; ct. × 100 f. **(S)**

ANAPEN® 300 µg/0,3 ml; ANAPEN JUNIOR® 150 µg/0,3 ml OWEN MUMFORD Ltd.; Sol. inj. 300 µg/0,3 ml, 150 µg/0,3 ml; ct. × 1 dispozitiv automat pt. autoinjectare conținând 1 seringă preumplută × 0,3 ml **(P-RF)**

Ind: Șoc anafilactic, alte reacții anafilactice acute sistemice, angioedem laringean; stop cardiac, hemoragii capilare de suprafață (în aplicație locală), se asociază anestezicelor locale vasodilatatoare pentru a le prelungi acțiunea și a le diminua toxicitatea generală; criza de astm bronșic.

Dz: *Astm bronșic*, inj. sc. 0,3 mg, eventual repetat la 20 de minute (cel mult 2-3 doze); *șoc anafilactic*, i.v. lent 0,1-0,5 mg, sau sc. 0,3-0,5 mg la fiecare 10-20 minute; *sincopa cardiacă*, i.v. lent 0,5-1 mg, eventual repetat după 5-15 minute; *hemostatic*, în aplicații locale, sol. 1/100000-1/2000, asociată anestezicelor locale, în sol. 1/200000-1/20000.

Cind: HTA, bolile miocardice, cardiopatia ischemică, tahicardia și aritmiile ectopice, IMA, ateroscleroza avansată, cord pulmonar, hemoragii interne, hipertiroidismul, feocromocitomul, glaucomul cu unghi îngust, adenomul de prostată cu retenție de urină, IR severă, parkinsonism. Cind sunt relative în situații de urgență, care pun viața în pericol.

Al: Prudență în diabet zaharat, Basedow, tineri, bătrâni, femei la menopauză, în stări de hipercalcemie și hipokaliemie; interacțiuni medicamentoase cu ciclopropan și halotan, sarcină; inj. iv. sunt periculoase (multă prudență).

RA: Palpitații, tahicardie, aritmii ectopice, dureri anginoase, anxietate, neliniște, slăbiciune, amețeli, cefalee, parestezie în extremități, creșterea glicemiei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01DB03

DEXPANTHENOLUM
DEXRAZOXANUM
DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM

EPIRUBICIN "EBEWE" 2 mg/ml EBEWE PHARMA; Conc. pt. sol. inj. 2 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 5, 25 sau 50 ml (S)
EPI SINDAN® 10 mg; EPI SINDAN® 50 mg SINDAN SRL/THYMOORGAN; Pulb. pt. sol. inj. 10 mg, 50 mg; ct. × 1 fl. (S)
FARMORUBICIN C.S. PFIZER; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 sau 25 ml (S)
FARMORUBICIN® RD 10 mg; FARMORUBICIN® RD 50 mg SINDAN SRL/ PHARMACIA UPJOHN; Pulb. pt. sol. inj. 10 mg, 50 mg; ct. × 1 fl. (S)
FARMORUBICIN® PFS 10 mg/5 ml; FARMORUBICIN® PFS 50 mg/25 ml SINDAN SRL/PHARMACIA UPJOHN; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml, respectiv ct. × 1 fl. × 25 ml (S)

Ind: Carcinom mamar, carcinom ovarian, pulmonar, gastric, hepatic, pancreatic și carcinom sigmo-rectal, carcinom de cap și gât, limfom non-Hodgkin și boala Hodgkin, sarcom de țesut moale și oase, leucemie acută și mielom multiplu. Carcinom de vezică urinară cu celule tranziționale.

Dz: Doza în monoterapie 60-89 mg/m² inj. i.v. în interval de 3-5 minute, repetat la 21 zile; doze mai mici în asociere, IH.

Cind: Mielodepresie marcată, cardiaci, antecedente de suferință cardiacă, hipersensibilitatea la componentele produsului, sarcină, alăptare.

Al: Supraveghere atentă și repetată a pacientului (hemoleucograma, funcția hepatică, ECG), cardiotoxicitate, hiperuricemie.

RA: Mielodepresie, cardiotoxicitate, căderea părului, oprirea creșterii bărbii; inflamația mucoaselor (stomatită cu zone de eroziune dureroase, localizate de-a lungul marginilor laterale ale limbii și pe mucoasa sublinguală); tulburări gastrointestinale: greață, vomă, diaree; hiperpirexie. Rar anafilaxie, febră, rash și urticarie. Cazuri rare de leucemie mielogenă secundară acută, cu sau fără fază preleucemică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B03XA01

DEXRAZOXANUM
 DEXTROMETHORPHANUM
 DIAZEPAMUM
 DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBICINUM
 DOXYCYCLINUM
 DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
 EFALIZUMABUM
 EFAVIRENZUM
 EMEDASTINUM
 ENALAPRILUM
 ENFLURANUM
 ENFUVIRTIDUM
 ENOXAPARINUM
 ENTACAPONUM
 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
 EPINEPHRINUM
 EPIRUBICINUM
EPOETINUM

EPREX® 1000 VETTER PHARMA; Sol. inj. 1.000 U.I./0,5 ml; ct. × 6 seringi × 0,5 ml (S/P-RF)

EPREX® 2000 VETTER PHARMA; Sol. inj. 2.000 U.I./0,5 ml; ct. × 6 seringi × 0,5 ml (S/P-RF)

EPREX® 3000 VETTER PHARMA; Sol. inj. 3.000 U.I./0,3 ml; ct. × 6 seringi × 0,3 ml (S/P-RF)

EPREX® 4000 VETTER PHARMA; Sol. inj. 4.000 U.I./0,4 ml; ct. × 6 seringi × 0,4 ml (S/P-RF)

EPREX® 10000 VETTER PHARMA; Sol. inj. 10.000 U.I./ml; ct. × 6 seringi × 1 ml (S/P-RF)

EPREX® 40000 VETTER PHARMA; Sol. inj. 40.000 U.I./ml; ct. × 1 fl. × 1 ml (S/P-RF)

NEORECORMON 500 ROCHE REGISTRATION LTD; Sol. inj. 500 U.I. (4,15 mg) epoetină beta (eritropoetină umană recombinată)/0,3 ml; ct. × 1 sau 6 seringi preumplute × 0,3 ml (S/P-RF)

NEORECORMON 1000 ROCHE REGISTRATION LTD; Sol. inj. 1000 U.I. (8,30 mg) epoetină beta (eritropoetină umană recombinată)/0,3 ml; ct. × 1 sau 6 seringi preumplute × 0,3 ml (S/P-RF)

NEORECORMON 2000 ROCHE REGISTRATION LTD; Sol. inj. 2000 U.I. (16,60 mg) epoetină beta (eritropoetină umană recombinată)/0,3 ml; ct. × 1 sau 6 seringi preumplute × 0,3 ml (S/P-RF)

NEORECORMON 4000 ROCHE REGISTRATION LTD; Sol. inj. 4000 U.I. (33,20 mg) epoetină beta (eritropoetină umană recombinată)/0,3 ml; ct. × 1 sau 6 seringi preumplute × 0,3 ml (S/P-RF)

NEORECORMON 5000 ROCHE REGISTRATION LTD; Sol. inj. 5000 U.I. (41,50 mg) epoetină beta (eritropoetină umană recombinată)/0,3 ml; ct. × 1 sau 6 seringi preumplute × 0,3 ml (S/P-RF)

NEORECORMON 10000 ROCHE REGISTRATION LTD; Sol. inj. 10000 U.I. (83,0 mg) epoetină beta (eritropoetină umană recombinată)/0,6 ml; ct. × 1 sau 6 seringi preumplute × 0,6 ml (S/P-RF)

NEORECORMON 30000 ROCHE REGISTRATION LTD; Sol. inj. 30000 U.I. (249,0 mg) epoetină beta (eritropoetină umană recombinată)/0,6 ml; ct. × 1 sau 4 seringi preumplute × 0,6 ml (S/P-RF)

Ind: Anemie asociată cu IR cronică (anemie renală) la pacienți dializați; anemie renală simptomatică la pacienți care nu sunt încă supuși dializei; prevenirea anemiei datorată prematurității la nou-născuți; prevenirea și trat. anemiei la pacienți adulți cu tumori solide și tratați cu chimioterapice pe bază de platină; creșterea disponibilului de sânge autolog la pacienți planificați pentru intervenții chirurgicale care presupun transfuzii (program de predonare).

Dz: *Trat. pacienților anemici cu IR cronică* Doza inițială este de 3 × 20 UI/kg și săpt., inj. sc. sau 3 × 40 UI/kg și săpt. inj. iv., crescut la 80 UI/kg - de 3 ori/săpt. și, dacă sunt necesare creșteri ulterioare, acestea vor consta în 20 UI/kg de 3 ori/săpt. la intervale lunare. Apoi, pentru a menține o valoare a hematocritului între 30 și 35%, doza este inițial redusă la jumătate din cea adm. anterior. *Prevenirea anemiei la prematuri:* 3 × 250 UI/kg și săpt. *Trat. trebuie să dureze 6 săpt.* *Trat. pacienților cu tumori solide:* 450 UI/kg și săpt. *Trat. destinat creșterii cantității de sânge autolog:* Doza trebuie determinată de către echipa de chirurși, individual pentru fiecare pacient, în funcție de cantitatea necesară de sânge predonat și de rezerva endogenă de celule roșii.

Cind: HTA greu controlabilă, hipersensibilitate la epoetina beta, infarct miocardic sau ictus, angină pectorală instabilă, risc de tromboză venoasă profundă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DEXTROMETHORPHANUM
DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM

Cod ATC: C09CA02

TEVETEN 400; TEVETEN 600 SOLVAY PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 400 mg sau 600 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr., respectiv ct. × 2 sau 4 × 7 cpr. (*P-6L*)

Ind: HTA esențială (antagonist selectiv al receptorilor AT1 pentru angiotensina II), cu efect comparabil cu cel al enalaprilului.

Dz: *Oral:* înainte sau după masă. Inițial 400 mg o dată pe zi. Se poate crește la 600-800 mg/zi. Efectul maxim se obține după 2-3 săptămâni. Se poate asocia cu diuretice tiazidice sau blocanți ai canalelor de calciu. Nu necesită modificarea dozelor la vârstnici, insuf. renală sau hepatică. Nu interacționează cu digoxina, warfarina, glibenclamida, ranitidina, ketoconazolul.

Cind: Sarcină, copii.

RA: hTA.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B02BD08

DIAZEPAMUM
DICLOFENACUM
DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM

NOVOSEVEN® 1,2 mg (60KUI) NOVO NORDISK A/S; Pulb. + solv. pt. sol. inj. 1,2 mg/fl.; ct. × 1 fl. pulb. + 1 fl. solv. + 1 ac pt. transf. + 1 seringă pt. reconstituire + 1 set perfuzare (S)

Ind: Tratamentul episoadelor de sângerare și pentru prevenirea sângerării legate de proceduri invazive/diagnostice și/sau chirurgicale la pacienți cu hemofilie ereditară care au inhibitori ai factorilor de coagulare VIII sau IX într-un titru > 5 BU, pacienți cu hemofilie ereditară la care se așteaptă un răspuns anamnestic intens la administrarea de factor VIII sau IX, pacienți cu hemofilie dobândită, pacienți cu deficiență congenitală de factor VII, pacienți diagnosticați cu trombastenie Glanzmann care prezintă anticorpi la GP IIb-IIIa și/sau HLA și refractari la transfuzia de trombocite în prezent sau în antecedente.

Dz: Inițial, 90 µg/kg în bolus i.v., pe durata a 2-5 minute, adm. cât mai repede posibil după debutul sângerării.

Cind: Hipersensibilitatea cunoscută la substanța activă, excipienți, sau la proteine de șoarece, hamster sau bovine. În stări patologice în care factorul tisular poate fi exprimat mai mult decât se consideră a fi normal (boală aterosclerotică avansată, sindrom de zdrobire, septicemie sau CID și intervenții chirurgicale cu distrucții tisulare majore)

Al: Trebuie evitată utilizarea concomitentă a concentratelor de complexe protrombinice activate sau nu. Prudență la administrarea în timpul sarcinii și al alăptării.

RA: Evenimente trombotice arteriale cum sunt ischemia și infarctul miocardic sau afecțiuni cerebrovasculare și infarct mezenteric. Evenimente trombotice venoase cum sunt tromboflebitele, trombozele venoase profunde și embolismul pulmonar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DICLOFENACUM
 DIDANOSINUM
 DIGOXINUM
 DIHYDROCODEINUM
 DIHYDROERGOCRIPTINUM
 DIHYDROTACHYSTEROLUM
 DIMETINDENUM
 DINOPROSTONUM
 DIOSMECTITA
 DIPYRIDAMOLUM
 DISULFIRAMUM
 DITHRANOLUM
 DIVERSE
 DOBUTAMINUM
 DOCETAXOLUM
 DOLASETRONUM
 DOMPERIDONUM
 DONEPEZILUM
 DOPAMINUM
 DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBICINUM
 DOXYCYCLINUM
 DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
 EFALIZUMABUM
 EFAVIRENZUM
 EMEDASTINUM
 ENALAPRILUM
 ENFLURANUM
 ENFUVIRTIDUM
 ENOXAPARINUM
 ENTACAPONUM
 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
 EPINEPHRINUM
 EPIRUBICINUM
 EPOETINUM
 EPROSARTANUM
 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM

Cod ATC: B01AC16

INTEGRILIN™ SCHERING PLOUGH EUROPE; Sol. perf. 0,75 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S)

Ind: Prevenirea infarctului miocardic precoce la pacienții cu angină pectorală instabilă sau infarct miocardic non-Q; pacienții supuși intervenției coronariene percutane (PCI) pentru prevenirea ocluziei vasului coronarian tratat și a complicațiilor ischemiei cardiace acute. Eptifibatida se adm. în asociație cu acid acetilsalicilic și heparină nefracționată.

Dz: *Adulți (peste 18 ani) cu angină instabilă sau infarct miocardic non-Q:* 180 µg/kg în bolus i.v. adm. cât mai repede posibil după stabilirea diagnosticului, urmat de o perfuzie continuă cu 2 µg/kg și min, timp de până la 72 de ore, sau până la inițierea pontajului chirurgical aortocoronarian (CABG), sau până la externare. Dacă intervenția chirurgicală percutană (PCI) este efectuată în timpul adm. eptifibatidei, perfuzia se continuă 20-24 de ore după intervenție, cu o durată totală a trat. de cel mult 96 de ore. *Adulți (peste 18 ani) supuși intervenției coronariene percutane (PCI)* 180 µg/kg în bolus i.v., adm. cu puțin timp înaintea începerii PCI, urmat de o perfuzie continuă cu 2 µg/kg și min, timp de cel puțin 20-24 de ore.

Cind: Hemoragii gastrointestinale, genitourinare importante sau alte hemoragii active în ultimele 30 de zile înaintea trat.; antecedente de accident vascular cerebral în ultimele 30 de zile sau hemoragie cerebrală; tumori intracraniene, malformații arteriovenoase sau anevrisme cerebrale în antecedente; intervenții chirurgicale majore sau traumatisme severe în ultimele 6 săpt.; antecedente de diateză hemoragică; trombocitopenie; timp de protrombină > de 1,2 ori față de martor sau INR ^a 2; HTA severă; IR severă; IH semnificativă clinic; adm. concomitentă sau planificată a altui inhibitor GPIIb/IIIa parenteral; hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

Al: Pacientul trebuie supravegheat cu atenție pentru a se putea depista semnele de hemoragie (hematocrit sau hemoglobină, numărul de trombocite, creatinină serică, timp de protrombină (PT) și timp de tromboplastină parțial activat); interacțiuni medicamentoase cu alte medicamente care afectează hemostaza, prudență în IMA transmural cu unde-Q patologice recente, supradenivelarea segmentelor ST sau bloc de ramură stângă, trombocitopenie, IH, IR severă, pacienți sub 18 ani, sarcină și alăptare.

RA: Hemoragii, în proporție similară cu placebo: fibrilație atrială, hTA, insuficiență cardiacă congestivă, stop cardiac și șoc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DIDANOSINUM
DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM

Cod ATC: R05CB15

ERDOMED® CSC PHARMACEUTICALS; Cps. 150 mg, 300 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cps. (150 mg); ct. × 2 blist. × 10 cps. (300 mg) **(P-6L)**

ERDOMED® CSC PHARMACEUTICALS; Pulb. pt. sol. inhal. 225 mg; ct. × 3 fl. pulb. + 3 fl. solv. **(P-6L)**

ERDOMED® 175 CSC PHARMACEUTICALS; Pulb. pt. susp. orală 175 mg/ 5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 100 ml susp. **(P-6L)**

ERDOMED® 225 CSC PHARMACEUTICALS; Pulb. pt. susp. orală 225 mg/ plic; ct. × 20 plicuri **(P-6L)**

Ind: Tulburările secreției bronhice în pusee acute de bronhopneumopatie cronică obstructivă, în completarea antibioterapiei.

Dz: 300 mg de 2 ori/zi timp de 10 zile.

Cind: Insuf. hepatică sau renală severă (creatinină < 25 ml/min).

Al: Ulcer gastroduodenal.

RA: Gastralgie, grețuri, vome.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DIGOXINUM
DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A11CC01

SICOVIT® D₂ 400.000 UI/ml; SICOVIT® D₂ 600.000 UI/ml S/COMED SA; Sol. inj. 400000 UI/ml, 600000 UI/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml (P-RF)

Ind: Trat. și profilaxia rahitismului, în osteoartrite, osteomalacie și decalcifiere gravidică; în spasmofilia de tip rahitic, în fracturi (în asociere cu calciul), în carii dentare repetate; tuberculoza pulmonară și în special extrapulmonară; în leziunile cutanate ulcerative; în intoxicații cu plumb, favorizând depunerea plumbului în oase.

Dz: În rahitism și tetania hipocalcemică, profilactic, oral 400-2400 u.i. zilnic până la vârsta de 1 1/2 ani, apoi 3-6 luni/an (în sezonul rece) până la vârsta de 5 ani sau adm. intermitentă, oral, câte 300000 u.i. la fiecare 6 luni, până la 1 1/2 ani, apoi o dată/an (la începutul iernii), până la vârsta de 5 ani, sau i.m. profund 600000 u.i. o dată/an; curativ, oral sau im., 600000 u.i. o dată, continuând, după 6 luni, cu dozele recomandate pentru profilaxie. În carența vitaminică la adult și bătrân, profilactic oral 400-2000 u.i. zilnic, oral sau i.m. 300000 u.i. o dată la 6 luni sau 600000 u.i. o dată pe an; curativ în osteoporo-malacie, oral 4000-20000 u.i./zi, oral sau intramuscular 600000 u.i. la intervale de 1-2 săpt. În spasmofilia hipocalcemică, oral 4000-8000 u.i./zi, oral sau i.m. 600000 u.i. o dată.

Cind: Hipercalcemie, hipercalciurie, litiază renală, hipersensibilitate la vit. D.

Al: IR, bătrâni, bolnavii imobilizați, hipercolesterolemie, hipotiroidism; supravegherea calciuriei, eventual a calcemiei; sarcină, alăptare.

RA: Fenomene de hipervitaminoză: oboseală, anorexie, greață, vomă, diaree, poliurie cu urină diluată, sudorație, sete, slăbiciune, pierdere în greutate, decalcifierea oaselor, hipercalcemie, hipercalciurie, perturbarea probelor renale, depunere de calciu în diferite țesuturi, litiază renală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DIHYDROCODEINUM
DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM

Cod ATC: G02AB03**MALEAT DE ERGOMETRINĂ** S/COMED SA; Sol. inj. 0,2 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml (S/P-RF)

Ind: Profilaxia și controlul metroragiilor post-partum, involuție uterină imperfectă, retenție de lohii; hemoragii în cursul operațiilor cezariene, metroragii post-abortum, meno- și metroragii grave.

Dz: Inj. i.m.: 0,2-0,4 mg ergometrină maleat; inj. i.v.: 0,1-0,2 mg ergometrină maleat; la nevoie, se poate repeta după 1 oră; intern 0,2-0,8 mg ergometrină maleat de 3 ori/zi.

Cind: Sarcină, travaliu (până la degajarea umărului), alăptare, toxemie, IH gravă.

Al: Prudență în HTA, bolile vasculare obliterante (angină pectorală, arterite periferice, infecții, boli hepatice, boli renale, deficit de pompă cardiacă.

RA: Dozele mari pot provoca greață, vomă, dureri pelviene, HTA trecătoare; inj. i.v. rapidă (în mai puțin de 1 minut) poate produce HTA bruscă (chiar accidente cerebro-vasculare), parestezii, amețeli, cefalee, tinitus, palpitații, dureri precordiale, dispnee, sudorație; rareori erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DIHYDROERGOCRIPTINUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM

Cod ATC: L01XX34

TARCEVA 25 mg; TARCEVA 100 mg; TARCEVA 150 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 25 mg, 100 mg, 150 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (S)

Ind: Tratamentul pacienților cu cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici, avansat local sau metastazat, după eșecul terapeutic al cel puțin unui regim de chimioterapie precedent.

Dz: Doza zilnică recomandată este de 150 mg administrată cu cel puțin o oră înainte sau două ore după masă. Când este necesară ajustarea dozei, aceasta este redusă cu câte 50 mg.

Cind: Hipersensibilitate.

Al: Trebuie evitat tratamentul cu inductorii sau inhibitorii puternici CYP3A4.

RA: Eruptii cutanate, diaree, anorexie, conjunctivită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DH

DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM

INVANZ® 1 g MERCK SHARP & DOHME; Pulb. pt. conc. pt. sol. perf./inj. 1 g (S/P-RF)

Ind: Tratamentul pacienților adulți cu infecții moderate-severe, determinate de tulpini de microorganisme sensibile, precum și ca tratament inițial, empiric, administrat înainte de identificarea agenților patogeni în infecții intra-abdominale complicate; infecții complicate ale tegumentelor și ale structurilor pielii, inclusiv infecții ale extremităților inferioare în cadrul diabetului zaharat; pneumonie comunitară, infecții complicate ale tractului urinar, inclusiv pielonefrită, infecții pelvine acute, inclusiv endometrită post-partum, abort septic și infecții ginecologice postchirurgicale, septicemie bacteriană.

Dz: *Adulți:* doza uzuală 1 g, 3-14 zile, administrată o dată pe zi, perfuzie i.v. (calea i.m. este o alternativă); durata perfuziei trebuie să fie mai mare de 30 de minute. *IR:* la pacienții cu clearance al creatininei 30 ml/min și 1,73 m², nu este necesară ajustarea dozei. Pacienților cu IR avansată, inclusiv celor hemodializați, trebuie să li se administreze doza de 500 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la ertapenem sau față de alte medicamente din aceeași clasă sau la pacienții care au prezentat reacții anafilactice la beta-lactamine. Datorită utilizării clorhidratului de lidocaină ca solvent, este contraindicată administrarea i.m. la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută față de anestezice locale de tip amidic și la pacienții cu șoc sever sau stop cardiac.

Al: Înainte de începerea tratamentului trebuie făcută o investigație atentă a reacțiilor de hipersensibilitate anterioare la peniciline, cefalosporine, alte beta-lactamine și alți alergeni. Dacă apare o reacție alergică, administrarea trebuie întreruptă imediat.

Nu au fost stabilite siguranța și eficacitatea la copii; nu este recomandată administrarea la pacienți cu vârsta sub 18 ani.

Sarcină și alăptare: trebuie administrat în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru mamă și făt. Ertapenem se excretă în laptele matern. Administrarea la mama care alăptează trebuie efectuată cu precauție.

RA: *Frecvente:* Diaree, complicații la nivelul venei perfuzate (flebita, tromboflebita), greață și cefalee. *Rare:* Amețeli, somnolență, insomnie, convulsii, confuzie, hTA, dispnee, candidoză orală, constipație, regurgitații acide, diaree asociată cu *C. difficile*, uscăciunea gurii, dispepsie, anorexie, prurit vaginal. A fost raportată colită pseudomembranoasă a cărei gravitate poate varia.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DIMETINDENUM
DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM

COD ATC: J01FA01, D10AF02

ERITRO 200 LEK PHARMATECH; Cpr. 200 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
ERITRO 200 LEK PHARMATECH; Pulb. susp. 200 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 60 ml susp. (P-RF)
ERITROMAGIS 200 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ERITROMICINĂ 200 mg ANTIBOTICE SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
ERITROMICINA 200 mg EUROPHARM SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ERYFLUID LAB. PIERRE FABRE; Sol. cut. 4%; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 ml (P-RF)
LACTOBIONAT ERITROMICINĂ ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 300 mg; ct. × 100 fl. (S)

Ind: Trat. infecțiilor cu microorganisme sensibile: infecții bronho-pulmonare, ORL, cutanate, genitale, osoase. Streptococcus pyogenes, streptococ alfa, beta-hemolitic, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus - numeroase tulpini sunt rezistente - Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, difterie, Chlamydia trachomatis, Campylobacter fetus jejuni, Bordetella pertussis, Neisseria, sifilis, Listeria monocytogenes).

Dz: *Adulți:* 1,5-2 g/zi, în 2-3 prize, cu o jumătate de oră înainte de mese. În infecțiile grave, doza zilnică poate să crească la 4 g/zi (divizate în 4 prize). *Copii:* în general 50 mg/kg și zi, în 2-3 prize. În infecții grave se dublează doza. *Șancrul primar, sifilisul secundar și latent (< 1 an):* 3-4 g/zi, timp de 10-15 zile. Infecții acute pelviene: 500 mg i.v., la 6 h, timp de 3 zile, urmate de 500 mg oral, de 2 ori/zi (la 12 h), timp de 7 zile. *Uretrita gonococică:* 500 mg de 2-3 ori/zi, timp de 14 zile. *Infecții cu Bordetella pertussis:* 40-50 mg/kg/zi, 5-14 zile (dozele și durata optimă a trat. nu s-au stabilit cu exactitate). *Conjunctivite cu Chlamydia la copii:* 12,5 mg (eritromicină bază)/kg la 6 h, timp de 10-14 zile. Intravenos, în injecții lente, la adulți 300-900 mg la fiecare 6 ore; la copii 30-50 mg/kg și zi (fracționat). În aplicații locale, de 2 ori/zi (după spălarea și uscarea zonei de piele interesată).

Cind: Hipersensibilitate la antibioticele din clasa macrolidelor. IH gravă. Nu se asociază cu alcaloizi vasoconstrictori proveniți din *Secale cornutum*, mai ales cu ergotamina și dihidroergotamina.

AI: Prudență la IR, astm bronșic, interacțiuni medicamentoase cu teofilina, anticoagulante cumarinice, ergotamină sau DH-ergotamină; sarcină și alăptare.

RA: Tulburări gastrointestinale: grețuri, vărsături, diaree, dureri abdominale, suprainfecție cu microorganisme rezistente la eritromicină, colestază hepatică (grețuri, vărsături, dureri abdominale, febră, prurit, icter și eozinofilie), reacții alergice, hipoacuzii tranzitorii și reversibile.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DINOPROSTONUM
DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM

Cod ATC: A02BC05**NEXIUM®** ASTRAZENECA; Liofilizat pt. sol. inj./perf. 40 mg; ct. × 1 sau 10 fl. (**P-RF**)**NEXIUM® 20 mg; NEXIUM® 40 mg** ASTRAZENECA; Cpr. film. 20 mg sau 40 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 7 cpr. (**P-RF**)**Ind:** Boală de reflux gastroesofagian, vindecarea eroziunilor și profilaxia recăderilor. Eradicarea *Helicobacter pylori* în cadrul schemelor terapeutice.**Dz:** Oral, cpr. întregi sau desfăcute în 1/2 pahar cu apă necarbogazoasă; nu se vor adm. cu alte lichide. Se amestecă până când cpr. se dizolvă și se bea conținutul imediat sau în interval de 30 de minute. *Boala de reflux gastroesofagian:* vindecarea eroziunilor în esofagita de reflux: 40 mg o dată/zi, timp de 4-8 săptăm.; *trat. simptomelor în esofagita de reflux:* 20 mg o dată/zi la pacienții cu rezultate negative la investigațiile paraclinice timp de 4 săptăm. După dispariția simptomelor, prevenirea reapariției acestora poate fi obținută prin adm. orală a 20 mg esomeprazol o dată/zi, la nevoie; *profilaxia de durată a recăderilor la pacienții cu esofagită vindecată:* 20 mg o dată/zi. *Eradicarea Helicobacter pylori în cadrul schemelor terapeutice:* 20 mg de 2 ori/zi, în asociere cu 1 g amoxicilină de 2 ori/zi și 500 mg claritromicină de 2 ori/zi, timp de 7 zile. La pacienții cu IH severă se dau maxim 20 mg/zi. *Copii:* produsul nu este recomandat la această categorie.

Inj., pentru pacienții care nu pot beneficia de terapie orală: 20-40 mg o dată pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la esomeprazol, derivați de benzimidazol sau la oricare dintre excipienți. Intoleranță ereditară la fructoză, malabsorbție de glucoză-galactoză sau insuficiență de sucrază-izomaltază.**Al:** Pacienții tratați timp îndelungat, mai mult de un an trebuie supravegheați regulat. Când se prescrie esomeprazol pentru eradicarea *Helicobacter pylori*, trebuie luate în considerare posibilele interacțiuni între componentele schemei terapeutice triple. Atenție în prezența oricărui simptom de alarmă (pierdere în greutate semnificativă neintenționată, vărsături recurente, disfagie, hematemeză sau melenă) sau atunci când ulcerul gastric este suspectat sau diagnosticat; trebuie exclus un proces malign, deoarece esomeprazolul poate ameliora simptomatologia, mascând diagnosticul. Prudență în IR severă. Sarcină și alăptare.**RA:** *Mai frecvente:* cefalee, durere abdominală, diaree, flatulență, greață/vărsături, constipație; dermatită, prurit, urticarie, amețală, uscăciunea gurii. *Posibile* (observate pentru omeprazol): *SNC și periferic:* parestezii, somnolență, insomnie, vertij; mai ales la pacienții debilitați pot să apară confuzie reversibilă, agitație, agresivitate, depresie și halucinații; *sistem endocrin:* ginecomastie; *aparat digestiv:* stomatită și candidoză gastrointestinală; *măduva hematopoetică:* leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză și pancitopenie; *ficat:* creșterea enzimelor hepatice, encefalopatie la pacienții cu afectare hepatică severă preexistentă; hepatită cu sau fără icter, IH; *sistem musculoscheletal:* artralгии, slăbiciune musculară și mialgii; *tegumente:* erupții cutanate, eritem multiform, sd. Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, alopecie; *alte reacții adverse:* stare generală de rău; reacții de

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DIOSMECTITA
DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONIUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM

Cod ATC: G03CA03**CLIMARA** SCHERING AG; Sist. transderm. 3,9 mg/12,5 cmp; ct. × 4 sau 12 plicuri × 1 sistem TTS (**P-6L**)**ESTREVA** LAB. THERAMEX; Gel 0,1%; ct. × 1 fl. × 50 g (**P-6L**)**ESTROFEM® 1 mg** NOVO NORDISK A/S; Cpr. film. 1 mg; ct. × 1 disc calendar × 28 cpr. (**P-6L**)**FEM 7 LTS** LOHMANN; Sist. transderm. 1,5 mg, cu eliberare 50 mcg pe zi; ct. × 4 plicuri × 1 sistem TTS (**P-6L**)**FEMSEVEN 75 LTS** LOHMANN; Sist. transderm. 2,25 mg estradiol hemihidrat, care eliberează în organism 75 mcg/zi; ct. × 4 plicuri × 1 sistem TTS (**P-6L**)**FEMSEVEN 100 LTS** LOHMANN; Sist. transderm 3 mg estradiol hemihidrat, care eliberează în organism 100 mcg/zi; ct. × 4 plicuri × 1 sistem TTS (**P-6L**)**OESTROGEL** LAB. BESINS INTERNATIONAL; Gel 0,06%; ct. × 1 tub × 80 g (**P-6L**)**RISELLE** ORGANON; Implant 25 mg 17-b-estradiol (**P-RF**)**VAGIFEM** NOVO NORDISK A/S; Cpr. vag. 25 µg 17-b-estradiol hemihidrat; ct. × 3 blist. × 5 aplicatoare cu 1 cpr. vag. (**P-6L**)

Ind: Terapia de substituție hormonală cu estrogen fiziologic pt. menopauză: tulburări vasomotorii - transpirație, bufeuri și alte simptome ale deficitului estrogenic - atrofie urogenitală, tulburări de micțiune, tulburări de somn și dispoziție afectivă oscilantă. Prevenirea osteoporozei. Injectabil în trat. amenoreei primare sau secundare, dismenoreei funcționale, pentru trat. endometritei post-partum și post-abortum și în trat. cancerului la prostată (inoperabil, metastazat sau recidivant). În adm. vag. este indicat în trat. vaginitei atrofice datorată unei deficiențe estrogenice.

Dz: *Int.:* 2-4 mg/zi: femeile hysterectomizate și cele aflate în post-menopauză pot începe trat. în oricare zi; cele care mai au ciclu menstrual pot începe trat. în a 5-a zi de sângerare. *Ext.:* se aplică pe piele și se lasă timp de 7 zile preparate care eliberează 50 µg pe zi, la nevoie 75 µg pe zi sau 100 µg pe zi. *Inj.:* amenoree primară sau secundară 2,5-5 mg de 2-3 ori/săpt.; endometrită post-partum și post-abortum: 3-5 adm. a 5 mg; cancer la prostată: 100 mg o dată, la fiecare 2-3 săpt. *Adm. vaginală:* 25 µg/zi timp de două săpt. *Implante:* 25 mg 17 b-estradiol o dată la 4-8 luni.

Cind: Sarcină cunoscută sau suspectată, perioada de alăptare; cancere de sân sau uter; tumori hipofizare; sângeri genitale anormale, nediagnosticate; forme severe de endometrioza; lupus eritematos sistemic și alte colagenoze; afecțiuni hepatice acute sau cronice severe, antecedente de afecțiuni hepatice; sindrom Rotor sau sindrom Dubin-Johnson; tromboză venoasă profundă, boală tromboembolică; afecțiuni renale severe; porfirie; otoscleroză; hipersensibilitate la estradiol sau la celelalte componente ale produsului.

A!: Măsurarea TA, examenul sânilor, examen ginecologic și o anamneză atentă; prudență în hiperplazia endometrului cu sângeri uterine și risc crescut de carcinom endometrial; creștere modestă a riscului de cancer mamar pentru trat. prelungit (mai mult de 5 ani) cu doze mari de estrogeni; prudență în epilepsie, diabet zaharat,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01XX11

DIPYRIDAMOLUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM

ESTRACYT® PHARMACIA & UPJOHN; Pulb. pt. sol. inj. 300 mg; ct. × 10 fl. pulb. + 10 f. solv. **(S)**
ESTRACYT® PHARMACIA & UPJOHN; Cps. 140 mg; ct. × 40, 50, 100 sau 120 cps. **(S/P-RF)**

Ind: Stadii avansate de carcinom prostatic, în special la pacienții cu tumori refractare la trat. hormonal, și în terapia primară a pacienților cu factori de prognostic ce indică un răspuns slab la trat. hormonal pur.

Dz: *Int:* 7-14 mg/kg corp/zi, în 2-3 prize. *Inj.:* 5 mg/kg corp/zi, timp de până la 3 săpt., apoi 300 mg de 2 ori/săpt.

Cind: Hipersensibilitate la estradiol sau derivații azotiperitei. Afecțiuni hepatice grave. Afecțiuni cardiovasculare grave: ischemice, tromboembolice sau complicații datorate retenției hidrosaline.

Al: Prudență în antecedente de tromboflebită, tromboză sau afecțiuni trombo- embolice, afecțiuni vasculare cerebrale sau maladii coronariene, diabet zaharat, HTA, retenție hidrosalină, migrenă, disfuncție renală, afecțiuni osoase metabolice asociate cu hipercalcemie, IR, disfuncții hepatice, sarcină și alăptare.

RA: Ginecomastie, impotență, greață/vărsături, diaree, retenție hidrosalină/ edemul, tromboembolie, cardiopatie ischemică, IC, HTA, rareori, edem angioneurotic, slăbiciune musculară, depresie, cefalee, confuzie, letargie, reacții de hipersensibilitate, inclusiv rash cutanat alergic și edem angioneurotic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM

Cod ATC: G03CA04**OVESTIN ORGANON**; Ovule 0,5 mg; ct. × 3 folii × 5 ovule (*P-RF*)**OVESTIN ORGANON**; Cremă vag. 0,1%; ct. × 1 tub × 15 g (*P-RF*)

Ind: Insuficiența ovariană primară sau secundară la pubertate (hipoplazie uterină și mamară, amenoree, vaginită atrofică). Climacteriu.

Dz: *Adm. vaginală:* 0,5 mg pe zi pentru primele câteva săptăm., apoi reducere progresivă la doză de întreținere 0,5 mg de 2 ori/săpt.

Cind: Tromboze; tumoră estrogenodependentă diagnosticată sau suspectată; sângerări vaginale nediagnosticate; istoric al manifestărilor sau deteriorării unei otoscleroze în cursul sarcinii sau în timpul unei utilizări anterioare a steroizilor; sarcină.

Al: Examene medicale periodice; prudență în colelitiază; tulburări tromboembolice; IC latentă sau manifestă; HTA; retenție lichidiană prin disfuncție renală; epilepsie sau migrenă (antecedente de astfel de manifestări); patologie hepatică severă; endometrioză; mastopatie fibrochistică; porfirie; hiperlipoproteinemie; antecedente de prurit, icter colestatic sau herpes în timpul sarcinii sau în cursul utilizării de preparate pe bază de estrogen; alăptare.

RA: *Adm. vag.:* iritație locală și prurit; tensiune sau durere mamară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DITHRANOLUM
DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM

Cod ATC: B02BX01**DICYNONE** OM PHARMA; Cpr. 250 mg; ct. × 2 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-RF)**DICYNONE** OM PHARMA; Sol. inj. 125 mg/ml; ct. × 1, 4, 20 sau 100 f. × 2 ml (S/P-RF)**ETAMSYLAT 250 mg/2 ml** SICOMED SA; Sol. inj. 125 mg/ml; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 2 ml (S/P-RF)

Ind: Prevenirea și trat. hemoragiilor capilare, pre- și postoperatorii; prevenirea și trat. hemoragiilor capilare de diverse etiologii și localizări; metroragie, menoragie primară sau datorată dispozitivelor intrauterine, de mică intensitate, în absența unei patologii organice; profilaxia hemoragiilor periventriculare la prematuri.

Dz: *Int.:* *Adulți:* Preoperator: 250 sau 500 mg cu 1 oră înainte de intervenție. Postoperator: 250 sau 500 mg la intervale de 4-6 ore atât cât persistă riscul hemoragic. Medicina internă: 500 mg de 2 sau 3 ori/zi (1000 sau 1500 mg). Menometroragii: 500 mg de 3 ori/zi (1500 mg). *Copii:* Se adm. jumătate din doza adultului. *Inj.:* *Adulți:* Preoperator: 250-500 mg i.v., cu 1 oră înainte de intervenție. Peroperator: 250-500 mg i.v.; se repetă la nevoie. Postoperator: 250-500 mg i.v. la intervale de 4-6 ore, atât cât persistă riscul hemoragic. În urgențe, în funcție de severitatea hemoragiei: 250-500 mg i.v. sau i.m. la fiecare 4-6 ore, atât cât persistă hemoragia și riscul hemoragic. *Copii:* Se adm. jumătate din doza adultului. La nou-născuți: 10 mg/kg (0,1 ml = 12,5 mg etamsilat) în injecții intramusculare, în primele 2 ore de la naștere, apoi la fiecare 6 ore, timp de 4 zile

Cind: Porfirie acută, astm bronșic.

Al: Febră; monitorizarea TA, sarcină și alăptare.

RA: Febră, cefalee, erupții cutanate, tulburări digestive - epigastralgie, greață, vomă, diaree; hipotensiune arterială trecătoare; reacții alergice; au fost semnalate cazuri grave de astm bronșic și șoc anafilactic cu risc letal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AA11

DIVERSE
DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONIUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM

ENBREL WYETH LEDERLE PHARMA GmbH; Pulb. și solvent pentru sol. inj. 25 mg; ct. × 4, 8 sau 24 fl. (S)

Ind: Trat. poliartritei reumatoide active la adulți când răspunsul la alte medicamente antireumatice a fost inadecvat. Trat. formei poliarticulare active de artrită reumatoidă juvenilă cronică, la copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 17 ani, care au prezentat un răspuns inadecvat sau au dovedit intoleranță la metotrexat.

Dz: Adulți (18-64 ani): 25 mg etanercept de 2 ori pe săptăm. prin inj. sc. Copii și adolescenți (* 4 la < 18 ani): 0,4 mg/kg (până la o doză maximă de 25 mg) de 2 ori pe săptăm. ca inj. s.c., cu un interval de 3-4 zile între doze.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Sepsis sau risc de sepsis; infecții active, inclusiv infecții cronice sau localizate.

Al: Prudență în infecții; reacții alergice; imunosupresie; vaccinări; formarea de autoanticorpi; boală de demielinizare a SNC preexistentă sau recentă; reacții hematologice; sarcină și alăptare.

RA: Reacții la locul de injecție; infecții; teste pozitive pentru anticorpi anti-ADN dublu catenar; cefalee, rinită, ameteală, faringită, tuse, astenie, durere abdominală, erupție cutanată, tulburări respiratorii, dispepsie, sinuzită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DOBUTAMINUM
DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONIUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM

Cod ATC: J04AK02

ETAMBUTOL 250 mg; ETAMBUTOL 400 mg ANTIBIOTICE SA; Cpr. 250 mg, 400 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
ETAMBUTOL 250 mg; ETAMBUTOL 400 mg ARENA GROUP SA; Cps. 250 mg, 400 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps., respectiv ct. × 1 fl. × 50 cps. (S/P-RF)

Ind: Tuberculoza pulmonară, tuberculoza miliară, pleurezia tuberculoasă, peritonita tuberculoasă, meningita tuberculoasă, tuberculoza genito-urinară, tuberculoza osteo-articulară și ganglionară. Se va asocia obligatoriu cu alte chimioterapice și antibiotice antituberculoase. Tuberculoza pulmonară și extrapulmonară (în terapie combinată cu alte antituberculoase); infecții cu mycobacterii atipice sensibile.

Dz: *Adulți:* oral, 15 mg/kg și zi, priza unică, pe stomacul gol, zilnic sau 40-50 mg/kg și zi de 2 ori/săpt. asociat cu alt tuberculostatic (izoniazidă, rifampicină, streptomycină). În IR: 10 mg/kg și zi. *Copii:* oral, 25 mg/kg și zi.

Cind: Hipersensibilitate la clorhidrat de etambutol; nevrită optică, retinopatie diabetică, cataractă; IR renală severă.

Al: Prudență în hiperuricemie; tulburări vizuale (cataractă sau retinopatie diabetică); disfuncții renale; copii sub 13 ani; bătrâni; alcoolici; fumatori. Interacțiuni medicamentoase cu antiacidele gastrice cu aluminiu. Sarcină și alăptare.

RA: Nevrita optică cu pierderea parțială a vederii (reversibilă în câteva luni dacă se suprimă trat. imediat), febră, artralгии, erupții cutanate alergice, prurit, cefalee, grețuri, vărsături, dureri abdominale, parestezii, stări confuzive, rareori nevrите periferice sau alterări pasagere ale funcției hepatice, hiperuricemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N03AD01

DOCETAXOLUM
DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM

PETINIMID GEROT; Cps. 250 mg; ct. × 10 blist. × 10 cps. (P-6L)

PETINIMID GEROT; Sirop 50 mg/ml; ct. × 1 fl. × 250 ml (P-6L)

Ind: Epilepsie petit mal.

Dz: La *copii între 3-6 ani*: oral, începând cu 250 mg/zi; la *copiii mai mari și la adulți* 500 mg/zi, se crește săpt. cu câte 250 mg, după nevoie; dozele utile sunt cuprinse între 250 și 1200 mg/zi (obișnuit 20-40 mg/kg corp), fracționat, în timpul meselor.

Cind: Hipersensibilitate la ethosuximidă sau alte succinimide.

A!: Prudență în tulburări hepatice sau renale; efectuarea regulată a hemogramei și a testelor de urină; controlul periodic al funcțiilor hepatice; trat. cu ethosuximidă nu trebuie întrerupt brusc; sarcină și alăptare.

RA: Greață, vărsături, anorexie, dureri gastrice, scădere în greutate, diaree, oboseală, dureri de cap, amețeli, ataxie și fotofobie. Rareori se pot manifesta tulburări de somn, scăderea puterii de concentrare, sughiț, albuminurie, urticarie, erupții, sindrom Stevens-Johnson, lupus eritematos sistemic, sclerodermie, hirsutism, reacții de tip parkinsonian, iritabilitate, agresivitate, excitație, inerție, miopie, hemoragii vaginale, inflamarea limbii și a vălului palatin, creșterea valorilor GOT și a urobilinogenului, leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, eozinofilie, anemie aplastică și pancitopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DOLASETRONUM
DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM

Cod ATC: C01CA01**THOMASIN** APOGEPHA; Sol. orală 15 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml (*P-RF*)**THOMASIN** APOGEPHA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 cpr. (*P-RF*)**Ind:** Stări hipotensive cronice, hipotensiune ortostatică.**Dz:** *Adulți și copii mari:* câte 5-10 mg etilefrin de 2-3 ori/zi, înainte de mese; *copii mici:* câte 2,5-5 mg etilefrină de 3 ori/zi.**Cind:** Hipertiroidie, IC (necompensată), boală coronariană, HTA, IR severă, feocromocitom, glaucom cu unghi îngust, adenom de prostată cu retenție de urină, asociere cu IMAO.**Al:** Simpatomimeticele figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi).**RA:** Uneori cefalee, neliniște, anxietate, tremor, tahicardie, aritmii ectopice, dureri anginoase (mai ales la dozele mari).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M02AA06

DOMPERIDONUM
DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM

RHEUMON BAYER AG; Sol. inj. 500 mg/ml; ct. × 1 f. × 2 ml (**P-RF**)
RHEUMON BAYER AG; Cremă 10%; ct. × 1 tub × 50 g (**OTC**) - COD ATC: M01AGN1

Ind: Boli reumatice, acute și subacute, dureri de origine reumatică.

Dz: Se aplică, de mai multe ori/zi, la nivelul zonei afectate, un segment de 5-10 cm etofenamat gel, se masează apoi ușor pentru a pătrunde în piele.

Al: Nu se aplică la nivelul leziunilor pielii și nici pe leziuni eczematoase.

RA: Foarte rar apar local zone de înroșire a pielii, arsuri sau prurit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DONEPEZILUM
DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N01AX07**ETOMIDAT®-LIPURO** B. BRAUN MELSUNGEN AG; Emulsie inj. 2 mg/ml; ct. × 10 f. × 10 ml (S)**Ind:** Inducerea anesteziei generale.

Dz: Doza trebuie ajustată individual, în funcție de răspunsul clinic. *Dozele recomandate:* La *adulti*, doza hipnotică eficace este de 0,15-0,30 mg etomidat/ kg (0,075-0,15 ml/kg). La *copii sub 15 ani și vârstnici* se administrează o singură doză de 0,15-0,2 mg etomidat (0,075-0,15 ml/kg), ajustată în funcție de efectul clinic. La pacienții cu ciroză hepatică și la cei tratați anterior cu neuroleptice, doza trebuie micșorată. În cazul utilizării anesteziei în marele rău epileptic sau în crizele epileptice în serie, se injectează rapid 0,3 mg etomidat/kg (0,15 ml), în decurs de 10 secunde. Dacă este necesar, această doză poate fi repetată de mai multe ori. Trebuie injectat strict intravenos, de regulă lent (o doză în aproximativ 30 secunde) și, dacă este necesar, fracționat. Injectarea intraarterială trebuie evitată, datorită riscului de necroză. Injectarea paravenoasă provoacă durere puternică. La pacienții cu epilepsie manifestă sau cu risc convulsivant crescut, injectarea trebuie efectuată rapid, în câteva secunde, pentru a evita pătrunderea prea lentă a etomidatului în creier; trecerea rapidă a acestuia în creier previne apariția convulsiilor.

Cind: Hipersensibilitate la etomidat, emulsii lipidice sau la oricare dintre excipienții produsului. Copii sub 6 luni.

Al: Înainte de administrarea etomidatului, pentru a evita apariția miocloniilor trebuie administrată medicație adecvată, de exemplu diazepam, care poate fi injectat i.m. cu aproximativ o oră înainte sau i.v. cu aproximativ 10 minute înainte. Nu se adm. pacienților cu tulburări ereditare ale biosintezei hemului, cu excepția cazurilor în care indicația administrării etomidatului a fost ferm stabilită și după evaluarea atentă a raportului risc potențial/beneficiu terapeutic. Nu se adm. în timpul sarcinii sau în timpul alăptării.

Afectează capacitatea de a conduce autovehicule sau utilaje.

RA: Etomidatul inhibă biosinteza corticosuprarenaliană a steroizilor. Ocazional s-au observat: greață și vărsături (totuși, acestea au fost probabil provocate de opioidele administrate concomitent sau ca premedicație), tuse, sughiț și tremor. Rareori, după administrarea de etomidat, s-a observat eliberarea de histamină. Există raportări izolate privind apariția laringospasmului după administrarea de etomidat. În cazul asocierii cu deprimante SNC poate să apară apnee tranzitorie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DOPAMINUM
DORNAZA ALFA
DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM

Cod ATC: L01CB01

ETOPOSID EBEWE 50 mg; ETOPOSID EBEWE 100 mg; ETOPOSID EBEWE 200 mg EBEWE PHARMA; Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 2,5, 5 sau 10 ml (S)

TOPOSIDE PHARMACIA & UPJOHN; Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 sau 25 ml (S)

ETOPOSIDE PIERRE FABRE 100 mg/5 ml LAB. PIERRE FABRE; Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml; ct. × 5 fl. × 5 ml (S)

SINTOPOZID 100 mg/5 ml SINDAN SRL; Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (S)

VEPESID BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. moi 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (50 mg), ct. × 1 blist. × 10 cps. (100 mg) (S/P-RF)

Ind: Tumori testiculare refractare - în scheme polichimioterapice la pacienți care au efectuat trat. chirurgical, chimioterapic și radioterapie adecvate; tumori pulmonare cu celule mici - în scheme polichimioterapice; este eficient și în alte tipuri de carcinoame pulmonare; limfoame maligne hodgkiniene și non-hodgkiniene (în special cele histiocitare); leucemie acută non-limfocitară; cancer de sân tratat anterior; coriocarcinom placentar; sarcom Kaposi.

Dz: Int. în doză de 100-200 mg etopozidă/m² și zi timp de 5 zile (zilele 1-5 ale curei citostatice) sau 200 mg etopozidă/m² și zi, în zilele 1, 3 și 5; curele se repetă la fiecare 3-4 săptăm., în asociere cu alte chimioterapice. Perfuzie iv. în ser fiziologic sau glucoză 5%, timp de aprox. 2 ore. Dozele uzuale sunt cuprinse între 50-120 mg/m² și zi, pentru o perioadă de 3-5 zile, consecutiv, în serii repetate la 14 zile funcție de protocolul utilizat. Curele se repetă după un interval de 14 zile. Doza totală uzuală pentru o cură i.v. este de 400 mg/m².

Cind: Hipersensibilitate la etopozidă.

Al: Se poate produce o mielosupresie severă urmată de infecții sau sângerări. Pacienții trebuie supravegheați atât pe durata terapiei cât și după oprirea acesteia (numărul trombocitelor, hemoglobina, numărul leucocitelor și formula leucocitară). Interacțiuni medicamentoase cu ciclosporina și vaccinuri cu germeni vii atenuați. Sarcină și alăptare. *oferi și activități de precizie.

RA: Mielosupresie (leucopenii, trombocitopenii, leucemii acute), greață și vărsături, anorexie, stomatită, inflamația mucoasei digestive, esofagite ușoare sau severe, diaree, alopecie reversibilă, reacții de tip anafilactic, cazuri de hipertensiune arterială și/sau hiperemie, apnee, neuropatie periferică, somnolență și oboseală, toxicitate hepatică, gust neplăcut, febră, rash, pigmentație, prurit, urticarie, dureri abdominale, constipație, disfagie, cecitate tranzitorie și un singur caz de reactivare a unei radiodermite.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DORNAZA ALFA
 DORZOLAMIDUM
 DOXAZOSINUM
 DOXEPINUM
 DOXORUBINUM
 DOXYCYCLINUM
 DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
 EFALIZUMABUM
 EFAVIRENZUM
 EMEDASTINUM
 ENALAPRILUM
 ENFLURANUM
 ENFUVIRTIDUM
 ENOXAPARINUM
 ENTACAPONUM
 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
 EPINEPHRINUM
 EPIRUBICINUM
 EPOETINUM
 EPROSARTANUM
 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
 EPTIFIBATIDUM
 ERDOSTEINUM
 ERGOCALCIFEROLUM
 ERGOMETRINUM
 ERLOTINIBUM
 ERTAPENEMUM
 ERYTHROMYCINUM
 ESOMEPRAZOLUM
 ESTRADIOLUM
 ESTRAMUSTINUM
 ESTRIOLUM
 ETAMSYLATUM
 ETANERCEPTUM
 ETHAMBUTOLUM
 ETHOSUXIMIDUM
 ETILEFRINUM
 ETOFENAMATUM
 ETOMIDATUM
 ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM

Cod ATC: M01AH05

ARCOXIA® 60 mg; ARCOXIA® 90 mg; ARCOXIA® 120 mg MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 60 mg, 90 mg, 120 mg; ct. × 1 blist. × 7 sau 14 cpr., ct. × 2 blist. × 7 sau 14 cpr. (P-RF)

Ind: Tratamentul simptomatic al bolii artrozice (BA), al poliartritei reumatoide și al durerii și semnelor inflamației asociate cu artrita gutoasă acută.

Dz: Administrare orală, cu sau fără alimente. Boală artrozică: 60 mg o dată pe zi. Poliartrită reumatoidă: 90 mg o dată pe zi. Artrită gutoasă acută: 120 mg o dată pe zi, în perioada cu simptomatologie acută. La pacienții cu clearance al creatininei ^{*} 30 ml/min nu este necesară ajustarea dozei. La pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (scor Child-Pugh 5-6) nu trebuie administrată o doză mai mare de 60 mg o dată pe zi. La pacienții cu insuficiență hepatică moderată (scor Child-Pugh 7-9) doza recomandată este de 60 mg în fiecare a doua zi.

Cind: Pacienți cu hipersensibilitate cunoscută la etoricoxib sau la oricare dintre excipienți. Ulcer peptic activ sau hemoragie gastrointestinală (GI) activă. Disfuncție hepatică gravă (scor Child-Pugh > 9). Pacienți cu clearance al creatininei estimat de < 30 ml/min. Pacienți care au prezentat semne de astm bronșic, rinită acută, polipi nazali, edem angioneurotic sau urticarie în urma administrării de acid acetilsalicilic sau a altor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Gravide și femeile care alăptează. Copii și adolescenți cu vârsta sub 16 ani. Boală intestinală inflamatorie. Insuficiență cardiacă congestivă decompensată.

Al: Administrare cu prudență la pacienți cu boală cardiacă ischemică, antecedente de insuficiență cardiacă, insuficiență ventriculară stângă, hipertensiune arterială, edeme anterior începerii tratamentului, antecedente de boli cerebrovasculare, funcție renală alterată, antecedente de perforații gastrointestinale, ulcere și hemoragii digestive superioare, vârsta peste 65 de ani, disfuncție hepatică. Prudență la asocierea cu: Warfarină (monitorizarea INR), inhibitori ECA (mai ales la vârstnici sau pacienți cu funcție renală alterată), nu se recomandă asocierea cu acid acetilsalicilic sau alte AINS în doze mai mari decât cele folosite în profilaxia cardiovasculară, ciclosporină și tacrolimus (monitorizarea funcției renale), litiu (monitorizarea litemiei), metotrexat (monitorizarea toxicității metotrexatului, contraceptive orale, digoxină (monitorizare la pacienți cu risc crescut de toxicitate digitalică), rifampicină.

RA: Incidența reacțiilor adverse a fost evaluată utilizând următoarea scală: frecvente: > 1/100, < 1/10; puțin frecvente: > 1/1000, < 1/100; rare: > 1/10000, < 1/1000; foarte rare: < 1/10000. Puțin frecvente: gastroenterită, infecții respiratorii superioare, infecții ale tractului urinar, creșterea sau scăderea apetitului, edeme/retenție de lichide, creștere în greutate, anxietate, disgeuzie, insomnie, parestezii/hiperestezie, somnolență, depresie, scăderea performanțelor intelectuale, vedere neclară, insuficiență cardiacă congestivă, modificări nespecifice ale ECG, înroșirea feței, hipertensiune arterială, tuse, dispnee, epistaxis, echimoze, distensie abdominală, reflux acid, tulburări ale peristaltismului intestinal, constipație, uscăciunea gurii, ulcer gastroduodenal, sindrom de colon iritabil,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DORZOLAMIDUM
DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM

Cod ATC: V09AA01, V09HA02**CERETEC** AMERSHAM PLC; Liof. pt. sol. inj. 0,5 mg; ct. × 1 trusă × 1, 2 sau 5 fl. (S)

Ind: Scintigrafia cerebrală și marcare *in vitro* cu tehnетиу-99m a leucocitelor, leucocitele marcate fiind apoi reinjectate, efectuându-se ulterior scintigrafia pentru vizualizarea localizărilor acestora.

Dz: Pentru scintigrafia cerebrală, 350-500 MBq; pentru localizarea *in vivo* a leucocitelor marcate cu tehnетиу-99m, 200 MBq.

A!: Prudență la copii; sarcină și alăptare.

RA: Hipersensibilitate ușoară, manifestată prin apariția unui rash urticarian eritematos după inj. i.v. directă a produsului reconstituit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DOXAZOSINUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM

Cod ATC: L02BG06

AROMASIN® PHARMACIA; Dj. 25 mg; ct. × 2 blist. × 15 dj. (S/P-RF)

Ind: Trat. cancerului de sân avansat, la femeile în postmenopauză naturală sau indusă, la care boala a progresat sub trat. antiestrogenic. Eficiența nu a fost demonstrată la pacientele a căror tumoră este lipsită de receptori estrogenici.

Dz: Doza uzuală este de 25 mg exemestan o dată/zi, atât timp cât este eficace (împiedică dezvoltarea tumorii).

Cind: Hipersensibilitate la exemestan. Premenopauză. Sarcină și alăptare.

A!: Statusul postmenopauză trebuie confirmat prin măsurarea concentrațiilor serice de LH, FSH și estradiol; prudență la pacienții cu IH sau IR; copii; șoferi și activități de precizie.

RA: Bufeuri, greață, oboseală, transpirație și amețeli. RA mai rare: cefalee, insomnie, durere, erupții cutanate, durere abdominală, anorexie, vomă, depresie, alopecie, edem periferic sau al membrelor inferioare, constipație și dispepsie. Au fost raportate ocazional trombocitopenie și leucopenie. Au fost observate ocazional creșteri ale enzimelor hepatice și ale fosfatazei alcaline.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C10AX09

EZETROL® MERCK SHARP & DOHME; Cpr. 10 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 4 cpr. (P-RF)

Ind: Hipercolesterolemie primară: în asociere cu un inhibitor de HMG-CoA reductază (statină), ca tratament adjuvant al dietei la pacienți cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă familială și non-familială) la care tratamentul cu o statină în monoterapie nu oferă rezultate satisfăcătoare. Hipercolesterolemie homozigotă familială (HHoF): în asociere cu o statină ca terapie adjuvantă a dietei la pacienții cu HHoF. În monoterapie, ca terapie adjuvantă a dietei la pacienții cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă familială și non-familială) la care tratamentul cu o statină este considerat neadecvat sau nu este tolerat. Sitosterolemie homozigotă (fitosterolemie): tratament adjuvant al dietei la pacienții cu sitosterolemie homozigotă familială.

Dz: Oral, 10 mg zilnic, asociat cu dietă corespunzătoare hipolipidică. Când se asociază cu secheștranti de acizi biliari, administrarea trebuie făcută fie cu * 2 ore înainte sau cu * 4 ore după administrarea acestuia. Copii și adolescenți * 10 ani, nu este necesară ajustarea dozei.

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (scor Child-Pugh 5-6). Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Tratamentul în asociere cu o statină este contraindicat în timpul sarcinii și alăptării. Este contraindicată administrarea în asociere cu o statină la pacienții cu boală hepatică activă sau cu persistență inexplicabilă a valorilor crescute ale transaminazelor serice. Atunci când Ezetrol este administrat cu o statină, consultați rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) al acelei statine.

Al: La administrarea în asociere cu o statină se va consulta RCP-ul statinei respective. Nu este recomandată utilizarea la pacienți cu insuficiență hepatică moderată sau severă. La asocierea cu o statină, la inițierea tratamentului și în concordanță cu recomandările statinei respective trebuie efectuate teste pentru evaluarea funcției hepatice. Nu este recomandată administrarea asociat cu fibrati. La gravide se administrează doar dacă este absolut necesar.

RA: Reacții adverse frecvente (* 1/100, < 1/10) la administrarea medicamentului singur: cefalee, dureri abdominale și diaree; asociat cu o statină: cefalee și oboseală, dureri abdominale, constipație, diaree, flatulență și greață, mialgii. Reacții adverse suplimentare raportate după punerea pe piață a produsului: rare (* 1/10000, <1/1000): hipersensibilitate, inclusiv angioedem și rash.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DOXORUBICINUM
DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM

Cod ATC: J05AB09

FAMVIR SMITHKLINE BEECHAM; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 15 sau 21 cpr. (250 mg), ct. × 1 blist. × 14 cpr. sau ct. × 3 blist. × 10 cpr. (500 mg) (*P-RF*)

Ind: Trat. formei acute a infecției cu *Herpes zoster*, reducerea perioadei de disconfort dată de nevralgia postherpetică, trat. formei acute de herpes genital și al herpesului genital recurent.

Dz: Adm. int. Infecțiile cu *Herpes zoster*: 250 mg de 3 ori/zi, cât mai devreme posibil, timp de 7 zile. Pentru pacienții considerați cu risc de dezvoltare a nevralgiei postherpetice 500 mg de 3 ori/zi, timp de 7 zile. Infecțiile genitale herpetice, primul episod: 250 mg de 3 ori/zi, timp de 5 zile. Infecțiile genitale herpetice recurente: 250 mg de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la famciclovir, penciclovir sau la excipienți.

Al: Prudență la copii, tulburări funcționale renale, evitarea relațiilor sexuale, sarcină și alăptare.

RA: Cefalee și greață; rar: vomă, vertij, halucinații și stări confuzionale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A02BA03

DOXYCYCLINUM
DROTAVERINUM
DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM

FAMODAR 10; FAMODAR 20; FAMODAR 40 DAR AL DAWA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FAMODIN 20; FAMODIN 40 AC HELCOR SRL; Cpr. film. 20 mg sau 40 mg; ct. × 30 cpr. (S/P-6L)
FAMOTAK SEDICO; Cpr. film. 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FAMOTIDIN PROMEDIC SRL; Dj. 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj. (P-6L)
FAMOTIDINĂ 20 mg; FAMOTIDINĂ 40 mg SICOMED SA; Cpr. film. 20 mg, 40 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (P-6L)
FAMOTIDINA ALKALOID AD; Cpr. film. 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 1 blist. × 10cpr. (P-6L)
GASTROSIDIN ECZACIBASI ILAC; Cpr. film. 40 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
QUAMATEL® 20 mg; QUAMATEL® 40 mg RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. film. 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)
QUAMATEL® 20 mg; RICHTER GEDEON Ltd.; Liof./solv. pt. sol. inj. 20 mg; ct. × 5 fl. + 5 f. × 5 ml solv. (P-RF)
ULCERAN-40 MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 40 mg; ct. × 1 blist. × 40 cpr. (P-6L)

Ind: Ulcer gastro-duodenal activ. Profilaxia recăderilor ulcerului duodenal. Esofagita de reflux. Sindrom Zollinger-Ellison, mastocitoză sistemică, sindrom de neoplazie endocrină multiplă. Hemoragie digestivă superioară. Trat. leziunilor gastro-duodenale și profilaxia acestora la pacienții cu risc.

Dz: *Intern:* Ulcer gastro-duodenal activ 40 mg famotidină, în priză unică, seara la culcare sau 20 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara, timp de 4-8 săpt. Profilaxia recăderilor ulcerului duodenal: 20 mg, seara la culcare. Esofagita de reflux: 20 mg, de 2 ori/zi, dimineața și seara, timp de 4-8 săpt. Sd. Zollinger-Ellison: 20 mg, la intervale de 6 ore. IR severă 20 mg, seara la culcare. *Inj:* Cazurile severe: 20 mg i.v., de 2 ori/zi, la un interval de 12 ore. Sd. Zollinger-Ellison: 20 mg i.v., la un interval de 6 ore. În anestezia generală 20 mg i.v., în dimineața zilei intervenției chirurgicale sau cu cel puțin 2 ore înainte de începerea intervenției.

Cind: Hipersensibilitate la famotidină sau la oricare din componenții produsului.

Al: Verificarea benignității leziunii înaintea începerii trat., prudență în IR, copii, interacțiuni medicamentoase cu antiacidele gastrice; sarcină și alăptare.

RA: Rareori: cefalee, vertij, diaree, constipație, uscăciunea gurii, greață, vărsături, oboseală; excepțional - reacții alergice (rash, prurit, anafilaxie), creșterea nivelului transaminazelor serice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C08CA02

DROTAVERINUM
 DUTASTERIDUM
 DYDROGESTERONUM
 EFALIZUMABUM
 EFAVIRENZUM
 EMEDASTINUM
 ENALAPRILUM
 ENFLURANUM
 ENFUVIRTIDUM
 ENOXAPARINUM
 ENTACAPONUM
 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
 EPINEPHRINUM
 EPIRUBICINUM
 EPOETINUM
 EPROSARTANUM
 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
 EPTIFIBATIDUM
 ERDOSTEINUM
 ERGOCALCIFEROLUM
 ERGOMETRINUM
 ERLOTINIBUM
 ERTAPENEMUM
 ERYTHROMYCINUM
 ESOMEPRAZOLUM
 ESTRADIOLUM
 ESTRAMUSTINUM
 ESTRIOLUM
 ETAMSYLATUM
 ETANERCEPTUM
 ETHAMBUTOLUM
 ETHOSUXIMIDUM
 ETILEFRINUM
 ETOFENAMATUM
 ETOMIDATUM
 ETOPOSIDUM
 ETORICOXIBUM
 EXAMETAZIMUM
 EXEMESTANUM
 EZETIMIBUM
 FAMCICLOVIRUM
 FAMOTIDINUM
FELODIPINUM

AURONAL 2,5 mg; AURONAL 5 mg; AURONAL 10 mg EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. elib. prel. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FELOCORD® 5 mg, FELOCORD® 10 mg TERAPIA SA; Dj. elib. prel. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (P-6L)
FELODIPIN AL 2,5 RETARD; FELODIPIN AL 5 RETARD; FELODIPIN AL 10 RETARD ALIUD PHARMA; Cpr. elib. modif. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 2, 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FELODIPIN EP 5 mg; FELODIPIN EP 10 mg AC HELCOR SRL; Cpr. elib. prel. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FELOHEXAL® 5 mg; FELOHEXAL® 10 mg HEXAL AG; Cpr. film. cu elib. prel. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FELOTARD® 2,5 mg; FELOTARD® 5 mg; FELOTARD® 10 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. cu elib. prel. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)
PLENDIL ASTRAZENECA; Cpr. film. ret. 2,5 mg, 5 mg sau 10 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)
PRATOL® 2,5 mg; PRATOL® 5 mg; PRATOL® 10 mg SICOMED SA; Cpr. film. cu elib. prel. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
PRE SID 2,5 mg; PRE SID 5 mg; PRE SID 10 mg IVAX PHARMACEUTICALS; Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
SISTAR® 2,5 mg; SISTAR® 5 mg; SISTAR® 10 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. cu elib. modif. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: HTA. Angină pectorală.

Dz: Inițial 5 mg zilnic (2,5 mg la vârstnici), doza de întreținere 5-10 mg zilnic.

Cind: Hipersensibilitate la felodipină, sarcină.

Al: Prudență la copii, poate precipita o HTA semnificativă, cu ischemie miocardică, interacțiuni medicamentoase cu inhibitorii enzimatici și inductorii enzimatici, alăptare.

RA: Înroșirea feței, cefalee, palpitații, obnubilare și oboseală; edeme, tumefiere moderată a mucoasei gingivale. Rar rash, prurit, cefalee, obnubilare, tahicardie, palpitații, sincopă, fatigabilitate. Izolat reacții de fotosensibilitate, artralгии, mialgii, parestezii, grețuri, vărsături, hiperplazie gingivală, creșterea valorii enzimelor hepatice, reacții de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

DUTASTERIDUM
DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM

Cod ATC: C10AB05

FENOFIBRAT LPH® 100 mg; FENOFIBRAT LPH® 200 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. 100 mg și 200 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cps. (100 mg); ct. × 2, 3 sau 100 blist. × 10 cps. **(S/P-6L)**

LIPANTHYL® LAB. FOURNIER; Cps. micronizate 100 mg; ct. × 4 blist. × 12 cps. **(P-6L)**

LIPANTHYL® 200 M LAB. FOURNIER; Cps. micronizate 200 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

LIPANTHYL® SUPRA 160 mg LAB. FOURNIER; Cpr. film. elib. modif. 160 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

LIPIVIM VIM SPECTRUM SRL; Cps. 200 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

LIPOFIB® SR 250 mg TERAPIA SA; Cps. cu elib. prel. 250 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

Ind: Hipertrigliceridemie primară (de tip I); Disbetalipoproteinemia primară (tip III); Hiperlipidemia (tip II b) combinată cu hipercolesterolemie (tip II a).

Dz: 300-600 mg/zi divizate în 3 prize, în timpul meselor.

Cind: Hipersensibilitate la fenofibrat; IH și IR severe cu sindrom nefrotic sau ciroză biliară primară.

RA: Greață, vomă, diaree, colelitiază, eritem, prurit, dureri de cap, amețeli, mialgii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R03DX03

DYDROGESTERONUM
EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM

EURESPAL® LAB. SERVIER; Sirop 0,2%; ct. × 1 fl. × 150 ml (**P-6L**)**EURESPAL**® 80 mg LAB. SERVIER; Cpr. film. 80 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (**P-6L**)

Ind: Bronșită cronică cu sau fără insuficiență respiratorie; simptome respiratorii sau ORL ale reacțiilor alergice; rinite alergice sezoniere și perene; tratament de întreținere în astmul bronșic necomplicat sau complicat.

Dz: *Adulți:* doza uzuală recomandată este 160 mg fenspiridă pe zi, înainte de mese (dimineața și seara). Dacă este nevoie de creșterea efectului și/sau în afecțiunile acute, doza recomandată este de 240 mg fenspiridă pe zi (dimineața, la prânz și seara). *Copii:* la copii se recomandă să se administreze sirop; între 0-24 luni sau o greutate de până la 10 kg: 4 mg/kg corp zilnic, adică 2-4 lingurițe de sirop (sau 10-20 ml) adăugate la un biberon. Peste 24 luni sau o greutate de peste 10 kg: 2-4 linguri de sirop (sau 30-60 ml) zilnic, înainte de mese.

Cind: Nu se cunosc.

Al: Administrarea fenspiridei nu trebuie să întârzie instituirea tratamentului antiinfecțios. Nu este recomandată administrarea fenspiridei în timpul sarcinii, deși instalarea sarcinii în timpul tratamentului nu justifică întreruperea acesteia. Nu se recomandă alăptarea în timpul tratamentului.

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje: Fenspirida poate influența capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, datorită posibilității apariției somnolenței.

RA: Sunt posibile tulburări gastrointestinale (greață, vărsături, epigastralgie), somnolență. Rar poate să apară tahicardie moderată, care dispare la reducerea dozelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EFALIZUMABUM
EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM

Cod ATC: N02AB03, N01AH01

DUROGESIC 25 g/h; DUROGESIC 50 g/h; DUROGESIC 100 g/h JANSSEN PHARMACEUTICA; Sist. transderm. 2,5 mg/10 cmp; ct. × 5 plicuri × 1 sist. transderm. **(P-TS)**

FENTANYL GEDEON RICHTER Ltd.; Sol. inj. 0,05 mg/ml; ct. × 50 f. × 5 ml **(S)**

FENTANYL-JANSSEN JANSSEN PHARMACEUTICA; Sol. inj. 0,05 mg/ml; ct. × 5 sau 50 f. × 10 ml **(S)**

Ind: Anestezia generală sau locală. Analgezia cu neuroleptice. Premedicație anestezică.

Dz: Doza se stabilește individual. Se poate adm. i.m., i.v. și în perfuzie: 0,002-0,05 mg/kg. Analgezia cu neuroleptice: 0,2-0,6 mg i.v. **Vârșnici:** doza va fi redusă. **Copii:** 0,002-0,003 mg/kg i.m.

Cind: Hipersensibilitate la fentanyl.

Al: Inducerea rigidității musculare poate fi evitată prin adm. i.v. lentă, premedicație cu benzodiazepine și folosirea de miorelaxante. Prudență în deprimare respiratorie; complianță intracerebrală compromisă; hipotiroidism necontrolat, afecțiuni pulmonare, rezervă respiratorie scăzută; alcoolism; funcția hepatică și renală alterată. Interacțiuni medicamentoase cu barbituricele, benzodiazepinele, neurolepticele, alcoolul, ritonavirul. Sarcină și alăptare, șoferi și activități de precizie.

RA: Depresie respiratorie, apnee, rigiditate musculară, mișcări mioclonice, bradicardie, hipotensiune (tranzitorie), greață, vărsături și amețeală. Rar: laringospasm; reacții alergice (cum ar fi anafilaxia, bronhospasmul, pruritul, urticaria) și asistolie; depresie respiratorie secundară, de rebound, după intervenția chirurgicală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EFAVIRENZUM
EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM

Cod ATC: D01AC12, G01AF12**LOMEXIN** LAB. FOURNIER; Ovule 600 mg; ct. × 1 sau 2 ovule (*P-RF*)**LOMEXIN** LAB. FOURNIER; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)**LOMEXIN** LAB. FOURNIER; Cremă vag. 2%; ct. × 1 tub × 30 sau 78 g + aplicator (*P-RF*)

Ind: *Ovule:* Candidoze genitale suprainfectate sau neinfectate cu bacterii grampozitive. *Cremă:* Candidoze cutanate, intertrigo (în special genito-crural, anal și perianal), onyxis și perionyxis, dermatofite ale pielii fără păr, pityriasis versicolor.

Dz: *Ovule:* 600 mg, la culcare, în doză unică. *Cremă:* 1-2 aplicații/zi (candidoze, intertrigo: 2-3 săptăm.; onyxis și perionyxis: 2 luni; dermatofite: 2-6 săptăm.; pityriasis versicolor 2-4 săptăm.).

Cind: Hipersensibilitate la fenticonazol sau la alți imidazoli.

Al: Nu este recomandată folosirea prezervativelor, diafragmelor din cauciuc, spermicidelor, săpunului cu pH acid. Se evită contactul cu ochii. Prudență în sarcină.

RA: Foarte rar: manifestări de intoleranță locală: senzație de arsură, câteodată prurit, eritem. Posibilă alergie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EMEDASTINUM
ENALAPRILUM
ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM

Cod ATC: B03ABN1**FER-SOL** E.I.P.I.C.O.; Sol. orală 24 mg Fe/ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (**P-6L**)**Ind:** Trat. anemiei feriprive la copii. Profilaxia anemiei feriprive la nou-născuții prematuri.**Dz:** *Adulți:* 6-10 mg fer/kg. *Copii sub 2 ani:* 9,6 mg fer de 3 ori/zi. *Copii între 2 și 6 ani:* 14,4 mg fer de 3 ori/zi. *Copii între 6 și 10 ani:* 19,2 mg fer de 3 ori/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la fer citrat; anemie normocromă sau hipercromă (talasemia); anemie refractară, anemie prin insuficiență medulară, hipersideremii.**Al:** Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetraciclina, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluoroquinolone, antiacide.**RA:** Tulburări gastrointestinale (greață, vărsături), reacții alergice, colorarea scaunelor în negru.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B03AA02

ENALAPRILUM
 ENFLURANUM
 ENFUVIRTIDUM
 ENOXAPARINUM
 ENTACAPONUM
 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
 EPINEPHRINUM
 EPIRUBICINUM
 EPOETINUM
 EPROSARTANUM
 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
 EPTIFIBATIDUM
 ERDOSTEINUM
 ERGOCALCIFEROLUM
 ERGOMETRINUM
 ERLOTINIBUM
 ERTAPENEMUM
 ERYTHROMYCINUM
 ESOMEPRAZOLUM
 ESTRADIOLUM
 ESTRAMUSTINUM
 ESTRIOLUM
 ETAMSYLATUM
 ETANERCEPTUM
 ETHAMBUTOLUM
 ETHOSUXIMIDUM
 ETILEFRINUM
 ETOFENAMATUM
 ETOMIDATUM
 ETOPOSIDUM
 ETORICOXIBUM
 EXAMETAZIMUM
 EXEMESTANUM
 EZETIMIBUM
 FAMCICLOVIRUM
 FAMOTIDINUM
 FELODIPINUM
 FENOFIBRATUM
 FENSPIDUM
 FENTANYLUM
 FENTICONAZOLUM
 FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS

FERRONAT IVAX PHARMACEUTICALS; Susp. orală 3%; ct. × 1 fl. × 100 ml (**P-6L**)

Ind: Anemii feriprive (microcitare) posthemoragice, prin aclorhidrie, de sarcină, nutriționale ale sugarilor, secundare infecțiilor, infestării parazitare sau cancerului; anemii macrocitare tratate cu cianocobalamină; stări de sideropenie la copii în creștere, în caz de hemoragii cronice; pentru profilaxia carențelor de fier în sarcină, la copii, la donatori de sânge.

Dz: Int., la *adulti*, curativ, 300-600 mg/zi (pe stomacul gol sau, în caz de iritație gastrică, la mese). La *copii* sub 3 ani - 5 mg/kg și zi, 3-6 ani - 1/2 din doza adultului.

Cind: Hemocromatoză, hemoliză cronică, anemie sideroacrestică, anemia din intoxicația cu plumb, talasemie, boli hepatice grave, alergii sau intoleranță la fier; gastrite severe, ulceratii gastrice, varice esofagiene, diaree, colită ulceroasă, sindrom de malabsorbție intestinală (se recomandă fier injectabil).

Al: Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluoroquinolone, antiacide.

RA: Rareori greață, dureri epigastrice, constipație sau diaree (scaunul este colorat în negru), senzație de vertij, bufeuri de căldură.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B03AA03

ENFLURANUM
ENFUVIRTIDUM
ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS

ASCOFER ARENA GROUP SA; Cpr. Fe; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (**P-6L**)**SIROFER**® GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Sirop 4,6%; ct. × 1 fl. × 120 ml (**OTC**)

Ind: Anemii feriprive (microcitare) posthemoragice, prin aclorhidrie, de sarcină, nutriționale ale sugarilor, secundare infecțiilor, infestării parazitare sau cancerului; anemii macrocitare tratate cu cianocobalamină; stări de sideropenie la copii în creștere, în caz de hemoragii cronice; pentru profilaxia carențelor de fier în sarcină, la copii, la donatori de sânge.

Dz: *Adulți:* curativ 600-1200 mg gluconat feros/zi (72-144 mg fier); profilactic 100-300 mg gluconat feros/zi. *Copii:* 200-600 mg gluconat feros/zi; *sugari:* 150 mg/zi. Doza zilnică se fracționează în 3 prize, adm. în afara meselor (dacă se produc fenomene de iritație gastrică, se adm. la mese).

Cind: Hemocromatoză, hemoliză cronică, anemie sideroacrestică, anemia din intoxicația cu plumb, talasemie, boli hepatice grave, alergii sau intoleranță la fier; gastrite severe, ulcerații gastrice, varice esofagiene, diaree, colită ulceroasă, sindrom de malabsorbție intestinală (se recomandă fier injectabil).

Al: Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluorochinolone, antiacide.

RA: Rareori greață, dureri epigastrice, constipație sau diaree (scaunul este colorat în negru), senzație de vertij, bufeuri de căldură.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ENFUVIRTIDUM
 ENOXAPARINUM
 ENTACAPONUM
 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
 EPINEPHRINUM
 EPIRUBICINUM
 EPOETINUM
 EPROSARTANUM
 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
 EPTIFIBATIDUM
 ERDOSTEINUM
 ERGOCALCIFEROLUM
 ERGOMETRINUM
 ERLOTINIBUM
 ERTAPENEMUM
 ERYTHROMYCINUM
 ESOMEPRAZOLUM
 ESTRADIOLUM
 ESTRAMUSTINUM
 ESTRIOLUM
 ETAMSYLATUM
 ETANERCEPTUM
 ETHAMBUTOLUM
 ETHOSUXIMIDUM
 ETILEFRINUM
 ETOFENAMATUM
 ETOMIDATUM
 ETOPOSIDUM
 ETORICOXIBUM
 EXAMETAZIMUM
 EXEMESTANUM
 EZETIMIBUM
 FAMCICLOVIRUM
 FAMOTIDINUM
 FELODIPINUM
 FENOFIBRATUM
 FENSPIDUM
 FENTANYLUM
 FENTICONAZOLUM
 FERROCHOLINATUM
 FERROSII FUMARAS
 FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS

Cod ATC: B03AA07

FERRO-GRADUMET GALENIKA A.D.; Cpr. ret. sulfat feros anhidru 325 mg, corespunzător la 105 mg Fe (II); ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

FERRO-GRADUMET® ABBOTT; Cpr. ret. sulfat feros anhidru 325 mg, corespunzător la 105 mg Fe (II); ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Anemii feripive; cerințe crescute de fier; carență latentă de fier.

Dz: Se admin. oral 80-100 mg de 1-2 ori/zi, în funcție de gravitatea anemiei.

Cind: Hipersensibilitate la proteinsuccinilat de fer. Hemosideroză, hemocromatoză. Anemie aplastică, anemie hemolitică și anemie sideroacrestică. Pancreatită cronică. Ciroză hepatică.

Al: Hiposideremia asociată cu sindroame inflamatorii nu răspunde la trat. cu fier; este necesar trat. etiologic al anemiei; control al eficacității trat. la 3 luni; interacțiuni medicamentoase cu tetracicline, difosfonați, penicilamină, tiroxină, fluorochinolone, antiacide.

RA: Ocazional tulburări gastrointestinale ușoare (dureri gastrice, constipație, diaree, grețuri).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ENOXAPARINUM
ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V08CB03

RESOVIST SCHERING AG; Sol. inj. 0,5 mmol Fe/ml; ct. × 1, 5 sau 10 seringi preumplute × 0,9 sau 1,4 ml (S)

Ind: Substanță de contrast pentru imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) a leziunilor hepatice, atunci când examinarea fără substanță de contrast nu a oferit informații certe.

Dz: *Adulți:* cu greutate < 60 kg: 0,9 ml (echivalent cu 0,45 mmol fer); pacienți cu greutate > 60 kg: 1,4 ml (echivalent cu 0,7 mmol fer). *Vârstnici, pacienți cu insuficiență renală sau hepatică:* nu sunt necesare ajustări ale dozei.

Cind: Hipersensibilitate la ferucarbotran sau la oricare dintre excipienți; hipersensibilitate la dextran. Nu există experiență clinică la pacienți cu vârsta sub 18 ani; de aceea, utilizarea la acești pacienți nu este recomandată.

Al: Ferucarbotranul nu trebuie folosit în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar. Nu se administrează în timpul alăptării decât în cazuri speciale. În acest caz alăptarea se întrerupe câteva zile.

RA: La pacienții cu teren atopic, incluzând antecedente de astm bronșic, este necesară atenție specială deoarece s-a observat că la aceștia incidența reacțiilor adverse este de 2 ori mai mare. Majoritatea reacțiilor adverse au fost de intensitate ușoară - moderată. *Organismul ca întreg și reacțiile la locul de injectare:* obișnuite: durere < 2%; neobișnuite: astenie, durere dorsolombară, reacții la locul injectării; rare: hipersensibilitate și anafilaxie. *Aparat cardiovascular:* obișnuite: vasodilatație < 2%; neobișnuite: durere precordială; rare: hipertensiune arterială, flebită. *Tract gastrointestinal:* neobișnuite: greață, vărsături. *Sistem nervos central:* obișnuite: parestezii < 2%; neobișnuite: cefalee; rare: hipoestezie, anxietate, amețală, convulsii. *Organe de simț:* neobișnuite: modificarea gustului; rare: parosmie. *Aparat respirator:* rare: dispnee, tuse, rinită. *Tegumente:* neobișnuite: prurit, erupții cutanate; rare: eczemă, urticarie. Ocazional, poate să apară o creștere ușoară și tranzitorie a timpului parțial de tromboplastină (TPT), în asocieră cu scăderea activității factorului XI (scăderea maximă a fost în medie de 15 %), timpul Quick nemodificându-se. După administrare de ferucarbotran a fost observată o creștere dependentă de doză a sideremiei și a concentrației feritinei, cu atingerea unui nivel maxim după 24 ore, în timp ce capacitatea totală de legare a ferului nu a fost afectată. Ca și în cazul altor complexe paramagnetice, foarte rar s-au observat reacții de hipersensibilitate și anafilactice, inclusiv șoc, care necesită intervenție medicală de urgență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ENTACAPONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM

Cod ATC: R06AX26

ALTIVA 120 mg; ALTIVA 180 mg RANBAXY; Cpr. film. 120 mg, 180 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

TELFAS[®] 30 mg; TELFAST[®] 120 mg; TELFAST[®] 180 mg AVENTIS PHARMA; Cpr. film. 30 mg, 120 mg, 180 mg; ct. × 1, 2, 5 sau 10 blist. × 4 cpr.; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 15 cpr. (30 mg); ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (120 mg, 180 mg) (**P-6L**)

Ind: Trat. simptomatic al urticariei cronice idiopatice și rinitei alergice sezoniere.

Dz: Adulți: Adm. orală 120-180 mg o dată/zi. Copii 6-11 ani: 30 mg de două ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la fexofenadină sau la oricare dintre excipienții produsului.

Al: Copii sub 6 ani (nu au fost stabilite eficacitatea și siguranța administrării); vârstnici; IR; IH; interacțiuni medicamentoase cu antiacide; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, somnolență, greață, amețeli, oboseală; reacții de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM

COD ATC: L03AA02

NEUPOGEN *HOFFMANN-LA ROCHE*; Sol. inj. 30 MU/0,5 ml sau 48 MU/0,5 ml; ct. × 1 sau 5 seringi preumplute × 0,5 ml (*S/P-RF*)

Ind: Reducerea duratei neutropeniei și a incidenței neutropeniei febrile, la pacienții tratați cu citostatice pentru cancere nemieloide și a neutropeniei după terapie mieloablative, urmată de transplant medular; neutropenie severă congenitală, ciclică sau idiopatică.

Dz: Perf. i.v. sau s.c. 5-12 g/kg și zi, în funcție de indicație și situația clinică.

Cind: Hipersensibilitate la filgrastim; neutropenie congenitală severă (sindromul Kostmann) cu citogenetică anormală.

Al: Prudență la pacienții cu mielodisplazie; malignități mieloide; afectare severă renală sau hepatică; sarcină și alăptare.

RA: Durere osteo-musculară; tulburările urinare; hTA; creșterea reversibilă a nivelului LDH, FA, acidului uric, GPT; leucocitoză; tulburări vasculare (boală veno-ocluzivă și modificări de volum); alergii; splenomegalie; trombocitopenie; cefalee; diaree; anemie; epistaxis; scăderea glicemiei; reacții la locul injectiei, hepatomegalie, artralgie, alopecie, osteoporoză și rash.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EPINEPHRINUM
EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM

Cod ATC: G04CB01, D11AX10**FINASTERID SANDOZ 5 mg** HEXAL AG; Cpr. film. 5 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cpr.; ct. × 1, 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)****PROPECIA®** MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 1 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. **(P-6L)****PROSCAR®** MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 5 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. **(P-6L)**

Ind: Cpr. film. 1 mg: Tratamentul alopeciei androgenice la persoanele de sex masculin ce prezintă calviție, pentru accelerarea creșterii părului și prevenirea pierderii ulterioare a părului. Cpr. film. 5 mg: Trat. și controlul hiperplaziei benigne a prostatei.

Dz: Adm. orală 1 cpr. zilnic, înainte sau după ingestia de alimente.

Cind: Hipersensibilitate la finasterid; sarcină; finasterid nu este indicat la femei și copii.

A!: Monitorizare pentru uropatie obstructivă; tușeu rectal și ASP (modifică valorile reale ale ASP) periodic.

RA: Rar impotență, scăderea libidoului; scăderea volumului ejaculatului; dureri și creștere de volum la nivelul sânilor; reacții de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EPIRUBICINUM
EPOETINUM
EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM

Cod ATC: C01BC04**TAMBOCOR® 50; TAMBOCOR® 100** 3M HEALTH CARE Ltd.; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 20 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. și prevenirea recidivelor în tahicardii ventriculare cu potențial letal, tahicardii ventriculare simptomatice și invalidante (în absența afectării funcției ventriculului stâng), tahicardii supraventriculare (în absența afectării funcției ventriculului stâng).

Dz: 100 mg de 2 ori/zi, dimineața, până la maximum 200 mg (excepțional până la 300 mg).

Cind: Hipersensibilitate la flecainidă; în primele 3 luni după un IMA sau în cazul unui debit cardiac redus (fracție de ejeție a ventriculului stâng sub 35%), cu excepția pacienților cu aritmii ventriculare care pun viața în pericol; IC severă, decompensată; șoc cardiogen, cu excepția celui datorat aritmiilor; bradicardie severă; tulburări de conducere atriale; tulburări de conducere atrioventriculară și/sau intraventriculară la pacienți fără stimulator cardiac implantat; boala nodului sinusal (sindromul bradicardie-tahicardie), la pacienți fără stimulator cardiac implantat; tulburări electrolitice (de exemplu hipo- sau hiperpotasemii); hTA severă.

AI: ECG standard la intervale de 1 lună sau, la nevoie, examen ECG de efort; prudență după implantarea unui stimulator cardiac; IR, IH; monitorizarea concentrației plasmatice a flecainidei; interacțiuni medicamentoase cu antiaritmice din clasa I, sultopridă, digoxină, cimetidină, betablocante, amiodaronă, digitalice, verapamil, diltiazem, antidepresive triciclice, anestezice locale, cărbune activat, sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Tulburări cardiace (acutizări severe ale IC și șoc cardiogen), agravarea tulburărilor de conducere preexistente; bloc atrioventricular, bloc de ramură complet și permanent sau bloc interatrial; încetinirea conducerii; poate agrava tulburările de ritm preexistente sau poate provoca apariția unei noi tulburări de ritm; vertij, tulburări de vedere (diplopie, vedere încețoșată, diminuarea acuității vizuale), tremor, senzație de instabilitate, cefalee, stare de astenie, scăderea libidoului, greață, uscăciunea gurii, tulburări de gust, creșterea enzimelor hepatice cu sau fără icter, febră, artralгии, mialgii, urticarie; leucopenie, trombocitopenie, pneumonie interstițială.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COD ATC: J02AC01

EPOETINUM
 EPROSARTANUM
 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
 EPTIFIBATIDUM
 ERDOSTEINUM
 ERGOCALCIFEROLUM
 ERGOMETRINUM
 ERLOTINIBUM
 ERTAPENEMUM
 ERYTHROMYCINUM
 ESOMEPRAZOLUM
 ESTRADIOLUM
 ESTRAMUSTINUM
 ESTRIOLUM
 ETAMSYLATUM
 ETANERCEPTUM
 ETHAMBUTOLUM
 ETHOSUXIMIDUM
 ETILEFRINUM
 ETOFENAMATUM
 ETOMIDATUM
 ETOPOSIDUM
 ETORICOXIBUM
 EXAMETAZIMUM
 EXEMESTANUM
 EZETIMIBUM
 FAMCICLOVIRUM
 FAMOTIDINUM
 FELODIPINUM
 FENOFIBRATUM
 FENSPERIDUM
 FENTANYLUM
 FENTICONAZOLUM
 FERROCHOLINATUM
 FERROSII FUMARAS
 FERROSII GLUCONAS
 FERROSII SULFAS
 FERUCARBOTRANUM
 FEXOFENADINUM
 FILGRASTIMUM
 FINASTERIDUM
 FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM

DIFLAZON® KRKA; Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (**P-RF**)
DIFLAZON® 50 mg; DIFLAZON® 100 mg; DIFLAZON® 150 mg; DIFLAZON® 200 mg KRKA; Cps. 50 mg, 100 mg, 150 mg sau 200 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (50 mg, 200 mg); ct. × 4 blist. × 7 cps. (100 mg); ct. × 1 blist. × 1 cps. (150 mg) (**P-RF**)
DIFLUCAN® PFIZER; Cps. 50 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (50 mg), ct. × 1 blist. × 1 cps. (150 mg) (**P-RF**)
DIFLUCAN® PFIZER; Pulb. pt. susp. orală 50 mg/5 ml; ct. × 1 fl. pulb. pt. 35 ml susp. (**P-RF**)
DIFLUCAN® PFIZER; Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 25, 50, 100 sau 200 ml (**S**)
FLUCONAZOL 50 mg TERAPIA SA; Cps. 50 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (**P-RF**)
FLUCONAZOL ARENA GROUP SA; Cps. 50 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (50 mg); ct. × 1 blist. × 1 cps. (150 mg) (**P-RF**)
FLUCORIC RANBAXY LAB.; Cps. 50 mg, 100 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (50 mg, 100 mg); ct. × 1 blist. × 1 cps. (150 mg) (**P-RF**)
FLUCOSANDOZ® SANDOZ GmbH; Cpr. film. 50 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 7 cpr., respectiv ct. × 1 blist. × 1 cpr. (150 mg) (**P-RF**)
FLUCOVIM 50; FLUCOVIM 100; FLUCOVIM 150 VIM SPECTRUM SRL; Cps. 50 mg, 100 mg sau 150 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (50 mg), ct. × 1 blist. × 4 cps. (100 mg), ct. × 1 blist. × 1 cps. (150 mg) (**P-RF**)
MEDOFLUCON 50; MEDOFLUCON 150 MEDOCHEMIE; Cps. 50 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (50 mg), ct. × 1 blist. × 1 cps. (150 mg) (**P-RF**)
MYCOMAX® 50; MYCOMAX® 100; MYCOMAX® 150 ZENTIVA AS; Cps. 50 mg, 100 mg sau 150 mg; ct. × 1 sau 4 blist. × 7 cps. (50 mg), ct. × 1, 4 sau 10 blist. × 7 cps. (100 mg), ct. × 1 blist. × 1 sau 3 cps. (150 mg) (**P-RF**)
MYCOMAX® INF ZENTIVA AS; Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50, 100 sau 200 ml (**P-RF**)
MYCOSYST® 50 mg; MYCOSYST® 150 mg; GEDEON RICHTER Ltd.; Cps. 50 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 7 cps. (50 mg), ct. × 1 blist. × 1 cps. (150 mg) (**P-RF**)
SYSCAN 100 LAB. TORRENT Ltd.; Cps. 100 mg; ct. × 2 cps. (**P-RF**)

Ind: Trat. în criptococoză, incluzând meningita criptococică și infecții cu alte localizări (ex. pulmonare, cutanate); trat. de întreținere pentru a preveni recidiva infecției criptococice la pacienții cu SIDA. Candidoze sistemice, incluzând candidemia, candidozele diseminate și alte forme de infecții candidozice invazive. Candidoze ale mucoaselor. Candidoze genitale. Prevenirea infecțiilor fungice la pacienți cu neoplazii. Dermatomicoze incluzând tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, tinea unguium (onicomicoze) și infecții dermice candidozice. Micoze endemice profunde incluzând coccidiomicoze, paracoccidio-micoze, sporotricoze și histoplasmoze la pacienți cu imunitate normală.

Dz: *Adulți:* meningite criptococice și infecții criptococice cu alte localizări - 400 mg în prima zi urmată de 200-400 mg în priză unică zilnic; durata trat.: 6-8 săptăm., apoi profilactic 200 mg/zi. Pentru candidemie, candidoza disemnată și alte infecții candidozice invazive - 400 mg în prima zi, urmată de 200-400 mg zilnic. Pentru candidozele

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01BB05

EPROSARTANUM
EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM

FLUDARA SCHERING AG; Pulb. liof. pt. sol. inj./perf. 50 mg; ct. × 5 fl. (S)

FLUDARA® ORAL SCHERING AG; Cpr. film. 10 mg; ct. × 3 sau 4 blist. × 5 cpr. (P-RF)

Ind: Leucemie limfocitară cronică cu celule B, care nu a răspuns la trat. sau la care boala a progresat sub un trat. conținând cel puțin un agent alchilant standard.

Dz: Adm. i.v. 25 mg/ml, 5 zile consecutiv la fiecare 28 de zile. De obicei se vor adm. 6 cicluri.

Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului, sarcină, alăptare, IR severă.

Al: Monitorizare neurologică, hematopoietică și renală; interacțiuni medicamentoase cu pentostatin, dipiridamol.

RA: Fenomene de aplazie medulară, febră, frisoane, infecții; în unele cazuri oboseală, anorexie, greață, vomă, stare de slăbiciune.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EPTACOG ALFA ACTIVATUM
EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM

Cod ATC: H02AA02**ASTONIN-H** MERCK KGaA; Cpr. 0,1 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (*P-RF*)

Ind: hTA constituțională (esențială). Sindromul ortostatic. hTA ortostatică idiopatică. Tulburări circulatorii periferice. Boala Addison. Sindromul adrenogenital.

Dz: *Adulți:* în hTA esențială și sindromul ortostatic se începe cu 0,2-0,3 mg/zi; după ameliorarea simptomelor se adm. 0,1-0,2 mg/zi. În boala Addison: 0,1-0,2 mg/ zi. În sd. adrenogenital: hidroclortizon 15-30 mg/m, asociat cu fludrocortizon. *Copii:* în general 0,1 mg/zi.

Cind: HTA, edeme, ateroscleroză cerebrală avansată.

Al: Prudență în sarcină și alăptare.

RA: Edeme (retenție de sodiu), HTA, cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EPTIFIBATIDUM
ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM

Cod ATC: V03AB25

ANEXATE HOFFMANN LA ROCHE; Sol. inj. 0,1 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml (*P-RF*)

Ind: Combaterea efectelor sedative centrale ale benzodiazepinelor în anestezie și terapie intensivă (intoxicații cu benzodiazepine).

Dz: În anestezie doza inițială este de 0,2 mg, adm. i.v. în 15 secunde, apoi 0,1 mg repetat la nevoie, până la doza totală de 1 mg.

Cind: Hipersensibilitate la flumazenil.

A!: Prudență în sarcină.

RA: Rar, greață, vărsături; uneori, după adm. rapidă pot apărea: anxietate, palpitații.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ERDOSTEINUM
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM

[Cod ATC: D07AB03](#)

PIVALAT DE FLUMETAZON ANTIBIOTICE SA; Ung. 0,02%; ct. × 1 tub × 15 g (*P-RF*)

Ind: Afecțiuni cutanate inflamatorii care răspund la corticosteroizi, neinfectate: eczeme seboreice, eczeme de contact, dermatite, fotodermite, psoriazis vulgar, lichen plan, neuro-dermatite localizate, lupus eritematos discoid.

Dz: Unguentul/crema se aplică în strat subțire pe zona afectată a pielii, repetând aplicația de 2-4 ori/zi.

Cind: Infecții bacteriene și virale ale pielii (ex., varicelă, erupții postvaccinale, herpes simplex, herpes zoster), afecțiuni micotice ale pielii, sifilis, tuberculoză cutanată, acnee rosacee, dermatite periorale, acnee vulgară, aplicații perioculare, hipersensibilitate la oricare din componenți.

Al: Prudență în trat. îndelungat, în special pe pielea feței; copii; pansamente ocluzive; sarcină și alăptare.

RA: Rar la locul aplicării: iritație, senzație de arsură, prurit sau erupție; izolat atrofie moderată a pielii; alergie de contact, modificări ale pigmentației pielii sau infecții secundare; după trat. îndelungat pe zone întinse, sub pansamente ocluzive se pot agrava vergeturile, telangiectazia, purpura, acneea steroidiană.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05CD03

FLUNITRAZEPAM 1 mg; FLUNITRAZEPAM 2 mg; LABORMED PHARMA SA; Cpr. 1 mg sau 2 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; (*P-RF*) și ct. × 100 blist. × 10 cpr. (*S*)

ROHYPNOL® 1 mg *HOFFMANN LA ROCHE*; Cpr. film. 1 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Trat. de scurtă durată al insomniei, când tulburările sunt grave.

Dz: *Adulți:* 0,5-1 mg; în situații excepționale, doza poate fi mărită până la 2 mg. *Vârstnici:* 0,5 mg; în situații excepționale, doza poate fi mărită până la 1 mg. *IR:* reducerea dozelor în funcție de afectarea renală.

Cind: Miastenia gravis, hipersensibilitate la benzodiazepine, insuficiență respiratorie gravă, apnee, IH gravă, copii.

Al: Risc de dependență, doza va fi micșorată treptat; durata trat. nu va depăși 4 săptăm.; amnezie anterogradă; reacții paradoxale; prudență în insuficiență respiratorie; alcoolism sau narcomanie în antecedente; interacțiuni medicamentoase cu alcool etilic, relaxante ale SNC, antipsihotice, hipnotice, anxiolitice/sedative, antidepressive, analgezice opioide, antiepileptice, anestezice și sedative, antihistaminice, inhibitorii enzimatici; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Somnolență în timpul zilei, detașare, vigilență scăzută, stări confuzionale, oboseală, cefalee, amețelă, slăbiciune musculară, ataxie sau diplopie; ocazional: tulburări gastrointestinale, modificări ale libidoului sau reacții cutanate; amnezie anterogradă; reacții paradoxale: neliniște, agitație, iritabilitate, agresivitate și în cazuri mai grave: manie, furie, coșmaruri, halucinații, psihoze, tulburări comportamentale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ERGOMETRINUM
ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM

Cod ATC: D07AC04**FLUOCINOLON ACETONID** LAROPHARM SRL; Ung. 0,025%; ct. × 1 tub × 20 g (*P-RF*)

Ind: Afecțiuni inflamatorii, pruriginoase și alergice ale pielii: dermatite alergice (eczemă, intertrigo, prurigo, neurodermită, dermatită seboreică, lichen plan, prurit ano-genital), psoriazis, lupus eritematos cronic; cheloide și cicatrice hipertrofice.

Dz: Se aplică ușor o cantitate mică la nivelul zonei afectate de 2-3 ori/zi și se masează.

Cind: Leziuni cutanate tuberculoase, micoze ale pielii și în majoritatea virozelor; acnee rozacee și vulgară, dermatita periorală, rash produs de scutece; hipersensibilitate la componentele cremei sau ale unguentului.

Al: Prudență în infecție asociată cu o afecțiune cutanată inflamatorie; folosirea îndelungată sau trat. unor zone mari poate produce hipercorticism; nu trebuie aplicat la nivelul feței; copii sub un an; sarcină și alăptare.

RA: Iritare la locul aplicării, reacții de hipersensibilizare, striuri, subțierea tegumentului, telangiectazie sau atrofie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ERLOTINIBUM
ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM

[Cod ATC: D07AC05](#)

ULTRALAN SCHERING AG; Cremă, Ung. 0,25%; ct. × 1 tub × 15, 30 sau 50 g (*P-RF*)

Ind: Dermatoze inflamatorii, alergice și pruriginoase: eczeme, dermatite diverse, neurodermite, prurigo, psoriazis, lichen plan, lupus eritematos discoid netuberculos; prurit anal și vulvar.

Dz: Se aplică local, pe piele, la început de 2-3 ori/zi, apoi o dată/zi.

Cind: Tuberculoză cutanată, leziuni sifilitice, varicelă, vaccină, zona zoster, herpes simplex, dermatită periorală, rozacee, acnee, hipersensibilitate la componentele produsului.

Al: Prudență în aplicarea pe față timp îndelungat; sarcină și alăptare.

RA: Rareori iritație locală, prurit, hipertricoză, foliculite, erupții acneiforme, dermatită periorală; aplicarea prelungită poate provoca atrofia locală a pielii, telangiectazii, purpură, vergeturi; dozele mari, aplicate pe suprafețe mari, pot fi cauză de fenomene de hipercorticism; rareori suprainfecții cu germeni rezistenți.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01JA01

ERTAPENEMUM
ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCINUM NATRIUM

FLUORESCITE® INJECTION 10% ALCON; Sol. inj. 10%; ct. × 12 f. × 5 ml (S/P-RF)

Ind: Angiofluorografiile sau angioscopiile în scop diagnostic, ale fundului de ochi sau ale vascularizației irisului.

Dz: Se injectează conținutul fiolei rapid în vena antecubitală, după luarea măsurilor pentru evitarea extravazării. Luminiscenta apare în vasele retiniene și coroidiene în 9-14 secunde și poate fi observată cu echipamentul standard de vizualizare. *Copii: 7,7 mg/kg.*

Cind: Hipersensibilitate la fluorosceină.

Al: Test intradermic înaintea injectării; a se evita extravazarea; prudență în istoric de alergie sau astm bronșic; colorație gălbuie a pielii și urinii; sarcină și alăptare.

RA: Greață și cefalee, disconfort gastrointestinal, sincopă, vomă, hTA, simptome și semne de hipersensibilitate; rar: stop cardiac, ischemie de arteră bazilară, șoc sever, convulsii, tromboflebită la locul injectării; erupție urticariană și prurit generalizat, bronhospasm și reacții anafilactice exacerbare a simțului gustativ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ERYTHROMYCINUM
ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM

Cod ATC: S01BA07

FLUMETOL S FARMILA FARMACEUTICI; Sol. oft. 0,1%; Ung. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml, respectiv ct. × 1 tub × 5 g (*P-RF*)

Ind: Afecțiuni inflamatorii ale segmentului anterior al ochiului precum și ale anexelor ochiului, conjunctivite, blefaroconjunctivite, keratite și keratoconjunctivite, episclerite și sclerite, dacriocistite, reacții postoperatorii.

Dz: Se instilează 1-2 picături colir în sacul conjunctival de 2-4 ori pe zi. Unguentul se aplică în sacul conjunctival de 1-2 ori pe zi.

Cind: Hipertensiune intraoculară; herpes simplu acut și cea mai mare parte a bolilor virale ale corneei în faza acută ulcerativă, exceptând asocierea cu chimioterapice antivirale; conjunctivite cu keratite ulcerative, încă din faza inițială (test la fluoresceină pozitiv). În cheratitele herpetice virale nu se recomandă utilizarea produsului. Tuberculoza oculară. Micoza oculară. Oftalmii purulente acute, conjunctivite purulente și blefarite purulente și herpetice care ar putea fi mascate sau agravate de corticosteroizi. Orjelet. Hipersensibilitate la unul dintre componentii produsului.

Al: În timpul tratamentelor prelungite se recomandă controlul frecvent al tensiunii intraoculare. Utilizarea prelungită ar putea produce glaucom, leziuni de nerv optic, deficite de acuitate și de câmp optic, formarea cataractei subcapsulare sau pot contribui la stabilizarea infecțiilor oculare secundare cu patogeni eliberați de țesutul ocular.

RA: Ocazional pot apărea senzații de arsură locală, iritații, fenomene de hipersensibilitate individuală la unul din componentele produsului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01BC02

ESOMEPRAZOLUM
ESTRADIOLUM
ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM

5-FLUOROURACIL „EBEWE” 250 mg; 5-FLUOROURACIL „EBEWE” 500 mg; 5-FLUOROURACIL „EBEWE” 1000 mg; 5-FLUOROURACIL „EBEWE” 5000 mg EBEWE PHARMA; Conc. pt. sol. perf. 50 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5, 10, 20 sau 100 ml (S)

EFUDIX ICN HUNGARY CO Ltd.; Ung. 5%; ct. × 1 tub × 20 g (S/P-RF)

FLUOROSINDAN® 250 mg/5 ml SINDAN SRL; Sol. inj./perf. i.v. 50 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (S)

Ind: Trat. paleativ al tumorilor maligne, în special de rect, colon și sân, dar și gastrice, pancreatice, hepatice (tumori primare), uterine (în special de cervix), ovariene și de vezică urinară. Local: tulburări de keratinizare, epitelioame bazo-celulare, boala Bowen.

Dz: Maxim 1 g/zi. Trat. inițial: perfuzare: 15 mg/kg sau 600 mg/m² și zi în 4 ore. Injectare: 12 mg/kg sau 480 mg/m² și zi, 3 zile consecutiv. Trat. de întreținere: injectare: 5-10 mg/kg sau 200-400 mg/m² i.v., o dată/săpt. Trat. asociat cu alte citostatice: dozele recomandate trebuie reduse corespunzător. Local: 1-2 ori pe zi, în strat subțire. Suprafața tratată nu trebuie să depășească 500 cm². Dacă suprafața e mai mare, se tratează pe rând zonele afectate.

Cind: Posibile infecții grave cu depresie a măduvei osoase, cu afectare gravă a funcției hepatice, cu status hematologic grav afectat, hipersensibilizare la fluorouracil.

Al: Prudență la pacienții cu risc, status nutrițional inadecvat, IR, IH, afectarea funcției măduvei hematogene, istoric de iradiere pelvică crescută sau folosire anterioară de agenți alchilanți, după intervenții chirurgicale majore; supraveghere atentă, numărătoarea leucocitelor cu formula leucocitară; sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară; interacțiuni cu calciu leucovorin; copii, sarcină și alăptare. Expunerea la soare după tratamentul local.

RA: Stomatită și esofagofaringită, diaree, anorexie, greață și vomă; leucopenie; alopecie și dermatită; pancitopenie, trombocitopenie, agranulocitoză, anemie; ischemie miocardică; reacții alergice; sindrom acut cerebelos, nistagmus, cefalee; piele uscată; fisuri; fotosensibilitate, pigmentare venoasă, sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară, manifestată ca parestezii ale mâinii și piciorului, urmate de durere, eritem și umflături; stenoză duct lacrimal, modificări vizuale, lăcrimare și fotofobie; dezorientare, confuzie, euforie; afectare hepatică; tromboflebită, epistaxis, modificări ale unghiilor (inclusiv pierderea lor).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06AB03

ESTRADIOLUM
 ESTRAMUSTINUM
 ESTRIOLUM
 ETAMSYLATUM
 ETANERCEPTUM
 ETHAMBUTOLUM
 ETHOSUXIMIDUM
 ETILEFRINUM
 ETOFENAMATUM
 ETOMIDATUM
 ETOPOSIDUM
 ETORICOXIBUM
 EXAMETAZIMUM
 EXEMESTANUM
 EZETIMIBUM
 FAMCICLOVIRUM
 FAMOTIDINUM
 FELODIPINUM
 FENOFIBRATUM
 FENSPIDUM
 FENTANYLUM
 FENTICONAZOLUM
 FERROCHOLINATUM
 FERROSII FUMARAS
 FERROSII GLUCONAS
 FERROSII SULFAS
 FERUCARBOTRANUM
 FEXOFENADINUM
 FILGRASTIMUM
 FINASTERIDUM
 FLECAINIDUM
 FLUCONAZOLUM
 FLUDARABINUM
 FLUDROCORTISONUM
 FLUMAZENILUM
 FLUMETASONUM
 FLUNITRAZEPAMUM
 FLUOCINOLONI ACETONIDUM
 FLUOCORTOLONUM
 FLUORESCEINUM NATRIUM
 FLUOROMETHOLONUM
 FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM

ANXETIN DAR AL DAWA; Cps. 20 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
FLOXET[®] 10 mg EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cps. 10 mg; ct. × 1 blist. × 14 cps. (P-RF)
FLUOCIM SIEGFRIED CMS; Cps. 20 mg; ct. × 1 blist. × 14 cps; ct. × 3 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
FLUOHEXAL[®] 20 HEXAL AG; Cps. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-RF)
FLUOXETIN LPH[®] 20 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
FLUOXETINĂ 20 mg TERAPIA SA; Cpr. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
FLUOXIN VIM SPECTRUM SRL; Cps. 20 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. (P-RF)
FLURAN RANBAXY LAB.; Cps. 20 mg; ct. × 2 blist. × 15 cps. (P-RF)
FLUVAL[®] 20 mg KRKA; Cps. 20 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cps. (P-RF)
MAGRILAN MEDOCHEMIE Ltd.; Cps. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-RF)
PORTAL LEK PHARMACEUTICALS; Cps. 20 mg; ct. × 2 blist. × 7 sau 14 cps. (P-RF)
PROZAC[®] ELI LILLY; Cps. 20 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cps. (P-RF)
PROZAC[®] ELI LILLY; Cpr. dispersabile 20 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cps. (P-RF)

Ind: Depresie: ca trat. simptomatic al bolii depresive, însoțită sau nu de anxietate, în special atunci când nu este necesară sedarea. Tulburări obsesiv-compulsive. Bulimie nervoasă. Tulburare disforică premenstruală (TDPM).

Dz: Depresie, însoțită sau nu de anxietate: 20 mg/zi. Tulburare obsesiv-compulsivă: 20-60 mg/zi. Bulimie nervoasă: 60 mg/zi. TDPM: 20 mg/zi. Trat. se adm. 6 luni, după care se evaluează necesitatea continuării terapiei. Toate indicațiile: Doza recomandată poate să fie crescută sau scăzută. Dozele mai mari de 80 mg/zi nu au fost evaluate sistematic.

Cind: Hipersensibilitate la fluoxetină.

Al: Prudență la copii; reacții alergice; convulsii în antecedente; antecedente de manie sau hipomanie; afectare hepatică; boli cardiace acute; diabet; tentative de suicid; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, carbamazepină, haloperidol, clozapină, diazepam, alprazolam, litiu, fenitoină și antidepresive triciclice (de exemplu imipramina și desipramina), tramadol, sumatriptan, litiu, triptofan, flecainidă, encainidă, vinblastină, anticoagulante și antiagregante, alcool etilic și preparatele medicinale de sunătoare; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie

RA: Reacții de hipersensibilitate, frisoane, sindrom serotoninic, fotosensibilitate; diaree, greață, vărsături, dispepsie, disfagie, modificarea gustului, uscăciunea gurii; rareori teste anormale ale funcției hepatice; foarte rar cazuri de hepatită idiosincrazică; cefalee, tulburări de somn, amețală, anorexie, oboseală, euforie, fasciculații musculare, ataxie, tremor, mioclonie, convulsii și neliniște psihomotorie, halucinații, reacție maniacoală, confuzie, agitație, anxietate și simptome asociate (nervozitate), tulburări de concentrare și de gândire (depersonalizare), atacuri de panică; retenție urinară, micțiuni frecvente; ejaculare întârziată sau absentă, lipsa orgasmului, priapism, oalactoree; alopecie. căscat. tulburări de vedere. echimoze. transpirații. vasodilatație. artralgii. mialgii. hTA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ESTRAMUSTINUM
ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM

Cod ATC: N05AF01**FLUANXOL DEPOT** H. LUNDBECK A/S; Sol. inj. flupentixol decanoat 20 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (*P-RF*)

Ind: Schizofrenie subacută și cronică (fără tulburări majore în sfera psihomotorie), stări paranoid-halucinatorii cronice, psiho-sindroame organice de tipul halucinozei etilice și psihozelor de involuție; pentru profilaxie în psihoza maniaco-depresivă.

Dz: I.m. 20-60 mg la fiecare 2-4 săptăm.

Cind: Intoxicație acută cu deprimante centrale, stări de agitație marcată, sarcină, alergie la flupentixol.

Al: Prudență la bătrâni; IC; interacțiuni medicamentoase cu deprimante centrale, antihipertensive, alcool și levodopa; alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Diminuarea performanțelor psihomotorii, tulburări de somn (mai ales insomnie), uscăciunea gurii, tulburări de vedere, disurie (uneori, la începutul trat.), constipație, relativ frecvent hTA ortostatică; manifestări de tip extrapiramidal (la doze mari).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ESTRIOLUM
ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM

COD ATC: R07AXN1**STREPSILS® INTENSIVE** BOOTS HEALTHCARE INT.; Cpr. de supt 8,75 mg; ct. × 2 blist. × 8 cpr. (P-6L)**Ind:** Tratamentul simptomatic al durerilor faringiene.**Dz:** *Adulți și copii peste 12 ani:* un comprimat de supt la 3-6 ore, în funcție de gravitatea simptomelor; doza maximă este de 5 comprimate în 24 de ore. Este recomandat ca acest produs să se folosească pentru o perioadă de maximum 3 zile. *Copii:* nu este indicat copiilor sub 12 ani. *Vârstnici:* nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de vârstă. Ca și în cazul altor comprimate de supt, pentru a se evita apariția iritațiilor locale se va schimba în permanență poziția comprimatului la nivelul cavității bucale.**Cind:** Hipersensibilitate la flurbiprofen, acid acetilsalicilic, alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sau la oricare dintre excipienți. Ulcer gastric activ sau în antecedente. Antecedente de bronhospasm, rinită sau urticarie asociate cu administrarea acidului acetilsalicilic sau a altor AINS.**Al:** Bronhospasmul poate fi agravat la pacienții cu astm bronșic prezent sau în antecedente. Va fi folosit cu precauție la pacienții cu teren atopic. Prudență la pacienții cu afecțiuni renale, cardiace sau hepatice, antecedente de afecțiuni gastrice.

Flurbiprofen poate prelungi timpul de sângerare; se recomandă prudență la pacienții cu risc de hemoragii, în special la nivelul tubului digestiv.

Se recomandă evitarea administrării în timpul sarcinii și alăptării.

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje: Poate produce vertij.**RA:** Dispepsie, greață, vărsături, hemoragii gastro-intestinale, diaree, ulceratii ale mucoasei bucale, exacerbarea ulcerului gastric și perforație gastrică. Flurbiprofenul poate produce iritații tranzitorii ale mucoasei bucale cu tulburarea gustului. Reacții de hipersensibilitate: urticarie, angioedem, crize de astm, reacții anafilactice și erupții cutanate de diferite tipuri. Rar pot să apară reacții nervos centrale: vertij, cefalee. Foarte rar poate să apară afectare renală cu retenție hidrică și edeme, icter și trombocitopenie. Aceste efecte sunt, de obicei, reversibile la oprirea tratamentului. Foarte rar s-a raportat anemie aplastică și agranulocitoză asociate cu administrarea flurbiprofenului, fără a se stabili o relație de cauzalitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L02BB01

ETAMSYLATUM
ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM

ELBAT GENEPHARM SA; Cpr. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

FLUCINOM® SCHERING PLOUGH EUROPE; Cpr. 250 mg; ct. × 10 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

FLUTASIN® 250 mg SINDAN SRL/ROTTENDORF; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 30 sau 90 cpr. (S/P-RF)

FLUTAN MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 250 mg; ct. × 10 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Trat. cancerului prostatic avansat la pacienții netratați anterior sau la cei care nu au răspuns sau au devenit rezistenți la trat. hormonal; carcinom prostatic B2-C2 (T2b-T4).

Dz: Oral 250 mg de 3 ori/zi, la interval de 8 ore.

Cind: Hipersensibilitate la flutamidă sau la oricare dintre excipienți.

Al: Prudență în afectare hepatică; testarea periodică a funcțiilor hepatice; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante; sarcină și alăptare.

RA: Ginecomastie și/sau dureri ale sânilor, uneori însoțite de galactoree; diaree, greață, vărsături, apetit crescut, insomnie, oboseală, afectarea tranzitorie a funcțiilor hepatice și hepatită; rare: scăderea libidoului, tulburări gastrice, anorexie, dureri similare celor din ulcerul gastroduodenal, precordialgii, constipație, edeme, echimoze, herpes zoster, prurit, sindrom lupus-like, cefalee, vertij, slăbiciune, indispoziție, vedere încetșată, sete, dureri toracale, anxietate, depresie, limfedem; reducere a numărului de spermatozoizi; au fost raportate: anemie hemolitică, anemie macrocitară, methemoglobinemie, sulfhemoglobinemie, reacții de fotosensibilitate - care includ eritem, ulceratii, erupții buloase și necroliză epidermală și modificarea culorii urinei în galben-portocaliu sau galben-verde, icter colestatic, encefalopatie hepatică și necroză hepatică; valori anormale ale testelor de laborator au inclus modificări ale funcțiilor hepatice, creșterea valorii ureei sanguine (BUN) și rar a creatininei serice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ETANERCEPTUM
ETHAMBUTOLUM
ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM

Cod ATC: D07AC17, R01AD08, R03BA05**CUTIVATE** GLAXO SMITHKLINE; Ung. 0,005%; Cremă 0,05%; ct. × 1 tub × 15 g (**P-RF**)**FLIXONASE™** GLAXO SMITHKLINE; Susp. nazală 50 µg/doză; ct. × 1 fl. × 120 doze (**P-RF**)**FLIXOTIDE® 50 INHALER CFC-FREE; FLIXOTIDE® 125 INHALER CFC-FREE** GLAXO SMITHKLINE; Susp. inhal. presurizată 50 µg/doză, 125 µg/doză; ct. × 1 fl. × 120 doze, respectiv ct. × 1 fl. × 60 doze (**P-6L**)**FLIXOTIDE® NEBULES 0,5 mg/2 ml; FLIXOTIDE® NEBULES 2 mg/ 2 ml** GLAXO SMITHKLINE; Susp. inhal. 0,5 mg/2 ml, 2 mg/2 ml; ct. × 10 fl. × 2 ml (**P-RF**)

Ind: Cremă și ung.: trat. manifestărilor inflamatorii și pruriginoase ale dermatozelor sensibile la corticosteroizi: eczeme inclusiv eczema atopică, infantilă și discoidă (numulară); prurigo nodular; psoriazis (exclusiv psoriazis eritrodermic); neurodermatoze inclusiv lichenul simplu; lichenul plan; dermatite seboreice; dermatite de contact; lupus eritematos discoid; adjuvant al trat. sistemic cu steroizi în eritrodermia generalizată; reacții după înțepături de insecte. *Spray nazal:* profilaxia și trat. rinitelor alergice sezoniere, inclusiv febra fânului și al rinitelor perene. *Aerosol:* trat. profilactic în astmul ușor, moderat, sever.

Dz: Cremă și ung.: se va aplica pe zona afectată un strat subțire de 2 ori/zi. *Spray nazal: adulți și copii peste 12 ani:* 2 pulverizări în fiecare nară o dată/zi, preferabil dimineața, maxim 4 pulverizări în fiecare nară/zi; *copii 4-12 ani:* o pulverizare în fiecare nară. *Aerosol: adulți și copii peste 16 ani:* 100 până la 1000 µg de 2 ori/zi; *copii peste 4 ani:* 50-100 µg de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la oricare din componentele produselor; Cremă și ung.: acnee rozacee; acnee vulgară; dermatite periorale; infecții virale cutanate primare; prurit perianal și genital.

Al: Prudență în sarcină și alăptare. Cremă și ung.: infecțiile leziunilor cutanate primare; copii sub 1 an; aplicarea de lungă durată, în doze mari și pe o suprafață corporală mare; aplicarea pe față; evitarea contactului cu ochii. *Spray nazal:* expunerea intensă la alergenii poate necesita un trat. adițional. *Aerosol:* monitorizare; tehnica de inhalare; tuberculoză activă sau reziduală.

RA: Cremă și ung.: arsuri locale și prurit; tulburări trofice cutanate ca: subțieri, striatii, dilatarea vaselor superficiale, hipertricoză și hipopigmentare; infecții secundare; hipercorticism după doze mari sau trat. pe suprafețe cutanate întinse. *Spray nazal:* uscăciunea și iritarea mucoasei nazale, gust și miros neplăcut, epistaxisuri. *Aerosol:* Candidoza bucală și laringiană, disfonie, bronhospasm paradoxal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ETHAMBUTOLUM
 ETHOSUXIMIDUM
 ETILEFRINUM
 ETOFENAMATUM
 ETOMIDATUM
 ETOPOSIDUM
 ETORICOXIBUM
 EXAMETAZIMUM
 EXEMESTANUM
 EZETIMIBUM
 FAMCICLOVIRUM
 FAMOTIDINUM
 FELODIPINUM
 FENOFIBRATUM
 FENSPIDUM
 FENTANYLUM
 FENTICONAZOLUM
 FERROCHOLINATUM
 FERROSII FUMARAS
 FERROSII GLUCONAS
 FERROSII SULFAS
 FERUCARBOTRANUM
 FEXOFENADINUM
 FILGRASTIMUM
 FINASTERIDUM
 FLECAINIDUM
 FLUCONAZOLUM
 FLUDARABINUM
 FLUDROCORTISONUM
 FLUMAZENILUM
 FLUMETASONUM
 FLUNITRAZEPAMUM
 FLUOCINOLONI ACETONIDUM
 FLUCORTOLONUM
 FLUORESCINUM NATRIUM
 FLUOROMETHOLONUM
 FLUOROURACILUM
 FLUOXETINUM
 FLUPENTIXOLUM
 FLURBIPROFENUM
 FLUTAMIDUM
 FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM

Cod ATC: D01AC16**MICETAL® CREMĂ** J. URIACH & CIA SA; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 30 g (P-RF)**MICETAL® GEL** J. URIACH & CIA SA; Gel 1%; ct. × 1 fl. × 100 g (P-RF)**MICETAL®** J. URIACH & CIA SA; Spray cutanat 1%; ct. × 1 fl. × 30 ml (P-RF)**Ind:** Gelul este indicat pentru tratamentul topic al Pityriasis capitis (mătreață) și al dermatitei seboreice.

Crema este indicată pentru tratamentul următoarelor afecțiuni: micoze cutanate superficiale cum sunt Tinea pedis (picior de atlet), Tinea cruris, Tinea corporis, Tinea faciei și barbae și Tinea inguinalis provocate de specii de Trichophyton (de ex. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans), specii de Microsporum (de ex. M. canis, M. gypseum) sau de Epidermophyton floccosum; candidoze cutanate, provocate de levuri din genul Candida (de ex. C. albicans, C. parapsilosis, C. guilliermondii, C. tropicalis); Pitiriasis versicolor provocat de Malassezia furfur (Pityrosporum ovale).

Soluția de uz cutanat este indicată pentru tratamentul următoarelor afecțiuni: micoze cutanate superficiale cum sunt Tinea pedis (picior de atlet), Tinea cruris, Tinea corporis, Tinea faciei și barbae și Tinea inguinalis provocate de specii de Trichophyton (de ex. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans), specii de Microsporum (de ex. M. canis, M. gypseum) sau de Epidermophyton floccosum; candidoze cutanate, provocate de levuri din genul Candida (de ex. C. albicans, C. parapsilosis, C. guilliermondii, C. tropicalis); Pitiriasis versicolor provocat de Malassezia furfur (Pityrosporum ovale).

Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* Gelul se aplică de 3 ori pe săptămână, timp de 4 săptămâni. Pe scalp și zona adiacentă se aplică o cantitate suficientă de gel, masând sau fricționând ușor. După 3-5 minute se îndepărtează prin spălare cu apă din abundență. Dacă după 4 săptămâni de tratament situația clinică nu se îmbunătățește, diagnosticul trebuie reevaluat.

Crema. La adulți se aplică local o dată pe zi, preferabil seara. O cantitate mică de cremă se aplică pe zona afectată și cea înconjurătoare. Durata tratamentului depinde de natura și localizarea infecției și de microorganismul implicat. Pentru prevenirea recidivelor se recomandă ca tratamentul să dureze 4 săptămâni pentru Tinea pedis și micoza interdigitală; 2-3 săptămâni pentru Tinea corporis; 1-2 săptămâni pentru Pitiriasis versicolor; 2-4 săptămâni pentru candidozele cutanate. Ameliorarea simptomatologiei clinice și calmarea pruritului apar din primele zile de tratament. Dacă după 4 săptămâni de tratament situația clinică nu se îmbunătățește, diagnosticul trebuie reevaluat. Pentru evitarea unei noi contaminări sau a reinfecției pacienții trebuie sfătuiți să respecte măsurile de igienă uzuală. *Copii:* Crema nu se folosește la copiii sub 10 ani.

Soluție de uz cutanat. La adulți și copii peste 10 ani soluția se aplică local o dată pe zi, preferabil seara. Se va aplica o cantitate suficientă pentru a acoperi întreaga zonă afectată și cea adiacentă la pacienții cu dermatofitie sau candidoză cutanată și pe întreaga suprafață a trunchiului la pacienții cu Pitiriasis versicolor. Durata tratamentului

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ETHOSUXIMIDUM
ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM

Cod ATC: C10AA04

LESCOL® 20 mg; LESCOL® 40 mg NOVARTIS PHARMA; Cps. 20 mg, 40 mg; ct. × 4 blist. × 7 cps. (P-6L)

LESCOL® XL NOVARTIS PHARMA; Cpr. elib. prel. 80 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (P-6L)

Ind: Hipercolesterolemia primară la pacienții care nu răspund în mod adecvat la regimul alimentar controlat.

Dz: Doza recomandată este de 20-40 mg o dată/zi, seara.

Cind: Hipersensibilitate la fluvastatin; boală hepatică activă sau cu creșteri persistente și neexplicate ale transaminazelor; copii; sarcină și alăptare; femeile fertile care nu adoptă precauții contraceptive adecvate.

Al: Dozări periodice ale lipidelor; teste funcționale hepatice înainte de începerea trat. și periodic în cursul acestuia; prudență în antecedente de hepato- patie sau alcoolism; mialgii difuze inexplicabile, sensibilitate sau slăbiciune musculară și cu creștere marcată a CPK de peste 10 ori limita superioară a normalului; afecțiuni acută sau severă care predispune la apariția IR secundare rabdomiolizei; IR; interacțiuni medicamentoase cu colestiramină, imunosupresoare, gemfibrozil, acid nicotinic, eritromicină.

RA: Dispepsie, greață, insomnie, sinuzită, flatulență, dureri abdominale, hipoestezie, afecțiuni dentare și infecții ale tractului urinar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ETILEFRINUM
ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM

Cod ATC: N06AB08

FEVARIN® 50; FEVARIN® 100 SOLVAY PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 50 mg sau 100 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. tulburărilor depresive.

Dz: Doza inițială este de 50-100 mg, într-o singură priză, seara. Doza zilnică: 100-200 mg; doza maximă 300 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la fluvoxamină.

Al: Prudență în IH, copii, epileptici; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, warfarină, fenitoină, teofilină, carbamazepină, antidepressive triciclice, litiu; sarcină și alăptare.

RA: Vedere încețoșată și uscăciunea gurii; greață, vărsături.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ETOFENAMATUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA

Cod ATC: G03GA05

GONAL[®]-f 75 UI; GONAL[®]-f 150 UI SERONO EUROPE Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. hormon uman foliculostimulant recombinant (FSH), 75 UI/fiolă, 150 UI/fiolă; ct. × 1, 3, 5 sau 10 fl. pulb. + 1, 3, 5 sau 10 f. cu solv. (P-RF)

GONAL[®]-f 450 UI/0,75 ml; GONAL[®]-f 1050 UI/1,75 ml SERONO EUROPE Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. hormon uman foliculostimulant recombinant (FSH), 600 UI/ml; ct. × 1 fl. pulb. + 1 seringă preumplută × 1, resp. 2 ml solv. + 6, resp. 15 seringi pt. adm.; ct. × 1 stilou injector (pen) preumplut × 0,75 ml solv. + 7 ace pt. adm. s.c. (450 UI) (P-RF)

Ind: Anovulație, stimularea dezvoltării multifoliculare. Bărbați cu hipogonadism hipogonadotrofic.

Dz: Inj. s.c. 75-150 UI FSH zilnic, crescând preferabil cu 37,5 UI sau 75 UI la intervale de 7 zile, sau mai bine de 14 zile dacă este necesar, pentru a obține un răspuns adecvat. După obținerea răspunsului optim, se adm. o injecție unică de 5000-10000 UI hCG la 24-48 ore de la ultima injecție de GONAL-F. Se recomandă ca pacienta să aibă contact sexual în ziua respectivă și în cea care urmează adm. hCG. Bărbați cu hipogonadism hipogonadotrofic: 150 UI de 3 ori/săpt.

Cind: Hipersensibilitate la FSH, sarcină și alăptare, mărirea dimensiunilor ovarelor sau chisturi în afara ovarului polichistic, hemoragii genitale de etiologie necunoscută, carcinom ovarian, uterin sau mamar, tumori ale hipotalamusului și glandei hipofize.

Al: Trebuie evaluată infertilitatea cuplului, risc crescut de hiperstimulare, sindromul de hiperstimulare ovariană, monitorizarea atentă a răspunsului ovarian, riscul sarcinilor multiple.

RA: Reacții locale la locul injectării, durere în regiunea inferioară a abdomenului, posibil în asocieri cu grețuri, vomă și creștere în greutate, tromboembolia arterială, ginecomastie, acnee și creșterea în greutate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03GA06

ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA

PUREGON 50 ui N. V. ORGANON; Sol. inj. 50 ui/0,5 ml; ct. × 1, 5 sau 10 fl. × 0,5 ml **(P-RF)**
PUREGON 100 ui N. V. ORGANON; Sol. inj. 100 ui/0,5 ml; ct. × 1, 5 sau 10 fl. × 0,5 ml **(P-RF)**
PUREGON 150 ui N. V. ORGANON; Sol. inj. 150 ui/0,5 ml; ct. × 1, 5 sau 10 fl. × 0,5 ml **(P-RF)**

Ind: Trat. infertilității la femei în anovulație și hiperstimularea ovariană controlată.

Dz: Anovulație: trat secvențial cu adm. 50 UI/zi până când creșterea foliculară și/sau concentrațiile plasmatice de estradiol indică un răspuns farmacodinamic adecvat. Hiperstimularea ovariană controlată doză inițială de 100-225 UI cel puțin în primele 4 zile, în general 75-375 UI pentru 6-12 zile. După aceea, doza trebuie ajustată individual, în funcție de răspunsul ovarian.

Cind: Tumori ale ovarului, sânului, uterului, hipofizei sau hipotalamusului, sarcină și alăptare, hemoragii vaginale de etiologie nedagnosticată; hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; insuficiență ovariană primară; chisturi ovariene sau ovare mărite, fără legătură cu boala ovarelor; malformații ale organelor sexuale sau fibroame uterine, incompatibile cu sarcina.

Al: Trebuie exclusă prezența endocrinopatiilor non-gonadale necontrolate, risc crescut de sarcini multiple și sarcini ectopice; evaluarea ultrasonografică a dezvoltării foliculare și determinarea nivelelor de estradiol trebuie efectuată înainte de trat. și la intervale regulate în timpul trat.; prudență în factor de risc pentru tromboză; interacțiuni medicamentoase cu clomifen și agoniști GnRH.

RA: Hiperstimulare ovariană nedorită, reacții la locul injectării, tromboembolii arteriale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ETOPOSIDUM
ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM

Cod ATC: R03AC13

OXIS TURBUHALER 4,5 µg/doză; OXIS TURBUHALER 9 mg/doză ASTRAZENECA; Pulb. inhal. 4,5 mg/ doză sau 9 mg/doză; ct. × 1 fl. × 60 doze (**P-6L**)

Ind: Trat. şi profilaxia crizelor de bronhospasm.

Dz: *Adulţi şi vârstnici:* 4,5-9 g o dată sau de 2 ori/zi, maxim 18 g o dată sau de 2 ori/zi. *Copii peste 6 ani:* 4,5-9 g o dată sau de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la formoterol.

Al: În cazul unei crize, se va adm. un beta 2-agonist cu durata scurtă de acţiune; prudenţă în tireotoxicoză; tulburări cardiovasculare severe (boala ischemică, tahiaritmii sau IC severă); interval QTc prelungit; diabet; hipokaliemie severă; IR, IH; interacţiuni medicamentoase cu betablocante, chinidină, disopiramid, procainamidă, fenotiazine, antihistaminice (terfenadina), IMAO, antidepresive triciclice, L-Dopa, L-tiroxina, oxitocina şi alcoolul etilic; sarcină şi alăptare.

RA: Uzuale: cefalee, palpitaţii, tremor; rare: agitaţie, stare de nelinişte, tulburări de somn, crampe musculare, tahicardie, exantem, urticarie, prurit, bronhospasm, hipopotasemie; în cazuri izolate: greţuri, tulburări gustative, ameţeală, angină pectorală, oscilaţii ale tensiunii arteriale şi hiperglicemie. În timpul trat. cu beta2-simpatomimetice pot apărea creşteri ale nivelului sanguin de insulină, acizi graşi liberi, glicerol sau corpi cetonici.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AE07

ETORICOXIBUM
EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM

TELZIR GLAXO GROUP Ltd.; Cpr. film. 700 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (S/P-RF)

TELZIR GLAXO GROUP Ltd.; Sol. orală 50 mg/ml; ct. × 1 fl. × 225 ml (S/P-RF)

Ind: Telzir în asociere cu o doză mică de ritonavir este indicat în tratamentul adulților infectați cu Virusul Imunodeficienței Umane de tipul 1 (HIV-1) în asociere cu alte produse medicamentoase antiretrovirale.

Dz: Adulți (18 ani sau mai mult): 700 mg, administrat de două ori pe zi, împreună cu 100 mg ritonavir, de două ori pe zi

Cind: Hipersensibilitate, insuficiență hepatică severă. Telzir nu trebuie administrat concomitent cu produse medicamentoase care au indice terapeutic îngust care sunt substraturi pentru citocromul P450 3A4 (CYP3A4), cum ar fi amiodarona, dihidroergotamina, pimozida, chinidina.

Al: Pacienții trebuie avertizați că Telzir sau oricare alt tratament antiretroviral uzual nu vindecă infecția HIV și că pot dezvolta infecții oportuniste și alte complicații ale infecției HIV. Nu s-a dovedit că tratamentul antiretroviral uzual, incluzând Telzir, înlătură riscul transmiterii HIV prin contact sexual sau contaminare cu sânge. Trebuie continuate măsurile de precauție adecvate. Interacțiuni numeroase cu alte medicamente.

RA: Frecvente: cefalee, amețeală, diaree, greață, vărsături, dureri abdominale, erupții cutanate, fatigabilitate, creșteri ale transaminazelor hepatice, a trigliceridelor și a lipazei plasmatice, lipodistrofie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EXAMETAZIMUM
EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM

Cod ATC: C01EB06

NEOTON-1g PHLEBO CSC PHARMACEUTICALS/ALFA WASSERMANN S.p.A; Pulb. pt. sol. inj. 1 g, ct. × 1 fl. pulb. + 1 fl. solv. × 50 ml (S)

Ind: Cardioprotector în chirurgia cardiacă, fiind adăugat în soluția cardioplegică.

Dereglarea metabolică a miocardului în cazul ischemiei.

Dz: 1 flacon, 1 dată sau de două ori pe zi în funcție de indicațiile medicului, administrat în perfuzie i.v. timp de 35-45 minute.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de componentele medicamentului și în insuficiența renală cronică, când sunt utilizate doze mari (5-10 g/zi).

Al: Doze în exces de 1 g creatin fosfat, administrate i.v. rapid, pot conduce la scăderea presiunii sângelui. Administrarea de doze mari (5-10 g/zi) duce la creșterea cantității de fosfat introdusă, cu posibile influențe asupra metabolismului calciului și secreției hormonale ce reglează homeostaza calciului, funcția renală și metabolismul purinelor. Asemenea doze mari trebuie să fie administrate pacienților selectați cu grijă și pe perioade scurte.

RA: Nu se cunosc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

EXEMESTANUM
EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM

Cod ATC: J01XX01

MONURAL® PEDIATRIC 2 g; MONURAL® 3 g ZAMBON GROUP S.p.A.; Gran. pt. susp. orală 2 g/plic, 3 g/plic; ct. × 2 plicuri, respectiv ct. × 1 plic (*P-RF*)

Ind: Trat. infecțiilor acute necomplicate ale tractului urinar inferior determinate de germeni sensibili la fosfomicină, precum și profilaxia de scurtă durată (una sau două doze) a infecțiilor acute necomplicate ale tractului urinar inferior.

Dz: Oral, de preferat pe stomacul gol, înainte de a merge la culcare și după golirea vezicii urinare. *Adulți:* 3 g de fosfomicină, o singură dată (la nevoie, de 2 ori).

Cind: Hipersensibilitate la fosfomicină; IR severă.

Al: Prudență în sarcină și alăptare.

RA: Ocazional tulburări gastrointestinale (greață, diaree, pirozis); rar rash cutanat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C09AA09

EZETIMIBUM
FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCYNUM
FOSINOPRILUM

FOSIRAN 10 mg; FOSIRAN 20 mg RANBAXY; Cpr. 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FOSYPRIL 10 mg; FOSYPRIL 20 mg TERAPIA SA; Cpr. 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
MONOPRIL BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. HTA.

Dz: Doza inițială este de 10 mg. Doza de întreținere este de 10-40 mg.

Cind: Hipersensibilitate la fosinopril; antecedente de angioedem față de orice alt IEC; sarcină și alăptare.

Al: Terapia trebuie întreruptă imediat dacă apare angioedem; prudență în afecțiuni cardiace congestive, HTA renovasculară sau depleție de volum sau de electroliți; IR; riscul apariției hiperkaliemiei; interacțiuni medicamentoase cu diuretice, antiacide.

RA: Amețeli, tulburări respiratorii, tuse, tulburări gastrointestinale, palpitații/dureri ale pieptului, rash/prurit, dureri/parestezie a mușchilor scheletici, oboseală și perturbări ale simțului gustativ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01AD05

FAMCICLOVIRUM
FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM

MUSTOPHORAN LAB. SERVIER; Pulb. liof. pt. sol. inj. 200 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 4 ml (S)

Ind: Melanom malign diseminat (localizări cerebrale).

Dz: Monochimioterapie: trat. de atac - 100 mg/m² - 3 adm. consecutive la o săpt. interval, urmat de un repaus de 4-5 săpt.; trat. de întreținere - 100 mg/ m² - o adm. la 3 săpt. Polichimioterapie: a treia adm. a trat. de atac este suprimată.

Cind: Sarcină și alăptare.

Al: Nu se adm. la pacienții care au făcut un trat. chimioterapic la un interval mai mic de 4 săpt.

RA: La 4-5 săpt. de la adm.: trombopenie, leucopenie. La 2 ore de la adm. apar: greață, vomă. Mai rar: stări febrile, diaree, dureri abdominale, creșterea tranzitorie a ureei, prurit, tulburări neurologice tranzitorii (parestezii, stări de angoasă, tulburări de conștiență).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FAMOTIDINUM
FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM

Cod ATC: A07AXN0, G01AX06**FURAZOLIDON 100 mg** TERAPIA SA; Cpr. 100 mg; ct. × 1 sau 50 blist. × 20 cpr. (S/OTC)**FURAZOLIDONA 25 mg; FURAZOLIDONA FORTE 100 mg** ARENA GROUP SA; Cpr. 25 mg, 100 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr.; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (OTC)

Ind: Toxiinfecții alimentare (salmoneloze), dizenterii bacilare, enterite infecțioase ale sugarului, lambliază, dizenterie amoebiană; activ față de numeroase tulpini de colibacili patogeni, salmonele, shigele, enterococi, stafilococi, ca și față de Trichomonas, Giardia și Entamoeba.

Dz: Oral: *Adulți:* 100 mg de 1-4 ori/zi; *Copii sub 1 an:* 8-16 mg de 4 ori/zi, *Copii 1-5 ani:* 25-35 mg de 4 ori/zi, *Copii peste 5 ani:* 50 mg de 4 ori/zi.

Cind: IR gravă, intoleranță la nitrofurani, copii sub o lună, deficit de G-6-PDH.

AI: Interacțiuni medicamentoase cu IMAO, simpatomimetice cu acțiune indirectă (amfetamină, efedrină), sedative, antihistaminice, tranchilizante și neuroleptice; prudență în sarcină și alăptare.

RA: Rareori cefalee, greață, vomă (la doze mari), erupții cutanate alergice, febră, artralгии, foarte rar agranulocitoză, anemie hemolitică (cei cu deficit de G-6-PDH); colorează urina în galben închis.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C03CA01

FELODIPINUM
FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM

FUROSEMID 40 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 40 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. **(P-6L)**

FUROSEMID 20 mg/2 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml, ct. × 10 f. × 2 ml, ct. × 100 f. × 2 ml **(S/P-RF)**

FUROSEMID LPH® 40 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 40 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-6L)**

FUROSEMID 40 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 40 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

FUROSEMID EEL B/O EEL SRL; Cpr. 40 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

FUROSEMID 40 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 40 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. **(P-6L)**

FUROSEMID 40 mg SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 40 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. **(P-6L)**

Ind: Trat. edemelor din IC, ciroză hepatică sau afecțiuni renale; formele ușoare și moderate de HTA; unele cazuri de IR acută cu oligurie.

Dz: *Adulți oral* 40-80 mg/zi, în 1-2 prize, mărit treptat, până la maximum 240 mg/zi, în 2-3 prize. În IR sunt necesare uneori doze mai mari: 500 mg - 1 g/zi. La *copii* doza este de 1-2 mg/kg/zi. *Adm. inj.:* 20-40 mg, i.v. repetat până la obținerea diurezei.

Cind: Hipersensibilitate la furosemidă sau alte sulfamide; obstacol al căilor urinare cu oligurie; hipovolemie cu deshidratare; intoxicație digitalică, alăptare.

Al: Controlul echilibrului electrolitic, glicemiei, ureei, creatininei din ser și al debitului urinar; se evită trat. prelungit, cu doze mari sau însoțit de o dietă prea strictă; ciroză hepatică; gută; sportivi; interacțiuni medicamentoase cu diuretice care rețin potasiul, tiazidice, antiinflamatoare nesteroidiene, corticosteroizi, substanțe de contrast iodate, antiaritmice, eritromicină, astemizol, bepridil, vincamină, digitalice, inhibitorii enzimei de conversie, fenitoină, curarizante, antibiotice aminoglicozidice, cefaloridină, cisplatină, neuroleptice, litiu, antiacide gastrice; sarcină.

RA: Deshidratare, hiperazotemie, hiponatriemie, hipopotasemie, hipovolemie cu hipotensiune ortostatică, encefalopatia hepatică, hipopotasemie cu sau fără alcaloză metabolică, tulburări de ritm grave, mai ales ventriculare, creștere a glicemiei, creștere a uricemiei, trombembolie, scăderea marcată a TA, până la colaps, cazuri rare de pancreatită, nefrită interstițială, erupții alergice cutanate, leucopenie, trombopenie, dureri lombare, surditate trecătoare sau definitivă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FENOFIBRATUM
FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM

Cod ATC: R02AB03

BIOPAROX® LAB. SERVIER; Spray bucofaringian și nazal 0,125 mg/doză; ct. × 1 fl. presurizat × 10 ml (*P-6L*)

Ind: Trat. local antibacterian și antiinflamator în afecțiuni ale căilor respiratorii superioare: rinită, rinofaringită, amigdalită și post-amigdalectomie, laringită, traheită, sinuzită.

Dz: *Adulți:* 4 pufuri oral și/sau în fiecare nară la intervale de 4 ore. *Copii:* 4 pufuri oral și/sau în fiecare nară la intervale de 6 ore.

Cind: Antecedente de alergie la medicament. Copii sub 12 ani.

Al: Trat. prelungit nu este justificat.

RA: Uscăciunea mucoasei buco-faringiene și nazale, înțepături, cazuri izolate de edem, eritem, bronhospasm, în special la pacienții cu teren alergic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N03AX12

FENSPIRIDUM
FENTANYLUM
FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM

GABAGAMMA 100; GABAGAMMA 300; GABAGAMMA 400 WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cps. 100 mg, 300 mg, 400 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cps. (P-6L)

GABARAN 100 mg; GABARAN 300 mg; GABARAN 400 mg RANBAXY; Cps. 100 mg, 300 mg, 400 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (P-6L)

GABARAN 600 mg; GABARAN 800 mg RANBAXY; Cpr. film. 600 mg, 800 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

GABOTON 300; GABOTON 400 HEXAL AG; Cps. 300 mg, 400 mg; ct. × 3 sau 5 blist. × 10 cps. (P-6L)

NEURONTIN PFIZER; Cps. 100 mg, 300 mg, 400 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cps. (100 mg); ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cps. (300 mg, 400 mg) (P-6L)

Ind: *Epilepsie:* ca monoterapie în trat. convulsiilor parțiale, cu/fără fenomene de generalizare secundară, la adulți și copii peste 12 ani. Siguranța și eficacitatea monoterapiei la copii cu vârsta sub 12 ani nu au fost încă determinate. În tratamentul asociat al convulsiilor parțiale, cu/fără fenomene de generalizare secundară, la adulți și copii începând cu vârsta de 3 ani. *Durerea neuropatică:* la adulți cu vârsta peste 18 ani.

Dz: *Epilepsie: Adulți și copiii peste 12 ani:* 900-3600 mg/zi. Inițial 300 mg de trei ori pe zi (TID) din prima zi, sau titrând doza astfel: în prima zi 300 mg în priză unică; a doua zi: câte 300 mg de două ori pe zi; a treia zi: câte 300 mg de trei ori pe zi. Apoi, doza poate fi crescută, cu adm. divizată în trei doze egale, până la o doză maximă de 3600 mg/zi. Intervalul maxim între două adm., în cazul adm. a trei doze pe zi, nu trebuie să depășească 12 ore. *Copii cu vârsta între 3 și 12 ani:* 25-35 mg/kg/zi, divizat în trei prize egale (de 3 ori pe zi). Titrarea inițială până la o doză eficace poate fi făcută în trei zile, administrând 10 mg/kg/zi în prima zi, 20 mg/kg/zi în a doua zi și 30 mg/kg/zi în a treia zi. Apoi, doza poate fi crescută, cu adm. divizată în trei doze egale, până la doza maximă de 35 mg/kg/zi. Au fost bine tolerate doze de până la 40-50 mg/kg/zi. *Durerea neuropatică la adulți:* Doza inițială: 900 mg/zi, divizat în trei doze egale și titrat, dacă este necesar, în funcție de răspuns, până la o doză maximă de 3600 mg/zi. La pacienții cu funcția renală alterată se ajustează doza în funcție de clearance-ul creatininei.

Cind: Hipersensibilitate la gabapentin sau compușii produsului.

AI: Întreruperea bruscă a tratamentului poate duce la status epilepticus. Întreruperea sau înlocuirea tratamentului cu alt medicament antiepileptic trebuie făcută în mod treptat, timp de min. 1 săptăm. Atenție la asocieri cu: antiacide conținând aluminiu și magneziu. Sarcină și alăptare.

RA: Durere abdominală, durere dorsală, oboseală, febră, cefalee, infecții virale, vasodilatație, constipație, anomalii dentare, diaree, dispepsie, creșterea apetitului, uscăciune oro-faringiană, greață și/sau vărsături, leucopenie, edeme periferice, fracturi, mialgii, confuzie, tulburări de coordonare, depresie, amețeli, dizartrie, labilitate emoțională, insomnie, nervozitate, somnolență, tremor, spasme, tuse, faringită, rinită, abraziuni, acnee, prurit, rash, ambliopie, diplopie, impotență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V08CA09

FENTANYLUM
 FENTICONAZOLUM
 FERROCHOLINATUM
 FERROSII FUMARAS
 FERROSII GLUCONAS
 FERROSII SULFAS
 FERUCARBOTRANUM
 FEXOFENADINUM
 FILGRASTIMUM
 FINASTERIDUM
 FLECAINIDUM
 FLUCONAZOLUM
 FLUDARABINUM
 FLUDROCORTISONUM
 FLUMAZENILUM
 FLUMETASONUM
 FLUNITRAZEPAMUM
 FLUOCINOLONI ACETONIDUM
 FLUOCORTOLONUM
 FLUORESC EINUM NATRIUM
 FLUOROMETHOLONUM
 FLUOROURACILUM
 FLUOXETINUM
 FLUPENTIXOLUM
 FLURBIPROFENUM
 FLUTAMIDUM
 FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM
 FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM

GADOVIST® 1 mmol/ml SCHERING AG; Sol. inj. 1,0 mmol/ml; ct. × 1 sau 10 flac. × 30 ml (S/P-RF)

Ind: Îmbunătățirea contrastului în imagistica de rezonanță magnetică craniană și spinală (IRM); îmbunătățirea contrastului în angiografia prin rezonanță magnetică (CE-MRA). Indicații speciale în IRM spinală: diferențierea tumorilor intra- și extramedulare, identificarea zonelor cu tumori solide în cavitățile medulare cunoscute, determinarea diseminării tumorilor intramedulare.

Dz: Doza necesară se administrează intravenos în bolus. Metoda IRM cu contrast îmbunătățit poate începe imediat după aceea (la puțin timp de la injectare, în funcție de secvențele pulsului utilizate și de protocolul de examinare). Doza zilnică maximă studiată la om, 10,5 ml/kg, a fost bine tolerată. **Adulți**, IRM craniană și spinală: în doză de 0,1 ml/kg este suficient pentru diagnostic. Pentru excluderea metastazelor sau a tumorilor recidivante, în doză de 0,3 ml/kg conduce adesea la o precizie mai mare a diagnosticului.

Pentru investigațiile privind perfuzia cerebrală: se recomandă secvențele T₂*-ponderate utilizate în asociere cu IRM cranială și spinală, pentru detectarea leziunilor în masă și a ischemiei focale fără suspectarea leziunilor în masă. Pentru aceste examinări, se recomandă utilizarea unui injector: 0,3 ml/kg (3-5 ml/secundă). CE-MRA: imaginea unui singur câmp vizual: 7,5 ml/kg sub 75 kg, 10 ml/kg pentru □ 75 kg (care corespunde la 0,1-0,15 mmol/kg); imaginea mai multor câmpuri vizuale: 15 ml/kg sub 75 kg, 20 ml/kg □ 75 kg (care corespunde la 0,2-0,3 mmol/kg).

Cind: Hipersensibilitate la gadobutrol sau la oricare dintre excipienții produsului.

Al: Pentru produse similare au fost raportate reacții anafilactice, care nu au putut fi excluse. La pacienții cu predispoziție la reacții alergice, decizia trebuie luată după o evaluare atentă a raportului risc potențial/beneficiu terapeutic. Starea de excitație marcată, durerea, anxietatea pot crește riscul reacțiilor adverse. Precauții speciale la pacienți cu prag convulsivant scăzut. Utilizarea în timpul sarcinii se face numai dacă este absolut necesar. Alăptarea se întrerupe cel puțin 24 de ore după administrare. Atenție în insuficiența hepatică severă.

RA: Pacienții cu predispoziție la reacții alergice prezintă mai frecvent reacții de hipersensibilitate. În cazuri rare pot să apară reacții anafilactice însoțite de dispnee și de alte simptome care pot merge până la șoc. Similar altor medii de contrast, pot să apară reacții alergice întârziate (după ore sau zile). Ocazional, au fost observate reacții cutanate de tip alergic. Senzația de scurtă durată de rece (slabă până la moderată), de căldură sau durere la locul injectării reprezintă reacții posibile asociate cu punctia venoasă sau cu injectarea mediului de contrast. Ocazional, s-au observat greață și vărsături și, de asemenea, reacții de tip alergic cutanate și ale mucoaselor, cefalee pasageră și amețeli. Durere tisulară, cu durată de câteva minute la injectarea paravasculară. Senzații tranzitorii de gust sau miros pot să apară în timpul sau imediat după injectia în bolus.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FENTICONAZOLUM
FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCYNUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM

Cod ATC: V08CA03

OMNISCAN AMERSHAM HEALTH; Sol. inj. 287 mg/ml; ct. × 1 sau 10 fl. × 10, 15 sau 20 ml (S/P-RF)

Ind: Imagistică prin rezonanță magnetică pentru cap și coloană vertebrală.

Dz: 0,1 mmol/kg (echivalent cu 0,2 ml/kg corp) până la 100 kg. La o greutate > 100 kg, 20 ml sunt de regulă suficienți.

Cind: Hipersensibilitate la gadodiamidă sau la excipienți; IR.

Al: Este necesar echipament pt. tratarea reacțiilor de hipersensibilitate; prudență în sarcină și alăptare.

RA: Disconfort, cu senzație generală de căldură, răcoare sau senzație de presiune locală sau durere la locul injectării; amețeală, greață, durere de cap și senzație modificată a gustului sau mirosului; reacții alergice, greață, somnolență, convulsii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FERROCHOLINATUM
FERROSII FUMARAS
FERROSII GLUCONAS
FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM

Cod ATC: N06DA04

REMINYL® 4 mg; REMINYL® 8 mg; REMINYL® 12 mg JANSSEN PHARMACEUTICA; Cpr. film. 4 mg, 8 mg, 12 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (4 mg, 8 mg); ct. × 4 blist. × 14 cpr. (8 mg, 12 mg) (*P-RF*)

REMINYL® 4 mg/ml JANSSEN PHARMACEUTICA; Sol. orală 4 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (*P-RF*)

Ind: Tratamentul simptomatic al demenței Alzheimer, forme ușoare și moderat-severe.

Dz: Doza inițială recomandată este de 8 mg galantamină pe zi (4 mg galantamină, de 2 ori pe zi), timp de patru săptămâni. Doza de întreținere inițială este de 16 mg galantamină pe zi (8 mg galantamină, de 2 ori pe zi). Această doză trebuie utilizată timp de cel puțin 4 săptămâni. O creștere a dozei de întreținere la 24 mg galantamină pe zi (12 mg galantamină de 2 ori pe zi) se va lua în considerare după o evaluare adecvată a beneficiului clinic și a tolerabilității.

Cind: Hipersensibilitate. IR și IH severă.

Al: Tratamentul se va face sub supravegherea unui medic și trebuie inițiat doar dacă există un însoțitor care să monitorizeze în mod regulat administrarea medicamentului la pacient. Trebuie monitorizată greutatea corporală.

RA: Cele mai frecvente reacții adverse observate în studii clinice: greață, vărsături, diaree, durere abdominală, dispepsie, anorexie, fatigabilitate, amețeală, cefalee, somnolență, scadere în greutate, confuzie, rinită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AB06

FERROSII FUMARAS
 FERROSII GLUCONAS
 FERROSII SULFAS
 FERUCARBOTRANUM
 FEXOFENADINUM
 FILGRASTIMUM
 FINASTERIDUM
 FLECAINIDUM
 FLUCONAZOLUM
 FLUDARABINUM
 FLUDROCORTISONUM
 FLUMAZENILUM
 FLUMETASONUM
 FLUNITRAZEPAMUM
 FLUOCINOLONI ACETONIDUM
 FLUOCORTOLONUM
 FLUORESC EINUM NATRIUM
 FLUOROMETHOLONUM
 FLUOROURACILUM
 FLUOXETINUM
 FLUPENTIXOLUM
 FLURBIPROFENUM
 FLUTAMIDUM
 FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM
 FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM

CYMEVENE® HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; ct. × 1 fl. (S/P-RF)

CYMEVENE® HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 84 cps. (S/P-RF)

Ind: Prevenirea și trat. infecției cu CMV la pacienții imunocompromiși.

Dz: *Inducție:* 5 mg/kg în p.i.v. de 1 oră, repetat la 12 ore, timp de 14-21 zile. *Întreținere:* 5 mg/kg p.i.v. de 1 oră, repetat la 24 ore, 7 zile/săpt., sau 6 mg/kg și zi, timp de 5 zile/săpt.; ajustarea dozei la cei cu IR.

Cind: Hipersensibilitate la ganciclovir sau aciclovir.

AI: Potențial factor teratogen și carcinogen; terapia nu trebuie inițiată dacă neutrofilia absolută este < 500 celule/μl, sau trombocitele < 25000 celule/μl; prudență în afectare renală; copii; vârstnicii; asocierea cu probenecid, zidovudină, didanosină, imipenem + cilastatin; sarcină și alăptare.

RA: Pacienții cu SIDA: leucopenie, anemie, trombocitopenie, diaree, greață, anorexie, vomă, astenie, suprainfecții, dureri abdominale, cefalee, inflamație la locul injectării, flebită. Pacienții cu transplant: hipercreatininemie. Alte RA: febră, durere generală, suprainfecții, celulită, edeme, modificări de laborator, durere toracică, frisoane, abces, hemoragie sau flebită la locul injectării, dureri de sân, fotosensibilitate, dispepsie, anomalii funcționale hepatice, eructații, ulceratii bucale, constipație, disfagie, incontinență fecală, anemie hipocromă, pancitopenie, depresie medulară, eosinofilie, parestezii, convulsii, somnolență, amețeală, anxietate, euforie, insomnie, ataxie, confuzie, uscăciunea gurii, hiperestezie, reacții maniacale, depresie, comă, nervozitate, psihoză, tremor, rash, prurit, alopecie, transpirații, acnee, herpes simplex, urticarie, afectarea vitrosului, durere oculară, ambliopie, orbire, conjunctivită, surzenie, dezlipire de retină, glaucom, creșterea creatininei, tromboflebită profundă, migrenă, vasodilatație, aritmie, HTA sau hTA, urinare frecventă, infecție urinară, IR, hematurie, uremie, scăderea glicemiei, miastenienie, pancreatită, septicemie și insuficiență multiplă de organ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FERROSII GLUCONAS
 FERROSII SULFAS
 FERUCARBOTRANUM
 FEXOFENADINUM
 FILGRASTIMUM
 FINASTERIDUM
 FLECAINIDUM
 FLUCONAZOLUM
 FLUDARABINUM
 FLUDROCORTISONUM
 FLUMAZENILUM
 FLUMETASONUM
 FLUNITRAZEPAMUM
 FLUOCINOLONI ACETONIDUM
 FLUOCORTOLONUM
 FLUORESC EINUM NATRIUM
 FLUOROMETHOLONUM
 FLUOROURACILUM
 FLUOXETINUM
 FLUPENTIXOLUM
 FLURBIPROFENUM
 FLUTAMIDUM
 FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM
 FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
 GANCICLOVIRUM
 GANIRELIXUM

Cod ATC: H01CC01

ORGALUTRAN ORGANON; Sol. inj. 0,25 mg/0,5 ml; ct. × 1 sau 5 seringi preumplute × 0,5 ml (*P-RF*)

Ind: Prevenirea vârfurilor secretorii premature de hormon luteinizant, la femeile supuse hiperstimulării ovariene controlate în cadrul tehnicilor de reproducere asistată.

Dz: 0,25 mg s.c. o dată pe zi, începând cu ziua a 6-a a adm. de FSH.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; hipersensibilitate la hormonul de eliberare a gonadotropinei (GnRH) sau la oricare alt analog GnRH; disfuncții moderate sau severe ale funcției hepatice sau renale; sarcină sau alăptare.

Al: Prudență în afecțiuni alergice grave; sindromul hiperstimulării ovariene (OHSS); greutate < 50 kg sau > 90 kg.

RA: Reacție cutanată locală la locul injectării; cefalee și greață; amețeli, astenie, dureri abdominale, OHSS, sarcină ectopică sau pierderea sarcinii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01BC05

FERROSII SULFAS
FERUCARBOTRANUM
FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM

GEMCITABINA SINDAN 200 mg; GEMCITABINA SINDAN 1 g SINDAN SRL; Pulb. pt. sol. perf. 200 mg, 1 g; ct. × 1 fl. (S)
GEMZAR® 200 mg; GEMZAR® 1 g LILLY FRANCE; Pulb. pt. sol. perf. 200 mg, 1 g; ct. × 1 fl. (S)

Ind: Cancerul pulmonar fără celule mici. Cancer pancreatic: adenocarcinom local avansat sau metastatic al pancreasului. Cancer al vezicii urinare, în stadiul invaziv. Cancer de sân. Cancer ovarian.

Dz: Cancer pulmonar fără celule mici: monoterapie: 1000 mg/m², în perf i.v. 30 de min, repetată o dată pe săpt. timp de 3 săpt., urmată de o pauză de o săpt. În asociere (cu cisplatin): 1250 mg/m², în perf. i.v. 30 de min, în zilele 1 și 8 ale fiecărui ciclu de 21 zile. Cancer de pancreas: 1000 mg/m², în perf. i.v. 30 de min, repetată o dată pe săpt. timp de până la 7 săpt., urmată de o pauză de o săpt. Cancer al vezicii urinare, în stadiul invaziv: 1000 mg/m² în perf. i.v. de 30 min, în zilele 1, 8, 15 ale fiecărui ciclu de 28 zile, apoi 1 săpt. pauză. Cancer de sân: asociere gemcitabină și paclitaxel. Doza de paclitaxel este de 175 mg/m² adm. i.v. în aprox. 3 ore în ziua 1, urmată de gemcitabină (1250 mg/m²) adm. i.v. timp de 30 min., în zilele 1 și 8 ale fiecărui ciclu de 21 zile. Cancer ovarian: asociere de gemcitabină și carboplatină. Doza de gemcitabină este de 1000 mg/m² se adm. în perf. i.v. timp de 30 min. în zilele 1 și 8 ale fiecărei ciclu de 21 zile. Carboplatina este adm. după gemcitabină, în ziua 1, cu o doză calculată în funcție de ASC de 4 mg/ml/min.

Cind: Hipersensibilitate la gemcitabină.

Al: Monitorizare hematologică, renală și hepatică; interacțiuni cu radioterapia; sarcină și alăptare.

RA: Anemie, leucopenie și trombocitopenie, anormalitățile testelor funcției hepatice, grețuri, vărsături, diaree, stomatită, proteinurie și hematurie ușoară, rash, alopecie, dispnee, bronhospasm, pneumonie interstițială, febră, cefalee, frisoane, mialgii, astenie și anorexie, tuse, rinită, reacție anafilactoidă, edeme periferice, sindrom hemolitic uremic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FERUCARBOTRANUM
 FEXOFENADINUM
 FILGRASTIMUM
 FINASTERIDUM
 FLECAINIDUM
 FLUCONAZOLUM
 FLUDARABINUM
 FLUDROCORTISONUM
 FLUMAZENILUM
 FLUMETASONUM
 FLUNITRAZEPAMUM
 FLUOCINOLONI ACETONIDUM
 FLUOCORTOLONUM
 FLUORESC EINUM NATRIUM
 FLUOROMETHOLONUM
 FLUOROURACILUM
 FLUOXETINUM
 FLUPENTIXOLUM
 FLURBIPROFENUM
 FLUTAMIDUM
 FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM
 FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
 GANCICLOVIRUM
 GANIRELIXUM
 GEMCITABINUM
GENTAMICINUM

Cod ATC: J01GB03, S01AA11

DIAKARMON HELP PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 40 mg/ml; ct. × 50 f. × 2 ml (S)
GENTAMICIN LEK PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 20 mg/ml, 40 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 ml (P-RF)
GENTAMICIN "SANDOZ" 40 mg/ml SANDOZ GmbH; Sol. inj. 40 mg/ 1 ml, 80 mg/2 ml; ct. × 50 f. (S/P-RF)
GENTAMICIN KRKA; Sol. inj. 40 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml; ct. × 10 sau 50 f. × 2 ml (S/P-RF)
GENTAMYCIN „BIOCHEMIE" BIOCHEMIE; Sol. inj. 40 mg/ml sulfat de gentamicină; ct. × 50 f. × 1 ml; ct. × 50 f. × 2 ml (S)
GENTAMYCIN SULPHATE E.I.P.I.C.O.; Sol. oft. 0,5% sulfat de gentamicină (echiv. cu 0,3% gentamicină bază); ct. × 1 fl. × 10 ml (P-RF)
GENTICOL S.I.F.I.; Sol. oft. 0,5% sulfat de gentamicină (echiv. cu 0,3% gentamicină bază); ct. × 1 fl. × 10 ml + disp. picurare (P-RF)
GENTICOL S.I.F.I.; Ung. oft. 0,5% sulfat de gentamicină (echiv. cu 0,3% gentamicină bază); ct. × 1 tub × 10 g (P-RF)
LYRAMYCIN LYKA LABS Ltd.; Sol. inj. 40 mg/ml; ct. × 10 fl. × 2 ml (P-RF)
OPHTAGRAM® LAB. CHAUVIN; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)
OPHTAGRAM® LAB. CHAUVIN; Ung. oft. 0,3%; ct. × 1 tub × 0,5 g (P-RF)
PAN-GENTAMICINE PANPHARMA; Sol. parent. 40 mg/ml; ct. × 1 sau 10 f. × 2 ml (P-RF)

Ind: Adm. inj.: infecții provocate de germeni sensibili (E. coli, Proteus, Shigella, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Providencia, Haemophilus, gonococi și stafilococi, incluzând pe cei rezistenți la penicilină) ale tractului respirator, căilor urogenitale, oculare severe, în urma arsurilor grave, septicemii și intra-spitalicești. Adm. ext.: trat. local al infecțiilor bacteriene ale polului anterior al ochiului și profilactic în traumatisme și intervenții chirurgicale oftalmologice, trat. infecțiilor conductului auditiv extern.

Dz: Adm. inj.: 2-3 mg/kg și zi în 2-3 prize, până la 5 mg/kg și zi, repartizate în 3-4 prize. Oftalmic: 1-3 picături se instilează în sacul blefaro-conjunctival de 3-4 ori/zi. Auricular: se instilează 2-4 picături de 3-4 ori/zi și o dată în cursul nopții.

Cind: Hipersensibilitate la gentamicină sau aminoglicozide.

Al: Prudență în IR, boli neuromusculare, afecțiuni vestibulare sau/și cohleare, vârstnici; monitorizare renală, vestibulară și cohleară, hepatică, hematologică; interacțiuni medicamentoase cu alte substanțe ototoxice și/sau nefrotoxice, blocanți neuromusculari, alte antibiotice aminoglicozide; sarcină și alăptare.

RA: Alterarea funcțiilor nervului vestibular (vertij, tinitus, nistagmus, sindrom Ménière și tulburări de echilibru), nervului cohlear (hipoacuzie la tonuri înalte, rar surditate completă), nefrotoxicitate, neuropatie periferică (parestezii faciale și ale extremităților, tremor și spasm muscular), reacții alergice, tulburări hematologice, suprainfecții, febră medicamentoasă, greață, vărsături, scădere ponderală, alopecie, hipersalivație, fibroză pulmonară, hTA sau HTA, dureri localizate la locul iniecției. La doze extrem de mari pot surveni blocaie neuromusculare și paralizii ale

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FEXOFENADINUM
FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA

Cod ATC: N06DX02, C04AXN1**BILOBIL® KRKA**; Cps. 40 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 10 cps. **(P-6L)****GINKOGINK LAB. URPAC ASTIER**; Sol. orală 40 mg/ml; ct. × 1 fl. × 90 ml; ct. × 1 fl. presurizat × 150 ml **(P-6L)****FLAVOTAN 40 mg LABORMED PHARMA SA**; Cpr. film. 40 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-6L)****TANAKAN (EGB 761) BEAUFOUR IPSEN**; Cpr. film. 40 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. **(P-6L)****TANAKAN (EGB 761) BEAUFOUR IPSEN**; Sol. orală 40 mg/ml; ct. × 1 fl. × 30 ml **(P-6L)****Ind:** Trat. tulburărilor psihocomportamentale la vârstnici și al claudicațiilor intermitente din arteriopatiile cronice obliterante ale membrelor inferioare (stadiul 2).**Dz:** 120 mg/zi, p.o, în timpul mesei.**Cind:** Hipersensibilitate la extract standardizat de Ginkgo Biloba sau la celelalte componente ale produsului.**Al:** Prudență în sarcină și alăptare.**RA:** Rareori pot să apară tulburări digestive, cefalee, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: I03ax13

FILGRASTIMUM
FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT

COPAXONE® TEVA PHARM.; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 28 seringi preumplute × 1 ml (S/P-RF)

Ind: Reducerea frecvenței recăderilor la pacienții cu scleroză multiplă (SM), la care alternează episoadele de recădere cu cele de remisiune.

Dz: *Adulți:* - 20 mg, s.c. (braț, abdomen, șold și coapse) o dată pe zi, la aceeași oră. Este destinat trat. pe termen lung și nu se va întrerupe adm. fără indicația medicului. Utilizare la *copii, vârstnici:* Nu s-a studiat utilizarea specifică.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la acetat de glatimeră sau manitol. Sarcină și alăptare.

Al: Adm. exclusiv s.c. Nu se adm. pe cale i.v.

RA: În mod obișnuit: reacții locale la locul injectării. Ocazional: vasodilatație, dureri toracale, tahicardie, anxietate și/sau dispnee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10BB01

FINASTERIDUM
FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM

GLIBENCLAMID LAROPHARM SRL; Cpr. 5 mg; ct. × 3 blist. × 20 cpr. (**P-6L**)

GLIBENCLAMID 1,75 mg; GLIBENCLAMID 3,5 mg; GLIBENCLAMID 5 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 1,75 mg, 3,5 mg, 5 mg; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cpr. (**P-6L**)

GLIBENCLAMID LPH® 1,75 mg; GLIBENCLAMID LPH® 3,5 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 1,75 mg, 3,5 mg; ct. × 3, 6 sau 100 blist. × 20 cpr. (**S/P-6L**)

MANINIL BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. 1,75 mg, 3,5 mg, 5 mg; ct. × 1 fl. × 120 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 sau 20 cpr. (1,75 mg, 3,5 mg) (**P-6L**)

Ind: Diabetul zaharat de tip II (tip adult) insulino-independent.

Dz: Inițial: 0,875-1,75 mg pe zi, doza se crește treptat, la intervale de câteva zile - o săpt., până la doza de întreținere de 10,5 mg pe zi.

Cind: Diabetul zaharat de tip I, insulino-dependent, eșecul secundar complet al terapiei cu glibenclamidă în diabetul zaharat de tip II, în special în caz de decompensare metabolică cu acidoză, precomă sau comă diabetică, decompensarea metabolică în cursul bolilor infecțioase, int. chir., în cazul rezecției pancreatice; IH gravă, IR gravă; hipersensibilitate cunoscută la glibenclamidă sau la excipienți; sarcină.

!: Monitorizarea atentă; prudență în funcție hepatică afectată; trat. lungi; vârstnici; asocieri cu sulfonamide, cloramfenicol, fenilbutazonă, azapropazonă, sulfpirazonă, derivați cumarinici, miconazol și feniramidol, metformină, acarboză, salicilați, IMAO, fenfluramină, pentoxifilină, oxitetraciclină, anabolizante, IEC, clofibrat, fluoxetină, ciclofosfamidă, ifosfamidă, trofosfamidă, simpatolitice, barbiturice, fenitoină și rifampicină, glucagon, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, diuretice inclusiv acetazolamidă, acid nicotinic (în doze mari), fenotiazine, diazoxid și hormoni sexuali, anti H₁; sarcină și alăptare.

RA: Reacții hipoglicemice, tulburări de vedere pasagere, tulburări gastrointestinale, reacții de fotosensibilizare, eritem polimorf, sindrom Lyell, dermatită exfoliativă, eritrodermie și eritem nodos, colestază, hepatită, creșterea enzimelor hepatice, trombocitopenie cu purpură, leucocitopenie, eritrocitopenie, pancitopenie și granulocitopenie până la agranulocitoză.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10BB09

FLECAINIDUM
FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM

DIABREZIDE® L. MOLTENI DENTAL; Cpr. 80 mg; ct. × 2 blist. × 20 cpr. (P-6L)

DIAPREL® LAB. SERVIER; Cpr. 80 mg; ct. × 3 blist. × 20 cpr. (P-6L)

DIAPREL® MR LAB. SERVIER; Cpr. elib. prel. 30 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 30 cpr. (P-6L)

ESQUEL® 80 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 80 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-6L)

GLICLAZID MR LPH 30 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. elib. prel. 30 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 20 cpr. (P-6L)

GLIDIET MONDI-MUNDIPHARMA; Cpr. 80 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Diabetul zaharat insulino-independent.

Dz: *Adulți:* de la 80 mg până la 240 mg pe zi, maxim 320 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la gliclazidă, la alți derivați de sulfoniluree sau la excipienții produsului; diabet zaharat insulino-dependent, mai ales diabet juvenil, diabet complicat cu ceto-acidoză sau stările precomatoase diabetice; IR sau IH severă; trat. concomitent cu miconazol; sarcină și alăptare.

Al: Monitorizarea glicemiei; prudență la vârstnici; subnutriție; degradarea stării generale; insuficiență suprarenală sau hipopituitarism; regim alimentar neregulat; febră, traumatisme, procese infecțioase, intervenții chirurgicale; IR sau IH; interacțiuni cu miconazol, fenilbutazonă, administrată sistemic crește efectul hipoglicemiant al derivaților de sulfoniluree (desface legăturile acestora de proteinele plasmatiche), alcool etilic, beta-blocante, fluconazol, IEC, clorpromazină, glucocorticoizi, progestogeni, ritodrină, salbutamol, terbutalină, șoferi și activități de precizie.

RA: Hipoglicemie, tulburări gastrointestinale (greață, dispepsie, diaree și constipație), reacții la nivelul pielii și mucoaselor (rash, prurit, urticarie, erupții maculopapulare), tulburări hematologice (anemie, leucopenie, trombocitopenie, creșteri ale fosfatazei alcaline, hepatită), icter colestatic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FLUCONAZOLUM
FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM

Cod ATC: A01BB12

AMARYL® 1 mg; AMARYL® 2 mg; AMARYL® 3 mg AVENTIS PHARMA; Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-6L)
GLIMEPIRID LPH® 1 mg; GLIMEPIRID LPH® 2 mg; GLIMEPIRID LPH® 3 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg
glimepiridă; ct. × 2 sau 100 blist. × 15 cpr. (S/P-6L)

Ind: Diabet zaharat de tip 2, insulino-independent.

Dz: Doza inițială este de 1 mg o dată, zilnic; doza poate fi crescută treptat, la intervale de 1-2 săptăm., la 2 mg, 3 mg sau 4 mg pe zi, în funcție de situația metabolică.

Cind: Diabet zaharat de tip 1 insulino-dependent; eșec al terapiei cu glimepiridă; precomă sau comă diabetică; pancreatctomie; dezechilibru metabolic diabetic (de ex. cetoacidoză, inclusiv în antecedente); hipersensibilitate la glimepiridă, la alte sulfoniluree antidiabetice, la sulfonamide sau la componentii produsului; IR sau IH grave; sarcină și alăptare.

Al: Monitorizare regulată a glicemiei, glucozuriei, tabloului sanguin și a funcției hepatice; respectarea cu strictețe a trat.; prudență la vârstnici; situații de stres; interacțiuni medicamentoase cu alopurinol, azapropazonă, beta-blocante, chinină, chinolone antibacteriene, ciclofosamidă și ifosfamidă, cloramfenicol, anticoagulante cumarinice, disopiramidă, fenfluramină, fenilbutazonă, feniramidol, fibrati, fluoxetină, guanetidină, IEC, IMAO, insulină și diferite antidiabetice orale, miconazol, pirazinamidă, pentoxifilină, oxifenbutazonă, probenecid, salicilați, steroizi anabolizanți și androgenici, sulfinpirazonă, sulfonamide, tetraciclone, clonidină, guanetidină și rezerpină, acetazolamidă, adrenalină sau alte simpatomimetice, barbiturice, ciclosporină, diazoxid, fenitoină, fenotiazine, glucagon, glucocorticoizi, hormoni sexuali feminini, hormoni tiroidieni, indometacină, HIN, laxative, nicotinați, rifampicină, saluretice, alcool; șoferi și activități de precizie.

RA: Hipoglicemie (greață, vărsături, senzație imperioasă de foame, tremurături, neliniște, iritabilitate, tulburări de concentrare, afectarea capacității de reacție, stare confuzională, depresie, cefalee, amețeli, fatigabilitate, somnolență și alte tulburări de somn, delir, respirație superficială, bradicardie, deficite neurologice tranzitorii - tulburări vizuale, afazie, pareze și parestezii), senzație de sațietate sau de presiune epigastrică, epigastralgie, diaree, icter colestatic, creșterea valorilor serice ale TGO, TGP și hepatită, eventual IH, trombocitopenie, eritropenie, leucopenie, granulocitopenie care pot evolua către agranulocitoză, pancitopenie, (mielosupresie) și anemie hemolitică, vasculită, reacții de hipersensibilitate, îndeosebi cutanate, hiponatremie, fotosensibilizare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A01BB07

FLUDARABINUM
FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCINIUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM

GLIPIZID LPH® 5 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (**P-6L**) și ct. × 100 blist. × 15 cpr. (**S**)
GLUCOTROL XL PFIZER; Cpr. film. gits, 5 mg, 10 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (**P-6L**)

Ind: Adjuvant al dietei la pacienții cu diabet zaharat insulino-independent, atunci când dieta adecvată nu este suficientă.

Dz: Doza inițială este de 5 mg/zi, administrată la micul dejun, apoi dozele se cresc cu 5 mg în funcție de glicemie până la maxim 20 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la glipizid, alte sulfoniluree sau sulfamide și la excipienți; diabet insulino-dependent (Tip I - diabet juvenil), ceto-acidoza diabetică, precomă diabetică; IR sau IH severă; sarcină și alăptare.

Al: Monitorizarea glicemiei și glicozuriei; prudență în febră, traumatisme, infecții sau proceduri chirurgicale; eșec secundar; interacțiuni medicamentoase cu AINS și alte medicamente cu legare mare de proteinele plasmatică, salicilați, sulfonamide, cloramfenicol, probenecid, anticoagulante cumarinice, IMAO, beta-blocante, diuretice tiazidice și alte diuretice, corticosteroizi, fenotiazine, preparate tiroidiene, estrogeni, contraceptive orale, fenitoină, acid nicotinic, simpatomimetice, blocanți ai canalelor de calciu, HIN; șoferi și activități de precizie.

RA: Hipoglicemie, erupții cutaneo-mucoase (prurit, urticarie, erupții maculo-papuloase); tulburări gastrointestinale (greață, diaree, disconfort epigastric), tulburări hepatice (icter colestatic, hepatite toxice), reacții hematologice (leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, anemie hemolitică, anemie aplazică, pancitopenie); porfirie și reacții tip disulfiram, cazuri de hiponatriemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FLUDROCORTISONUM
FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCEINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM

Cod ATC: A10BB08

GLIQUIDON LPH® 30 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 30 mg gliquidonă; ct. × 3 sau 6 blist. × 10 cpr. (P-6L) și ct. × 100 blist. × 15 cpr. (S)

GLURENORM BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 30 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. diabetului zaharat la vârstă mijlocie și înaintată.

Dz: Inițial 15 mg la micul dejun, cu creștere gradată a dozei până la 120 mg/zi.

Cind: Diabetul insulinodependent, comă și precomă diabetică, afecțiunile metabolice grave asociate cu ceto-acidoză, alergii la sulfamide; sarcină.

AI: Monitorizarea glicemiei; IR gravă; respectarea regimului alimentar; asocierea cu salicilați, sulfonamide, fenilbutazonă, tuberculostatice, cloramfenicol, tetraciclină, cumarine, ciclofosamidă, IMAO, beta-blocante, clorpromazină, simpatomimetice, corticoizi, hormoni tiroidieni, contraceptive orale, acid nicotinic, alcool; prudență în alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Reacții hipoglicemice, fenomene alergice cutanate, modificări ale compoziției sângelui sau fenomene de intoleranță digestivă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FLUMAZENILUM
FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCETINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM

Cod ATC: H04AA01

GLUCAGEN® HYPOKIT 1 mg NOVO NORDISK A/S; Liof./solv. pt. sol. inj. 1 mg de clorhidrat de glucagon; ct. × 1 fl. liof. + seringă preumplută × 1 ml solv. **(S)**

Ind: Trat. hipoglicemiei severe la persoanele cu diabet zaharat; oprirea temporară a peristaltismului intestinal în timpul examinării tractului gastrointestinal; evaluarea secreției maxime a pancreasului la persoanele cu diabet.

Dz: Hipoglicemie - *Adulți și copii peste 25 kg:* 1 mg; *copii sub 25 kg sau sub 6-8 ani:* inj. s.c./i.m. 0,5 mg. Dacă pacientul nu răspunde în 10 minute trebuie să i se administreze glucoză intravenos. *Examinarea tractului gastrointestinal:* inj. i.v./i.m. 0,2-2 mg.

Cind: Hipersensibilitate la glucagon sau la excipienți; tumoră de glandă supraadrenală.

Al: Prudență în regim strict, nivele scăzute de adrenalină, hipoglicemie cronică sau hipoglicemie produsă de alcool; afecțiuni cardiace.

RA: Greață și vărsături, tahicardie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AX05

FLUMETASONUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESCETINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM

DONA® ROTTAPHARM; Pulb. pt. sol. orală 1500 mg/plic; ct. × 20 plicuri unidoză (**P-6L**)

Ind: Boală artrozică cu diferite localizări (genunchi, șold, coloană vertebrală, umăr, mână, gleznă etc.).

Dz: Oral 1500 mg glucozaminosulfat (dizolvat în 50 ml apă) o dată/zi, timp de 1-3 luni sau mai mult. Trat. se repetă de 2-3 ori/an.

Cind: Hipersensibilitate la glucozaminosulfat, fenilcetonurie.

A!: Prudență în sarcină.

RA: Reacții adverse la nivelul tractului gastrointestinal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B05BA03

FLUNITRAZEPAMUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM

DEXTROSE 5%; DEXTROSE 10% ACS DOBFAR INFO; Sol. perf. 5%, 10%; pungi × 250 sau 500 ml (S)
DEXTROSE 5% VIOSER; DEXTROSE 10% VIOSER VIOSER SA; Sol. perf. 5%, 10%; ct. × 10 fl. × 500 sau 1000 ml (S)
GLUCOZĂ 5%; GLUCOZĂ 10%; GLUCOZĂ 20%; GLUCOZĂ 40% B. BRAUN MELSUNGEN AG; Sol. perf. 5%, 10%, 20%, 40%; ct. × 10 fl. × 250 ml (5%), ct. × 10 fl. × 500 ml (S)
GLUCOSTERIL 5%; GLUCOSTERIL 10% FRESENIUS KABI; Sol. perf. 5%, 10%; 1 fl. sticlă sau plastic × 250 sau 500 ml (S)
GLUCOZĂ 5%; GLUCOZĂ 10% HEMOFARM; Sol. perf. 5%, 10%; ct. × 10 fl × 500 ml (S)
GLUCOZĂ 5%; GLUCOZĂ 10%; GLUCOZĂ 20% INFOMED FLUIDS; Sol. perf. 5%, 10%, 20%; ct. × 10 pungi × 250 sau 500 ml (S)
GLUCOZĂ 3,3 g/10 ml SICOMED SA; Sol. inj. 33%; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 10 ml (S)
GLUCOZĂ 5% m/v; GLUCOZĂ 10% m/v HELVETICA PROFARM SA; Sol. perf. 5%, 10%; ct. × 10 fl. PEJD × 500 ml (S)

Ind: Glucoză 5%: Solvent sau vehicul pentru electroliți și medicamente compatibile. Aport de apă în caz de deshidratare hipertonă.

Glucoză 10%: Solvent sau vehicul pentru electroliți și medicamente compatibile. Supliment energetic parenteral.

Dz: Perfuzie cu debit constant în venele periferice. Glucoză 5%: 30-40 ml/kg, echivalând cu 1,5-2 g glucoză/kg, maxim 6,0 g/kg. Viteza maximă de perfuzie este de 3 ml/kg/oră, echivalând cu 0,15 g glucoză/kg/oră. Glucoză 10%: 30-40 ml/kg, echivalând cu 3-4 g glucoză/kg, maxim 6,0 g/kg. Viteza maximă de perfuzie este de 2,5 ml/kg/oră sau 0,25 g glucoză/kg/oră.

Cind: Hiperglicemie, hipokaliemie (fără administrare simultană de electroliți), acidoză metabolică, stări de hiperhidratare și deshidratare hipotonă.

Al: Glicemia, balanța hidro-electrolitică și echilibrul acido-bazic trebuie monitorizate frecvent; prudență în diabet zaharat; stări post-traumatice sau postoperatorii; IC, stări edematoase, HTA, sarcină și alăptare.

RA: Nu apar dacă administrarea este corect adaptată scopului propus.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FLUOCINOLONI ACETONIDUM
 FLUOCORTOLONUM
 FLUORESCETINUM NATRIUM
 FLUOROMETHOLONUM
 FLUOROURACILUM
 FLUOXETINUM
 FLUPENTIXOLUM
 FLURBIPROFENUM
 FLUTAMIDUM
 FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM
 FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
 GANCICLOVIRUM
 GANIRELIXUM
 GEMCITABINUM
 GENTAMICINUM
 GINKGO BILOBA
 GLATIMER ACETAT
 GLIBENCLAMIDUM
 GLICLAZIDUM
 GLIMEPIRIDUM
 GLIPIZIDUM
 GLIQUIDONUM
 GLUCAGONUM
 GLUCOSAMINUM
 GLUCOSUM
 GLYCEROLUM

Cod ATC: A06AX01

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ pentru copii ANTIBIOTICE SA; Sup. 1,3904 g glicerină; ct. × 2 folii × 3 sup. (OTC)
SUPOZITOARE CU GLICERINĂ pentru adulți ANTIBIOTICE SA; Sup. 2,0856 g glicerină; ct. × 2 folii × 3 sup. (OTC)

Ind: Constipație.

Dz: 1 sup. o dată pe zi, la nevoie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FLUOCORTOLONUM
FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM

Cod ATC: G03GA01

OVITRELLE® 250 micrograme; OVITRELLE® 250 micrograme/0,5 ml SERONO EUROPE Ltd.; Pulb. + Solv. pt. sol. inj. 250 µg, respectiv sol. inj. în seringă preumplută; ct. × 1, 2 sau 10 fl. pulb. + 1, 2 sau 10 fl. solv., respectiv ct. × 1 seringă × 0,5 ml (**P-RF**)

PREGNYL N.V. ORGANON; Liof. pt. sol. inj. 500 U.I./ml; ct. × 3 sau 6 f. cu pulbere + 3 sau 6 f. × 1 ml (**P-RF**)

PREGNYL 5000 N.V. ORGANON; Pulb. liof. pt. sol. inj. 5000 U.I./ml; ct. × 3 f. cu liof. + 3 f. solv. × 1 ml (**P-RF**)

Ind: La femei: infertilitate anovulatorie, avort habitual, amenințare de avort. La bărbați: hipogonadism hipogonadotrofic. Criptorhidism. Oligo-astenospermie și azoospermie.

Dz: Femei: infertilitate anovulatorie: inj. i.m. 10000 UI la mijlocul ciclului. Superovulație: inj. i.m. 10000 UI, în priză unică. Insuficiența de corpus luteum: inj. i.m. 5000 UI în a 5-a zi de ovulație, repetat în a 9-a zi. Avort habitual, amenințare de avort: inj. i.m. 10000 UI, apoi câte 5000 UI de două ori/săpt. Bărbați: hipogonadism hipogonadotrofic: inj. i.m./s.c. 2000 UI de 2 ori/săpt. Criptorhidism: inj. i.m./s.c. 500 UI sau 1000 UI la 5 zile.

Cind: Tumori hipofizare sau ovariene, carcinom de prostată sau neoplasm androgen - dependent. Disgenezie ovariană, absența uterului, menopauză precoce, ocluzie tubară cu excepția cazului în care pacienta se află în terapie de superovulație pentru fertilizare in vitro. Tromboflebită activă; hipersensibilitate la gonadotrofină; în reducerea surplusului ponderal; alăptare.

Al: Nu este eficace la bărbați cu FSH crescut; prudență în hipotiroidism, deficit adreno-cortical sau hiperprolactinemie; poate produce sindrom de hiperstimulare ovariană; risc de sarcini multiple; afecțiuni cardiace sau renale, epilepsie, migrenă sau astm bronșic; poate produce precocitate sexuală.

RA: Reacție locală/durere la locul de injecție. Cefalee, astenie, depresie, iritabilitate, agitație. Reacții alergice. Sindrom de hiperstimulare ovariană la femei. La bărbați: retenție lichidiană, edeme, senzație de tensiune la nivelul mameloanelor, ginecomastie, precocitate sexuală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L02AE03

FLUORESC EINUM NATRIUM
FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM

ZOLADEx®; ZOLADEx® LA ASTRAZENECA; Implant 3,6 mg și 10,8 mg; ct. × 1 seringă preumplută (S/P-RF)

Ind: Cancer de prostată; cancerul de sân la femeile la pre- și peri-menopauză care răspunde la trat. hormonal; endometrioză; presubțierea endometrului dinaintea ablației chirurgicale; fibrom uterin.

Dz: 3,6 mg inj. s.c. în peretele abdominal anterior, la fiecare 28 zile.

Cind: Hipersensibilitate la goserelină sau alți analogi LH-RH; sarcină sau alăptare.

Al: Prudență la copii; obstrucție ureterală la bărbați; reducere a densității minerale osoase la femei; creștere a rezistenței cervixului uterin.

RA: Reacții de hipersensibilizare, artralgii, rash cutanat, hTA, HTA, echimoze la locul de injectare, bufeuri, scădere a libidoului, obstrucție ureterală, cefalee, modificări ale afectivității, inclusiv depresie, uscăciunea mucoasei vaginale și modificări ale dimensiunilor sânilor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A04AA02

FLUOROMETHOLONUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM

KYTRIL HOFFMANN LA ROCHE; Sol. inj. 1 mg/ml; f. × 3 ml (**S/P-RF**)
KYTRIL HOFFMANN LA ROCHE; Sol. orală 20 µg/ml; ct. × 1 fl. × 30 ml (**P-RF**)
KYTRIL® 1 mg; KYTRIL® 2 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 1 mg, 2 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr (1 mg), ct. × 1 blist. × 5 cpr. (2 mg) (**P-RF**)
Ind: Prevenirea şi trat. greţurilor şi vărsăturilor acute sau tardive produse de citostatice sau radioterapie.
Dz: Adm. inj.: *Adulţi:* 3 mg în perf. sau inj. i.v., la nevoie se repetă de 1-2 pe zi. *Copii peste 2 ani:* doză unică de 40 µg/kg, la nevoie se repetă 40 µg/kg. Adm. p.o.: 2 mg pe zi.
Cind: Hipersensibilitate la granisetron sau la oricare din componenţii produsului.
Al: Prudenţă în simptome de ocluzie intestinală subacută; hipersensibilitate încrucişată cu alţi antagonişti 5HT3; sarcină şi alăptare.
RA: Cefalee şi constipaţie, reacţii de hipersensibilitate, creşteri tranzitorii ale valorilor transaminazelor hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R05CA03

FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM

COLDREX BRONCHO GLAXO SMITHKLINE; Sirop 2%; ct. × 1 fl. × 100 sau 160 ml (*OTC*)

ROBITUSSIN EXPECTORANS IVAX PHARMACEUTICALS; Sol. orală 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (*OTC*)

TRECID SICOMED SA; Cpr. 100 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (*OTC*)

Ind: Bronșite, laringite, traheite acute și cronice; catar respirator; spasme musculare (fibrozite, miozite, rupturi tendinoase, torticolis, sciatică).

Dz: *Adulți:* 100-200 mg de 4-6 ori/zi; *copii sub 7 ani:* 1-5 picături de 3 ori/ zi; *copii peste 7 ani:* 100 mg, 20 picături sau o linguriță de sirop de 3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la guaiafenezină; ulcer gastroduodenal, gastroduodenite; tulburări de deglutiție; copii sub 5 ani.

Al: Interacțiuni cu alcool și medicamentele care produc depresie respiratorie; reacție fals pozitivă pentru acidul 5-hidroxi-indolacetic în urină (interferă diagnosticul de sindrom carcinoid); prudență la șoferi și activități de precizie.

RA: Rareori, iritație gastrointestinală și sedare excesivă până la somnolență (mai ales la copiii mici).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AD01

FLUOXETINUM
 FLUPENTIXOLUM
 FLURBIPROFENUM
 FLUTAMIDUM
 FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM
 FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
 GANCICLOVIRUM
 GANIRELIXUM
 GEMCITABINUM
 GENTAMICINUM
 GINKGO BILOBA
 GLATIMER ACETAT
 GLIBENCLAMIDUM
 GLICLAZIDUM
 GLIMEPIRIDUM
 GLIPIZIDUM
 GLIQUIDONUM
 GLUCAGONUM
 GLUCOSAMINUM
 GLUCOSUM
 GLYCEROLUM
 GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
 GOSERELINUM
 GRANISETRONUM
 GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM

HALDOL JANSSEN PHARMACEUTICA; Cpr. 5 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (P-RF)
HALDOL JANSSEN PHARMACEUTICA; Sol. orală 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 15 sau 100 ml (P-RF)
HALOPERIDOL 1 mg; HALOPERIDOL 2 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 1 mg, 2 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-RF)
HALOPERIDOL GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Sol. orală 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-RF)
HALOPERIDOL TERAPIA SA; Sol. orală 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-RF)
HALOPERIDOL 5 mg/ml RICHTER GEDEON Ltd.; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)
HALOPERIDOL DECANOAT RICHTER GEDEON Ltd.; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)
HALOPERIDOL 5 mg TERAPIA SA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)

Ind: Tulburări psihotice; tulburări grave de comportament la copii; sindrom Gilles de la Tourette; autism infantil; coree Huntington. Greață și vărsături induse de citostatice.

Dz: Adm. orală: Psihoze și tulburări de comportament asociate: La *adulti* 0,5- 5 mg de 2-3 ori/zi; se poate crește, la nevoie, până la 75-100 mg/zi. La *copiii peste 3 ani*: 25-50 μg/kg și zi, în 2 prize; la nevoie se crește până la 150 μg/kg/zi. Combaterea vomei: 1-5 mg de 2 ori/zi. Adm inj: Psihoză acută: *Adulti*: 5-10 mg i.v. sau i.m. maxim 15-40 mg/zi. *Copii peste 10 ani*: 2,5-5 mg i.v. sau i.m.

Cind: Hipersensibilitate la haloperidol; deprimare toxică severă a sistemului nervos, provocată de alcool sau de deprimante centrale; comă; leziuni ale ganglionilor bazali; tulburări neurologice însoțite de manifestări piramidale sau extrapiramidale.

Al: Prudență în antecedente de cardiopatii grave, epilepsie, glaucom, dis-funcție hepatică, hipertiroidism, tireotoxicoză, hipokaliemie, afecțiuni respiratorii grave, IR, retenție urinară; control stomatologic repetat; vârstnici; monitorizarea hematologică, a manifestărilor precoce ale diskineziei tardive și a funcțiilor hepatice; asocieri cu amfetaminele, anticolinergicele și antihistaminicele, antiepilepticele, alcool și deprimante centrale, metildopa, levodopa, antidepresivele triciclice, inductoare enzimaticice; litiul, anticoagulatele orale, simpatomimetice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Tulburări extrapiramidale, sindrom neuroleptic malign, sedare, somnolență, agitație, insomnie, confuzie, cefalee, vertij, crize epileptice, greață și vărsături, hiperprolactinemie, tahicardie, hTA, constipație, tulburări de vedere, uscăciunea gurii, tulburări de termoreglare, retenție urinară, tulburări de erecție, edeme periferice, sudorații profuze, arsuri gastrice, scăderea tranzitorie a numărului elementelor figurate sanguine; rareori agranulocitoză și trombocitopenie, disfuncții hepatice și hepatită; foarte rar rash cutanat, urticarie sau fenomene anafilactice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N01AB01

FLUPENTIXOLUM
FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM

HALOTANE Liquid RHODIA ORGANIQUE; Lichid pt. inhal. 100%; ct. × 1 fl. × 250 ml (S)

NARCOTAN ZENTIVA AS; Lichid pt. inhal. 100%; ct. × 1 fl. × 250 ml (S)

Ind: Inducerea și menținerea anesteziei.

Dz: *Adulți:* inducerea anesteziei: 2-4% halotan; menținerea anesteziei: 0,5-2% halotan. *Copii:* inducție: 1,5-2%, menținere: 0,5-2%.

Cind: Hiperpirexie malignă sau la cei susceptibili de a dezvolta hiperpirexie malignă. Apariția icterului și a pirexiei după expunerea la halotan este o Cind pentru utilizarea lui ulterioară.

A!: Prudență în intervenții obstetricale, expunerea repetată în decurs de 3 luni, ciroza, hepatita virală sau alte afecțiuni hepatice pre-existente, leziuni intracraniene, hTA, bradicardie, feocromocitom, miastenia gravis; asigurarea unei ventilații adecvate a sălilor; asocieri cu: curarizante, aminoglicozide, adrenalină, alte simpatomimetice, aminofilină, teofilină și antidepressive triciclice; sarcină, alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Bradicardie și/sau hTA, frisoane, febră, greață și vărsături, afectare hepatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AB01

FLURBIPROFENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM

HEPARIN GALENIKA A.D.; Sol. inj. 5000 UI/ml; ct. × 5 fl. × 1 ml; ct. × 10 fl. × 5 ml (S)

HEPARIN "SANDOZ" 25000 UI/5 ml SANDOZ GmbH; Sol inj. 25000 ui/5 ml; ct. × 100 fl. × 5 ml (S)

HEPARINE SODIQUE PANPHARMA; Sol. inj. 5000 UI/ml; ct. × 10 fl. × 5 ml (S)

LIOTON BERLIN CHEMIE AG; Gel 100000 UI/100 g; ct. × 1 tub × 20 sau 50 g (OTC)

VIATROMB FORTE CSC PHARMACEUTICALS; Emulsie cut. 2400 UI/g; ct. × 1 fl. × 25 g + pompă dozatoare (OTC)

Ind: Adm. inj.: trat. trombozelor venoase și al emboliei pulmonare, trombozelor arteriale (îndeosebi IMA); profilaxia accidentelor tromboembolice venoase și arteriale; ca anticoagulant în cadrul transfuziilor, circulației extracorporale și dializei. **Ext:** sindrom varicos și complicațiile lui; flebită varicoasă postchirurgicală; complicațiile safenectomiei; traumatisme și contuzii; edeme și infiltrații localizate; hematoame subcutanate. Afecțiuni traumatice musculo-tendinoase și capsulo-ligamentare.

Dz: Adm. inj.: *adulti și copii:* inj. i.v. 400-600 UI/kg/zi; *vârstnici:* reducerea dozei la jumătate. **Ext.:** Se aplică de 1-3 ori pe zi câte 3-10 cm gel pe suprafața afectată, masând ușor.

Cind: Prudență în antecedente de trombopenie după administrare de heparină sau heparinoizi; tendință de hemoragii la pacienți cu tulburări de hemostază, cu excepția coagulopatiei de consum nedatorată heparinei; leziuni organice cu risc hemoragic; endocardite infecțioase acute (cu excepția celor ce survin pe proteze mecanice); perioada postoperatorie, după int. chir. cerebrale sau medulare; accident cerebrovascular hemoragic; alergii la heparină.

Al: Adm. inj.: controlul de laborator al coagulării sângelui și numărarea trombocitelor înainte începerii trat., apoi la intervale de 2-3 zile; evitarea manevrelor ce pot leza vasele de sânge; prudență în IH, IR, HTA, bolile vasculare retiniene, traumatisme; **Ext.:** Nu se va aplica în caz de sângerare, pe plagă sau pe mucoasă. Interacțiuni medicamentoase: acid acetilsalicilic, AINS, ticlopidina, anticoagulante orale, glucocorticoizi sistemici (doze mari), dextran 40, sarcină și alăptare.

RA: Accidente hemoragice; hematoame la locul inj. s.c. sau noduli inflamatori; rar: trombocitopenie severă, necroză cutanată la locul inj., manifestări alergice cutanate sau sistemice; osteoporoză (în cazul trat. prelungit cu doze mari); creșterea transaminazelor, eozinofilie; excepțional alopecie, priapism; câteva cazuri de hipoadosteronism cu hiperkaliemie și/sau acidoză metabolică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A01AB12

FLUTAMIDUM
FLUTICASONUM
FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM

HEXORAL® PFIZER; Sol. bucală 0,1%; ct. × 1 fl. × 200 ml + măsură doz. × 15 ml (OTC)

HEXORAL® PFIZER; Aerosol 0,1%; ct. × 1 fl. presurizat × 40 ml + sist. pulverizare (OTC)

Ind: Infecții cu germeni sensibili ale zonei oro-faringiene, inclusiv cele dentare.

Dz: Clătirea gurii, gargară, pulverizare de 2 ori/zi de preferat dimineața și seara, după mese și toaleta locală.

Cind: Alergie la unul din componenți.

RA: După întrebuințare îndelungată apare o iritație locală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G02CA

FLUTICASONUM
 FLUTRIMAZOLUM
 FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
 GANCICLOVIRUM
 GANIRELIXUM
 GEMCITABINUM
 GENTAMICINUM
 GINKGO BILOBA
 GLATIMER ACETAT
 GLIBENCLAMIDUM
 GLICLAZIDUM
 GLIMEPIRIDUM
 GLIPIZIDUM
 GLIQUIDONUM
 GLUCAGONUM
 GLUCOSAMINUM
 GLUCOSUM
 GLYCEROLUM
 GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
 GOSERELINUM
 GRANISETRONUM
 GUAIFENESINUM
 HALOPERIDOLUM
 HALOTHANUM
 HEPARINUM
 HEXETIDINUM
 HEXOPRENALINUM

GYNIPRAL® 0,5 mg NYCOMED GmbH; Cpr. 0,5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

GYNIPRAL® 10 µg NYCOMED GmbH; Sol inj. 10 µg/2 ml; ct. × 5 f. × 2 ml (S/P-RF)

Ind: Sol. inj.: Tocoliză acută: Suprimarea travaliului în timpul naşterii în caz de asfixie acută intrauterină (suferinţă fetală), oprirea travaliului înainte de cezariană. În caz de prezentatie transversă, înaintea efectuării manevrelor de rotație, în prolaps de cordon ombilical sau travaliu distocic. Ca măsură de urgență pentru tratamentul pacientelor în ambulator în caz de naștere prematură, înainte de transportarea la spital. Tocoliză masivă: Oprirea travaliului prematur eficient cu angajarea fătului și/sau dilatarea colului uterin. Tocoliză pe termen lung: Prevenirea travaliului prematur cu contracții uterine de intensitate și frecvență crescute fără angajarea capului sau dilatarea colului uterin. Oprirea contracțiilor uterine înaintea timpului, în timpul și după cerclajul colului uterin.

Cpr.: Iminența de avort și de naștere prematură (în principal pentru continuarea tratamentului perfuzabil).

Dz: Sol. inj.: Tocoliză acută: 10 mg. în continuare, dacă este necesar, tratamentul poate fi continuat prin perfuzie. Tocoliză masivă: Se va începe tratamentul cu 10 µg (o fiolă de 2 ml) în bolus, urmată de perfuzie de 0,3 µg/min. Alternativ se poate da o perfuzie de 0,3 µg/min fără o injectare prealabilă în bolus. Tocoliză pe termen lung: 0,075 µg/min ca perfuzie în picături lente. După oprirea travaliului, tocoliza poate fi menținută pentru 48 ore cu comprimate. **Observație:** dozele menționate mai sus sunt doar instrucțiuni generale, tocoliza necesitând o ajustare individuală pentru fiecare pacientă tratată.

Cpr.: Iminența de avort sau de naștere prematură: După o administrare anterioară de soluție injectabilă, tratamentul cu comprimate a 0,5 mg se începe cu 1-2 ore înainte de sistarea administrării perfuziei. Inițial se ia un comprimat la fiecare 3 ore, apoi la intervale mai largi, de 4-6 ore (8-4 comprimate pe zi) cu puțin lichid.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componentele preparatului. La paciente astmatice sau cu hipersensibilitate la sulfat. În: hipertiroidism, afecțiuni cardiace, în special aritmii tahicardice, miocardită, defecte de valvă mitrală și stenoza aortică subvalvulară hipertrofică, afecțiuni severe hepatice și renale, glaucom cu unghi închis, sângerări genitale severe (abruptio placenta prematură) și infecții intrauterine, alăptare.

Al: Sol. inj.: Se monitorizează frecvența cardiacă, tensiunea arterială a mamei și alura ventriculară a fătului în timpul folosirii. Înainte și în timpul tratamentului se recomandă controale ECG regulate. La pacientele cu sensibilitate individuală crescută față de medicamentele simpatomimetice, se va administra sub supraveghere medicală foarte atentă, în doză redusă, care se ajustează individual. Se întrerupe tratamentul imediat în cazul apariției de: dispnee, angină pectorală, senzație de presiune toracică sau semne de insuficiență cardiacă. Se reduc dozele în cazul creșterii marcate a frecvenței cardiace (mai mult de 130/minut) și în cazul scăderii importante a tensiunii arteriale. Controlul glicemiei la gravide cu diabet zaharat și al nou-născutului. Se evită consumul excesiv de lichid în timpul travaliului (doza medie zilnică nu trebuie să depășească 1500 ml). Se oprește administrarea

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C03AA03

FLUTRIMAZOLUM
FLUVASTATINUM
FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM

NEFRIX ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 25 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. **(P-6L)**

Ind: Cardiopatie decompensată cu edem, stenoza mitrală cu hipertensiune pulmonară; ciroză hepatică ascitogenă; edeme de origine medicamentoasă; HTA; edeme nefrotice; diabet insipid.

Dz: *Adulți:* 25-75 mg/zi, în 1-2 prize, maxim 100 mg. *Copii:* 3-7 ani: 0,025 g/zi; 7-14 ani: 0,05 g/zi.

Cind: Hipokaliemie; alcaloză; IR gravă; IH; hipersensibilitate la hidroclorotiazidă; sarcină.

Al: Prudență în ciroză, nefropatii toxice, diabet zaharat, gută, alăptare.

RA: Trat. prelungit poate provoca hipokaliemie, alcaloză, hiperglicemie, hiperuricemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H02AB09

FLUVASTATINUM
 FLUVOXAMINUM
 FOLLITROPINUM ALFA
 FOLLITROPINUM BETA
 FORMOTEROLUM
 FOSAMPRENAVIRUM
 FOSFOCREATININUM
 FOSFOMYCINUM
 FOSINOPRILUM
 FOTEMUSTINUM
 FURAZOLIDONUM
 FUROSEMIDUM
 FUSAFUNGINUM
 GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
 GANCICLOVIRUM
 GANIRELIXUM
 GEMCITABINUM
 GENTAMICINUM
 GINKGO BILOBA
 GLATIMER ACETAT
 GLIBENCLAMIDUM
 GLICLAZIDUM
 GLIMEPIRIDUM
 GLIPIZIDUM
 GLIQUIDONUM
 GLUCAGONUM
 GLUCOSAMINUM
 GLUCOSUM
 GLYCEROLUM
 GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
 GOSERELINUM
 GRANISETRONUM
 GUAIFENESINUM
 HALOPERIDOLUM
 HALOTHANUM
 HEPARINUM
 HEXETIDINUM
 HEXOPRENALINUM
 HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM

FLEBOCORTID NILE CO.; Pulb. pt. sol. inj. 100 mg; ct. × 1 f. pulb. + 1 f. solv. × 2 ml (**P-RF**)

HYDROCORTISONE 100 mg; HYDROCORTISONE 500 mg HEMOFARM; Liof. pt. sol. inj. 100 mg, 500 mg; ct. × 1 fl. liof. + 1 f. solv. × 2 ml, respectiv 4 ml (**P-RF**)

HYDROCORTISONE NA SUCCIN. E.I.P.I.C.O.; Pulb. pt. sol. inj. 100 mg hidrocortizon succinat sodic; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 2 ml (**P-RF**)

HIDROCORTIZON ANTIBIOTICE SA; Ung. 1% hidrocortizon acetat; ct. × 1 tub × 20 g (**P-RF**)

HIDROCORTIZON HEMISUCCINAT 25 mg/5 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. A: hidrocortizon hemisuccinat 25 mg/ml; Sol. inj. B: Solvent soluție hidrogenocarbonat de sodiu 0,225%; ct. × 1 f. × 1 ml sol. A + 1 f. × 4 ml sol. B; ct. × 5 f. × 1 ml sol. A + 5 f. × 4 ml sol. B (**S/P-RF**)

Ind: Insuficiență acută corticosuprarenaliană; adrenalectomie bilaterală; șoc anafilactic și alte reacții alergice grave; infecții generalizate cu toxicitate ridicată; LES; pneumonie prin aspirație.

Dz: Inj. i.m. i.v. sau perf. i.v. 100-500 mg, repetat la intervale de 1, 3, 6 sau 10 ore, în funcție de reacția pacientului.

Cind: Herpes simplex (keratite), psihoze acute, tuberculoză latentă.

Al: Prudență în ulcer gastric sau duodenal activ sau latent, sindrom Cushing, diverticulită, anastomoze intestinale recente, osteoporoză, IR, infecții locale sau sistemice (poate masca simptomele infecțiilor); se evită întreruperea bruscă a trat. cu glucocorticoizi; hipocorticism exogen; intervenții chirurgicale; regim hiposodat și suplimentare a potasiului; diabet zaharat; miastenia gravis; monitorizarea potasemiei; sarcină și alăptare.

RA: Sindrom Cushing, hirsutism, acnee, balanță negativă a azotului; dezechilibre electrolitice; agravarea diabetului zaharat inclusiv hiperglicemia și glicozuria; osteoporoza reversibilă cu dificultate, necroze aseptice ale șoldului și humerusului; activarea și complicarea ulcerului gastric și duodenal, inclusiv perforarea și hemoragia; agravarea sau mascarea infecțiilor; creșterea TA; convulsii; peteșii și purpură; tulburări ale ciclului menstrual, inclusiv amenoreea, sângerarea prelungită; insomnie; tulburări psihice, euforie, nervozitate; cataractă subcapsulară posterioară; creșterea tensiunii intraoculare; creșterea presiunii intracraniene cu edem papilar; pancreatită; suprimarea creșterii la copii; eritem facial; esofagită ulceroasă; transpirații; vertij; slăbiciune; cefalee; exoftalmie. Atrofie subcutanată sau cutanată, abcesul steril, hiper- și hipo-pigmentația pot fi asociate cu glucocorticoizii injectați.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D07AB02

FLUVOXAMINUM
FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM

LOCOID® ASTELLAS PHARMA; Cremă 0,1%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)
LOCOID® ASTELLAS PHARMA; Sol. cut. 0,1%; ct. × 1 fl. × 30 ml (*P-RF*)
LOCOID® CRELO ASTELLAS PHARMA; Emulsie 0,1%; ct. × 1 fl. × 30 g (*P-RF*)
LOCOID® LIPOCREAM ASTELLAS PHARMA; Cremă 0,1%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)

Ind: Eczeme, dermatite și psoriazis.

Dz: Se aplică de 1-3 ori/zi în strat subțire pe leziune.

Cind: Infecții bacteriene (impetigo, lues, TBC, piodermite), virale (Herpes simplex, varicelă, herpes zoster, veruci vulgare, veruci plane, condiloame, molluscum contagiosum) sau fungice (Candida sau dermatofiti); leziuni cutanate ulcerate, răni, ihtioză, rozaceea facială, acneea vulgaris, dermatita periorală, fragilitate capilară tegumentară, atrofie tegumentară, pruritul perianal și genital; hipersensibilitate la compus.

Al: Trebuie evitat trat. de lungă durată și contactul cu ochii; sarcină și alăptare.

RA: Irritație ușoară, suprainfecții bacteriene, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A02AD04

FOLLITROPINUM ALFA
FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM

RUTACID KRKA; Cpr. mast. 500 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 10 cpr. (OTC)

TALCID BAYER AG; Cpr. mast. 500 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cpr. (OTC)

Ind: Gastrite, ulcere gastrice și duodenale, esofagită de reflux.

Dz: 0,5-1 g hidrotalcit oral la 1-2 ore după fiecare masă, seara la culcare sau atunci când reapar simptomele.

Cind: Hipersensibilitate la hidrotalcit sau la celelalte componente ale produsului.

Al: Prudență în IR; asocierea cu tetraciclone, preparate cu fer, digoxină, acid chenodeoxicholic, cimetidină, anticoagulante cumarinice.

RA: Doze mari pot produce diaree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01XX05

FOLLITROPINUM BETA
FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINIUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM

HYDREA BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. 500 mg; ct. × 1 fl. × 100 cps. (S/P-RF)**HYDROXYCARBAMIDE** PLIVA KRAKOW; Cps. 500 mg; fl. metalic × 1 pungă × 100 cps. (S/P-RF)

Ind: Melanom, leucemie mielocitară cronică rezistentă și carcinom ovarian recurent, metastatic ori inoperabil, carcinom primar cu celule scuamoase (epidermoid) al capului și gâtului (excluzând buzele) și carcinomul colului uterin.

Dz: *Tumori solide:* Terapie intermitentă: 80 mg/kg, p.o. în doză unică, o dată la 3 zile. Terapie continuă: 20-30 mg/kg, p.o. în doză unică zilnică. *Leucemia cronică mielocitară rezistentă:* 20-30 mg/kg, p.o. în doză unică zilnică.

Cind: Depresie medulară (< 2500 leucocite/mm³ sau <100 000 trombocite/mm³) sau anemie severă; sarcină și alăptare.

Al: Prudență la pacienți care au fost supuși anterior radioterapiei/chimioterapiei; IR severă; vârstnici; măsuri contraceptive în timpul trat.; aport suficient de lichide; monitorizarea hemoleucogramei; interacțiuni medicamentoase cu uricozurice, citarabină.

RA: Leucopenie, trombocitopenie, anemie; stomatită, anorexie, greață, vărsături, diaree și constipație; rash maculo-papular, eritem facial și eritem periferic; alopecie, hiperpigmentare, atrofierea pielii și a unghiilor, formare de scuame, papule violete; somnolență; cefalee, amețeli, dezorientare, halucinații și convulsii; afectare temporară a funcției tubulare; febră, frisoane și creșteri ale concentrațiilor enzimelor hepatice; infiltrate pulmonare difuze și dispnee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: P01BA02

FORMOTEROLUM
FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM

PLAQUENIL® SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. film. 200 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Lupus eritematos sistemic; lupus eritematos discoid; artrită reumatoidă; artrită cronică juvenilă; afecțiuni dermatologice produse sau agravate de lumina solară; malarie.

Dz: *Maladii reumatice:* inițial, 400-800 mg/zi. *Întreținere:* 200-400 mg/zi. *Afect. dermatologice:* 400 mg/zi. *Malarie:* la *adulti*, 400 mg în aceeași zi a fiecărei săptăm.; la *copii*, 6,5 mg/kg, dar nu va depăși doza pentru adult.

Cind: Maculopatie oculară preexistentă; hipersensibilitate la derivați de 4-aminochinolină.

Al: Examen oftalmologic înaintea începerii trat. și apoi anual; teste sanguine periodice; prudență în deficiențe hepatice sau renale, tulburări gastrointestinale, neurologice sau sanguine; sensibilitate la chinină, deficit G-6-PDH, porfirie, psoriazis; copii mici; asociere cu digoxină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Retinopatie cu modificări de pigmentare și defecte ale câmpului vizual; rash cutanat; modificări pigmentare ale pielii și mucoaselor, albirea părului și alopecie; dermatită exfoliativă; greață, diaree, anorexie, dureri abdominale; slăbiciune musculară, vertij, tinitus, surditate de cauză nervoasă, cefalee, labilitate emoțională; rar depresie medulară, cardiomiopatie, neuromiopatie, psihoză și convulsii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z **Toate**

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FOSAMPRENAVIRUM
FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM

Cod ATC: N05BB01**HIDROXIZIN** S/COMED SA; Dj. 25 mg; ct. × 1 fl. × 30 dj. (P-RF)**Ind:** Stări de anxietate, agitație psihomotorie, nevroze, psihoze, tulburări de somn, alcoolism, distonii neurovegetative, greață și vărsături, urticarie, prurit și dermatite alergice cu componentă psihoafectivă, sindrom Ménière.**Dz:** *Adulți și copii peste 10 ani:* 50-100 mg *Copii peste 1 an:* 1 mg/kg/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la hidroxizină, primul trimestru de sarcină, alăptare.**Al:** Prudență în IR, glaucom cu unghi închis; asocieri cu deprimante centrale, analgezicele opioide, alcool și anticoagulante cumarinice; șoferi și activități de precizie.**RA:** Somnolență, tremor, uscăciunea gurii, convulsii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FOSFOCREATININUM
FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN

Cod ATC: L01XC

ZEVALIN® SCHERING AG; Trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice pentru perfuzie, 1,6 mg/ml (*S/P-RF*)

Ind: Tratamentul limfomului non-hodgkinian.

Dz: Zevalin va fi administrat doar de către o persoană experimentată și va fi manipulat doar de către personalul medical specializat. 1 perfuzie Zevalin se administrează după 2 perfuzii cu rituximab.

Cind: Hipersensibilitate, sarcină, alăptare.

Al: Siguranța administrării și modul în care Zevalin acționează la copii și adolescenți nu au fost încă studiate.

RA: Foarte frecvente: fatigabilitate, frisoane, febră, infecții bacteriene, cefalee, durere, iritație faringiană, gastralgie, dureri ale spatelui, stare de rău (greață și vărsături), diaree, pierderea poftei de mâncare, echimoze, scăderea numărului trombocitelor, celulelor roșii sau celulelor albe sanguine, durere articulară, amețeli, tuse accentuată, respirație dificilă, prurit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AE01, M02AA13

FOSFOMYCINUM
FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM

ADVIL® BASF; Dj. 200 mg; ct. × 1, 2, 3, 5 sau 10 blist. × 10 dj. (OTC)
ANTIDOL EUROPHARM SA; Sup. 500 mg; ct. × 2 sau 50 blist. × 5 sup. (S/P-RF)
FASPIC® 400; FASPIC® 600 ZAMBON GROUP S.p.A.; Pulb. pt. susp. orală 400 mg/1 plic, 600 mg/1 plic; ct. × 12 plicuri × 3 g pulb., respectiv ct. × 30 plicuri × 3 g pulb. (P-RF)
FASPIC® 400 mg ZAMBON GROUP S.p.A.; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1, 2, 3 sau 4 blist. × 6 cpr. (P-6L)
IBALGIN® ZENTIVA AS; Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 sau 12 cpr. (OTC)
IBALGIN FORTE® ZENTIVA AS; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 sau 12 cpr. (P-6L)
IBALGIN BABY® ZENTIVA AS; Susp. orală 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-RF)
IBALGIN® ZENTIVA AS; Gel 5%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)
IBUFEN® ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
IBUGESIC® DAR AL DAWA; Susp. orală 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-RF)
IBUPROFEN POLFA; Dj. 200 mg; ct. × 5 blist. × 20 dj. (OTC)
IBUPROFEN 200 mg ARENA GROUP SA; Cps. 200 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. (OTC)
IBUPROFEN 200; IBUPROFEN 400; IBUPROFEN 600 C/PLA; Cpr. film. 200 mg, 400 mg, 600 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC/P-6L)
IBUPROFEN MK MARK PHARMACEUTICS; Cremă 5%; ct. × 1 tub × 25 sau 45 g (OTC)
MARCOFEN® EUROPHARM; Cps. 400 mg; ct. × 2 sau 50 blist. × 6 cps. (S/P-6L)
MARCOFEN® GLAXO SMITHKLINE; Sirop 2%; ct. × 1 fl. × 120 ml (P-RF)
NUROFEN® 200 mg BOOTS HEALTHCARE; Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 blist. × 12 dj.; ct. din material plastic, cu capac flip-top × 12 dj. (OTC)
NUROFEN 200 mg BOOTS HEALTHCARE; Cps. moi 200 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 12 cps.; ct. × 1 blist. × 10 cps. (OTC)
NUROFEN FORTE BOOTS HEALTHCARE; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 12 dj. (P-6L)
NUROFEN PT. COPII BOOTS HEALTHCARE; Susp. orală 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-RF)
NUROFEN GEL BOOTS HEALTHCARE; Gel 5%; ct. × 1 tub × 20, 25, 30, 35, 50 sau 100 g (OTC)
PADUDEN® TERAPIA SA; Cps. 200 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (OTC)
PADUDEN® SR 300 mg TERAPIA SA; Cps. cu elib. prel. 300 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
PROFINAL GULF PHARMACEUTICAL IND.; Dj. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj. (OTC)
PROFINAL GULF PHARMACEUTICAL IND.; Cpr. film. 400 mg, 600 mg; ct. × 2 blist. × 12 cpr. (400 mg), ct. × 2 sau 4 blist. × 10 cpr. (600 mg) (P-6L)
REUPROFEN 200 mg; REUPROFEN 400 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. 200 mg, 400 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (OTC/P-6L)
RUPAN MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. film. 200 mg; ct. × 2, 10 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
UPFEN BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. film. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. film. (OTC)
UPFEN BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. eff. 200 mg; ct. × 2 tuburi × 10 cpr. eff. (OTC)
URGO IBUPROFEN 5% GEL LAB. URGO; Gel 5%; ct. × 1 tub. × 60 g (OTC)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B05DAN1

FOSINOPRILUM
FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM

EXTRANEAL BAXTER HEALTH CARE; Sol. dializă peritoneală 7,5%; pungă × 1,5, 2 sau 2,5 l sol (S)

Ind: Trat. IRC, în program de dializă peritoneală continuă ambulatorie (CAPD) sau dializă peritoneală automată (APD).

Dz: Maxim 2 l, o dată/zi, în timpul celui mai lung schimb, de obicei în timpul nopții în CAPD, iar în APD în timpul zilei.

Cind: Alergie la polimeri derivați din amidon, maltoză sau izomaltoză; int. chir. abdominale în luna precedentă începerii trat.; fistule abdominale, tumori, plăgi deschise, hernie sau alte cazuri în care integritatea peretelui abdominal și a cavității peritoneale este compromisă.

Al: Nu se recomandă copiilor și în IRA; prudență în nutriție anormală, disfuncții respiratorii, deficit de potasiu, diabet zaharat; monitorizarea balanței hidrice, hematologice; sarcină și alăptare.

RA: Dureri abdominale, crampe musculare, hemoragii, infecții la locul de ieșire a cateterului, obstruarea cateterului, dezechilibre hidro-electrolitice, hTA, HTA.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01DB06

FOTEMUSTINUM
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM

ZAVEDOS PHARMACIA & UPJOHN; Cps. 10 mg; ct. × 1 fl. × 1 cps. (S)

ZAVEDOS SINDAN SRL/PHARMACIA & UPJOHN; Pulb. liof. pt. sol. inj. 5 mg, 10 mg; ct. × 1 fl. pulb. (S)

Ind: *Int.:* Leucemie acută nonlimfocitară (LANL), neoplasm mamar. *Inj.:* LANL la adulți pentru inducția remisiunii, leucemie acută limfocitară (LAL) ca trat. de linia a doua la adulți și copii. Cancer de sân.

Dz: *Int.:* Adulți cu LANL: 15-30 mg/m²/zi timp de 3 zile. Cancer avansat de sân: 35-45 mg/m², doză unică sau divizată pe parcursul a 3 zile consecutive repetat la fiecare 3 sau 4 săpt. *Inj.:* Adulți cu LANL: 12 mg/m² i.v. zilnic, timp de 3 zile sau 8 mg/m² i.v. zilnic timp de 5 zile. Adulți cu LAL: 12 mg/m² i.v. zilnic timp de 3 zile, copii: 10 mg/m² i.v. zilnic timp de 3 zile.

Cind: Hipersensibilitate la idarubicină sau/și la alte antracicline, afecțiuni renale sau hepatice severe, infecții greu de controlat; sarcină și alăptare.

Al: Prudență în depresie medulară preexistentă, afecțiuni cardiace preexistente și terapii anterioare cu antracicline, iradiere totală sau transplant de măduvă osoasă în antecedente, infecții sistemice, boli gastrointestinale active; monitorizarea hematologică, cardiacă și hepatică; interacțiuni cu mielosupresive, radioterapie; șoferi și activități de precizie.

RA: Mielosupresie severă, toxicitate cardiacă, alopecie, greață, vărsături, inflamații ale mucoaselor, diaree, febră, tremor; rash cutanat, creșterea enzimelor hepatice și a bilirubinei, frisoane, infecții severe.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01AA06

FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM

HOLOXAN 500 mg; HOLOXAN 1 g; HOLOXAN 2 g BAXTER ONCOLOGY; Pulb. pt. sol. perf. 500 mg, 1 g, 2 g; ct. × 1 sau 10 fl. pulb. (S)

Ind: Tumori inoperabile: carcinom bronșic, pancreatic, ovarian, mamar, tumorile testiculare, sarcoamele țesuturilor moi, limfoamele maligne.

Dz: 1,2-2,4 g/m²/zi, i.v., timp de 5 zile consecutiv sau doză unică 5 g/m².

Cind: Hipersensibilitate la ifosfamidă; depleție medulară marcată; infecții active; IR sau obstrucții ale tractului urinar; cistite; sarcină și alăptare.

Al: Monitorizare hematologică și renală; diureză corespunzătoare; adm. împreună cu mesna; prudență la vârstnici, radioterapie anterioară, diabet zaharat, IH, metastaze cerebrale, cerebropatii; asocieri cu alte citostatice, agenți nefrotoxici, vaccinuri, warfarină, allopurinol, hidroclortiazidă, clorpromazină, triiodotironină, disulfiram, sulfoniluree, fenobarbital, fenitoină, suxametoniu.

RA: Leucopenie, trombocitopenie, anemie, cistită hemoragică, afecțiuni renale, sdr. Fanconi, encefalopatie, greață și vărsături, alopecie, azoospermie sau oligospermie, tulburări de ovulație, amenoree, fibroză pulmonară interstițială cronică, pneumonii, inflamații cutanate; reacții de hipersensibilizare, creșterea enzimelor hepatice și/sau a bilirubinei, anorexie, constipație, flebite, febră, polineuropatii, tulburări de vedere.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

FUROSEMIDUM
FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AC11

ILOMEDIN® 20 SCHERING AG; Conc. pt. sol. perf. 20 µg/ml; ct. × 5 f. × 1 sau 2,5 ml (S)

Ind: Trat. trombangeitei obliterante avansate (boala Buerger) cu ischemie gravă a membrelor, când revascularizația nu este indicată. Afecțiuni arteriale periferice ocluzive, în special al acelor cu risc de amputație, la care int. chir. sau/și angioplastia nu sunt posibile. Sindrom Raynaud invalidant, care nu a răspuns la alt trat.

Dz: Adm. sub strictă supraveghere în spital. Inițial 0,5 ng/kg/min, timp de 30 minute. Apoi este crescută la intervale de 30 de minute, cu câte 0,5 ng/kg/min până la maximum 2 ng/kg/min. Durata tratamentului este de până la 4 săptămâni. În IR sau ciroză hepatică se reduce doza la jumătate. Nu se recomandă perfuzarea continuă câteva zile datorită dezvoltării tahifilaxiei și apariției unui rebound cu hiperagregabilitate trombocitară la oprirea tratamentului.

Cind: Hipersensibilitate la iloprost. Afecțiuni cu risc hemoragic (ulcer gastro-duodenal activ, traumatisme, hemoragie intracraniană). Afecțiuni coronariene severe sau angor instabil; infarct miocardic în ultimele 6 luni; IC congestivă cronică sau acută; aritmii; suspiciune de edem pulmonar. Sarcină și alăptare.

Al: Nu se amână intervenția chirurgicală la pacienții care necesită de urgență amputare. Monitorizarea funcției cardiace și a TA. Iloprost poate fi folosit numai după diluare iar nici un alt medicament nu se adăugă în soluția preparată pentru perfuzie. Ingestia produsului sau contactul cu mucoasele trebuie evitate. Atenție la asocieri cu alfa-blocante, blocantele canalelor de calciu, vasodilatatoare directe, IEC, acid acetilsalicilic sau alte AINS, molsidomină.

RA: Înroșirea feței, stare generală de rău, crampe abdominale, diaree, transpirație, senzație de căldură și slăbiciune musculară, dureri în membrul afectat, în mușchii masticatori și în maxilar, parestezii, febră, frison, confuzie, apatie, sedare, agitație, scăderea sau creșterea TA, tahicardie, aritmii, extrasistole, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

FUSAFUNGINUM
GABAPENTINUM
GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM

Cod ATC: L01XX28

GLIVEC® 50 mg; GLIVEC® 100 mg NOVARTIS PHARMA; Cps. 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 12 cps. (50 mg), ct. × 2, 4, 8, 10 sau 15 blist. × 12 cps. **(S)**

Ind: Trat. leucemie granulocitară cronică (LGC), cu cromozom Philadelphia pozitiv, în criză blastică, în fază accelerată sau în fază cronică după eșecul trat. cu interferon alfa.

Dz: 400 mg/zi pentru pacienții cu LGC în fază cronică și 600 mg/zi pentru pacienții în fază accelerată sau criză blastică.

Cind: Hipersensibilitate la produs.

Al: Prudență la copii, hepatici, IR; monitorizarea hepatică și a hemogramei, asocieri cu inhibitori/inductori ai CYP3A4; sarcină și alăptare.

RA: Neutropenie, trombocitopenie, anemie, cefalee, greață, vomă, diaree, dispepsie, edem periorbital, dermatită, erupții, spasme musculare și crampe, dureri musculo-scheletice, tumefacții articulare, edeme, neutropenie febrilă, pancitopenie, anorexie, amețeli, tulburări de gust, parestezii, insomnie, conjunctivită, lăcrimare, revărsat pleural, epistaxis, hemoragii gastrointestinale, melenă, ascită, ulcer gastric, reflux gastroesofagian, ulceratii bucale, edem palpebral, prurit, eritem, piele uscată, alopecie, sudorație nocturnă, febră, oboseală, slăbiciune, rigiditate, creștere în greutate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GABAPENTINUM
 GADOBUTROLUM
 GADODIAMIDUM
 GALANTAMINUM
 GANCICLOVIRUM
 GANIRELIXUM
 GEMCITABINUM
 GENTAMICINUM
 GINKGO BILOBA
 GLATIMER ACETAT
 GLIBENCLAMIDUM
 GLICLAZIDUM
 GLIMEPIRIDUM
 GLIPIZIDUM
 GLIQUIDONUM
 GLUCAGONUM
 GLUCOSAMINUM
 GLUCOSUM
 GLYCEROLUM
 GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
 GOSERELINUM
 GRANISETRONUM
 GUAIFENESINUM
 HALOPERIDOLUM
 HALOTHANUM
 HEPARINUM
 HEXETIDINUM
 HEXOPRENALINUM
 HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 HYDROCORTISONUM
 HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
 HYDROTALCITUM
 HYDROXYCARBAMIDUM
 HYDROXYCHLOROQUINUM
 HYDROXYZINUM
 IBRITUMOMABUM TIUXETAN
 IBUPROFENUM
 ICODextrinum
 IDARUBICINUM
 IFOSFAMIDUM
 ILOPROSTUM
 IMATINIBUM
IMIDAPRILUM

Cod ATC: C09A A16

TANATRIL 5 mg; TANATRIL 10 mg; TANATRIL 20 mg LAB. FOURNIER; Cpr. 5 mg, 10 mg sau 20 mg; ct. × 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 100 sau 1000 cpr. (S/P-6L)

Ind: Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale.

Dz: Se adm. oral, preferabil cu 15 minute înainte de masă. **Adulți:** Inițial 5 mg imidapril o dată pe zi. Dacă nu s-a obținut un control optim al tensiunii arteriale după cel puțin 3 săptămâni de tratament, doza zilnică poate fi crescută până la 10 mg clorhidrat de imidapril, care a fost dovedită a fi cea mai eficace doză zilnică. La unii pacienți poate fi necesară doza maximă recomandată: 20 mg/zi. **Vârstnici** (65 de ani sau peste): Inițial 2,5 mg o dată pe zi. Doza zilnică trebuie ajustată în funcție de răspunsul tensiunii arteriale (maxim 10 mg o dată pe zi). Insuficiența renală cu clearance-ul creatininei între 30 ml/min și 80 ml/min: se începe tratamentul cu 2,5 mg/zi. La pacienți cu clearance al creatininei sub 10 ml/min și până la 29 ml/min nu trebuie administrat. Insuficiență hepatică: inițial 2,5 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la clorhidratul de imidapril, alți IECA sau oricare dintre excipienții produsului; Antecedente de edem angioneurotic asociat cu tratament anterior cu IECA; Angioedem ereditar/idiopatic; Sarcină; Alăptare; Hipertensiune renovasculară; Insuficiență renală cu sau fără hemodializă (clearance-ul creatininei < 10 ml/min). Copii.

Al: Prudență la pacienți cu psoriasis, hipertensiune renovasculară, stenoză aortică, cardiomiopatie hipertrofică, insuficiență renală, pacienți care urmează un tratament de LDL afereză cu dextran sulfat, hipersensibilitate la toxine și mușcătura insectelor. Pacienți cu risc crescut de hipotensiune arterială la doza inițială: se corectează deficitul hidric și/sau electrolitic, se întrerupe terapia cu diuretice cu 2 - 3 zile înainte de tratamentul cu IEC. La pacienții hipertensivi cu insuficiență cardiacă asociată s-a observat hipotensiune arterială simptomatică după tratament cu IECA. La acești pacienți doza inițială trebuie să fie de 2,5 mg clorhidrat de imidapril o dată pe zi, sub stricta supraveghere medicală. Pacienții cu risc crescut de hipotensiune arterială la doza inițială trebuie supravegheați timp de 6-8 ore de la administrarea primei doze de imidapril și, de asemenea, ori de câte ori se crește doza de imidapril sau de diuretic asociat. Doza inițială trebuie să fie de 2,5 mg clorhidrat de imidapril. Acest lucru se aplică și pacienților cu angină pectorală și boală cerebrovasculară. Acești pacienți prezintă un risc crescut de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral acut, ca urmare a unei hipotensiuni arteriale de durată. Interacțiuni cu spironolactonă, triamteren, amilorid, suplimentele de potasiu, sărurile de potasiu, litiu, aneste-zice, antipsihotice, antihipertensive, alopurinol, citostatice, agenți imunosupresori, glucocorticoizi sistemici, procainamidă, AINS, antidiabetice, rifampicină, antiacide, simpatomimetice, alcool. Prudență la persoanele care conduc vehicule sau folo-sesc utilaje.

RA: Reacțiile adverse cele mai frecvente observate la grupul de pacienți tratați cu imidapril au fost: tuse, amețeli,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GADOBUTROLUM
GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM

Cod ATC: A16AB02**CEREZYME** GENZYME BV; Pulb. pt. sol. perf. 200 UI/ml., 400 UI/ml.; ct. × 1, 5 sau 25 fl (S/P-RF)**Ind:** Trat. enzimatic de substituție pe termen lung, la pacienți cu diagnostic confirmat de boală Gaucher tip I, care prezintă manifestări clinice semnificative.**Dz:** Perf. i.v. timp de 1-2 ore, inițial 60 UI/kg o dată la 2 săpt., apoi 2,5 UI/ kg de 3 ori/săpt. sau 15 UI/kg o dată la 2 săpt.**Cind:** Hipersensibilitate la produs.**AI:** Apar anticorpi IgG față de imiglucerază; risc de hipertensiune pulmonară; sarcină și alăptare.**RA:** Disconfort, prurit, arsură, inflamație sau abces steril la locul puncției venoase, prurit, congestie, angioedem, jenă toracică, tahicardie, cianoză, simptome respiratorii, hTA, greață, vomă, crampe abdominale, diaree, erupții cutanate, oboseală, amețeli, febră, rigiditate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

GADODIAMIDUM
GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01DH51

TIENAM® MERCK SHARP & DOHME; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg imipenem și 500 mg cilastatină sodică; ct. × 5 fl. pulb. (S/P-RF)

Ind: Trat. infecțiilor polimicrobiene și mixte cu agenți aerobi/anaerobi; în trat. inițial, înaintea identificării agenților etiologici implicați în: infecții abdominale, ale căilor respiratorii inferioare; ginecologice, septicemii; infecții ale tractului genitourinar, ale oaselor și articulațiilor; infecții ale pielii și țesuturilor moi; endocardite.

Dz: În scop terapeutic, la adulții cu funcție renală normală și greutate corporală > 70 kg: inf. ușoare: 250 mg la 6 ore; inf. moderate: 500-1000 mg la 8-12 ore; inf. severe: 500-1000 mg la 6-8 ore. Doza trebuie redusă pentru pacienții cu clearance al creatininei < 70 ml/min/1,73 m² și/sau greutate corporală < 70 kg. În scop profilactic: profilaxia infecțiilor postoperatorii la adulți: 1000 mg i.v. la inducerea anesteziei și 1000 mg, 3 ore mai târziu. Pentru int. chir. cu risc crescut se pot adm. două doze suplimentare de 500 mg la 8 și la 16 ore după inducție. În scop terapeutic: la copii (de 3 luni sau mai mari): copiii cu greutate corporală > 40 kg vor primi doze de adult; sugarii și copiii sub 40 kg: 15 mg/kg la 6 ore. Doza totală zilnică maxim 2 g.

Cind: Hipersensibilitate la produs. Meningită. Copii sub 3 luni. Asocierea cu ganciclovir.

Al: Înaintea începerii trat. este făcută o anamneză atentă în legătură cu o posibilă hipersensibilitate la antibiotice b-lactamice în antecedente. Dacă apare o reacție alergică, adm. va fi întreruptă și se vor lua măsurile corespunzătoare. Apariția colitei pseudomembranoase a fost raportată și se poate prezenta variat, de la forme blânde până la cele cu risc letal. De aceea trebuie prescris cu atenție la cei cu istoric de boli gastrointestinale, în special de colită. Tratamentul anticonvulsivant trebuie continuat la pacienții cu tulburări convulsive cunoscute. Dacă apar tremor focal, mioclonii sau convulsii, pacienții vor fi consultați neurologic și vor începe trat. anticonvulsivant, dacă acesta nu era instituit. Sarcină și alăptare.

RA: Eritem, durere și indurație locală, tromboflebită; rash, prurit, urticarie, sd. Steven-Johnson, angioedem, necroliză epidermică toxică, candidoză, febră, reacții anafilactice; greață, vărsături, diaree, pătarea dinților, colita pseudomembranoasă; eozinofilie, leucopenie, neutropenie, agranulocitoză, trombocitopenie, prelungirea timpului de protrombină, creșteri ale transaminazelor serice, bilirubinei, fosfatazei alcaline serice, rar hepatită; oligurie/anurie, poliurie, IRA, stări confuzionale sau convulsii, pierderea auzului, modificări ale gustului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GALANTAMINUM
GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODextrinum
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM

Cod ATC: D06BB10**ALDARA® 5% 3M HEALTHCARE;** Cremă 5%; ct. × 12 plicuri unidoză × 250 mg cremă (**S/P-RF**)**Ind:** Trat. la adulți a condiloamelor ano-genitale externe.**Dz:** Se aplică de 3 ori pe săpt. și se lasă pe piele 6-10 ore.**Cind:** Hipersensibilitate la produs.**Al:** Prudență la adm. în zona prepuțului la bărbații fără circumcizie, vârstnici; nu se recomandă la trat. condiloamelor interne; sarcină și alăptare.**RA:** Eritem, escoriații, scuame, edeme, indurație, ulcerare, cruste și vezicule, cefalee, simptome de tip gripal și mialgii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C03BA11

GANCICLOVIRUM
GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM

IMPAMID® 2,5 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 2,5 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. **(P-6L)**
INDAPAMID LPH® 1,5 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. elib. prel. 1,5 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-6L)**
INDAPAMID LPH® 2,5 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 2,5 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 15 cpr. **(S/P-6L)**
INDAPAMID 1,5 mg; INDAPAMID 2,5 mg LAROPHARM SRL; Cpr. film. elib. prel. 1,5 mg, cpr. film. 2,5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
INDAPMAG MAGISTRA C&C; Cpr. 2,5 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
INDAPMAG SR MAGISTRA C&C; Cpr. cu elib. prel. 1,5 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
INDATER® 2,5 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 2,5 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
RAWEL KRKA; Cpr. film. elib. prel. 1,5 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
TERTENSIF® SR LAB. SERVIER; Cpr. cu elib. prel. 1,5 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. **(P-6L)**
VALUTENS ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 2,5 mg; ct. × 3 sau 150 blist. × 10 cpr. **(S/P-6L)**

Ind: HTA esențială.

Dz: 2,5 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la indapamidă, accidente vasculare cerebrale recente; afecțiuni hepatice grave.

Al: Supravegherea nivelurilor kaliemiei și uricemiei; prudență în gută, asocieri cu litiul, medicații proaritmogene, glucocorticoizi, alte diuretice care elimină potasiu, laxativele, AINS, antidiabeticele orale, antiaritmice, antiHTA, vasodilatatoare, neuroleptice; sarcină și alăptare.

RA: Hipokaliemie, oboseală, hTA ortostatică, hiperuricemie, alergii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GANIRELIXUM
GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM + CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM

Cod ATC: J05AE02

CRIXIVAN® 100 mg; CRIXIVAN® 200 mg; CRIXIVAN® 333 mg; CRIXIVAN® 400 mg MERCK SHARP & DOHME; Cps. 100 mg, 200 mg, 333 mg, 400 mg; ct. × 1 fl. × 180 cps. (100 mg, 400 mg); ct. × 1 fl. × 360 cps. (200 mg); ct. × 1 fl. × 135 cps. (333 mg) **(S/P-RF)**

Ind: Trat. adulților, adolescenților și copiilor de 4 ani și peste, infectați cu HIV-1.

Dz: *Adulți:* 800 mg p.o. la 8 ore. *Copii și adolescenți* 500 mg/m² p.o la 8 ore.

Cind: Hipersensibilitate la indinavir.

Al: Risc de nefrolitiază (monitorizarea funcției renale și hidratare); prudență în hemofilie (tip A sau B), IH ușoară sau moderată, IR; asocieri cu terfenadină, cisapridă, astemizol, alprazolam, triazolam, pimozidă, derivați de ergot, rifampicină, statine, sildenafil, warfarină, rifabutină, delavirdină, ritonavir, saquinavir, didanozină, fenobarbital, fenitoină, dexametazonă și carbamazepină; sarcină și alăptare.

RA: Greață, cefalee, diaree, astenie, erupții cutanate, modificarea gustului, piele uscată, dureri abdominale, dispepsie, flatulență, insomnie, prurit, hiperestezie, uscăciunea gurii, disurie, regurgitații acide, parestezii și mialgii, nefrolitiază, piurie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, rezistență la insulină și hiperglicemie, redistribuirea țesutului adipos, creșteri ale volumului eritrocitar mediu, transaminazelor, bilirubinei indirecte, bilirubinei serice totale; scăderea neutrofilelor; hematurie, proteinurie, cristalurie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GEMCITABINUM
GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM

Cod ATC: M02AA23, M01AB01, S01BC01

INDOCOLLYRE LAB. CHAUVIN; Sol. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)
INDOMETACIN TERAPIA SA; Cps. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (**P-6L**)
INDOMETACIN ANTIBIOTICE SA; Gel 1%; Ung. 4%; ct. × 1 tub × 40 g, respectiv ct. × 1 tub × 35 g (**OTC**)
INDOMETACIN ANTIBIOTICE SA; Sup. 50 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (**P-RF**)
INDOMETACIN EUROPARM SA; Sup. 50 mg; ct. × 2 folii × 5 sup. (**P-6L**)
INDOMETACIN 25 mg LAROPHARM SRL; Cps. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (**P-RF**)
INDOMETACIN MK MARK PHARMACEUTICS SRL; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 35 g (**OTC**)
INDOMETACIN OZONE LABORATORIES Ltd.; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 35 g (**OTC**)
INDOMETACIN SINTOFARM SA; Sup. 50 mg; ct. × 2 folii × 5 sup. (**P-6L**)
INDOMETACIN 50 mg MAGISTRA C&C; Sup. 50 mg; ct. × 2 blist. × 5 sup. (**P-RF**)
INDOMETACIN 25 mg; INDOMETACIN 50 mg ARENA GROUP SA; Cps. 25 mg, 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (25 mg), ct. × 2 blist. × 10 cps. (50 mg) (**P-6L**)
INDOMETACIN 4% HYPERION; Ung. 4%; ct. × 1 tub × 25 sau 40 g (**OTC**)
INDOSIN GEL SINTOFARM SA; Gel 2%; ct. × 1 tub × 40 g (**OTC**)

Ind: Artrită reumatoidă cronică și pusee acute; spondilartrită anchilopoietică; artroză degenerativă; disfuncții musculo-scheletale acute; dureri cu localizare lombo-sacrală; gută (puseu acut); periartrită, tendinită, tenosinovită, bursită, capsulită; dismenoree primară; inflamații, dureri și edeme în afecțiuni și după intervenții chirurgicale ORL, stomatologie, ortopedie. Ung: Afecțiuni reumatismale, leziuni, inflamații și dureri de origine circulatorie, degerături.

Dz: *Int.:* 50-200 mg/zi, în funcție de indicație. *Ung.:* local de 2-3 ori pe zi.

Cind: Ulcer peptic activ, leziuni gastrointestinale recurente în antecedente, alergie la indometacină, aspirină sau alți AINS; hemofilie sau alte tulburări hemoragice; IR și IH severă; copii sub 14 ani. Aplicarea pe mucoase și leziuni cutanate (ulcer de gambă, supurații). Sarcină și alăptare.

Al: Prudență la vârstnici, pacienți cu tulburări de coagulare, tulburări psihiatrice, parkinsonism, epilepsie, IC, HTA, disfuncții hepatice sau renale; asocieri cu ticlopidină, aspirină și alți salicilați sau AINS, anticoagulante orale și heparină, probenecid, litiu, beta-blocante, diuretice tiazidice și care economisesc potasiu, metotrexat; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, insomnie, amețeală, somnolență, stări de confuzie, tinitus, greață, vărsături, dispepsie, ulceratie și hemoragie gastrointestinală, edem periferic, HTA, palpitații, tahicardie, aritmii, disfuncții renale și hepatice (rar icter), tulburări de vedere, discrazie sanguină, hiperglicemie, glicozurie, hematurie, creșteri/scăderi în greutate, manifestări respiratorii acute (dispnee, astm), reacții alergice și anafilactice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

GENTAMICINUM
GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AA12

REMICADE 100 mg SCHERING PLOUGH CENTRAL EAST AG; Pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg/fl.; ct. × 1, 2 sau 3 fl. (S)

Ind: Artrită reumatoidă. Boala Crohn activă și severă, trat. bolii Crohn cu fistule și activă. Spondilita anchilopoetică.

Dz: Artrită reumatoidă: perf. 3 mg/kg, timp de 2 ore, urmate de doze suplimentare de 3 mg/kg, la 2 și la 6 săpt. de la prima perfuzie și apoi o dată la 8 săpt. Se asociază cu metotrexat. *Boala Crohn severă și activă:* p.i.v. 5 mg/kg, timp de 2 ore, apoi perfuzii adiționale la 2 și 6 săpt. urmate de perfuzii la fiecare 8 săpt. (trat. de menținere). *Boala Crohn cu fistule și activă:* perf. inițială cu 5 mg/kg, în timp de 2 ore, repetat la 2 și 6 săpt. urmate de perfuzii adiționale la 8 săptămâni. *Spondilita anchilopoetică:* p.i.v. 5 mg/kg, timp de 2 ore, repetat la 2 și 6 săpt. de la prima perfuzie, apoi la fiecare 6 sau 8 săpt.

Cind: Tuberculoză, hipersensibilitate la infliximab și la alte proteine murine, sepsis, infecții manifeste clinic și/sau abcese, infecții oportuniste. Insuficiență cardiacă congestivă severă (NYHA clasa III-IV).

Al: Hipersensibilitate (de tip IV) la repetarea trat. după 2-4 ani; infecțiile trebuie tratate înaintea adm. de infliximab; nu se recomandă trat la copiii, vârstnici, boli hepatice sau renale, sarcină și alăptare.

RA: Infecții virale, febră, abcese, celulită, sepsis, vindecare întârziată a plăgilor, infecții bacteriene, autoanticorpi, anomalii ale factorilor complementului, anemie, leucopenie, limfadenopatie, limfocitoză, limfopenie, neutropenie, depresie, stare de confuzie, agitație, amnezie, apatie, nervozitate, somnolență, cefalee, conjunctivită, endoftalmită, cheratoconjunctivită, HTA, echimoze/hematoame, hTA, sincopă, peteșii, tromboflebită, bradicardie, palpitații, vasospasm, infecții ale tractului respirator, dispnee, sinuzită, epistaxis, bronhospasm, pleurezie, reacții alergice, greață, diaree, dureri abdominale, dispepsie, constipație, colecistită, rash, prurit, urticarie, hipersudorație, dermatită fungică/onicomicoză, eczemă/seboree, hordeolum, erupție buloasă, furunculoză, hipercheratoză, reacție de fotosensibilitate, rozacee, veruci, infecții ale tractului urinar, pielonefrită, piurie, mialgii, artralгии, vaginite, durere toracică, edem, reacții la locul de injectare. Hipersensibilitate de tip IV. Tulburări limfoproliferative.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GINKGO BILOBA
GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM +CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM

Cod ATC: J05AX05**ISOPRINOSINE® EWOPHARMA**; Cpr. inosin dimepranol acedoben 500 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. **(P-6L)****Ind:** Herpes zoster, herpes simplex I și II, bronșite virale, panencefalita sclerozantă subacută, eucefalite virale, rujeolă, varicelă, oreion, gripă, hepatite infecțioase, pre-SIDA.**Dz:** *Adulți:* 50 mg/kg/zi; *copii sub 5 ani:* 50-100 mg/kg/zi; *copii peste 5 ani:* 50 mg/kg/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la produs.**Al:** Prudență în gută; asocierea cu imunodepresive.**RA:** Greață.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10AB01

GLATIMER ACETAT
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE

ACTRAPID® 100 UI/ML NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 10 ml (S/P-6L)
ACTRAPID® PENFILL NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
ACTRAPID® NOVOLET 100 UI/ML NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)
HUMULIN® M3 LILLY FRANCE; Susp. inj. 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-6L)
HUMULIN® M3 (30/70) LILLY FRANCE; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
HUMULIN® N LILLY FRANCE; Susp. inj. 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-6L)
HUMULIN® N LILLY FRANCE; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
HUMULIN® R LILLY FRANCE; Susp. inj. 40 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-6L)
HUMULIN® R LILLY FRANCE; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
INSULATARD® 100 UI/ML NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 10 ml (S/P-6L)
INSULATARD® NOVOLET 100 UI/ML NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
INSULATARD® PENFILL 100 UI/ML NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® BASAL 100 UI/ml suspensie injectabilă în cartuș AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 4, 5 sau 10 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® BASAL 100 UI/ml suspensie injectabilă în flacon AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 5 ml (S/P-6L)
INSUMAN® BASAL OptiSet® 100 UI/ml suspensie injectabilă AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 3, 4, 5 sau 10 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® COMB 25 100 UI/ml suspensie injectabilă în cartuș AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 4, 5 sau 10 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® COMB 25 100 UI/ml suspensie injectabilă în flacon AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 5 ml (S/P-6L)
INSUMAN® COMB 25 OptiSet® 100 UI/ml suspensie injectabilă AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 3, 4, 5 sau 10 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® COMB 50 100 UI/ml suspensie injectabilă în cartuș AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 4, 5 sau 10 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® COMB 50 OptiSet® 100 UI/ml suspensie injectabilă AVENTIS PHARMA; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 3, 4, 5 sau 10 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® RAPID 100 UI/ml soluție injectabilă în cartuș AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 4, 5 sau 10 cartușe × 3 ml (S/P-6L)
INSUMAN® RAPID 100 UI/ml soluție injectabilă în flacon AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 5 ml (S/P-6L)
INSUMAN® RAPID OptiSet® 100 UI/ml soluție injectabilă AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 3, 4, 5 sau 10 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10AD05

NOVOMIX® 30 PENFILL® 100 U/ml NOVO NORDISK A/S; Susp. inj. insulină aspart solubilă 30% și protamin insulină aspart cristalizată 70%; ct. × 5 cartușe × 3 ml **(S/P-6L)**

NOVOMIX® 30 FLEXPEN® 100 U/ml NOVO NORDISK A/S; Susp. inj. insulină aspart solubilă 30% și protamin insulină aspart cristalizată 70%; ct. × 5 sau 10 pen-uri × 3 ml **(S/P-6L)**

NOVORAPID® 100 U/ml NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. insulină aspart 100 UI/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml **(S/P-6L)**

NOVORAPID® PENFILL® 100 U/ml NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. insulină aspart 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml **(S/P-6L)**

NOVORAPID® FLEXPEN® 100 U/ml NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. insulină aspart 100 UI/ml; ct. × 5 sau 10 pen-uri × 3 ml **(S/P-6L)**

Ind: Diabet zaharat.

Dz: Doza este individuală și determinată de către medic în concordanță cu nevoile pacientului. În mod normal se asociază cu o insulină cu acțiune intermediară sau prelungită, adm. cel puțin o dată pe zi. Cerința individuală de insulină este cuprinsă între 0,5-1,0 UI/kg/zi

Cind: Hipoglicemie; Hipersensibilitate la insulina aspart sau la oricare din excipienți.

Al: Control metabolic complet, cu monitorizarea glicemiei; prudență la vârstnici, infecții, stări febrile, afecțiuni renale sau hepatice, asocieri cu antidiabetice orale, octreotid, IMAO, a-blocante, IEC, salicilați, alcool, steroizi anabolizanți, contraceptive orale, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, simpatomimetice, danazol, fenitoină, litiu, fenotiazine, heparină, acid nicotinic; șoferi și activități de precizie. Este recomandată monitorizarea gravidelor cu diabet zaharat de-a lungul sarcinii sau în perioada de concepție.

RA: Hipoglicemie (transpirații reci, piele rece, paloare, nervozitate, tremor, anxietate, astenie marcată, confuzie, dificultate în concentrare, somnolență, foame excesivă, tulburări de vedere temporare, cefalee, greață și palpitații), edeme și anomalii de refracție, hipersensibilitate locală (eritem, inflamație, prurit și lipodistrofie la locul injectiei), reacții de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR

Cod ATC: A10AE05

LEVEMIR® FLEXPEN® 100 U/ml NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. insulină detemir 100 UI/ml; ct. × 1, 5 sau 10 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)

LEVEMIR® PENFILL® 100 U/ml NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. insulină detemir 100 UI/ml; ct. × 1, 5 sau 10 cartușe × 3 ml (S/P-6L)

Ind: Diabet zaharat.

Dz: Doza este individuală și determinată de către medic în concordanță cu nevoile pacientului. Se administrează o dată sau de două ori pe zi.

Cind: Hipoglicemie; Hipersensibilitate la insulina detemir sau la oricare din excipienți.

A!: Control metabolic complet, cu monitorizarea glicemiei; prudență la vârstnici, infecții, stări febrile, afecțiuni renale sau hepatice, asocieri cu antidiabetice orale, octreotid, IMAO, □-blocante, IEC, salicilați, alcool, steroizi anabolizanți, contraceptive orale, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, simpatomimetice, danazol, fenitoină, litiu, fenotiazine, heparină, acid nicotinic; șoferi și activități de precizie. Prudență în cazul administrării în timpul sarcinii și alăptării.

RA: Hipoglicemie (transpirații reci, piele rece, paloare, nervozitate, tremor, anxietate, astenie marcată, confuzie, dificultate în concentrare, somnolență, foame excesivă, tulburări de vedere temporare, cefalee, greață și palpitații), edeme și anomalii de refracție, hipersensibilitate locală (eritem, inflamație, prurit și lipodistrofie la locul injectiei), reacții de hipersensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10AE04

LANTUS® 100 UI/ml soluție injectabilă în cartuș AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 3,64 mg/ml (100 UI/ml); ct. × 4, 5 sau 10 cartușe × 3 ml (S/P-6L)

LANTUS® 100 UI/ml soluție injectabilă în flacon AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 3,64 mg/ml (100 UI/ml); ct. × 1, 2, 5 sau 10 fl. × 5 ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-6L)

LANTUS® OptiSet® 100 UI/ml soluție injectabilă AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 3,64 mg/ml (100 UI/ml); ct. × 3, 4, 5 sau 10 pen-uri × 3 ml (S/P-6L)

Ind: Diabet zaharat.

Dz: Se adm. zilnic, într-o singură injecție s.c., seara. Doza de insulină se individualizează pe baza monitorizării metabolice stricte.

Cind: Hipersensibilitate la insulină. Hipoglicemie.

Al: Nu este insulina de ales pentru trat. cetoacidozei diabetice; prudență la copii, IH sau IR, vârstnici, stenoza a arterelor coronare sau a vaselor cerebrale, retinopatie proliferativă, afecțiuni intercurrente; simptomele de alarmă ale hipoglicemiei pot fi modificate la anumite grupe de risc (pacienții la care controlul glicemiei este ameliorat marcat; la care hipoglicemia se dezvoltă treptat; vârstnici; cu neuropatie vegetativă; cu antecedente de diabet zaharat; cu afecțiuni psihiatrice; sub trat. concomitent cu alte medicamente); interacțiuni medicamentoase cu antidiabetice orale, IEC, disopiramidă, fibrati, fluoxetină, IMAO, pentoxifilină, propoxifen, salicilați, sulfonamide, glucocorticoizi, danazol, diazoxid, diuretice, glucagon, HIN, estrogeni, fenotiazine, somatotropină, hormoni tiroidieni, beta-blocante, clonidină, săruri de litiu, alcool; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Hipoglicemie, amauroză tranzitorie, lipodistrofie, eritem, durere, prurit, papule, inflamație și edem la locul injectării, reacții alergice, anticorpi la insulină.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10AB06

APIDRA® 100 UI/ml soluție injectabilă în cartuș AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 3,49 mg/ml (100 UI/ml); ct. × 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 sau 10 cartușe × 3 ml (**S/P-6L**)

APIDRA® 100 UI/ml AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 3,49 mg/ml (100 UI/ml); ct. × 1, 2, 4 sau 5 fl. × 10 ml (**S/P-6L**)

APIDRA® 100 UI/ml soluție injectabilă în cartuș pentru OptiClik AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 3,49 mg/ml (100 UI/ml); ct. × 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 sau 10 cartușe × 3 ml (**S/P-6L**)

APIDRA® 100 UI/ml soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut AVENTIS PHARMA; Sol. inj. 3,49 mg/ml (100 UI/ml); ct. × 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 sau 10 pen-uri × 3 ml (**S/P-6L**)

Ind: Diabet zaharat.

Dz: Se adm. cu puțin timp (0-15 min.) înainte sau după mese. Insulina glulizina are o instalare mai rapidă a acțiunii și o durată mai scurtă a acțiunii decât insulina umană solubilă. Trebuie utilizată în regimuri terapeutice care includ insulina cu durată de acțiune intermediară sau lungă sau analogi de insulină bazală (solubilă) și poate fi administrată în asociere cu antidiabetice orale. Se administrează prin injectare subcutanată sau prin perfuzie subcutanată continuă cu ajutorul pompei de perfuzie.

Cind: Hipersensibilitate la insulină. Hipoglicemie.

Al: Trecerea unui pacient pe un nou tip de insulină trebuie făcută numai sub supraveghere medicală strictă. Interacțiuni medicamentoase soldate cu potențarea efectului hipoglicemiant se produc la asociere cu: antidiabetice orale, inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA), disopiramidă, fibrati, fluoxetină, inhibitorii monoaminoxidazei (IMAO), pentoxifilină, propoxifen, salicilați și sulfonamide antimicrobiene. Interacțiuni cu medicamente care pot reduce efectul hipoglicemiant al insulinei: glucocorticoizi, danazol, diazoxid, diuretice, glucagon, izoniazida, derivații de fenotiazină, somatropină, simpatomimeticele (epinefrina, salbutamolul, terbutalina), hormonii tiroidieni, estrogeni, progestogenii (de ex. din contraceptivele orale), inhibitorii de protează și medicamentele antipsihotice atipice (de exemplu olanzapina și clozapina).

RA: Hipoglicemie, inflamație și edem la locul injectării, reacții alergice sistemice (urticarie, dispnee, dermatită alergică, prurit), lipodistrofie la nivelul locului de injectare, ca rezultat al omiterii schimbării locului de injectare din cadrul unei arii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10AB04

GLIQUIDONUM
GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO

HUMALOG® 100 UI/ml LILLY FRANCE; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml (S/P-6L)

HUMALOG® MIX 25; HUMALOG® MIX 50 LILLY FRANCE; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 cartușe × 3 ml (S/P-6L)

HUMALOG® MIX 25 PEN; HUMALOG® MIX 50 PEN LILLY FRANCE; Susp. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 disp. tip PEN × 3 ml (S/P-6L)

HUMALOG-PEN® 100 UI/ml LILLY FRANCE; Sol. inj. 100 UI/ml; ct. × 5 disp. tip PEN × 3 ml (S/P-6L)

Ind: Trat. pacienților cu diabet zaharat, care necesită insulină pentru controlul hiperglicemiei.

Dz: Este determinată de medic în funcție de necesități. Acțiunea rapidă a insulinei lispro impune adm. s.c. cât mai aproape de masă (15 minute înainte) comparativ cu mixturile de insulină obișnuită (30 minute înaintea mesei). Nu se adm. i.v.

Cind: Hipersensibilitate la insulina lispro sau la unul din excipienți; hipoglicemie.

Al: Control metabolic complet, cu monitorizarea glucozei; prudență la vârstnici, infecții, stări febrile, IH, IR, asocieri cu antidiabetice orale, octreotid, IMAO, a-blocante, IEC, salicilați, alcool, steroizi anabolizanți, contraceptive orale, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, simpatomimetice, danazol, fenitoină, litiu, neuroleptice fenotiazinice, heparină, acid nicotinic; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Hipoglicemie (transpirații reci, piele rece, paloare, nervozitate, tremor, anxietate, astenie marcată, confuzie, dificultate în concentrare, somnolență, foame excesivă, tulburări de vedere temporare, cefalee, greață și palpitații), edeme și anomalii de refracție, eritem, inflamație, prurit și lipodistrofie la locul injectării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GLUCAGONUM
GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM + CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A

Cod ATC: L03AB04

ROFERON® A HOFFMANN LA ROCHE; Sol. inj. 3 milioane U.I./0,5 ml; 4,5 milioane U.I./0,5 ml; 6 milioane U.I./0,5 ml; 9 milioane U.I./0,5 ml; ct. × 1 seringă × 0,5 ml + ac 16-5/10 (**P-RF**)

ROFERON® A HOFFMANN LA ROCHE; Sol. inj. 18 milioane U.I./0,6 ml; ct. × 1 sau 3 cartușe multidoză (**P-RF**)

ROFERON® A HOFFMANN LA ROCHE/SINDAN SRL; Sol. inj. 3 milioane U.I./0,5ml, 9 milioane U.I./0,5 ml; ct. × 1 seringă × 0,5 ml + ac (**P-RF**)

Ind: Trat. neoplasmelor limfatice și hematopoietice, neoplasme solide, maladii virale.

Dz: Doza variază între 3-36 milioane U.I./zi, în funcție de indicație.

Cind: Hipersensibilitate la produs; afectare cardiacă severă; disfuncție severă renală, hepatică sau a măduvei hematopoietice; epilepsie și/sau alte disfuncții ale SNC; hepatită cronică decompensată sau ciroză hepatică severă; hepatită cronică care este sau a fost tratată recent cu agenți imunosupresori, cu excepția trat. de scurtă durată cu glucocorticoizi; leucemie mieloidă cronică la bolnavi la care este posibil un transplant alogen de măduvă osoasă.

Al: Monitorizare renală, hepatică sau medulară; supraveghere neuropsihiatrică; prudență în depresie medulară severă, transplant, psoriazis, diabet zaharat, copii; asocieri cu medicamente biotransformate prin oxidare; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Simptome pseudo-gripale, anorexie, greață, vărsături, tulburări de gust, senzație de uscăciune a gurii, scădere în greutate, diaree, dureri abdominale, creșterea ALAT, fosfatazei alcaline, LDH și bilirubinei, amețeală, vertij, tulburări de vedere, scăderi ale funcției cerebrale, tulburări de somn, tendință la suicid, paretezii, scăderea sensibilității, neuropatie, prurit și tremor, hTA tranzitorie, pusee hipertensive pasagere, edeme, cianoză, aritmii, palpitații și dureri toracice, reexacerbări ale herpesului labial, rash, prurit, uscăciunea mucoaselor, rinoree și epistaxis, scădere a funcției renale, leucopenie tranzitorie, hipocalcemie inconstantă, hiperglicemie, reacții la locul injectării. Anticorpi antiinterferon.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

GLUCOSAMINUM
GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L03AB05

INTRON A 18 milioane UI SCHERING PLOUGH EUROPE; Sol. inj. 15 milioane U.I./ml; ct. × 1, 2 sau 8 cartușe × 1,2 ml + 12, 24 sau 96 ace + 12, 24 sau 96 tamponi dezinfectanți (S)

INTRON A 30 milioane UI SCHERING PLOUGH EUROPE; Sol. inj. 25 milioane U.I./ml; ct. × 1, 2 sau 8 cartușe × 1,2 ml + 12, 24 sau 96 ace + 12, 24 sau 96 tamponi dezinfectanți (S)

Ind: Hepatita cronică B. Hepatita cronică C. Leucemie cu celule "păroase". Leucemie mieloidă cronică. Mielom multiplu. Limfom folicular. Tumoră carcinoidă. Sarcomul Kaposi asociat cu SIDA. Melanom malign.

Dz: Variaza între 5-20 milioane U.I./zi, de 3-5 ori/săpt., în funcție de indicație.

Cind: Hipersensibilitate la produs. Afecțiuni cardiace grave. Disfuncție renală sau hepatică gravă. Epilepsie și/sau afecțiuni ale SNC. Afecțiune psihică severă preexistentă sau istoric de tulburare psihică severă. Hepatită cronică cu ciroză hepatică decompensată. Hepatită cronică la pacienții care sunt sau au fost tratați recent cu agenți imunosupresivi, excluzând sevrul pe termen scurt la corticosteroizi. Hepatită autoimună, o boală autoimună în antecedente; sau pacienți cu transplant, cu trat. imunosupresiv. Afecțiune tiroidiană preexistentă, dacă aceasta nu poate fi controlată prin trat. convențional. Terapia combinată cu ribavirină: a se vedea informațiile privind ribavirina, adm. combinată cu ribavirina la pacienți cu hepatită cronică C.

Al: În caz de reacții de hipersensibilitate acută, adm. se întrerupe; monitorizare hepatică, examen oftalmologic; hidratare adecvată; prudență în diabet zaharat, tulburări de coagulare, afecțiuni pulmonare, afecțiuni psihice, antecedente de crize cardiace congestive, IMA și/sau aritmii, psoriazis; copii; asocieri cu narcotice, hipnotice, teoflina sau aminoflina; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Febră, oboseală, contracturi musculare/frisoane, anorexie și grețuri, vărsături, diaree, artralgie, astenie, somnolență, amețeli, senzație de uscăciunea gurii, simptome asemănătoare gripei, depresie, tentative de suicid, indispoziție, transpirație abundentă, alterarea gustului, iritabilitate, insomnie, stare de confuzie, tulburări de concentrare și hTA, dureri abdominale, rash, nervozitate, afecțiuni la locul de injectare, parestezie, herpes simplex, prurit, dureri oculare, anxietate, epistaxis, tuse, faringită, infiltrate pulmonare, pneumonită și pneumonie, pierderi de cunoștință, scădere în greutate, edeme faciale, dispnee, dispepsie, tahicardie, HTA, creșterea apetitului, scăderea libidoului, hipoestezie, scaune moi, sângerări gingivale, neuropatie, polineuropatie, rabdomioliză, IR, sindrom nefrotic, disfuncții renale, diabet agravat, autoanticorpi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GLUCOSUM
GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1

Cod ATC: L03AB09**INFERGEN** CFP; Sol. inj. 9 µg/0,3 ml; ct. × 1, 6 sau 12 fl. × 0,3 ml (*P-RF*)**Ind:** Hepatită cronică cu virusul hepatitei C (HCV).**Dz:** *Adulți:* 9 µg de 3 ori/săpt., inj. s.c.**Cind:** Hipersensibilitate la substanța activă; epilepsie sau tulburări psihice severe; afecțiuni cardiace severe preexistente; disfuncție renală sau hepatică severă; boală hepatică decompensată; hepatite cronice la pacienți care sunt sau au fost tratați recent cu agenți imunosupresivi, cu excepția celor care au întrerupt trat. de scurtă durată cu corticosteroizi; hepatite și boli autoimune; primitori de transplant sub trat. imunosupresiv; afecțiuni tiroidiene preexistente, care nu sunt controlate adecvat.**Al:** Prudență la copii, leucopenie, stări depresive, IC congestivă, IMA și/sau aritmii, psoriazis, tulburări de coagulare, afecțiuni debilitante, disfuncții tiroidiene; examen oftalmologic; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.**RA:** Febră, oboseală, cefalee și mialgii, rigiditate, anorexie, artralгии, greață, vomă, diaree, alopecie, lombalgii, dureri abdominale, depresie, hipsudorație, alterări ale gustului, instabilitate emoțională, insomnie, reacții la locul injectării, somnolență, confuzie, rash, reacții alergice, herpes simplex, prurit, dureri oculare, epistaxis, tuse, infecții/inflamații ale tractului respirator superior, pneumonie, variații ale greutății corporale, edeme, dispnee, tahicardie, HTA și hTA, libidou scăzut, hipoestezii, constipație, hemoragii gingivale, leucocitopenie, trombocitopenie și neuropatie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GLYCEROLUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODextrinum
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A

Cod ATC: L03AB07

AVONEX BIOGEN IDEC; Pulb. liof. pt. sol. inj. 30 µg (6 milioane UI); ct. × 4 doze (fl. pulb. + seringă preumplută) (*P-RF*)
REBIF® 22 micrograme; REBIF® 44 micrograme SERONO EUROPE Ltd.; Sol. inj. 22 µg/0,5 ml, 44 µg/0,5 ml; ct. × 1, 3 sau 12 seringi preumplute × 0,5 ml (*P-RF*)

Ind: Trat. ambulatoriu al pacienților cu scleroză multiplă cu recăderi, caracterizată prin cel puțin două atacuri recurente de disfuncție neurologică, timp de trei ani consecutivi, fără dovezi de progresie continuă a bolii.

Dz: 30 µg i.m. o dată pe săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la interferonul natural sau recombinant, la albumina serică umană. Sarcină. Depresii severe sau tendință la suicid. Epilepsie.

A!: Prudență în depresie, convulsii în antecedente, boli cardiace, monitorizare psihiatrică, hematologică și hepatică; interacțiuni cu medicamente biotransformate de cit. P450; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Sindrom de tip gripal: dureri musculare, febră, frisoane, astenie, cefalee și greață; diaree, anorexie, vărsături, artralgii, insomnie, anxietate, rash, reacții la locul injectării, vasodilatație, palpitații, alopecie, sincopă trecătoare, depresii și tendință la suicid, reacții de hipersensibilizare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM + CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B

Cod ATC: L03AB08

BETAFERON® SCHERING AG; Pulb. liof. pt. sol. inj. 250 µg (8 milioane UI)/ml; ct. × 5 fl. + 5 fl. solv.; ct. × 5 fl. + 5 seringi preumplute; ct. × 15 fl. + 15 fl. solv.; ct. × 15 fl. + 15 seringi preumplute. **(S/P-RF)**

Ind: Trat. ambulator al pacienților cu scleroză multiplă recurent recidivantă, cu cel puțin două atacuri cu disfuncții neurologice în ultimii doi ani, urmate de o recuperare parțială/totală.

Dz: 8 milioane UI inj. sc. la 2 zile.

Cind: Hipersensibilitate la produs sau albumină umană; sarcină.

RA: Inflamație locală, durere, necroză; febră, frison, dureri musculare, depresie, instabilitate emoțională, convulsii, confuzii; leucopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GOSERELINUM
GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM

Cod ATC: H03CA

LIPIODOL® 190 mg LAB. GUERBET; Cps. moi 190 mg iod; ct. × 1 blist. × 3 sau 75 cps. moi (**P-6L**); ct. × 1500 cps. moi (**S**)

Ind: Bronhografie, histerosalpingografie, uretrografie, colangiografie intraoperatorie, explorarea sinusurilor feței, mielografie.

Dz: Pentru bronhografie bolnavului i se adm. cu câteva zile înainte de examen calmante ale tusei; în ziua examenului nu va ingera nimic. Se va efectua anestezia locală a regiunii faringo-laringiene; la copii este obligatorie anestezia generală.

Cind: Alergie sau intoleranță la iod, tireotoxicoză, IC, IgM - gamopatii monoclonale, tbc, boli inflamatorii; nu se introduce în regiuni care sângerează.

RA: Anorexie, cefalee, febră, iodism; supurație pulmonară (după bronhografie), salpingită acută (după histerosalpingografie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GRANISETRONUM
GUAIFENESINUM
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM

Cod ATC: V08AB09

VISIPAQUE 150 mg l/ml; VISIPAQUE 270 mg l/ml; VISIPAQUE 320 mg l/ml AMERSHAM HEALTH; Sol. inj. 150 mg l/ml, 270 mg l/ml, 320 mg l/ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml **(S/P-RF)**

Ind: Examinări radiologice ale adultului: cardioangiografii, angiografie cerebrală, periferică, abdominală, urografie, flebografie, examinare CT cu contrast.

Dz: Doza variază între 150-320 mg l/ml în funcție de tipul de examinare, vârstă, greutate, debitul cardiac și starea generală a pacientului, cât și de tehnica utilizată.

Cind: Tireotoxicoză manifestă, IC decompensată.

Al: Înaintea adm. trebuie pregătite toate măsurile de trat. necesare posibilelor reacții severe. Substanțele de contrast non-ionice au o activitate anticoagulantă in vitro mai mică decât cele ionice. Prudență în afecțiuni renale, antecedente alergice, astm sau reacții la compuși iodați; interferează în testele funcționale tiroidiene; sarcină și alăptare.

RA: Senzație de căldură, de rece sau durere la locul injectării, tulburări de vedere, cefalee, greață, tulburări de gust; reacții cutanate, prurit, parosmie, angioedem și simptome respiratorii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

GUAIFENESINUM
 HALOPERIDOLUM
 HALOTHANUM
 HEPARINUM
 HEXETIDINUM
 HEXOPRENALINUM
 HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 HYDROCORTISONUM
 HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
 HYDROTALCITUM
 HYDROXYCARBAMIDUM
 HYDROXYCHLOROQUINUM
 HYDROXYZINUM
 IBRITUMOMABUM TIUXETAN
 IBUPROFENUM
 ICODEXTRINUM
 IDARUBICINUM
 IFOSFAMIDUM
 ILOPROSTUM
 IMATINIBUM
 IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM + CILASTATINUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFA-CON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM

Cod ATC: V08AB02**OMNIPAQUE® AMERSHAM HEALTH;** Sol. inj. 140 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml (S/P-RF)**OMNIPAQUE® AMERSHAM HEALTH;** Sol. inj. 180 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 10 fl. × 15 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml (S/P-RF)**OMNIPAQUE® AMERSHAM HEALTH;** Sol. inj. 240 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 10 fl. polipropilenă × 50 ml (S/P-RF)**OMNIPAQUE® AMERSHAM HEALTH;** Sol. inj. 300 mg I/ml; ct. × 10 fl. × 10 ml; ct. × 6 fl. × 20 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 10 fl. polipropilenă × 50 ml (S/P-RF)**OMNIPAQUE® AMERSHAM HEALTH;** Sol. inj. 350 mg I/ml; ct. × 6 fl. × 20 ml; ct. × 10 fl. × 50 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml; ct. × 6 fl. × 200 ml; ct. × 10 fl. polipropilenă × 50 ml (S/P-RF)

Ind: Mediu de contrast pentru: razele X, cardioangiografie, arteriografie, urografie, flebografie și CT; mielografie lombară, toracică, cervicală și CT cisterne- lor bazale, precedată de inj. subarahnoidiană; artrografie, pancreatografie endo- scopică retrogradă, colangiopancreatografie endoscopică retrogradă, herniografie, histerosalpingografie, sialografie, examinări ale tractului gastrointestinal.

Dz: Doza este dependentă de: tipul examinării, vârstă, greutate, starea generală a pacientului și tehnica utilizată, fiind de 200-350 mg I/ml.

Cind: Hipersensibilitate la iohexol în antecedente. Tireotxicoza manifestă.

Al: Prudență în astm sau reacții alergice la medii de contrast iodate, afecțiuni cardiace severe sau cu HTA pulmonară, patologie cerebrală acută, tumori sau epilepsie în antecedente, disfuncții renale, diabet zaharat, paraproteinemie, disfuncție renală și hepatică, feocromocitom, hipertiroidism; mediile de contrast non-ionice au mai puțin efect asupra coagulării in vitro, comparativ cu cele ionice; hidratare adecvată; asocieri cu biguanide, IL-2; interferează în testele funcției tiroidiene; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Senzație de căldură, gust metalic tranzitoriu, disconfort abdominal, durere, reacții de hipersensibilitate, hipersensibilitatea și inflamația glandelor salivare, spasm arterial, reacții neurologice, aritmii, IC, semne de ischemie, artralгии, cefalee, greață, vărsături sau vertij, fotofobie și meningism.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM + CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM

Cod ATC: V08AB04

IOPAMIRO 300; IOPAMIRO 370, BRACCO; Sol. inj. 30%, 37% iod; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (30%); ct. × 1 fl. × 50, 100 sau 200 ml (37%) **(S/P-RF)**

Ind: *Int.:* Substanță de contrast pentru examinarea radiologică a tractului digestiv; *Inj.:* pentru mielografie, angiografie cerebrală, arteriografie și venografie periferică, angiocardiografie, ventriculografie stângă și arteriografie coronariană, aortografie, angiografie viscerală selectivă, urografie, artrografie.

Dz: *Int.:* Doza variază în funcție de tipul examinării, vârstă, greutate, starea generală a pacientului și tehnica utilizată, fiind de 10-750 ml sol. diluată. *Inj.:* Doza variază în funcție de tipul examinării, vârstă, greutate, starea generală a pacientului și tehnica utilizată.

Cind: Hipersensibilitate la derivații iodați.

Al: Prudență la alergici, astmatici, IH și IR gravă, IC, boli sistemice grave, diabet, mielom multiplu, epilepsie; sarcină și alăptare.

RA: *Int.:* diaree, reacții tip anafilactic, *Inj.:* cefalee, greață, vomă, senzație de cald, dispnee, hTA, aritmii ventriculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

HALOTHANUM
HEPARINUM
HEXETIDINUM
HEXOPRENALINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM + CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM

Cod ATC: V08AB05

ULTRAVIST 300; ULTRAVIST 370 SCHERING AG; Sol. inj. iopromid 623,4 mg/ml, 768,86 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50, 100, 200 sau 500 ml (*S/P-RF*)

Ind: Creșterea contrastului în CT, angiografie cu subtracție digitală, urografie, flebografie a extremităților, venografii, vizualizarea cavităților corpului, arteriografii.

Dz: Urografii: *Adulți* 0,8-1,3 ml/kg, *copii* 0,5-1,2 ml/kg. CT: 1-2,5 ml/kg. Angiografie cu subtracție digitală: 30-60 ml în bolus i.v.

Cind: Hipersensibilitate la iopromid, hipertiroidism.

Al: Nu se recomandă pentru mielografii, ventriculografii. Nu se va face histerosalpingografie în cursul sarcinii sau în caz de inflamații la nivelul pelvisului.

RA: Greață, vărsături, senzație generală de căldură, reacții alergice, crize epileptice, confuzie, somnolență, tulburări de vedere.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

HEPARINUM
 HEXETIDINUM
 HEXOPRENALINUM
 HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 HYDROCORTISONUM
 HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
 HYDROTALCITUM
 HYDROXYCARBAMIDUM
 HYDROXYCHLOROQUINUM
 HYDROXYZINUM
 IBRITUMOMABUM TIUXETAN
 IBUPROFENUM
 ICODEXTRINUM
 IDARUBICINUM
 IFOSFAMIDUM
 ILOPROSTUM
 IMATINIBUM
 IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFACON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM

Cod ATC: R03BB01, R01AX03**ATROVENT®** BOEHRINGER INGELHEIM; Sol. inhal. 0,26 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml (**P-6L**)**ATROVENT® 20 µg** BOEHRINGER INGELHEIM; Susp. inhal. 20 µg/doză; ct. × 1 fl. presurizat × 15 ml + valva dozatoare acționată mecanic + aplicator bucal (**P-6L**)**ATROVENT® NAZAL 0,03%; ATROVENT® NAZAL 0,06%** BOEHRINGER INGELHEIM; Aerosol nazal 0,03%, 0,06%; ct. × 1 fl. × 15 ml (**P-RF**)**IPRAVENT 20-INHALER** CIPLA; Aerosol 20 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (**P-6L**)**Ind:** *Inhal.*: trat. de întreținere al bronhospasmului din BPCO, cu predominanța bronșitei sau a emfizemului și în trat. bronhospasmului acut asociat BPCO și astmului bronșic. *Nazal*: rinite alergice și non-alergice.**Dz:** *Inhal întreținere:* *Adulți și adolescenți:* 500 µg de 3-4 ori/zi; *Copii 6-12 ani:* 250 µg de 3-4 ori/zi; *Copii < 6 ani:* 100-250 µg de 3-4 ori/zi. *Trat. în criză:* *Adulți și adolescenți:* 500 µg repetat, până la remiterea crizei; *Copii 6-12 ani:* 250 µg repetat, până la remiterea crizei; *Copii < 6 ani:* 100 µg repetat, până la remiterea crizei. *Nazal:* *Adulți și adolescenți:* 42-84 µg/nară de 2-4 ori/zi; *Copii 6-12 ani:* maxim 42 µg/nară de 2 ori/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la atropină sau la substanțe înrudite.**Al:** Se va evita contactul cu ochii; tehnică de adm. corectă; prudență în glaucom, adenom de prostată sau obstrucție vezicală; asocieri cu b-mimetice și xantine, steroizi și cromoglicat disodic, parasimpatolitice; sarcină și alăptare.**RA:** Cefalee, greață, uscăciunea gurii și faringelui, tahicardie, palpitații, tulburări de acomodare vizuală, midriază, creșterea presiunii intraoculare, tulburări de motilitate gastrointestinală și retenție urinară, tuse, bronhoconstricție paradoxală, epistaxis.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

HEXETIDINUM
 HEXOPRENALINUM
 HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 HYDROCORTISONUM
 HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
 HYDROTALCITUM
 HYDROXYCARBAMIDUM
 HYDROXYCHLOROQUINUM
 HYDROXYZINUM
 IBRITUMOMABUM TIUXETAN
 IBUPROFENUM
 ICODEXTRINUM
 IDARUBICINUM
 IFOSFAMIDUM
 ILOPROSTUM
 IMATINIBUM
 IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM + CILASTATINUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFACON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM

Cod ATC: C09CA04

APROVEL® 150 mg; APROVEL® 300 mg SANOFI PHARMA - BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. 150 mg, 300 mg; ct. × 1, 2, 4 sau 7 blist. × 14 cpr. (**P-6L**); ct. × 4 blist. unidoză × 14 cpr. (**S**)

Ind: Trat. HTA esențiale.

Dz: Doza inițială și de întreținere 150 (75-300) mg o dată/zi, adm. în timpul mesei sau între mese.

Cind: Hipersensibilitate la produs. Sarcină trim. II-III. Alăptare.

Al: Prudență în depleție de volum intravascular, stenoza aortică sau mitrală, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; risc crescut de hTA severă și IR; monitorizarea funcției renale și a potasemiei; hiperaldosteronismul primar nu răspunde la irbesartan; asocieri cu diuretice și alte antiHTA, săruri de potasiu, heparină, litiu; primul trimestru al sarcinii; șoferi și activități de precizie.

RA: Infecții respiratorii, cefalee, dureri musculoscheletice, toracice, abdominale, amețeli, oboseală, diaree, tuse, grețuri/vărsături, traumatisme musculoscheletice, dispepsie/pirozis, edeme, rash, tahicardie, anxietate, nervozitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01XX19

HEXOPRENALINUM
 HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 HYDROCORTISONUM
 HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
 HYDROTALCITUM
 HYDROXYCARBAMIDUM
 HYDROXYCHLOROQUINUM
 HYDROXYZINUM
 IBRITUMOMABUM TIUXETAN
 IBUPROFENUM
 ICODEXTRINUM
 IDARUBICINUM
 IFOSFAMIDUM
 ILOPROSTUM
 IMATINIBUM
 IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM+CILASTATINUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFACON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
IRINOTECANUM

CAMPTO AVENTIS PHARMA; Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml; ct. × 1 f. × 2 sau 5 ml (S)

Ind: Trat. cancerului colorectal avansat în combinație cu 5-fluorouracil (5-FU) și acid folinic, la pacienții care nu au mai fost tratați cu chimioterapie în cancer avansat; în monoterapie, la pacienții tratați anterior cu chimioterapie care au inclus 5-FU, irinotecan; în combinație cu cisplatin, este indicat în tratamentul carcinomului de col uterin cu celule scuamoase, avansat, la pacienți care nu au fost tratați cu chimioterapie.

Dz: Numai pacienților *adulti*. Doza recomandată depinde de vârstă, greutate, starea generală a pacientului, indicație.

Cind: Pacienți cu boli cronice intestinale inflamatorii sau ocluzie intestinală. Hipersensibilitate la produs. Sarcină și alăptare. La pacienții cu Bd > 3 ori mai mare decât limita maximă normală. Pacienți cu insuficiență medulară severă. Pacienți cu status de performanță OMS > 2.

Al: Va fi adm. numai sub supravegherea unui oncolog calificat. Datorită naturii și frecvenței efectelor secundare, în următoarele cazuri se va administra numai după o atentă evaluare a raportului beneficii/risc: la pacienții cu factori de risc, în special cu status de performanță OMS = 2; în cazurile rare în care se presupune că pacientul nu va urma recomandările privind controlul efectelor secundare. Se recomandă ca aceste cazuri să fie strict supravegheate, în spital.

Diareea tardivă; monitorizarea formulei sanguine complete; prudență în afecțiuni hepatice, renale sau cardiace; pacienții cu astm; vârstnici. Hipersensibilitate la produs. Prudență în asocierea cu suxametoniu. Sarcină și alăptare. *oferi.

RA: Diaree, greață și vărsături; rar obstrucție intestinală, ileus sau hemoragie intestinală; anorexia, dureri abdominale, mucozita; neutropenie, anemie, trombocitopenie; reacții la locul perfuzării. Alopecie; reacții cutanate, reacții alergice ușoare și reacții anafilactoidice; crampe și parestezii, creșterea tranzitorie a nivelului seric al transaminazelor, fosfatazei alcaline sau bilirubinei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM + CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM

Cod ATC: G01AF07

GYNO-TRAVOGEN® SCHERING AG; Ovule 600 mg; ct. × 1 blist. × 1 ovul + 2 degete mănușă (P-RF)

TRAVOGEN SCHERING AG; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 10, 15, 20, 30, 35, 40 sau 50 g (P-RF)

Ind: *Vaginal:* micoze vaginale și infecții mixte cu bacterii grampozitive. *Ext:* micozelor superficiale ale pielii acoperite sau neacoperite cu păr, produse de: dermatofite, levuri, ciuperci asemănătoare levurilor și ciuperci de mucegai, eritasmă.

Dz: *Vaginal:* 600 mg/zi, seara, înainte de culcare. *Ext:* o aplicație pe zi, cel puțin 6 săpt.

Cind: Hipersensibilitate la isoconazol.

Al: Trat. profilactic simultan al partenerului; se evită dușurile vaginale, lenjeria trebuie schimbată zilnic și fiartă.

RA: Senzație de arsură locală, prurit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N01AB06

HYDROCORTISONUM
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM

FORANE ABBOTT; Lichid pt. inhalatie 100%; ct. × 1 fl. × 100 ml (S)

ISOFLURANE RHODIA Ltd.; Lichid pt. inhal. 100%; ct. × 1 fl. × 100 sau 250 ml (S)

Ind: Anestezie generală prin inhalare.

Dz: *Inducție:* concentrație de 0,5%. Conc. 1,5-3% produc anestezia chirurgicală în 7-10 minute. *Menținere:* 1-2,5% isofluran în amestecuri de oxigen/oxid de azot. Uneori adm. suplimentară de 0,5-1,0% isofluran atunci când este adm. numai cu oxigen.

Cind: Hipersensibilitate la isofluran sau antecedente de hipertermie malignă survenită după adm. isofluran.

A!: Utilizarea de vaporizoare care eliberează cu exactitate concentrațiile necesare; prudență în hipertensiune intracraniană; asocieri cu med. curarizante antidepolarizante; sarcină și alăptare.

RA: Aritmii, leucocitoză, creșteri mici ale concentrației plasmatice a fluorului, hTA și deprimare respiratorie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J04AC01

HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
HYDROTALCITUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM

ISONIAZIDĂ 100 mg ANTIBIOTICE SA; Cpr. 100 mg; ct. × 2 sau
150 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

IZONIAZIDĂ ANTIBIOTICE SA; Cpr. 300 mg; ct. × 2 sau 150 blist. ×
10 cpr. (S/P-RF)

IZONIAZIDĂ 500 mg TERAPIA SA; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 10 sau
100 f. × 10 ml (S)

Ind: Tbc pulmonară, miliară, osoasă, genito-urinară și articulară, meningita tbc, pleurezia și peritonita tbc.

Dz: *Terapeutic:* la adulți 5 mg/kg/zi, în 1-2 prize, sau 15 mg/kg/zi, de 2 ori pe săptăm. La copii 10 mg/kg/zi (maxim 300 mg/zi) sau 20 mg/kg/zi, de 2 ori/ săptăm.; în meningite pot fi necesare doze până la 30 mg/kg/zi. *Profilactic:* la adulți 300 mg/zi; la copii 10 mg/kg/zi (maxim 300 mg/zi).

Cind: Alergie la izoniazidă, IH gravă, afecțiuni hepatice iatrogene.

Al: Prudență în epilepsie, IR, afecțiuni hepatice, antecedente psihotice, alcoolici, alergici sau vârstnici; asocieri cu carmazepină, fenitoină, primidonă, disulfiram, alcool, etionamidă, glucocorticoizi, ketoconazol, anestezice volatile halogenate; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, amețeli, tulburări neurologice, polinevrită datorată antagonizării piridoxinei, encefalopatie toxică, tulburări psihotice, convulsii, constipație, hiperhidroză, xerostomie, hTA posturală, agitație, somnolență sau insomnie, spasme musculare, fenomene alergice, uscăciunea gurii, greață, epigastralgie, anore-xie, creșterea transaminazelor serice, mai rar hepatită toxică, agranulocitoză, leucopenie, sindrom lupoid, fenomene artritice, vasculită, acnee, gineco-mastie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01DA08

HYDOTALCITUM
 HYDROXYCARBAMIDUM
 HYDROXYCHLOROQUINUM
 HYDROXYZINUM
 IBRITUMOMABUM TIUXETAN
 IBUPROFENUM
 ICODEXTRINUM
 IDARUBICINUM
 IFOSFAMIDUM
 ILOPROSTUM
 IMATINIBUM
 IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFACON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
 IRINOTECANUM
 ISOCONAZOLUM
 ISOFLURANUM
 ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS

CORDIL® 10 mg; CORDIL® 20 mg; CORDIL® 40 mg SR GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 10 mg, 20 mg, respectiv cpr. film. cu elib. prel. 40 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (10 mg, 20 mg), respectiv ct. × 1 fl. × 25 cpr. (40 mg) **(P-6L)**
DINICORD RETARD® 20 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. cu elib. prelungită 20 mg; ct. × 2, 5 sau 100 blist. **(S/P-6L)**
DINITER® SR 20 mg; DINITER® SR 40 mg TERAPIA SA; Cps. cu elib. prel. 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. **(P-6L)**
ISODINIT BALKAN PHARMA DUPNITZA; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 30 cpr. **(P-6L)**
ISODINIT RETARD BALKAN PHARMA DUPNITZA; Cpr. retard 20 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. ret. **(P-6L)**
ISOSORBID ANTIBIOTICE SA; Cpr. 20 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. **(P-6L/S)**
ISOSORBID DINITRAT 10 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. **(P-6L)**
ISOSORBIDE DINITRATE E.I.P.I.C.O.; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (5 mg), ct. × 3 blist. × 20 cpr. (10 mg) **(P-6L)**
MAYCOR® Retard 20 PFIZER; Cps. retard 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. **(P-6L)**
ROMISODIN SICOMED SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. **(P-6L)**

Ind: Profilaxia și trat. curativ al crizelor de angină pectorală, IC cronică, trat. cardiopatiei ischemice dureroase, sechele post-IMA, IMA recent cu insuficiență acută ventriculară stângă, IC dreaptă, rinite angiospastice, afecțiuni ale vaselor periferice însoțite de spasm.

Dz: Crize de angină pectorală: sublingual 5-10 mg, repetat la nevoie la 5-10 minute. EPA: 5-10 mg, repetat la nevoie. Profilaxia crizelor anginoase, IC moderată: 10-20 mg la 4-6 ore. Trat. IC refractare și a angorului instabil cu crize repetate: 40-80 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la derivații nitrați, hTA gravă.

Al: Prudență în șoc, colaps, hemoragii cerebrale, traumatisme cerebrale, glaucom, cardiomiopatie obstructivă; nu se va întrerupe brusc trat.; asocieri cu agenți methemoglobinizanți, vasodilatatoare, antiHTA și diuretice, alcool; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, vertij, oboseală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFAON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01DA14

MONONITRON® EP 60 mg SICOMED SA; Cpr. cu elib. prel. 60 mg; ct. × 2 blist. × 20 cpr., ct. × 4 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

MONOTER® SR 20 mg; MONOTER® SR 40 mg; MONOTER® SR 60 mg TERAPIA SA; Cps. cu elib. prel. 20 mg, 40 mg, 60 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

OLICARD® 40 mg RETARD; OLICARD® 60 mg RETARD SOLVAY PHARMACEUTICALS; Cps. retard 40 mg, 60 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

Ind: Profilaxia și trat. de întreținere al anginei pectorale. IC cronice.

Dz: Inițial 20 mg de 2 ori/zi, crescut la nevoie la 40 mg de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la nitrați, colaps circulator acut, șoc cardiogen, hTA severă.

Al: Prudență în cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, pericardită constrictivă și tamponadă cardiacă, presiune scăzută de umplere, stenoza aortică și/sau mitrală, tendință la hTA ortostatică, boli asociate cu presiune intracraniană crescută, asocieri cu vasodilatatoare, antiHTA, b-blocante, antagoniști de calciu, neuroleptice, antidepresive triciclice, alcool, dihidroergotamină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, hTA ortostatică, tahicardie reflexă cu senzații de amețeală, somnolență, greață, înroșirea feței și eritem alergic, colaps, însoțit de sincopă și bradiaritmii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

HYDROXYCHLOROQUINUM
HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFAON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM

Cod ATC: D10BA01**ROACCUTANE®** HOFFMANN LA ROCHE; Cps. moi 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-RF)**SOTRET 10; SOTRET 20** RANBAXY LAB.; Cps. moi 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-RF)

Ind: Formele grave de acnee nodulochistică rezistente la trat., în special acneea chistică și acneea conglobată, atunci când apar și leziuni la nivelul trunchiului.

Dz: Inițial 0,5 mg/kg/zi. Doza de întreținere 0,1-1,0 mg/kg/zi timp de 16 săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la izotretinoin, IR, IH, hipervitaminoză A, hiperlipidemie forte, sarcină și alăptare.

Al: Adm. simultană a altor keratolitice sau exfoliative nu este indicată, nici trat. concomitent cu UV; expunerea la soare trebuie evitată; monitorizarea funcției hepatice; prudență în diabet; asocieri cu izotretinoin, vitamina A, tetracicline.

RA: Uscăciunea mucoaselor, epistaxis, răgușeală, conjunctivite și opacifiere reversibilă a corneei, fotosensibilitate, fotofobie, hemeralopie, cataractă lenticulară, granulomatoză Wegener, anemie, neutropie, creșterea/scăderea numărului de trombocite, creșterea VSH, tulburări de auz, infecții locale sau sistemice cu germeni grampozitiv, exanteme, prurit, transpirații, granuloame piogenice, paronichie, distrofia unghiilor, subțierea firelor de păr, alopecie reversibilă, acnee fulminans, hirsutism și hiperpigmentație (facială), dureri musculare și articulare, afecțiuni inflamatorii ale intestinului, hiperuricemie și tulburări psihice sau ale SNC, hipertensiune intracraniană benignă, creștere temporară și reversibilă a transaminazelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J02AC02

HYDROXYZINUM
IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM

ITRACONAZOL SLAVIA PHARM; Cps. 100 mg; ct. × 3 blist. × 5 cps. (P-RF)

ORUNGAL JANSSEN PHARMACEUTICA; Cps. 100 mg; ct. × 1 sau 7 blist. × 4 cps.; ct. × 3 blist. × 5 cps. (P-RF)

ORUNGAL JANSSEN PHARMACEUTICA; Sol. orală 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 150 ml + lg. dozatoare × 5 sau 10 ml (P-RF)

Ind: Candidoza orală și vulvovaginală. Pityriasis versicolor, dermatomicoze, keratite fungice. Onicomicoze determinate de dermatofiți și/sau levuri. Micoze sistemice: aspergiloze, candidoze, criptococoze, histoplasmoze, sporotrichoze, paracoccidioidomicoze, blastomicoze și alte tipuri rare de micoze sistemice sau tropicale. Candidoze bucale și/sau esofagiene la pacienții HIV pozitivi și alți pacienți imunocompromiși. Profilaxia infecțiilor fungice sistemice, la pacienții cu boli hematologice maligne sau la cei supuși transplantului de măduvă.

Dz: Candidoza vulvovaginală (200 mg/zi 3 zile) Pityriasis versicolor (200 mg/zi, 7 zile), dermatomicoze (200 mg/zi 7 zile sau 100 mg/zi 15 zile), keratite fungice (200 mg/zi 21 zile); imediat după masa principală.

Cind: Hipersensibilitate la itraconazol.

Al: Prudență la copii, vârstnici, afecțiuni hepatice, IR; asocieri cu rifampicină, rifabutină, fenitoină, ritonavir, claritromicină, terfenadină, astemizol, cisapridă, triazolam, chinidină, pimozidă, simvastatină, saquinavir, alcaloizi din Vinca, busulfan, docetaxel, trimetrexat, nifedipină, verapamil, ciclosporină, tacrolimus, rapamicină, digoxină, carbamazepină, buspironă, alfentanil, rifabutină, metilprednisolon; sarcină și alăptare.

RA: Diaree, greață, dureri, cefalee, creșteri reversibile ale enzimelor hepatice, amețeli, reacții alergice, hipokaliemie, edeme, hepatită, alopecie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01FA07

IBRITUMOMABUM TIUXETAN
IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-CON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM

WILPRAFEN HEINRICH MACK NACHF; Susp. orală 3%; ct. × 1 fl. × 100 ml (**P-RF**)

WILPRAFEN HEINRICH MACK NACHF; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (**P-RF**)

Ind: Infecții acute și cronice, provocate de germeni sensibili la josamicină, la nivelul ORL, căilor respiratorii, ale cavității bucale, ale pielii și țesuturilor moi, ale căilor urinare și organelor sexuale.

Dz: *Adulți și copii > 14 ani:* 1-2 g/zi p.o., fracționat în 3 prize. *La sugari și copii < 14 ani:* 30-50 mg/kg/zi, fracționat în 3 prize.

Cind: Hipersensibilitate față de eritromicină și alte antibiotice din grupa macrolidelor, leziuni hepatice la prematuri.

Al: Asocieri cu teofilină, alcaloizi din ergot, lincomicină, terfenadină, astemizol, ciclosporină, digoxină; prudență în sarcină și alăptare.

RA: Anorexie, pirozis, greață și diaree, reacții cutanate, modificări ale valorilor enzimelor hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IBUPROFENUM
ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM

Cod ATC: B05XA01

CLORURĂ DE POTASIU 7,45% B. BRAUN MELSUNGEN AG; Conc. pt. sol. perf. 7,45%; ct. × 20 f. × 20 ml; ct. × 20 fl. × 100 ml (S)

Ind: Hipopotasemie (mai ales în tulburări digestive, vărsături, diaree), miastenie, comă diabetică, trat. cu ACTH, cortizon; pentru ușurarea regimului desodat în: nefrită, nefroză, ciroză, hipertensiune arterială.

Dz: Oral, 0,6-3 g/zi.

Cind: Hiperpotasemie, anurie.

RA: Dureri epigastrice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ICODEXTRINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATINUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM

Cod ATC: H03CA01

JODID® 100; JODID® 200 MERCK KGaA; Cpr. iod 100 µg sub formă de iodură de potasiu 130,8 µg, respectiv cpr. iod 200 µg sub formă de iodură de potasiu 261,6 µg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. **(P-RF)**

Ind: Trat. şi profilaxia tulburărilor datorate deficitului de iod: prevenirea şi trat. guşei.

Dz: 50-200 µg/zi, în funcţie de situaţia clinică.

Cind: Hipertiroidism manifest; hipertiroidism latent în cazul adm. unor doze mai mari de 150 µg iod/zi.

A!: Trebuie exclusă existenţa autonomiei tiroidiene difuze sau focale; prudenţă în carcinomul tiroidian; interacţiuni medicamentoase cu antitiroidiene, litiu şi diuretice care economisesc potasiul; sarcină şi alăptare.

RA: Hipertiroidism la dozele zilnice de iod mai mari de 150 µg.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM

Cod ATC: J01GB04

PAN-KANAMYCINE LAB. PANPHARMA; Pulb. pt. sol. inj. 1 g; ct. × 50 sau 100 fl. × 1 g (S/P-RF)
KANAMICINĂ SULFAT ANTIBIOTICE SA; Ung. oft. 1%; ct. × 1 tub × 6 g (P-RF)

Ind: *Inj.*: infecții renale, urologice și genitale; septicemii și endocardite; infecții respiratorii; infecții cutanate; tbc cu BK rezistent la antituberculoasele majore. *Oftal.*: inflamații acute ale polului ocular anterior; blefarite ulceroscuamoase și ulcerocrustoase, conjunctivite alergice, kerato-conjunctivite flictenulare, keratite superficiale nespecifice, keratite traumatiche, sclero-keratite, episclerite.

Dz: *Inj.*: 15 mg/kg/zi în două prize la 12 ore, perf. i.v. 0,5-1 g în 250 ml sol. izotonică de glucoză sau ser fiziologic. În IR se adaptează în funcție de Cl creatininei. *Oftal.*: se alică la o oră în timpul zilei și la 2 ore noaptea, apoi de 3-4 ori/zi.

Cind: *Inj.*: Alergie la aminoglicozide, miastenienie, hipoacuzie, IR, IC gravă, sarcină, alăptare. *Oftal.*: afecțiunile tuberculoase și fungice ale ochiului, supurațiile acute, infecții virotice, ulcere corneene simple sau supurate, glaucom, antecedente de hipersensibilitate la componentele unguentului.

Al: Prudență în IR, vârstnici, tulburări vestibulare și cohleare; asocierea cu medicamente nefro- și ototoxice, curarizante, miorelaxante, anestezice generale, toxina botulinică.

RA: *Inj.*: IR, nefrotoxicitate, ototoxicitate, alergii. *Oftal.*: fenomene iritative sau de sensibilizare, cataractă subcapsulară posterioară, creșterea presiunii intraoculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IFOSFAMIDUM
ILOPROSTUM
IMATINIBUM
IMIDAPRILUM
IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-CON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM

Cod ATC: N01AX03**CALYPSOL** RICHTER GEDEON Ltd.; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 10 ml (S)**KETAMINE PANPHARMA** PANPHARMA; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 25 f. × 5 ml (S)**Ind:** Intervenții de scurtă durată; intervenții instrumentale sau de diagnosticare dureroase; inducerea anesteziei.**Dz:** *Adulți:* doza inițială 1-4,5 mg/kg i.v. *Copii:* iv doza inițială 0,5-4,5 mg/kg; doza medie pentru o anestezie cu o durată de 5-10 minute este de 2 mg/kg. *Adulți:* im doza inițială 6,5-13 mg/kg. *Copii:* 2,0-5,0 mg/kg. O doză de 10 mg/kg induce o anestezie cu o durată de 12-25 minute. Anestezia se menține prin repetarea dozei inițiale sau jumătate din doza inițială.**Cind:** Eclampsie, HTA.**AI:** Barbituricele sunt incompatibile cu ketamina, asocieri cu tubocurarina.**RA:** În perioada de trezire, pot apărea: HTA, tahicardie, salivă, greață, vomă, tulburări respiratorii, halucinații, agitație psihomotorie și confuzie mentală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ILOPROSTUM
 IMATINIBUM
 IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFA-CON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
 IRINOTECANUM
 ISOCONAZOLUM
 ISOFLURANUM
 ISONIAZIDUM
 ISOSORBIDI DINITRAS
 ISOSORBIDI MONONITRAS
 ISOTRETINOINUM
 ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
KETOCONAZOLUM

Cod ATC: J02AB02, D01AC08

FUNGICIDE TORRENT PHARM. Ltd.; Cpr. 200 mg; ct. × 1 folie × 10 cpr. (P-RF)
KEFUNGIN® 200 mg ANTIBIOTICE SA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
KETOCONAZOL 200 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
KETOCONAZOL 200 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
KETOCONAZOL ARENA GROUP SA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. (P-RF)
KETOCONAZOL 200 mg SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
KETOCONAZOL LPH® 200 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 200 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
KETOCONAZOL 2% TIS FARMACEUTIC; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 15 g (P-RF)
KETOCONAZOL MK MARK PHARMACEUTICS SRL; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 20 g (P-RF)
KETODAR® AMPON DAR AL DAWA; ampon 2%; fl. × 100 mg (OTC)
KETOSTIN 200 mg AC HELCOR SRL; Cpr. 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
NIZORAL JANSSEN PHARMACEUTICA; ampon 2%; ct. × 1 fl. × 60 sau 100 ml (OTC)
NIZORAL JANSSEN PHARMACEUTICA; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 15 sau 30 g (P-RF)
NIZORAL 200 mg TERAPIA SA/JANSSEN PHARMACEUTICA; Cpr. 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Sistemic: infecții micotice cu germeni sensibili la ketoconazol: Candida, Torulopsis, Cryptococcus, Pityrosporum, Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides, Geotrichum, Drechslera longirostrata; Epidermophyton; Petriellidium boydii, Hendersonula toruloidea, Madurella; Basidiobolus ranarum, Fonsecea pedrosol. Ext.: trat. și profilaxia infecțiilor cu Malassezia (Pityrosporum), cum sunt Pitiriasis versicolor (localizat), dermatita seboreică și Pitiriasis capitis (mătreața). Vag: trat. local al candidozelor vulvovaginale acute și cronice.

Dz: Sistemic: *Adulți:* 200 mg/zi, p.o în timpul mesei. La pacienții cu micoze sistemice grave, doza poate fi crescută la 400 mg/zi. *Copii:* 4-7 mg/kg/zi. Ext.: spălare cu șampon 2%, care se menține pe piele/scalp timp de 3-5 minute înainte de clătire. Pitiriasis versicolor: o dată/zi timp de 5 zile; Dermatita seboreică și pitiriasis capitis: de 2 ori/săpt. timp de 2-4 săptăm. Vag: 1 ovul vaginal/ zi, timp de 3-5 zile consecutiv.

Cind: Hipersensibilitate la ketoconazol, la alte antifungice cu structură imidazolică sau la oricare dintre componentii produselor.

Al: Sistemic: excluderea diagnosticului de sarcină și utilizarea metodelor contraceptive în timpul trat.; monitorizare hepatică; asocieri cu antiH1 nesedative, cisapridă, triazolam, alcool, midazolam, anticoagulante orale, busulfan, ciclosporină, tacrolimus, didanozină, izoniazidă, metilprednisolon (inj.), rifampicină, antiacide. Ext.: se va evita contactul cu ochii. Prudență în sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Sistemic: hepatotoxicitate; foarte rar, ginecomastie; cefalee, vertij; greață, vărsături, diaree; prurit, erupții cutanate, urticarie. Ext.: senzație de arsură locală, prurit sau dermatită de contact, păr gras sau uscat, modificarea

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IMATINIBUM
 IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFA-CON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
 IRINOTECANUM
 ISOCONAZOLUM
 ISOFLURANUM
 ISONIAZIDUM
 ISOSORBIDI DINITRAS
 ISOSORBIDI MONONITRAS
 ISOTRETINOINUM
 ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM

Cod ATC: M02AA10, M01AE03

FASTUM® GEL BERLIN-CHEMIE AG; Gel 2,5%; ct. × 1 tub × 20, 30 sau 50 g (OTC)
FLEXEN LIFE PHARMA; Pulb. pt. sol. inj. 100 mg; ct. × 6 f. pulb. + 6 f. solv. × 2,5 ml (P-RF)
FLEXEN LIFE PHARMA; Gel 2,5%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)
KETALGON® 100 mg/2 ml SICOMED SA; Sol. inj. i.m./i.v. 100 mg/2 ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml (S/P-RF)
KETALGON® 200 mg SICOMED SA; Cps. cu elib. prel. 200 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
KETOMAG MAGISTRA C&C; Sup. 100 mg; ct. × 2 blist. × 5 sup. (P-RF)
KETONAL® FORTE LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 100 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)
KETONAL® RETARD LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. cu elib. prel. 150 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)
KETONAL® DUO LEK PHARMACEUTICALS; Cps. cu elib. prel. 150 mg; ct. × 2 sau 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
KETONAL® 100 mg LEK PHARMACEUTICALS; Sup. 100 mg; ct. × 2 folii × 6 sup. (P-6L)
KETONAL® LEK PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 50 mg/1 ml; ct. × 10 f. × 2 ml (P-RF)
KETONAL® 2,5% LEK PHARMACEUTICALS; Gel 2,5%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)
KETOPROFEN MK MARK PHARMACEUTICS; Gel 2,5 %; ct. × 1 tub × 25 sau 45 g (OTC)
KETOPROFEN SR 100 mg; 200 mg TERAPIA SA; Cps. cu elib. prel. 100 mg, 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
KETOPROFEN 100 mg/2 ml TERAPIA SA; Sol. inj. 100 mg/2 ml; ct. × 5 f. × 2 ml (P-RF)
KETOSPRAY 5% CSC PHARMACEUTICALS; Spray cutanat sol. 5%; ct. × 1 fl. × 20, 30 sau 50 ml (OTC)
PROFENID® 100 mg LAB. AVENTIS; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-RF)
PROFENID® LP 200 mg LAB. AVENTIS; Cpr. film. cu elib. prel. 200 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (P-RF)
PROFENID® GEL LAB. AVENTIS; Gel 2,5%; ct. × 1 tub × 60 g (OTC)
PROFENID® 100 mg intramuscular LAB. AVENTIS; Liof. pt. sol. inj. 100 mg; ct. × 6 fl. liof. + 6 f. solv. × 5 ml (P-6L)
RUBIFEN® ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. gastrorez. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
RUBIFEN® ANTIBIOTICE SA; Sup. 100 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (P-RF)
RUBIFEN® ANTIBIOTICE SA; Gel 2,5%; ct. × 1 tub × 40 g (OTC)

Ind: Trat. simptomatic al afecțiunilor reumatice inflamatorii, degenerative și metabolice; durere postoperatorie, dismenoree, durere osoasă din metastazele tumorale, durere posttraumatică, artrită reumatoidă, spondiloartrită seronegativă, gută, pseudogută, artroze, reumatism extraarticular. Trat. local simptomatic al durerilor musculare sau osteoarticulare de natură traumatică sau reumatice.

Dz: Oral: Doza uzuală este de 50-100 mg de 3 ori/zi. Doza uzuală pentru prep. cu elib. prel. este de 150 mg de 2 ori/zi. I.m. 100 mg de 1-2 ori/zi, maxim 300 mg. Perf. i.v. maxim 300 mg/zi. Ext. Gelul se aplică pe piele de 1-2 ori/zi, masând ușor. Spray-ul se pulverizează de 3-4 ori/zi și se masează ușor.

Cind: Hipersensibilitate la ketoprofen, la alte AINS sau la oricare dintre componentele produsului; ulcer peptic activ; copii. Extern - în plăgi infectat, eczeme, arsuri.

Al: Prudență în antecedente de ulcer gastric sau duodenal, sângerări gastrointestinale; IH; IR; poate masca

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AB15

IMIDAPRILUM
 IMIGLUCERASUM
 IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
 IMIQUIMODUM
 INDAPAMIDUM
 INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFA-CON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDIUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
 IRINOTECANUM
 ISOCONAZOLUM
 ISOFLURANUM
 ISONIAZIDUM
 ISOSORBIDI DINITRAS
 ISOSORBIDI MONONITRAS
 ISOTRETINOINUM
 ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
 KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN

KETANOV RANBAXY LAB.; Sol. inj. 30 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (*P-RF*)
KETANOV RANBAXY LAB.; Cpr. film. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (*P-6L*)
KETOROL Dr. REDDY'S LAB.; Cpr. film. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (*P-6L*)
KETOROL Dr. REDDY'S LAB.; Sol. inj. 30 mg/ml; ct. × 10 sau 100 f. × 1 ml (*S/P-RF*)

Ind: Trat. de scurtă durată al durerii acute, moderate sau severe.

Dz: *Adulți* i.m.: 10-60 mg, în funcție de severitatea durerii; doza max. 120 mg/ zi; i.v.: 10-30 mg; oral: 10 mg la 4-6 ore.
Copii peste 2 ani i.m.: 1,0 mg/kg; i.v.: 0,5-1,0 mg/kg. Se adm. maxim 5 zile.

Cind: Ulcer peptic activ sau antecedente, hemoragii gastrointestinale severe sau perforații, IR moderată sau severă, travaliu, hipersensibilitate la ketorolac sau la alte AINS, analgezie preoperatorie profilactică, intraoperator, hemoragie cerebrovasculară suspectată sau confirmată, operații cu risc crescut de hemoragie sau hemostază incompletă.

Al: Nu este indicat în afecțiuni dureroase cronice; prudență la vârstnici; pacienți debilitați; afectarea funcției renale; hipovolemie; IC; IH; astm; tulburări ale coagulării; HTA; asociere cu aspirină sau alte AINS, pentoxifilină, probenecid, metotrexat, litu, anticoagulante, furosemid; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Durere/disconfort abdominal, anorexie, constipație, diaree, dispepsie, eructații, flatulență, hemoragii gastrointestinale, greață, esofagită, pancreatită, ulceratii și perforații gastrointestinale, stomatită, melenă; vise anormale, tulburări de gândire, anxietate, meningită aseptică, convulsii, depresie, somnolență, uscăciunea gurii, sete excesivă, halucinații, cefalee, hiperkinezie, insomnie, mialgii, nervozitate, parestezii, reacții psihotice, transpirații, vertij; IRA, durere în flancuri (cu sau fără hematurie și/sau azotemie), hiperkaliemie, hiposodemie, retenție urinară, nefrită interstițială, oligurie; bradicardie, înroșirea feței, HTA, paloare, palpitații, hTA, dureri toracice; astm, dispnee, edem pulmonar; anomalii ale probelor funcționale hepatice, hepatită, icter colestatic, IH; dermatită exfoliativă, urticarie; anafilaxie, bronhospasm, edem laringian, angioedem; purpură, trombocitopenie, epistaxis, hematoame, hemoragia plăgii postoperatorii, timp de sângerare crescut; tulburări ale gustului, tulburări de vedere, tinitus, hipoacuzie; edem, reacții la locul de injecție, febră.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R06AX17

IMIGLUCERASUM
IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM

FRENASMA FARAN LAB.; Sirop 1 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (**P-6L**)

H-KETOTIFEN AC HELCOR SRL; Cpr. 1 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

KETOF HEXAL AG; Sol. orală 1 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (**P-6L**)

KETOF HEXAL AG; Cps. 1 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cps. (**P-6L**)

KETOTIFEN 1 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 1 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

KETOTIFEN LPH® 1 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 1 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (**S/P-6L**)

ZADITEN NOVARTIS PHARMA; Cpr. 1 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

ZADITEN NOVARTIS PHARMA; Sol. oft. 0,025%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)

Ind: Prevenirea crizelor de astm bronșic, în special alergic; trat. afecțiunilor alergice: rinite, conjunctivite, dermatite și febra fânului.

Dz: *Adulți, tineri și copii peste 3 ani:* inițial 1 mg p.o, seara; apoi 1 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara, maxim 4 mg/zi.
Copii 6 luni-3 ani: 0,5 mg de 2 ori/ zi, dimineața și seara.

Cind: Hipersensibilitate la ketotifen sau la oricare dintre celelalte componente ale produsului.

Al: Prudență la copii sub 6 luni, nu se indică în trat. crizelor acute de astm bronșic; asocierea cu alcool, parasimpatolitice, deprimante ale SNC, antidiabetice orale; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Oboseală, sedare, uscăciunea gurii, amețeală, cefalee, greață și constipație; creșterea greutateii corporale, exaneme de natură alergică și urticarie; stări de excitație, iritabilitate, insomnie și nervozitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IMIPENEMUM+CILASTATIMUM
IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM

Cod ATC: C08CA09

LACIPIL® 2 mg; LACIPIL® 4 mg GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 2 mg, 4 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cpr. (P-6L)

Ind: HTA.

Dz: Inițial 2 mg o dată/zi; doza poate fi crescută la 4 mg.

Cind: Hipersensibilitate la produs.

Al: Prudență la copii; pacienții cu tulburări preexistente la nivelul nodulilor SA și AV; rezervă cardiacă mult diminuată; angină pectorală instabilă sau infarct recent; asocieri cu diuretice, beta-blocante, IEC, cimetidină; suc de grapefruit; sarcină și alăptare.

RA: Cefalee, eritemul feței, edeme, amețeală și palpitații; astenie, tulburări gastrice, greață, poliurie și hiperplazie gingivală; agravarea anginei pectorale existente.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IMIQUIMODUM
INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM

Cod ATC: A06AD11

DUPHALAC® SOLVAY PHARMACEUTICALS; Sirop 66,7%; ct. × 1 fl. × 200 ml (**P-6L**); ct. × 10 plicuri × 15 ml (**OTC**)
EPALFEN® 6 g; EPALFEN® 12 g ZAMBON GROUP S.p.A.; Granule pt. sol. orală; ct. × 12, 20 sau 30 plicuri × 6 g, respectiv ct. × 15 plicuri × 12 g (**OTC/P-6L**)

LACTULOSE E.I.P.I.C.O.; Sirop 65%; ct. × 1 fl. × 100 sau 300 ml (**P-6L**)

LACTULOSE AL SIROP ALIUD PHARMA; Sirop 66,7 %; ct. × 1 fl. × 200, 500 sau 1000 ml (**P-6L**)

LAEVOLAC® FESENIUS KABI; Sol. orală 67%; ct. × 1 fl. × 100, 200, 500 sau 1000 ml (**P-6L**)

Ind: Constipație; pacienții la care se evită efortul de defecație; prevenirea/trat. encefalopatiei portale; eradicarea infecției la purtătorii sănătoși de Salmonella.

Dz: Constipație: *Adulți:* 5-10 g de 1-2 ori/zi. *Copii:* 3-6 g de 1-2 ori/zi. *Encefalopatie portală:* *Adulți:* inițial 5-10 g de 3 ori/zi; doza se crește până la 20-30 g de 3-4 ori/zi.

Cind: Ileus; intoleranță la galactoză; rectocolită ulcero-hemoragică, boala Crohn.

Al: Prudență în diabet, trat. lung în constipație; sugari și nou-născuți; asocierea cu diuretice, glucocorticoizi și amfotericină B; sarcină și alăptare.

RA: Dureri și meteorism abdominal; greață, vărsături și diaree; dezechilibre hidroelectrolitice după trat. de lungă durată.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AF05

INDAPAMIDUM
INDINAVIRUM
INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM

EPIVIR GLAXO SMITHKLINE; Sol. orală 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 240 ml + seringă dozatoare (S/P-RF)

EPIVIR GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. film. (S/P-RF)

ZEFFIX GLAXO SMITHKLINE; Sol. orală 5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 240 ml (S/P-RF)

ZEFFIX GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 100 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 14 cpr. (S/P-RF)

Ind: Hepatită cronică (tip B) la adulți și cu dovada replicării virale cu afecțiune hepatică decompensată sau cu inflamație hepatică activă.

Dz: Inițial 100 mg o dată pe zi, până când apare seroconversia AgHBe la două determinări serice consecutive sau până la apariția seroconversiei AgHBs.

Cind: Hipersensibilitate la produs.

Al: Prudență în coinfecții cu virusul hepatitic Delta, tip B precoce mutant sau cu hepatită de tip C; transplant de organe; monitorizare regulată; IR; asocierea cu trimetoprim, ranitidină, cimetidină, zidovudină; sarcină și alăptare.

RA: Disconfort, oboseală, infecții respiratorii, cefalee, dureri abdominale, greață, vărsături și diaree, acidoză lactică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N03AX09

INDINAVIRUM
 INDOMETACINUM
 INFLIXIMABUM
 INOSINUM
 INSULINE
 INSULINE ASPART
 INSULINE DETEMIR
 INSULINE GLARGINE
 INSULINE GLULIZINA
 INSULINE LISPRO
 INTERFERONUM ALFA-2A
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFACON-1
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
 IRINOTECANUM
 ISOCONAZOLUM
 ISOFLURANUM
 ISONIAZIDUM
 ISOSORBIDI DINITRAS
 ISOSORBIDI MONONITRAS
 ISOTRETINOINUM
 ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
 KETOPROFENUM
 KETOROLACUM TROMETHAMIN
 KETOTIFENUM
 LACIDIPINUM
 LACTULOSUM
 LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM

EPIRAL 25; EPIRAL 50; EPIRAL 100 ZENTIVA AS; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 3, 6, 9 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
EPIZOL 25 mg; EPIZOL 50 mg; EPIZOL 100 mg; EPIZOL 200 mg KRKA; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 15 cpr.; ct. × 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
EPIZOL 2 mg; EPIZOL 5 mg; EPIZOL 25 mg; EPIZOL 50 mg; EPIZOL 100 mg; EPIZOL 200 mg KRKA; Cpr. disp. 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 3 sau 10 blist. × 10 cpr. disp. **(P-6L)**
LAMEPTIL 25 mg; LAMEPTIL 50 mg; LAMEPTIL 100 mg; LAMEPTIL 200 mg HEXAL AG; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
LAMICTAL® 25 mg; LAMICTAL® 50 mg; LAMICTAL® 100 mg GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
LAMICTAL® 2 mg; LAMICTAL® 5 mg GLAXO SMITHKLINE; Cpr. disp./mast. 2 mg, 5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. **(P-6L)**
LAMOLEP 25 mg; LAMOLEP 50 mg; LAMOLEP 100 mg RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
LAMOTIRAN 25 mg; LAMOTIRAN 50 mg; LAMOTIRAN 100 mg; LAMOTIRAN 200 mg RANBAXY; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
LAMOTRIGIN STADA 25 mg; LAMOLEP 50 mg; LAMOLEP 100 mg STADA; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 1, 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
LAMOTRIX 25 mg; LAMOTRIX 50 mg; LAMOTRIX 100 mg; LAMOTRIX 200 mg MEDOHEMIE; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 2, 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
PLEXXO® 25 mg; PLEXXO® 50 mg; PLEXXO® 100 mg DESITIN; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 3, 5, 6, 9 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

Ind: *Adulți:* adjuvant sau monoterapie în trat. epilepsiei, crizelor convulsive parțiale sau generalizate, convulsiile tonico-clonice și cele asociate sindromului Lennox-Gaustaut. *Copii:* adjuvant în trat. epilepsiei, al crizelor convulsive parțiale sau generalizate, inclusiv convulsiile tonice.

Dz: *Adulți* inițial 25 mg o dată/zi, timp de 2 săpt., apoi 50 mg o dată/zi, timp de 2 săpt. Doza de întreținere: 100-200 mg/zi, o dată sau divizată în 2 prize.

Cind: Hipersensibilitate la lamotrigină.

Al: Prudență la copii sub 2 ani; interferă în metabolismul acidului folic; IR; întreruperea bruscă poate provoca crize convulsive de rebound; asocierea cu contraceptive orale, valproați, carbamazepină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Eruptii cutanate, sd. Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică, cefalee, fatigabilitate, eruptii, greață, diplopie, vedere neclară, conjunctivită, somnolență, manifestări gastro-intestinale, iritabilitate/agresivitate, tremor, confuzie, leucopenie și trombocitopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INDOMETACINUM
INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-CON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM

Cod ATC: H01CB

SOMATULINE® PR 30 mg IPSEN; Liof. pt. sol. inj. 30 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 2 ml + 1 seringă × 3 ml + 2 ace (S)
SOMATULINE® AUTOGEL 60 mg; SOMATULINE® AUTOGEL 90 mg; SOMATULINE® AUTOGEL 120 mg BEAUFOR IPSEN;
Sol. inj. cu elib. prel. 60 mg, 90 mg, 120 mg; ct. × 1 seringă preumplută × 0,3 ml (60 mg, 90 mg), respectiv 0,5 ml (120 mg) (S)

Ind: Acromegalie; trat. simptomelor clinice ale tumorilor carcinoide.

Dz: Înaintea începerii trat. se efectuează o inj. test pt. evaluarea calității răspunsului. *Acromegalie:* inițial 30 mg, o dată i.m. la 14 zile. În funcție de răspuns se poate crește frecvența: 30 mg la 10 zile. *În tumori carcinoide:* inițial 30 mg, o dată i.m. la 14 zile. În funcție de răspuns se poate crește frecvența: 30 mg la 10 zile.

Cind: Sarcină, alăptare; hipersensibilitate la produs.

A!: Precauții la diabetici, IH, IR; se adm. doar după excluderea unei tumori obstructive intestinale; este necesară efectuarea a unei ecografii a colecistului la fiecare 6 luni; asocierea cu ciclosporină, insulină.

RA: durere la locul de adm. eritem local; diaree sau steatoree, flatulență, anorexie, greață sau vărsături; tulburări ale metabolismului glucidic; litiază biliară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INFLIXIMABUM
INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONIUM ALFA-2A
INTERFERONIUM ALFA-2B
INTERFERONIUM ALFA-CON-1
INTERFERONIUM BETA-1A
INTERFERONIUM BETA-1B
IODIDIUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDIUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM

Cod ATC: A02BC03**LANZAP** DR. REDDY'S LAB.; Cps. gastrorez. 30 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-6L)**LANZUL** KRKA; Cps. gastrorez. 30 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. (P-6L)**LASOPROL 30 mg** AEGIS Ltd.; Cps. gastrorez. 30 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. (P-6L)**LEVANT 30 mg; LEVANT 30 mg** RANBAXY; Cps. gastrorez. 15 mg, 30 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. (P-6L)**Ind:** Ulcer gastric și duodenal (inclusiv cel indus de AINS), esofagită de reflux, sd. Zollinger-Ellison.**Dz:** *Ulcer gastric:* 30 mg o dată/zi timp de 8 săptăm., cazurile severe 60 mg o dată pe zi. *Esofagite de reflux:* 30 mg o dată/zi timp de 8 săptăm. *Cazuri recidivante:* 60 mg o dată/zi. *Ulcer duodenal:* 30 mg o dată/zi timp de 2-4 săptăm. *Sindromul Zollinger-Ellison:* 120 mg o dată/zi. *Terapia de întreținere:* 30-60 mg.**Cind:** Hipersensibilitate la lansoprazol.**Al:** Afecțiunile gastrice maligne trebuie excluse; prudență în adm. îndelungată; copii; asocierea cu diazepam, fenitoină, warfarină, digoxină, fer, ampicilină și ketoconazol.**RA:** Diaree, cefalee, afecțiuni alergice cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INOSINUM
INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-CON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM

Cod ATC: A16AB05

ALDURAZYME® GENZYME Ltd.; Conc. pt. sol. perf. 100 U/ml; ct. × 1, 10 sau 25 fl. × 5 ml (*P-RF*)

Ind: Terapia de substituție enzimatică de lungă durată la pacienții cu diagnostic confirmat de mucopolizaharidoză de tip I (MPZ I; deficiență de alfa-L-iduronidază), pentru tratarea manifestărilor non-neurologice ale bolii.

Dz: Tratamentul trebuie să fie supravegheat de un medic cu experiență în tratamentul pacienților cu MPZ I sau alte boli metabolice ereditare. Doza recomandată este de 100 U/kg, administrate o dată/săptămână, sub formă de perfuzie i.v. Rata de perfuzie inițială de 2 U/kg și oră se poate crește treptat, la fiecare 15 minute, dacă acest lucru este tolerat, până la un maximum de 43 U/kg și oră.

Cind: Hipersensibilitate severă (ex. reacție anafilactică).

Al: Trebuie o monitorizare atentă a pacienților tratați cu Aldurazyme. Nu trebuie administrat simultan cu clorochina sau procaina, din cauza potențialului risc de interferență cu captarea intracelulară a laronidazei.

RA: Înroșirea feței, artropatie, artralgie, erupții cutanate, dureri abdominale, dureri de spate, cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INSULINE
INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM

Cod ATC: S01EX03**XALATAN® PFIZER**; Sol. oft. 50 µg/1 ml; ct. × 1 fl. × 2,5 ml (*P-RF*)**Ind:** Trat. glaucomului și al hipertensiunii intraoculare.**Dz:** 1 picătură o dată/zi, seara.**Cind:** Hipersensibilitate la latanoprost.**Al:** Prudență în sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.**RA:** Eritem, senzație de corp străin în ochi, modificarea culorii irisului și genelor, uneori o ușoară reducere a vederii, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INSULINE ASPART
INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-CON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDIUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM

Cod ATC: L04AA13

ARAVA 10 mg; ARAVA 20 mg LAB. AVENTIS PHARMA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cpr.; ct. × 3 sau 10 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Trat. poliartritei reumatoide la adulți.

Dz: Inițial 100 mg o dată/zi, timp de 3 zile. Doza de întreținere: 10-20 mg o dată/zi.

Cind: Hipersensibilitate la leflunomidă, stări imunodeficitare severe; depresia hematopoietică, anemie, leucopenie, neutropenie sau trombocitopenie datorate altor cauze decât poliartrita reumatoidă; infecții severe; IR moderată-severă; IH; hipoproteinemie severă; copii; sarcină și alăptare.

Al: În timpul trat. trebuie asigurată contracepția; monitorizare hepatică, hematologică și cardiovasculară; procedură de spălare când apar RA severe; interacțiuni medicamentoase cu fenitoină, warfarină, colestiramină, vaccinuri vii și tolbutamidă; șoferi și activități de precizie.

RA: HTA, diaree, greață, vărsături, anorexie, stomatită aftoasă, dureri abdominale, cefalee, parestezii, tenosinovite, căderea părului, eczeme, uscăciunea pielii, leucopenie; hipokaliemie, tulburări ale gustului, rupturi de tendon, anemie, trombocitopenie; tulburări severe ale funcției hepatice, eozinofilie, pancitopenie, hiperlipidemie; sd. Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, eritem multiform, RA anafilactice severe, agranulocitoză, scădere reversibilă a concentrației spermatozoizilor și a motilității acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INSULINE DETEMIR
INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-CON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM

Cod ATC: C08CA13

LERIDIP® BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. film. 9,4 mg (sub formă de 10 mg clorhidrat de lercanidipină); ct. × 1 blist. × 7 cpr.; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. film. (**P-6L**)

Ind: HTA esențiale, forme ușoare și moderate.

Dz: 10 mg oral o dată pe zi, cu cel puțin 15 min înainte de mese; doza poate fi crescută treptat la 20 mg, putând fi necesare 2 săpt. Se poate asocia lercanidipina la un tratament anterior cu: beta-blocant, diuretic sau IEC.

Cind: Hipersensibilitate la produs sau la alte dihidropiridine. Sarcină și alăptare, femei aflate la vârsta fertilă - cu excepția cazului în care este utilizată o metodă contraceptivă eficientă, obstacol în ejecția din ventriculul stâng, IC congestivă netratată, angină pectorală instabilă, IR sau IH severe; în decurs de 1 lună de la IM.

Al: Atenție la pacienți cu boala nodului sinusal (dacă nu are un pacemaker); la pacienți cu insuf. ventriculară stângă, la pacienți cu ischemie miocardică. Asocierea cu ketoconazol, itraconazol, eritromicină și fluoxetină, fenitoină, carbamazepină, terfenadină, astemizol, ciclosporină, amiodaronă, chinidină.

RA: Înrășirea feței, edeme periferice, extrasistole, tahicardie, cefalee, amețeli, astenie, tulburările gastrointestinale, poliuria, erupțiile cutanate, somnolența și mialgiile, hTA, creșteri izolate și reversibile ale valorilor plasmatice ale transaminazelor hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DESCRIZIONE

INFO

INSULINE GLARGINE
INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFAON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM

Cod ATC: L02BG04

FEMARA® 2,5 mg NOVARTIS PHARMA; Cpr. film. 2,5 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Cancer de sân în stadiu avansat, la femei aflate în postmenopauză naturală sau indusă artificial, după recidivă sau progresia bolii, în caz de eșec al tratamentului cu antiestrogeni. Trat. preoperator al cancerului de sân localizat, la femei în postmenopauză cu status pozitiv la receptorii pentru estrogeni.

Dz: 2,5 mg p.o., zilnic. Trat. se continuă până la regresia evidentă a tumorii.

Cind: Hipersensibilitate la letrozol sau la oricare dintre excipienții produsului; premenopauză; sarcină și alăptare; copii.

A1: La pacienții cu insuficiență hepatică gravă (scor Child-Pugh C).

RA: Cefalee, greață, edeme periferice, oboseală, bufeuri, subțierea firului de păr, rash, vărsături, dispepsie, creșterea greutatei corporale, dureri musculo-scheletale, anorexie, sângerări vaginale, leucoree, constipație, amețeli, creșterea apetitului, hipersudorație.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Lesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INSULINE GLULIZINA
INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDIUM
IODIXANOLIUM
IOHEXOLIUM
IOPAMIDOLIUM
IOPROMIDIUM
IPRATROPII BROMIDIUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLIUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDIUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINIUM
ITRACONAZOLIUM
JOSAMYCINIUM
KALII CHLORIDIUM
KALII IODIDIUM
KANAMYCINIUM
KETAMINIUM
KETOCONAZOLIUM
KETOPROFENIUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENIUM
LACIDIPINIUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINIUM
LAMOTRIGINIUM
LANREOTIDIUM
LANSOPRAZOLIUM
LARNIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDIUM
LERCANIDIPINIUM
LETOZOLIUM
LEUPRORELINIUM

Cod ATC: L02AE02

ELIGARD 7,5 mg; ELIGARD 22,5 mg ASTELLAS PHARMA; Liof. pt. sol. inj. 7,5 mg, 22,5 mg; ct. × 1 sau 3 seturi × 2 seringi preumplute (S)

LUCRIN DEPOT 3,75 mg; LUCRIN DEPOT 11,25 mg ABBOTT; Liof. pt. sol. inj. 3,75 mg, 11,25 mg; ct. × 1 fl. microsferice liof. + 1 f. solv. × 2 ml (S)

Ind: Trat. paleativ al carcinomului de prostată hormono-dependent în stadiu avansat, trat. leiomiomelor uterine pentru o perioadă de 6 luni.

Dz: 3,75 mg inj. i.m./s.c. o dată pe lună sau 11,25 mg inj. i.m./s.c. o dată la 3 luni.

Cind: Hipersensibilitate la produs, sarcină sau femeii care pot rămâne însărcinate în timp ce primesc medicamentul.

A!: Uneori agravarea simptomelor în timpul primelor săptăm. de trat. cu analogi ai gonadorelinelor; prudență în metastaze vertebrale și/sau obstrucție a tractului urinar; alăptare, șoferi și activități de precizie.

RA: Bufeuri/transpirații calde, diminuarea libidoului, nicturie, impotență, disurie, reducerea testiculelor, infecții urinare, creșterea în greutate, anorexie, RA la locul de injectare, dureri osoase, oboseală și slăbiciune musculară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INSULINE LISPRO
INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM

Cod ATC: P02CE01

DECARIS GEDEON RICHTER ROMANIA SA; cpr. 50 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr. (50 mg), ct. × 1 blist. × 1 cpr. (150 mg) (P-RF)

Ind: Infestări cu: *Ascaris lumbricoides*, *Necator americanus*, *Strongyloides stercoralis*, *Trichostrongylus colubriformis* și *Ankylostoma duodenale*.

Dz: *Adulți*: 150 mg, doză unică. *Copii*: 2,5 mg/kg. La nevoie, trat. se poate repeta după o pauză de 14 zile.

Cind: Hipersensibilitate la levamisol; alăptare.

AI: Interacțiuni cu mebendazol, alcool; prudență la copiii sub 3 ani; sarcină; șoferi și activități de precizie.

RA: Greață, vomă, cefalee, diaree, encefalopatie, leucopenie, agranulocitoză, eritem, nefropatie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

INTERFERONUM ALFA-2A
INTERFERONUM ALFA-2B
INTERFERONUM ALFA-2C
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARNIDAZOLUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N03AX14

KEPPRA® 250 mg U.C.B. S.A; Cpr. film. 250 mg; ct. × 2, 3, 5, 6 sau 10 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
KEPPRA® 500 mg U.C.B. S.A; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 20 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
KEPPRA® 1000 mg U.C.B. S.A; Cpr. film. 1000 mg; ct. × 1, 2, 3, 5, 6, 10 sau 20 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Terapia asociată tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu/fără generalizare secundară la pacienții epileptici.

Dz: Inițial 500 mg de 2 ori pe zi. În funcție de răspunsul clinic, doza poate fi crescută până la 1500 mg de 2 ori pe zi. Doza poate fi schimbată prin creștere/diminuare cu 500 mg de 2 ori pe zi, la fiecare 2-4 săptăm. IR: reducere cu 50% a dozei de întreținere atunci când clearance-ul creatininei este < 70 ml/min.

Cind: Hipersensibilitate la levetiracetam, la alți derivați de pirolidonă sau la oricare dintre excipienți. Adolescenți sub 16 ani.

Al: Nu se întrerupe brusc trat. Sarcină și alăptare.

RA: Somnolență, amnezie, ataxie, convulsii, amețeli, cefalee, tremor, depresie, labilitate emoțională, comportament anormal, anxietate, confuzie, halucinații, iritabilitate, diaree, dispepsie, greață, anorexie, vertij, diplopie, rash, leucopenie, neutropenie, pancitopenie, trombocitopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM ALFA-2B
 INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
 IRINOTECANUM
 ISOCONAZOLUM
 ISOFLURANUM
 ISONIAZIDUM
 ISOSORBIDI DINITRAS
 ISOSORBIDI MONONITRAS
 ISOTRETINOINUM
 ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
 KETOPROFENUM
 KETOROLACUM TROMETHAMIN
 KETOTIFENUM
 LACIDIPINUM
 LACTULOSUM
 LAMIVUDINUM
 LAMOTRIGINUM
 LANREOTIDUM
 LANSOPRAZOLUM
 LARONIDAZUM
 LATANOPROSTUM
 LEFLUNOMIDUM
 LERCANIDIPINUM
 LETROZOLUM
 LEUPRORELINUM
 LEVAMISOLUM
 LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM

Cod ATC: R01AC02, S01GX02

LIVOSTIN JANSSEN PHARMACEUTICA; Sol. oft. 0,5 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 4 ml (*P-6L*)

Ind: Adm oft: Conjunctivită alergică.

Dz: Oft.: 1 picătură în fiecare ochi, de 2 ori/zi. Doza poate fi mărită la 1 picătură de 3-4 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții produselor.

Al: Oft.: lentile de contact moi. Prudență în sarcină; șoferi și activități de precizie.

RA: Irritație slabă și tranzitorie, RA. alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INTERFERONUM ALFACON-1
INTERFERONUM BETA-1A
INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM

Cod ATC: R06AE09

XYZAL® U.C.B. S.A; Cpr. film. 5 mg; ct. × 4, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 cpr. (**P-6L**)

Ind: Rinite alergice sezoniere (inclusiv simptome oculare); rinite alergice perene; urticarie idiopatică cronică.

Dz: *Adulți și adolescenții peste 12 ani:* 5 mg; *copii 6-12 ani:* 5 mg; IR: 5 mg la 2-3 zile în funcție de clearance-ul de creatinină. Durata de adm. depinde de tipul, durata și evoluția simptomatologiei.

Cind: Hipersensibilitate la levocetirizină sau la oricare dintre excipienții produsului sau la oricare derivați de piperazină. IR severă (clearance-ul creatininei sub 10 ml/min). Copil sub 6 ani. Pacienți cu intoleranță ereditară la galactoză.

Al: Precauție la ingestia concomitentă de alcool. Sarcină și alăptare. *oferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, somnolență, oboseală și astenie; uscăciunea gurii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INTERFERONUM BETA-1A
 INTERFERONUM BETA-1B
 IODIDUM
 IODIXANOLUM
 IOHEXOLUM
 IOPAMIDOLUM
 IOPROMIDUM
 IPRATROPII BROMIDUM
 IRBESARTANUM
 IRINOTECANUM
 ISOCONAZOLUM
 ISOFLURANUM
 ISONIAZIDUM
 ISOSORBIDI DINITRAS
 ISOSORBIDI MONONITRAS
 ISOTRETINOINUM
 ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
 KETOPROFENUM
 KETOROLACUM TROMETHAMIN
 KETOTIFENUM
 LACIDIPINUM
 LACTULOSUM
 LAMIVUDINUM
 LAMOTRIGINUM
 LANREOTIDUM
 LANSOPRAZOLUM
 LARONIDAZUM
 LATANOPROSTUM
 LEFLUNOMIDUM
 LERCANIDIPINUM
 LETROZOLUM
 LEUPRORELINUM
 LEVAMISOLUM
 LEVETIRACETAMUM
 LEVOCABASTINUM
 LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM

Cod ATC: N04BA02

MADOPAR® 250 HOFFMANN LA ROCHE/TERAPIA SA; Cpr. cu 200 mg levodopa + 50 mg benserazidă; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)

MADOPAR® 125 HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. orale disp. cu 100 mg levodopa + 25 mg benserazidă; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cpr. (P-6L)

MADOPAR® HBS HOFFMANN LA ROCHE; Cps. cu elib. controlată; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cps. (P-6L)

Ind: Parkinson, cu excepția celui iatrogen. Cps. cu elib. prel. sunt indicate la pacienții cu fluctuații de orice tip privind răspunsul la trat., în special la cei cu fluctuații ale nivelelor plasmatice și pentru un mai bun control al simptomelor nocturne.

Dz: În stadiile inițiale: 62,5 mg de 3-4 ori/zi. În stadiile avansate doza este dublă. Dacă se confirmă tolerabilitatea planului terapeutic inițial, dozele pot fi crescute săptămânal, cu încă cel mult o doză/zi. Sub supraveghere strictă, doza se poate adapta la fiecare 2-3 zile. Efectul optimal se obține la doze de 400-800 mg levodopa + 100-200 mg benserazidă, adm. divizat în 3-4 doze/zi. Doza de întreținere este de 125 mg de 4-6 ori/zi. În cazul pacienților care prezintă fluctuații semnificative ale efectelor medicamentului în cursul zilei și la care se adm. doze mici, repetate, se preferă forma HBS, cu păstrarea aceleiași posologii, de la o zi la alta. După 2-3 zile dozele se cresc gradat cu până la 50%, datorită biodisponibilității acestei forme farmaceutice.

Cind: Asocierea cu IMAO (excepție selegilina). Pacienți cu decompensări grave, endocrine, renale, hepatice sau cardiace, cei cu psihoze sau nevroze psihice severe. Pacienți sub 25 de ani. Asocierea cu neuroleptice, vit. B₆. Sarcină și alăptare.

Al: Măsurarea presiunii intraoculare la pacienții cu glaucom. Controale periodice cardio-vasculare (inclusiv ECG) la pacienții care au în antecedente IMA, insuficiență coronariană sau aritmie cardiacă. Antecedente de ulcer gastric sau osteomalacie. Trat. va fi oprit cu cel puțin 12-14 ore înaintea unei anestezii generale. În cazurile de urgență, în care terapia nu a fost oprită, se evită anestezia cu ciclopropan sau halotan.

RA: Anorexie, greață, vomă; în stadiile tardive ale trat. mișcări involuntare de tip coreiform sau atetozic; insomnie, agitație, rareori psihoze și/sau reacții psihotice - în special la vârstnici; afectare hepatică sau renală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

INTERFERONUM BETA-1B
IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETOZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM

Cod ATC: N04BA02

CARBIDOPA/LEVODOPA 25/100; CARBIDOPA/LEVODOPA 25/250 TEVA PHARM.; Cpr. 100 mg levodopa și 25 mg carbidopa, resp. cpr. 250 mg levodopa și 25 mg carbidopa; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

CREDANIL REMEDICA; Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

ISICOM DESITIN; Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 100 cpr. **(P-6L)**

NAKOM; NAKOM MITE LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa, respectiv 100 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

SINEMET CR® 50/200; SINEMET CR® 25/100 MERCK SHARP & DOHME; Cpr. cu elib. prel. 200 mg levodopa + 50 mg carbidopa, respectiv 100 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 1 fl. × 100 cpr. **(P-6L)**

ZIMOX FARAN LAB.; Cpr. 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

Ind: Parkinson.

Dz: Inițial 1/2 cpr. 1-2 ori/zi, crescând cu câte 1/2 cpr./zi sau la două zile, până la obținerea efectul optim; doza max. 8 cpr./zi.

Cind: Glaucom, IC, IH, insuficiență pulmonară, endocrină și a măduvei osoase. Trat. cu IMAO, neuroleptice, simpatomimetice. Copii. Sarcină și alăptare.

Al: Depresie cu tendință de suicid sau manifestări antisociale. Examenul fundului de ochi la pacienți cu glaucom. ^aoferi și activități de precizie.

RA: Pierderea apetitului, greață, hTA ortostatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IODIDUM
IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM

Cod ATC: R05DB27**LEVOPRONT® SIROP** HEINRICH MACK NACHF; Sirop 0,6%; ct. × 1 fl. × 120 ml (*P-RF*)**LEVOPRONT® SOLUȚIE ORALĂ ÎN PICĂTURI** HEINRICH MACK NACHF; Sol. orală 6%; ct. × 1 fl. × 15 ml (*P-RF*)**Ind:** Trat. simptomatic al tusei neproductive.**Dz:** *Adulți și copii peste 12 ani:* 60 mg oral, la cel puțin 6 ore de max. 3 ori pe zi. *Copii peste 2 ani:* 1 mg/kg, de cel mult 3 ori/zi, max. 3 mg/kg. Tratamentul poate fi continuat până la 7 zile.**Cind:** Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului; hipersecreție traheobronșică; reducere a funcției mucociliare; IH gravă; sarcină; alăptare.**Al:** IR gravă; pacienții cu diabet zaharat; siguranța și eficacitatea adm. la copiii sub 2 ani nu au fost stabilite; șoferi și activități de precizie.**RA:** Greață, vărsături, pirozis, disconfort abdominal, diaree; lipotimie, somnolență, obnubilare, parestezii, amețeli, cefalee; palpitații.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IODIXANOLUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM

Cod ATC: J01MA11

TAVANIC® AVENTIS PHARMA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 1 blist. × 5, 7 sau 10 cpr. (P-RF)

TAVANIC® i.v. 250 mg; TAVANIC® i.v. 500 mg AVENTIS PHARMA; Sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml sau 100 ml (P-RF)

Ind: Infecții cu germeni sensibili: sinuzite, bronșite cronice, pneumonie.

Dz: *Adulți* p.o.: sinuzită 500 mg/zi, în priză unică; bronșită cronică: 500 mg/zi, în priză unică; pneumonie: 500 mg, de 2 ori/zi (sau iv).

Cind: Copii sau adolescent în creștere. Hipersensibilitate la produs sau la chinolone. Epilepsie, deficit de G-6PDH, antecedente de tendinopatie.

Al: Precauție în miastenie, convulsii în antecedente, IR, prezența colitei pseudomembranoase. Se evită expunerea la lumină sau UV. Soferi și activități de precizie.

RA: Grețuri, diaree, anorexie, cefalee, amețeală, vertij. Rar enterocolită, melenă, colită pseudomembranoasă, hipoglicemie, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM

Cod ATC: N05AA02**LEVOMEPRMAZIN 25 mg** TERAPIA SA; Cpr. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Stări psihotice acute și cronice (schizofrenie, delir paranoic, psihoze halucinatorii). Episoade severe de depresie majoră, în asociere cu un antidepresiv.

Dz: Doza uzuală este de 25-200 mg/zi, la nevoie putându-se crește până la 400 mg/zi. Tratamentele se inițiază cu doze mici, care se cresc treptat. **Cind:** Hipersensibilitate la levomepromazină, la alte fenotiazine și la celelalte componente ale produsului; stări de deprimare ale SNC; glaucom cu unghi închis; tulburări cu risc de retenție urinară; mielodepresie, antecedente de agranulocitoză; copii sub 12 ani.

Al: Apariția febrei sau a infecțiilor impune efectuarea hemogramei (risc de agranulocitoză); parkinson (neurolepticele agravează simptomatologia bolii Parkinson); epilepsie (risc de crize convulsive); afecțiuni cardiovasculare grave (crește riscul de tahicardie sau de hipotensiune arterială); la vârstnici (risc mai mare de hipotensiune ortostatică, sedare, tulburări extrapiramidale, retenție urinară sau constipație cronică); la pacienții cu afecțiuni renale sau hepatice grave (prudență și administrarea unor doze mai mici). Precauție în cazul asocierii cu: agoniști dopaminergici (apomorfina, bromocriptina), medicamente care pot induce torsada vârfurilor (antiaritmice din clasele I și III, cisaprid, eritromicină i.v.), anestezice generale, sedative, tranchilizante, analgezice opioide, antidepresive triciclice, antihistaminice gen. I (potențarea deprimării SNC), anticolinergice (potențarea retenției urinare, constipației sau uscăciunii gurii), antihipertensive (potențarea hipotensiunii arteriale), antiacide cu calciu, magneziu sau aluminiu (este redusă absorbția digestivă a levomepromazinei). A se evita consumul de alcool în timpul trat. Nu se recomandă adm. în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare. Precauție la șoferi și la persoane cu activități de precizie.

RA: La doze mici pot să apară tulburări neurovegetative: hipotensiune arterială ortostatică, efecte anticolinergice (uscăciunea gurii, constipație, ileus paralytic, retenție urinară); tulburări neuropsihice: sedare sau somnolență, mai ales la începutul tratamentului. La doze mai mari pot să apară tulburări neurologice: diskinezii precoce, sindrom extrapiramidal, diskinezii tardive; tulburări endocrine și metabolice: hiperprolactinemie, impotență, ginecomastie, frigiditate, amenoree, galactoree, hiperglicemie, creștere în greutate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

IOPAMIDOLUM
IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03AC03

MIRENA® SCHERING AG; Dispozitiv intrauterin 52 mg; ct. × 1 blist. × 1 disp. intrauterin + accesorii (*P-RF*)

POSTINOR® 2 RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. 0,75 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr. (*P-RF*)

Ind: *p.o.*: contracepția orală, destinată femeilor cu contacte sexuale ocazionale și/sau neplanificate. *Intrauterin*: contracepție, menoragie idiopatică, profilaxia hiperplaziei endometriale în timpul trat. cu estrogeni.

Dz: *p.o.*: 0,75 mg, în decurs de o oră de la contactul sexual, max. 1-2 cpr.; lunar, maxim 4 cpr. *Intrauterin*: dispozitivul intrauterin se plasează în cavitatea uterină (viteza de eliberare este inițial de 20 µg/24 ore) pentru 5 ani.

Cind: Hipersensibilitate la produs; sarcină sau suspiciune de sarcină; inflamații pelvine; infecții genitale; endometrită postpartum; abort septic în ultimele 3 luni; cervicită; cancer cervical, de sân sau uterin; hemoragie uterină; anomalii uterine congenitale sau dobândite incluzând fibroame care deformează cavitatea uterină; condiții asociate cu creșterea sensibilității la infecții; afecțiuni hepatice acute sau tumori hepatice, afecțiuni renale.

Al: *p.o.*: Prudență în astm, IC, HTA, migrenă, epilepsie, disfuncții renale, diabet zaharat, hiperlipemie, depresie, tromboflebite, afecțiuni trombotice și hemoragie cerebrală; vomă sau diaree. Asocierea cu ampicilină, rifampicină, tetraciclina, cloramfenicol, neomicină, sulfonamide, barbiturice și fenilbutazonă. *Intrauterin*: Prudență în ischemie cerebrală trecătoare; cefalee foarte severă; icter; creșterea marcată a TA; neoplasm hormono-dependent, incluzând cancerul de sân; risc crescut de tromboembolie venoasă; afecțiuni cardiace congenitale sau valvulare cu risc de endocardită infecțioasă; alăptare.

RA: Grețuri, amețeli sau sângerare intermenstruală la 2-3 zile după adm., cefalee și senzație de tensiune în sâni.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IOPROMIDUM
IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM

Cod ATC: C01CX08

SIMDAX® ABBOTT; Conc. pt. sol. perf. 2,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (S)

Ind: Tratamentul pe termen scurt al acutizărilor severe ale insuficienței cardiace cronice.

Dz: Tratamentul trebuie inițiat cu o doză de încărcare de 12-24 µg levosimendan/kg, administrată în 10 minute, urmată de o perfuzie intravenoasă continuă de 0,1 µg levosimendan/kg și minut. Tratamentul trebuie administrat într-o secție de terapie intensivă în care sunt disponibile facilități adecvate de monitorizare și personal cu experiență în utilizarea agenților inotrop-pozitivi.

Cind: Hipersensibilitate la levosimendan sau la oricare din excipienții produsului. Obstrucții mecanice semnificative care afectează umplerea sau ejecția ventriculară sau ambele. Insuficiența renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min). Insuficiența hepatică severă. Hipotensiune arterială și tahicardie, severe. Antecedente de aritmie de tipul torsadei vârfurilor.

Al: Precauție la pacienții cu insuficiență renală sau hepatică ușoară până la moderată. Poate apărea o scădere a kaliemiei. Astfel, concentrațiile plasmatice scăzute de kaliu trebuie corectate înainte de administrarea produsului și kaliul plasmatic trebuie monitorizat în timpul tratamentului.

RA: Cefalee, hipotensiune arterială, ischemie miocardică, extrasistole, fibrilații atriale, tahicardie, amețeli, scăderea hemoglobinei, hipokaliemie, greață, vărsături.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

IPRATROPII BROMIDUM
IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETOZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AL07

LEVOPRAID® 25 mg; LEVOPRAID® 50 mg; LEVOPRAID® 100 mg KNOLL FARMACEUTICI; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Depresii endogene și reactive. Schizofrenie acută și cronică.

Dz: *Adulți:* În depresii endogene și reactive se recomandă 50-150 mg levosulpiridă (1-3 comprimate Levopraid 50 mg) pe zi. În schizofrenia acută se recomandă 200-300 mg levosulpiridă (2-3 comprimate Levopraid 100 mg) pe zi. În schizofrenia cronică doza recomandată este de 150 mg levosulpiridă (3 comprimate Levopraid 50 mg) pe zi. Această doză poate fi redusă treptat în funcție de starea clinică. La vârstnici, doza trebuie stabilită cu atenție considerându-se o posibilă reducere a dozelor menționate mai sus.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la levosulpiridă sau la oricare dintre excipienții produsului; la pacienții cu feocromocitom, epilepsie, manii sau stadii maniacale ale psihozelor maniaco-depresive, pacienți cu mastopatie malignă.

Al: A fost raportat în timpul tratamentului un complex de simptome potențial letal cunoscut ca sindrom neuroleptic malign, cu semnele clinice: hiperpirexie, rigiditate musculară, achinezie, tulburări vegetative (variații ale pulsului și tensiunii arteriale, transpirații, tahicardie, aritmii) și alterări ale stării de conștiență care pot progresa până la letargie și comă. Tratamentul sindromului neuroleptic malign constă în: întreruperea imediată a administrării de medicamente antipsihotice și a altor medicamente neesențiale, precum și instituirea unui tratament simptomatic intensiv (o atenție specială se va acorda reducerii hipertermiei și corectării deshidratării). Nu trebuie administrat în prezența sângerărilor gastrointestinale, a obstrucțiilor mecanice sau a perforațiilor. Levopraid nu trebuie utilizate în timpul sarcinii presupuse sau confirmate și în timpul alăptării. La doze mai mari pot să apară: somnolență, parestezii și diskinezie; datorită pericolelor potențiale, pacienții aflați sub tratament cu Levopraid trebuie avertizați asupra acestor riscuri pentru a evita conducerea de vehicule sau folosirea de utilaje.

RA: Foarte rar au fost observate agitație psihomotorie, tulburări neurovegetative și reacții alergice; aceste reacții sunt ușoare și reversibile. După tratamente de lungă durată s-au observat cazuri izolate de creștere în greutate. În cazul administrării prelungite, tulburări cum sunt amenoreea, ginecomastia, galactoreea și alterarea libidoului, au fost observate în cazuri particulare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IRBESARTANUM
IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM

Cod ATC: H03AA01

EUTHYROX® 25; EUTHYROX® 50; EUTHYROX® 100; EUTHYROX® 150; EUTHYROX® 200 MERCK KGaA; Cpr. 25 µg, 50 µg, 100 µg, 150 µg, 200 µg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. **(P-6L)**

L-THYROXIN-25; L-THYROXIN-50; L-THYROXIN-100 BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. 25 µg, 50 µg, 100 µg; ct. × 2 sau 4 blist. × 25 cpr. **(P-6L)**

THYRO-4 FARAN LAB.; Cpr. 100 µg, 200 µg; ct. × 1 fl. × 100 cpr. **(P-6L)**

Ind: Trat. hipotiroidie şi bolnavii cu hipertiroidism trataţi cu antitiroidiene; profilaxia guşei după tiroidectomie la cei cu funcţie tiroidiană păstrată; guşa benignă eutiroidiană; trat. supresor/substitutiv în carcinom tiroidian; test de supresie tiroidiană.

Dz: *Adulţi:* În hipotiroidism: oral 25-300 µg/zi, crescând doza la 2-4 săpt.; doza de întreţinere: 125-250 µg/ zi. Test de supresie tiroidiană: p.o. 200 µg/zi, 14 zile sau o doză unică de 3 mg cu 7 zile înaintea repetării scintigrafiei. *Copii:* 12,5-50 µg/zi crescând progresiv până la doza de întreţinere de 100-150 µg/m² şi zi.

Cind: Hipersensibilitate la levotiroxină; hipertiroidii netratate cu antitiroidiene; IMA recent; angină pectorală; miocardite; IC decompensată; insuficienţă corticosuprarenală netratată.

Al: Monitorizarea nivelului plasmatic al tirotrofinei şi al tiroxinei libere; prudenţă la vârstnici; cardiaci; forme grave de hipotiroidism; HTA; insuficienţă hipofizară; anorexie cu denutriţie; tbc; diabet zaharat; obezitate; interacţiuni medicamentoase cu insulina, antidiabetice orale, anticoagulante cumarinice, antidepresive triciclice, colestiramină, sucralfat, hidroxid de aluminiu, sulfat feros, fenitoină, carbamazepină, rifampicină, digitalice, amiodaronă; sarcină şi alăptare.

RA: În caz de creştere rapidă a dozei: manifestări de hipertiroidism, în cazuri izolate RA. de hipersensibilitate (rash); creşterea riscului de crize convulsive la copiii epileptici; la sugari sau la copii poate să apară hipercalciurie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

IRINOTECANUM
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM

Cod ATC: N01BB02, C01BB01**LIDOCAIN** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sol. ext. 10%; ct. × 1 fl. spray × 38 g (50 ml) (*P-RF*)**LIDOCAINA INFO SINT 1%; LIDOCAINA INFOSINT 2%** A.C.S. DOBFAR; Sol. inj. 1%, 2%; ct. × 5 sau 10 f. × 5 sau 10 ml (*P-RF*)**XILINĂ 40 mg/2 ml; XILINĂ 80 mg/2 ml; XILINĂ 100 mg/10 ml** ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 2%, 4%, 1%; ct. × 5 f., ct. × 10 f., ct. × 100 f. (*S/P-RF*)**XYLOCAINE 10% SPRAY** ASTRAZENECA; Sol. ext. lidocaină 10%; ct. × 1 fl. × 50 ml (*S/P-RF*)**Ind:** Anestezie locală; trat. tahiaritmiilor ventriculare asociate infarctului miocardic; controlul fibrilației ventriculare în resuscitarea cardiopulmonară.**Dz:** Anestezie locală: 5-300 mg. *Antiaritmic:* resuscitarea cardiopulmonară, controlul fibrilației ventriculare doză unică de 100 mg i.v.; alte ind.: doză de atac 1-1,5 mg/kg inj. i.v., urmată de perfuzie 1-4 mg/min până la max. 200-300 mg/oră.**Cind:** Alergie la lidocaină sau alte anestezice amidice, IH, IR, miastenienie, asociere cu anticoagulante, șoc hipovolemic, IC, hTA, bloc cardiac, bradicardie.**AI:** Prudență în IMA, insuficiență respiratorie, antecedente convulsive; leziuni în regiunea aplicării; anestezie generală; riscul aspirației traheo-bronșice; interacțiuni medicamentoase cu tocainidă, cimetidină, propranolol, succinilcolină, antidepressive triciclice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.**RA:** hTA, bradicardie, cefalee, bloc spinal, deprimare cardio-vasculară, deprimare respiratorie; efecte toxice acute la nivelul SNC.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01FF02

ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM

LINCOCIN™ PHARMACIA & UPJOHN; Sol. inj. i.m./perf. 300 mg/ml; ct. × 1 fl. × 2 ml (S/P-RF)

LINCOCIN™ PHARMACIA & UPJOHN; Cps. 500 mg; ct. × 3 blist. × 4 cps. (P-RF)

NELOREN LEK PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 300 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 ml (S/P-RF)

Ind: Infecții severe produse de: stafilococi sensibili la meticilină, streptococi, Corynebacterium diptheriae, Campylobacter, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma sp., Chlamydia trachomatis, Clostridium perfringens, Actinomyces, Propionibacterium, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Veillonella, inclusiv anaerobi - infecții ORL, bronhopulmonare, stomatologice, cutanate, osteo-articulare, infecții abdominale postchirurgicale, septicemii.

Dz: *Int.:* **Adulți:** 500 mg la 6-8 ore. *Copii (peste o lună):* În infecții grave: 30-60 mg/kg/zi divizate în 3 sau 4 doze egale. *Inj. i.m.:* **Adulți:** 600 mg la 12-24 ore. *Copii (peste o lună):* 10 mg/kg o dată/zi, la nevoie de 2-3 ori/zi. *Perf. i.v.:* **Adulți:** 600 mg la 8-12 ore. *Copii (peste o lună):* 10-20 mg/kg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la lincomicină sau clindamicină. Copiii sub o lună; prematuri.

Al: Nu este indicată în meningite; risc de colită pseudomembranoasă; prudență în antecedente de astm sau alergii; monitorizarea hemogramei, funcției renale și hepatice; IR; IH; interacțiuni medicamentoase cu eritromicină, curarizante; sarcină și alăptare.

RA: Dureri abdominale, diaree persistentă inclusiv colită pseudomembranoasă, greață, vărsături, alergii, suprainfecții fungice, afectare hepatică, reacții la locul injectării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01XX

ISOFLURANUM
ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM

ZYVOXID® PHARMACIA & UPJOHN; Cpr. film. 400 mg, 600 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. **(P-RF)**

ZYVOXID® PHARMACIA & UPJOHN; Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 10 pungi × 300 ml **(S)**

ZYVOXID® PHARMACIA & UPJOHN; Gran. pt. susp. orală 100 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 66 gran. pt. 150 ml susp. **(P-RF)**

Ind: Pneumonii nozocomiale și comunitare; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; infecții enterococice. Dacă se suspectează coexistența unei bacterii patogene Gram negativ, se adm. asociat cu alt antibiotic.

Dz: *Adulți - Pneumonie nozocomială:* 600 mg i.v. sau p.o.; 10-14 zile; *Infecții cutanate și ale țesuturilor moi:* 400-600 mg oral sau 600 mg i.v.; 10-14 zile; *Infecții enterococice:* 600 mg i.v. sau p.o., 14-28 zile; *Copii sub 5 ani:* 10 mg/ kg de 2 ori pe zi; doza max. 600 mg.

Cind: Hipersensibilitate la produs.

Al: În cazurile în care se suspectează colita pseudomembranoasă se întrerupe adm. Poate determina dezvoltarea microorganismelor rezistente. Monitorizarea plachetelor sanguine la cei cu trombocitopenie preexistentă, tratați concomitent cu medicamente ce le scad, sau care au fost tratați mai mult de 14 zile. Se evită ingerarea de cantități excesive de alimente și băuturi cu conținut ridicat de tiramină sau asocierea cu dopamină sau adenalină. *oferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, diaree, greață și vărsături, candidoză vaginală, gust metalic, creșterea bilirubinei totale, GOT, GPT, LDH, fosfatazei alcaline, creatinkinazei, lipazei, amilazei, sau a glicemiei; scăderea proteinelor totale, albuminei, sodiului sau calciului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ISONIAZIDUM
ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARNIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM

Cod ATC: C09AA03

LISIGAMMA 5 mg; LISIGAMMA 10 mg; LISIGAMMA 20 mg WORWAG PHARMA; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

LISINOPRIL SANDOZ 5 mg; LISINOPRIL SANDOZ 10 mg; LISINOPRIL SANDOZ 20 mg HEXAL AG; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

LISIREN 10 mg; LISIREN 20 mg AC HELCOR SRL; Cpr. 10 mg, 20 mg; ct. × 20 cpr. **(P-6L)**

MEDAPRIL 5; MEDAPRIL 10; MEDAPRIL 20 MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (5 mg, 10 mg) sau ct. × 2 blist. × 10 cpr. (20 mg) **(P-6L)**

RANOLIP RANBAXY LAB.; Cpr. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

SINOPRYL ANTIBIOTICE SA; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

TONOLYSIN 2,5 mg; TONOLYSIN 5 mg; TONOLYSIN 10 mg; TONOLYSIN 20 mg GEDEON RICHTER Ltd.; Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. **(P-6L)**

Ind: HTA; IC.

Dz: HTA: 10-40 mg, o dată/zi (IR: scad doza). IC: inițial 2,5 mg/zi, doza de întreținere 5-20 mg, o dată/zi.

Cind: Hipersensibilitate la lisinopril sau alt IEC; sarcină și alăptare.

A!: Prudență în hTA; persoane cu pierderi de sodiu; cardiopatie ischemică; tulburări cerebrovasculare; monitorizarea potasemiei și HLG; vârstnici; IR; copii; interacțiuni medicamentoase cu indometacin; sarcină și alăptare.

RA: Vertij, cefalee, oboseală, diaree, tuse, disconfort la nivelul pieptului, febră, angină pectorală, hTA ortostatică, dureri abdominale, anorexie, constipație, gută, dureri de oase sau de șold, depresie, somnolență, insomnie, bronșită, sinuzită, oligurie, azotemie progresivă, IRA, infecții urinare, tulburări de vedere, prurit, vasculită, edeme angioneurotice, a glotei și/sau laringelui, creșteri minore ale uremiei și ale creatininei serice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01GX05

ISOSORBIDI DINITRAS
ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARNIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM

ALOMIDE ALCON; Sol. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)**Ind:** Keratoconjunctivite sezoniere, conjunctivite giganto-papilare, keratite sezoniere.**Dz:** 1-2 picături în fiecare ochi de 4 ori/zi, la intervale regulate.**Cind:** Hipersensibilitate la produs.**Al:** Prudență la copiii sub 4 ani; lentile de contact moi (hidrofilice); sarcină și alăptare.**RA:** Senzație de arsură, înțepătură, prurit sau lăcrimare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ISOSORBIDI MONONITRAS
ISOTRETINOINUM
ITRACONAZOLUM
JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARNIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM

Cod ATC: J01MA07

LOMADAY DR. REDDY'S LAB. Ltd.; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 blist. × 5 cpr. (P-RF)

OKACIN NOVARTIS PHARMA.; Sol. oft. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)

Ind: Infecții ale căilor respiratorii inf. și urinare, conform antibiogramei.

Dz: Oral 400 mg, o dată/zi.

Cind: Hipersensibilitate la lomefloxacină sau la derivați; sarcină și alăptare; la copii și adolescenți sub 18 ani.

Al: Se evită expunerile la soare sau UV; asocieri cu antiacidele care conțin aluminiu sau magneziu, cimetidină, AINS și probenecid.

RA: Greață, diaree, cefalee, amețeală, fotosensibilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A07DA03

ISOTRETINOINUM
 ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
 KETOPROFENUM
 KETOROLACUM TROMETHAMIN
 KETOTIFENUM
 LACIDIPINUM
 LACTULOSUM
 LAMIVUDINUM
 LAMOTRIGINUM
 LANREOTIDUM
 LANSOPRAZOLUM
 LARONIDAZUM
 LATANOPROSTUM
 LEFLUNOMIDUM
 LERCANIDIPINUM
 LETROZOLUM
 LEUPRORELINUM
 LEVAMISOLUM
 LEVETIRACETAMUM
 LEVOCABASTINUM
 LEVOCETIRIZINUM
 LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
 LEVODOPUM + CARBIDOPUM
 LEVODROPROPIZINUM
 LEVOFLOXACINUM
 LEVOMEPROMAZINUM
 LEVONORGESTRELUM
 LEVOSIMENDANUM
 LEVOSULPIRIDUM
 LEVOTHYROXINUM
 LIDOCAINUM
 LINCOMYCINUM
 LINEZOLIDUM
 LISINAPRILUM
 LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM

DISSENTEN S.P.A.; Cpr. 2 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
IMODIUM JANSSEN PHARMACEUTICA; Cps. 2 mg; ct. × 1 blist. × 6 cps. (OTC)
IMODIUM 2 mg TERAPIA SA/JANSSEN PHARMACEUTICA; Cps. 2 mg; ct. × 1 blist. × 6 cps. (OTC)
LOPERAMID TERAPIA SA; Sol. orală 0,02%; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
LOPERAMID 2 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. 2 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (OTC)
LOPERAMID 2 mg LAROPHARM; Cps. 2 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (OTC)
NEO-ENTEROSEPTOL® SPECIFAR SA; Cps. 2 mg; ct. × 1 blist. × 6 cps. (OTC)

Ind: Diaree acută și cronică.

Dz: Diaree acută: *Adulți și copii peste 12 ani:* inițial 4 mg, apoi 2 mg după fiecare scaun diareic, maxim 16 mg/zi. *Copii 6-8 ani* - inițial 2 mg după primul scaun diareic și apoi 1 mg după fiecare scaun diareic, maxim 4 mg/zi. *Copii 9-11 ani* - inițial 2 mg după primul scaun diareic și apoi 1 mg după fiecare scaun diareic, maxim 6 mg/zi. *Diaree cronică.* *Adulți:* 2 mg de 1-3 ori/zi. *Copii peste 8 ani:* 1 mg de 1-2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la loperamidă; acutizările rectocolitei ulcero-hemoragice.

Al: Este necesară rehidratarea; nu trebuie utilizată ca trat. de primă alegere în dizenterii acute cu sânge în scaun și cu febră sau în colită pseudomembranoasă; prudență în LH; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Constipație, reacții de hipersensibilitate, dureri abdominale, balonări, vărsături, oboseală, somnolență, vertij, uscăciunea gurii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R06AX13

ITRACONAZOLUM
 JOSAMYCINUM
 KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
 KETOPROFENUM
 KETOROLACUM TROMETHAMIN
 KETOTIFENUM
 LACIDIPINUM
 LACTULOSUM
 LAMIVUDINUM
 LAMOTRIGINUM
 LANREOTIDUM
 LANSOPRAZOLUM
 LARONIDAZUM
 LATANOPROSTUM
 LEFLUNOMIDUM
 LERCANIDIPINUM
 LETROZOLUM
 LEUPRORELINUM
 LEVAMISOLUM
 LEVETIRACETAMUM
 LEVOCABASTINUM
 LEVOCETIRIZINUM
 LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
 LEVODOPUM + CARBIDOPUM
 LEVODROPROPIZINUM
 LEVOFLOXACINUM
 LEVOMEPRMAZINUM
 LEVONORGESTRELUM
 LEVOSIMENDANUM
 LEVOSULPIRIDUM
 LEVOTHYROXINUM
 LIDOCAINUM
 LINCOMYCINUM
 LINEZOLIDUM
 LISINAPRILUM
 LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
 LOPERAMIDUM
LORATADINUM

CLARITINE SCHERING PLOUGH EUROPE; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
CLARITINE SCHERING PLOUGH EUROPE; Sirop 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 60 sau 120 ml (P-6L)
CLAROZONE OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
EROLIN EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 5 sau 10 cpr. (OTC)
EROLIN EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sirop 0,1%; ct. × 1 fl. × 120 ml (P-6L)
FLONIDAN® LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
FLONIDAN® LEK PHARMACEUTICALS; Susp. orală. 1 mg/1 ml; ct. × 1 fl. × 120 ml (P-6L)
LORANO® HEXAL HEXAL AG; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 7 cpr. (OTC)
LORASTAMIN 10 mg AC HELCOR SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
LORATADIN 10 mg VIM SPECTRUM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
LORATIMED OKASA PHARMA PRIVATE LTD; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
LORATIN TERAPIA SA; Sol. orală 5 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml + lg. dozatoare (P-6L)
LORATADIN 10 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
LORATADINĂ LPH® 10 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 sau 50 blist. × 10 cpr. (OTC)
PRESSING 10 mg HEMOFARM; Cpr. 10 mg; ct. × 1 tub × 10 cpr. (OTC)
PRESSING HEMOFARM; Cpr. eferv. 10 mg; ct. × 1 tub × 10 cpr. (OTC)
RINOLAN® PLIVA; Sirop 5 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml + lg. dozatoare (P-6L)
ROLETRA RANBAXY LAB.; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
SYMPHORAL® 10 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (OTC)
SYMPHORAL® 1 mg/ml GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Sirop 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 60 sau 120 ml (P-6L)

Ind: Rinite alergice sezoniere și perene; conjunctivite alergice; urticarie cronică idiopatică și alte dermatoze alergice.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 10 mg, o dată/zi. *Copiii 2-12 ani cu greutate corporală peste 30 kg:* 10 mg, o dată/zi. *Copiii 2-12 ani cu greutate corporală sub 30 kg:* 5 mg, o dată/zi. *Copiii 1-2 ani:* 2,5 mg, o dată/zi. **IH** - la adulți 5 mg o dată/zi.

Cind: Hipersensibilitate la produs.

Al: Prudență în trat. de lungă durată; **IH;** adm. trebuie întreruptă cu cel puțin 2 zile înaintea testelor cutanate de hipersensibilitate; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină, ketoconazol, fluconazol, eritromicină sau fluoxetină; sarcină și alăptare.

RA: Cefalee, amețeli, oboseală și somnolență, uscăciunea gurii, creșterea apetitului, greață, tuse, căderea părului, sincopă, anafilaxie, disfuncție hepatică și tahiaritmii supraventriculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

JOSAMYCINUM
KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRIMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM

Cod ATC: N05BA06**ANXIAR® 1 mg** GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 1 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. (P-RF)**Ind:** Anxietate, agitație, iritabilitate și insomnie asociate cu nevroze anxioase.**Dz:** *Adulți:* 2-6 mg/zi divizat în câteva prize. *Vârstnici:* inițial 1-2 mg/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la benzodiazepine; primul trimestru de sarcină, alăptare.**Al:** Dependență cu sdr. de abstenență; prudență în IR; IH; insuficiență cardio- respiratorie; asocierea cu neurolepticele, antidepresivele, hipnoticele, analgezicele, anestezicele, alcoolul.**RA:** Toropeală, oboseală, miorelaxare. Rar: hTA, tulburări gastro-intestinale, greață, modificări ale salivăției, constipație, tulburări vizuale, urticarie, retenție urinară, cefalee, depresie, confuzie, tremor, modificări ale libidoului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

KALII CHLORIDUM
 KALII IODIDUM
 KANAMYCINUM
 KETAMINUM
 KETOCONAZOLUM
 KETOPROFENUM
 KETOROLACUM TROMETHAMIN
 KETOTIFENUM
 LACIDIPINUM
 LACTULOSUM
 LAMIVUDINUM
 LAMOTRIGINUM
 LANREOTIDUM
 LANSOPRAZOLUM
 LARONIDAZUM
 LATANOPROSTUM
 LEFLUNOMIDUM
 LERCANIDIPINUM
 LETROZOLUM
 LEUPRORELINUM
 LEVAMISOLUM
 LEVETIRACETAMUM
 LEVOCABASTINUM
 LEVOCETIRIZINUM
 LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
 LEVODOPUM + CARBIDOPUM
 LEVODROPROPIZINUM
 LEVOFLOXACINUM
 LEVOMEPRIMAZINUM
 LEVONORGESTRELUM
 LEVOSIMENDANUM
 LEVOSULPIRIDUM
 LEVOTHYROXINUM
 LIDOCAINUM
 LINCOMYCINUM
 LINEZOLIDUM
 LISINAPRILUM
 LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
 LOPERAMIDUM
 LORATADINUM
 LORAZEPAMUM
LORNOXICAM

Cod ATC: M01AC05

XEFO® 4 mg; XEFO® 8 mg NYCOMED; Cpr. film. 4 mg, 8 mg; ct. × 1, 2, 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr.; ct. × 1 fl. × 250 cpr. (S/P-6L)

Ind: Trat. durerilor de intensitate medie și puternică, dureri articulare, reumatismale și artroze.

Dz: 16 mg, dacă este necesar se repetă adm. Doza de întreținere 16 mg zilnic.

Cind: Hipersensibilitate la lornoxicam, acid acetilsalicilic și alte AINS; hemoragii gastrointestinale, ulcere gastroduodenale; defecte de hemocitogeneză; sarcină, alăptare și la adolescenți sub vârsta de 18 ani.

Al: Monitorizarea TA și a HLG la vârstnici, obezi și HTA; prudență în afecțiuni gastrointestinale; infecții cronice respiratorii, astm sau febră; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante, antidiabetice, alte analgezice sau AINS, diuretice, antidepresive, litiu, metotrexat, cimetidină, digoxină, alcool; șoferi și activități de precizie.

RA: Dureri gastrice, diaree, amețeală, indigestie, greață și vărsături; constipație, disfagie, uscăciunea gurii, flatulență, gastrite, esofagita, hemoragii gastrointestinale, hemoroidale sau rectale, disfuncții hepatice, alopecie, reacții cutanate, icter, hipersudorație, disurie, edeme, crampe musculare, tremor, conjunctivite, inapetență, scădere în greutate, înroșirea pielii cu senzație de căldură, dispnee, urticarie, leucocitoză, prelungirea timpilor de coagulare, infecții ale căilor respiratorii superioare, oscilații tensionale, palpitații, creșterea frecvenței cardiace.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

KALII IODIDUM
KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM

Cod ATC: C09CA01

COZAAR® MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 50 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. film. **(P-6L)**

Ind: HTA, IC, protecție renală la pacienții cu diabet zaharat de tip 2, cu proteinurie.

Dz: Inițial 50 mg, o dată pe zi; efect maxim se obține la 3 săpt.; dacă după 6 săpt. posologia inițială nu se dovedește eficace se poate crește la 100 mg, o dată pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la losartan; sarcină și alăptare; IH severă.

Al: Precauție în IH, stenoză bilaterală a arterei renale. Se poate produce hiperpotasemie la asocierea cu diuretice antialdosteronice.

RA: Tuse uscată, exantem, mialgie, cefalee, amețeală, astenie, oboseală, edem angioneurotic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

KANAMYCINUM
KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARNIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM

Cod ATC: C10AA02**HOLETAR® KRKA**; Cpr. 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)****LOVASTATIN 20 mg; 40 mg LABORMED PHARMA SA**; Cpr. 20 mg, 40 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-6L)****MEDOSTATIN MEDOCHEMIE Ltd.**; Cpr. 20 mg; ct. × 1, 3 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

Ind: Scăderea colesterolului total și ale LDL-colesterolului la pacienții cu hipercolesterolemie primară sau combinată cu hipertrigliceridemie, trat. încetării progresiei aterosclerozei coronariene.

Dz: Hipercolesterolemie: inițial 10-20 mg/zi, maxim de 80 mg zilnic. Ateroscleroza coronariană: 20-80 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la lovastatină; afectare hepatică activă sau creșteri persistente ale transaminazelor serice; sarcină și alăptare.

A!: Monitorizarea transaminazelor; creatin-fosfokinazei; prudență la imunodeprimați; trat. se întrerupe dacă se suspectează miopatie; copii; hipercolesterolemie familială homozigotă; asociere cu imunosupresoare, itraconazol, gemfibrozil, niacină, eritromicină, anticoagulante cumarinice.

RA: Flatulență, diaree, constipație, greață, anorexie, dispepsie, amețală, vedere neclară, cefalee, mialgie, rash cutanat; oboseală, prurit, uscăciunea mucoasei bucale; miopatie și rabdomioliză; hepatită, icter colestatic, parestezii, neuropatie periferică, tulburări psihice, necroză epidermică toxică și eritem multiform, inclusiv sd. Stevens-Johnson; șoc anafilactic, angioedem, polimialgii reumatice, vasculită, trombocitopenie, leucopenie, eozinofilie, anemie hemolitică, ANA pozitiv, creșteri ale VSH, artrită, artralgie, urticarie, fotosensibilitate, febră, dispnee; creșteri ale: transaminazelor serice, fosfatazei alcaline, bilirubinei și creatin-fosfokinazei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

KETAMINUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA

Cod ATC: G03GA07

LUVERIS® 75 UI SERONO EUROPE Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 75 UI; ct. × 1, 3 sau 10 fl. pulb. + 1, 3 sau 10 f. solv. × 2 sau 3 ml (**P-RF**)

Ind: În asociere cu FSH pentru stimularea dezvoltării foliculare în caz de deficit sever de LH și FSH.

Dz: 75 UI lutropină + 75-150 UI FSH, adm. s.c.

Cind: Chist ovarian, carcinom ovarian, de sân, uter; hemoragii genitale; tumori active la nivel hipofizar sau hipotalamic. Sarcină și alăptare.

Al: Adm. numai sub supraveghere medicală.

RA: Cefalee, somnolență, greață, dureri abdominale, hiperstimulare ovariană, sarcini multiple, reacții la locul inj.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03DC03

KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARNIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM

EXLUTON ORGANON; Cpr. 0,5 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 28 cpr. (P-6L)

LINESTRENOL TERAPIA SA; Cpr. 5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)

ORGAMETRIL ORGANON; Cpr. 5 mg; ct. × 1 blist. × 30 cpr. (P-6L)

Ind: Tulburările ciclului menstrual, dismenoree, endometrioza, amenoree, mastopatia chistică fibroasă și ca trat. adjuvant în cancerul de endometru și a metastazelor. Contraceptiv.

Dz: Meno- și metroragii, hemoragii juvenile: 10 mg/zi timp de 10 zile. În timpul celor 4 cicluri următoare, 5 mg/zi de la a 16-a până la a 26-a zi a ciclului inclusiv, prima zi a menstruației fiind prima zi a ciclului. Meno- și metroragii grave: 10 mg/zi timp de 10 zile, urmate de 5 mg/zi timp de 3 luni fără întrerupere. Polimenoree: 5 mg/zi timp de 20 zile, începând de la a 5-a zi a ciclului, repetându-se de 2-3 ori. Amenoree și dismenoree: 5 mg/zi timp de 10 zile începând de la prima zi a trat. cu estrogen. Oligomenoree: 5 mg/zi de la a 16-a zi la a 25-a zi a ciclului. Suprimarea ovulației: 5 mg/zi de la a 5-a zi a ciclului. Endometrioza, suprimarea menstruației, mastopatie chistică fibroasă: 5 mg/zi de la a 5-a zi a ciclului, prima zi a menstruației fiind prima zi a ciclului. Trat. adjuvant al cancerului de endometru și al metastazelor sale: 30-50 mg/zi, perioade prelungite. Contracepție: 10 mg/zi din ziua a 5-a până în ziua a 25-a a ciclului.

Cind: Sarcină sau suspiciune de sarcină; patologie hepatică severă, metastaze hepatice, sindrom Rotor sau sindrom Dubin-Johnson; sângerarea vaginală nedagnosticată; herpes gestațional, icter de sarcină, otoscleroză, prurit sever sau porfirie.

Al: Prudență în expunerea la lumina naturală sau artificială; examinarea medicală periodică; afecțiuni circulatorii; depresie severă; asocierea cu barbiturice, hidantoină, rifampicină, beta-blocante, cefalosporine, insulină.

RA: Sângerări intermenstruale, modificări ale libidoului, tulburări gastrointestinale și creșterea greutateii corporale; cefalee, amețeli, nervozitate, depresie, transpirații, acnee, hirsutism, cloasmă, rash cutanat, prurit, icter, modificări în profilul lipoproteic, alterarea testelor hepatice, amenoree, ciclu menstrual neregulat, toleranța la glucoză redusă, mastodinie, edeme.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM

Cod ATC: A06AD15

FORLAX 4 g; FORLAX 10 g BEAUFOUR IPSEN; Pulb. pt. sol. orală; ct. × 10, 20, 30 sau 50 plicuri (OTC)

SICOLAX SICOMED SA; Gran. pt. sol. orală; fl. × 60 g (OTC)

Ind: Tratamentul simptomatic al constipației la adult.

Dz: *Adulți:* 1-2 plicuri pe zi, de preferință într-o singură priză, dimineața. Fiecare plic trebuie solubilizat într-un pahar cu apă. Efectul se manifestă în 24-48 ore de la administrare.

Cind: Colopatii organice, inflamatorii (rectocolita ulcerosă, maladia Crohn), sindrom ocluziv sau subocluziv, sindrom dureros abdominal de cauză nedeterminată. Intoleranță la macrogol 4000. Este de preferat să nu se adm. în timpul sarcinii.

RA: La doze mari poate apărea o diaree care încetează la cca 24-48 ore după încetarea adm. Trat. poate continua cu o doză inferioară. Dureri abdominale, în particular la pacienții suferind de manifestări funcționale intestinale. Cazuri rare de manifestări alergice: erupție, urticarie, edem. Extrem de rar s-a raportat șoc anafilactic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

KETOROLACUM TROMETHAMIN
KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS

Cod ATC: A12CC04

MAGNESIUM DIASPORAL ORANGE 100 PROTINA PHARMAZEUTISCHE GESSELLSCHAFT GmbH; Cpr. de supt 315 mg sare anhidră (16,12% Mg^{+2}) și 460 mg citrat de magneziu $\times 14 H_2O$ (echivalent a 610 mg sare anhidră = 98,6 mg = 4 mmol = 8 mEq Mg^{+2}); ct. $\times 5$ blist. $\times 10$ cpr. de supt (OTC)

MAGNESIUM DIASPORAL 300 PROTINA PHARMAZEUTISCHE GESSELLSCHAFT GmbH; Gran. pt. sol. orală citrat de magneziu anhidru 1830 mg, corespunzător la 295,7 mg magneziu (12 mmol = 24 mEq); ct. $\times 10$, 20 sau 50 plicuri cu granule (OTC)

Ind: Deficit de magneziu.

Dz: Doza recomandată pentru *adulti și copii peste 6 ani* este de 295,8 mg magneziu, administrat de 3 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la componentii produsului. Insuficiență renală severă. Copii sub 6 ani.

A!: În cazul deficitului sever și al sindromului de malabsorbție, se recomandă începerea tratamentului cu preparate de magneziu administrate intravenos. În cazul asocierii deficitului de calciu, se recomandă corectarea deficitului de magneziu înainte administrării calciului. Atenționare pentru *diabetici*: un comprimat de supt Magnesium Diasporal Orange 100 conține 0,1 g zaharoză, corespunzător la 0,01 UP. *Sarcină și alăptare*: Se va administra în timpul sarcinii doar dacă este absolut necesar. Deoarece magneziul se excretă în laptele matern, nu se recomandă administrarea produsului în timpul alăptării.

RA: Rar, la doze mari, pot să apară scaune moi sau diaree; tratamentul va fi întrerupt temporar, iar după dispariția acestor manifestări se poate continua cu doze mai mici.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

KETOTIFENUM
LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS

Cod ATC: A12CC09

MAGNEROT WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. 500 mg (corespunzător la 2,7 mEq, 1,35 mmol sau 32,8 mg Mg); ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cpr, ct. × 5 sau 10 blist. × 20 cpr. **(OTC)**

Ind: Profilaxia IMA și anginei pectorale, dacă acestea sunt determinate de un deficit de Mg. Ateroscleroză, stenocardie, arterită și arteriolită, tulburări ale metabolismului lipidic, crampe musculare.

Dz: Oral 1 g de 3 ori/zi timp de o săptăm., apoi 1-1,5 g/zi. *Copii peste 6 ani:* 0,5 g de 3 ori/zi.

Cind: IR; diateză litiazică de tip Ca-Mg-amoniu-fosfat.

AI: Interacțiuni medicamentoase cu fier, tetraciclina și fluorură de sodiu.

RA: Scaune moi sau diaree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LACIDIPINUM
LACTULOSUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARNIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRIMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM

Cod ATC: B05BC01

MANITOL 10% FRESENIUS; MANITOL 20% FRESENIUS FRESENIUS KABI; Sol. perf. 10%, 20%; fl. × 100, 250, 500 sau 1000 ml, respectiv fl. × 250 sau 500 ml (S)

MANITOL INFOMED FLUIDS SRL; Sol. perf. 20%; ct. × 10 pungi × 250 ml sau 500 ml (S)

MANITOL HEMOFARM; Sol. perf. 20%; ct. × 10 fl. × 250 ml (S)

Ind: Edem cerebral cu hipertensiune intracraniană, hipertensiune intracelulară.

Dz: 500 ml/zi sol. manitol 10% cu ritm de 60-70 picături/minut. *La copii:* 10 ml/ kg și zi sol. manitol 10% cu ritm de 10-15 picături/10 kg și minut.

Cind: Hiperosmolaritate plasmatică preexistentă, deshidratare predominant intracelulară.

Al: Controlul diurezei și al electroliților serici; prudență în IC.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LACTULOSUM
 LAMIVUDINUM
 LAMOTRIGINUM
 LANREOTIDUM
 LANSOPRAZOLUM
 LARONIDAZUM
 LATANOPROSTUM
 LEFLUNOMIDUM
 LERCANIDIPINUM
 LETROZOLUM
 LEUPRORELINUM
 LEVAMISOLUM
 LEVETIRACETAMUM
 LEVOCABASTINUM
 LEVOCETIRIZINUM
 LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
 LEVODOPUM + CARBIDOPUM
 LEVODROPROPIZINUM
 LEVOFLOXACINUM
 LEVOMEPRMAZINUM
 LEVONORGESTRELUM
 LEVOSIMENDANUM
 LEVOSULPIRIDUM
 LEVOTHYROXINUM
 LIDOCAINUM
 LINCOMYCINUM
 LINEZOLIDUM
 LISINAPRILUM
 LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
 LOPERAMIDUM
 LORATADINUM
 LORAZEPAMUM
 LORNOXICAM
 LOSARTANUM
 LOVASTATINUM
 LUTROPINUM ALFA
 LYNESTRENOLUM
 MACROGOLUM
 MAGNESII CITRAS
 MAGNESII OROTAS
 MANNITOLUM
MAPROTILINUM

Cod ATC: N06AA21

LUDIOMIL® 10 mg; LUDIOMIL® 25 mg NOVARTIS PHARMA; Cpr. film. 10 mg, 25 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (10 mg), ct. × 3 blist. × 10 cpr. (25 mg) **(P-RF)**

MAPROTILIN PROMEDIC SRL; Dj. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj. **(P-RF)**

SIPROTILIN® 25 mg SICOMED SA; Cpr. film. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Depresii endogene, tardive, psihologice, de epuizare, somatogene, alte distimii cu predominanță anxioasă, disforică sau iritabilitate, apatie, tulburări psihosomatice și somatice pe fond depresiv și/sau anxios. Depresii și distimii la copii și adolescenți.

Dz: 25 mg, oral, de 1-3 ori/zi, până la maxim 150 mg/zi; perf. i.v. de 25-100 mg/zi, până la maxim 150 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la maprotilină; epilepsie; prag convulsivant mic; IMA recent; BAV; glaucom cu unghi închis sau retenție urinară.

Al: Prudență în IR, IH, dificultăți de eliminare a urinei, antecedente de hipertensiune intraoculară, afecțiuni cardiace, vârstnici, tendință suicidală, hipertiroidism, hTA posturală, schizofrenie; interacțiuni medicamentoase cu guanetidina, betanidina, reserpina, metil-dopa, IMAO, simpatomimetice, alcool, deprimante nervos centrale, anticolinergice, levodopa, barbiturice, fenitoină, carbamazepină, fenitoină, benzodiazepine, propranolol, imipramină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, amețeli, convulsii, tulburări extrapiramidale, disartrie, slăbiciune, parestezie, oboseală pasageră, sedare diurnă, somnolență, tulburări ale somnului, agitație, anxietate, coșmaruri, stări de confuzie, delir, halucinații, hipomanie, manie, senzație de uscăciune a gurii, vedere tulbură, retenție urinară, stomatită, creșterea riscului apariției cariilor, erupții, urticarie, febră, vasculită cutanată, mâncărime, purpură, fotosensibilitate, edem, greață, vomă, constipație, hTA posturală, tahicardie, aritmie, BAV, palpitații, HTA, sincopă, alveolită alergică, mărirea sânilor, galactoree, creșterea transaminazelor serice, hepatită icterică sau anicterică, leucopenie, agranulocitoză, eozinofilie, tinitus, modificări ale gustului, transpirație, creștere în greutate, tulburări sexuale, înroșirea feței, alopecie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: P02CA01

LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM

PERMAZOLE E.I.P.I.C.O.; Susp. orală 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 30 ml (*P-RF*)
THELMOX 100 REMEDICA; Cpr. mast. 100 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr. mast. (*P-RF*)
VERMOX® JANSSEN CILAG; Cpr. 100 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr. (*P-RF*)

Ind: Trat. infestărilor simple sau mixte cu *Enterobius vermicularis* (oxiuroza), *Trichuris trichiura* (tricocefaloza), *Ascaris lumbricoides* (ascaridioza), *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus* (ankilostomiaza), *Strongyloides stercoralis* (strongiloidioza), *Taenia* spp. (teniază).

Dz: Enterobiază: 100 mg în doză unică. Ascaridioză, tricocefaloză, ankilostomiază și infecții mixte: 100 mg de 2 ori/zi dimineața și seara timp de 3 zile consecutiv. Teniază și strongiloidioză: *Adulți*: 200 mg de 2 ori/zi timp de 3 zile consecutiv. *Copii*: 100 mg de 2 ori/zi timp de 3 zile consecutiv.

Cind: Hipersensibilitate la mebendazol.

Al: Copii sub 1 an; interacțiuni medicamentoase cu cimetidina; sarcină și alăptare.

RA: Dureri abdominale tranzitorii și diaree, reacții de hipersensibilitate: exantem, rash, urticarie și angioedem.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03AA04

LAMOTRIGINUM
LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM

COLOSPASMIN E.I.P.I.C.O.; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

DUSPATALIN 200 mg SOLVAY PHARMACEUTICALS; Cps. elib. prel. 200 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)

Ind: Sindrom de colon iritabil; iritarea colonului asociată leziunilor organice ale tractului gastrointestinal.

Dz: 100 mg de 4 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la clorhidrat de mebeverină.

A!: Sarcină și alăptare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LANREOTIDUM
LANSOPRAZOLUM
LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETOZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM

Cod ATC: R06AE05**EMETOSTOP SPECIFAR SA;** Cpr. 30 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)**Ind:** Prevenirea și tratamentul răului de mișcare, sindrom Ménière sau alte tulburări labirintice.**Dz:** Pentru rău de mișcare: 1-2 comprimate cu o oră înainte de plecare. La nevoie se repetă la 24 de ore. Pentru tulburări labirintice: 1-4 comprimate/zi în prize egale.**Cind:** Hipersensibilitate la piperazine, copii sub 12 ani.**Al:** Precauții la pacienți cu glaucom, astm, hipertrofie a prostatei, hipotensiune, stenoza pilorului sau duodenului, obstrucție a căilor uretrale; pentru pacienții care folosesc inhibitori ai MAO. La gravide administrarea se face numai dacă este absolut necesar. Interacțiuni cu alcoolul, anticolinergice, inhibitori MAO.**RA:** Cele mai comune sunt: amețeală, vedere confuză, uscarea gurii și a faringelui, slăbiciune. Alte efecte nedorite: urticarie, coșuri pe față, nervozitate, stare euforică, insomnie, vomă, excitare, halucinații, lipsa poftei de mâncare, greață, diaree, constipație, diplopie, amețeli, pulsații, hipotensiune, creșterea bătăilor inimii, disurie, reținerea urinei; în cazul în care s-a administrat doza în exces, stare de euforie sau depresie, convulsii, halucinații sau scăderea funcției respiratorii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05BA03

LANSOPRAZOLUM
 LARONIDAZUM
 LATANOPROSTUM
 LEFLUNOMIDUM
 LERCANIDIPINUM
 LETROZOLUM
 LEUPRORELINUM
 LEVAMISOLUM
 LEVETIRACETAMUM
 LEVOCABASTINUM
 LEVOCETIRIZINUM
 LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
 LEVODOPUM + CARBIDOPUM
 LEVODROPROPIZINUM
 LEVOFLOXACINUM
 LEVOMEPRMAZINUM
 LEVONORGESTRELUM
 LEVOSIMENDANUM
 LEVOSULPIRIDUM
 LEVOTHYROXINUM
 LIDOCAINUM
 LINCOMYCINUM
 LINEZOLIDUM
 LISINAPRILUM
 LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
 LOPERAMIDUM
 LORATADINUM
 LORAZEPAMUM
 LORNOXICAM
 LOSARTANUM
 LOVASTATINUM
 LUTROPINUM ALFA
 LYNASTRENOLUM
 MACROGOLUM
 MAGNESII CITRAS
 MAGNESII OROTAS
 MANNITOLUM
 MAPROTILINUM
 MEBENDAZOLUM
 MEBEVERINUM
 MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM

ANSILAN LEK PHARMACEUTICALS; Cps. 10 mg; ct. × 1 fl. × 25 cps. (P-RF)

EUROZEPAM EUROPARM SA; Cps. 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-RF)

MEDAZEPAM 10 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (P-RF)

MEDAZEPAM ARENA GROUP SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-RF)

MEDAZEPAM 10 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

RUDOTEL AWD PHARMA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 20 sau 50 cpr. (P-RF)

RUSEDAL BYK GULDEN; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-RF)

Ind: Stări de anxietate de etiologie psihică și psihosomatică, acute și cronice; Stări de tensiune psihică și agitație.

Dz: 10-30 mg/zi, adm. oral în 2-3 prize sau ca doză unică seara, maxim

60 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la medazepam, alte benzodiazepine; dependențe medicamentoase sau non-medicamentoase (alcool etilic) în antecedente; miastenia gravis; insuficiență respiratorie decompensată.

Al: Copii și tineri; durata trat. nu trebuie să depășească 4 săptăm.; prudență în: intoxicații acute cu alcool etilic, hipnotice, analgezice, neuroleptice, antidepresive și litiu; ataxie spinală și cerebeloasă, glaucom acut cu unghi închis, afecțiuni hepatice, apnee în timpul somnului, vârstnici, tarați, modificări organice la nivel cerebral, insuficiență circulatorie, insuficiență respiratorie, IH; risc de dependență psihică și fizică; monitorizarea tabloului sanguin și a funcției hepatice; interacțiuni medicamentoase cu psihotrope, hipnotice, analgezice, antihistaminice, alcool etilic, miorelaxantelor, cimetidină, disulfiram, omeprazol, teofilină, levodopa, fenitoină, fenobarbital, beta-blocante, anticoagulante, antidiabetice orale, glicozide cardiace și anticoncepționale; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Sedare marcată în timpul zilei, oboseală, somnolență, apatie, hipersomnie, timp de reacție prelungit, vertij, cefalee, ataxie, confuzie, amnezie anterogradă, tulburări de concentrare, oboseală reziduală, hipotonie musculară, greață, vomă, dureri epigastrice, constipație, diaree, icter, anurie, spasm glotic, dureri toracice, hTA, bradicardie, depresie, scăderea libidoului, tulburări menstruale, creșterea apetitului, uscăciunea gurii, RA alergice cutanate, deprimare respiratorie; tulburări de vorbire, de vedere (diplopie, nistagmus) și de echilibru, halucinații, stări acute de agitație, anxietate, tendință la suicid, insomnie, agresivitate și spasme musculare; dependență cu toleranță și sindrom de abținere.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LARONIDAZUM
LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM

Cod ATC: G03AC06, L02AB02**DEPO PROVERA®** PHARMACIA & UPJOHN; Susp. inj. 150 mg/ml; ct. × 1 fl. × 1 ml (S/P-RF)**FARLUTAL 500 mg** PHARMACIA & UPJOHN; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (S/P-RF)**MEDROXYPROGESTERON ACETAT** TERAPIA SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-6L)**MEGESTRON** ORGANON; Susp. inj. 150 mg/ml; ct. × 100 fl. × 1 ml (S/P-RF)

Ind: *Int.:* Menoragii uterine funcționale (anovulatorii), amenoree secundară și endometrioză (forme ușoare și moderate). Cancer mamar, cancer de endometru, cancer de prostată, cancer renal. Adenom de prostată. *Inj.:* Anticoncepțional.

Dz: *Int.:* Metroragii funcționale: 2,5-10 mg/zi între a 16-a și a 21-a zi a ciclului menstrual, repetat în 2-3 cicluri consecutive. Amenoree secundară: 2,5-

10 mg/zi între a 16-a și a 21-a zi a ciclului menstrual, repetat 3 cicluri consecutive. Endometrioză: 10 mg de 3 ori/zi, timp de 90 zile consecutive. Neoplazii: 100-1000 mg/zi. *Inj.:* 150 mg im, repetat la 3 luni.

Cind: Tromboflebite, tromboembolii, afectarea severă a funcției hepatice, iminența de avort, hipercalcemia indusă de metastazele osoase, metroragii de etiologie necunoscută, hipersensibilitate la medroxiprogesteron acetat.

Al: Perioada de fertilitate revine între 4 și 24 luni de la ultima inj.; trat. trebuie întrerupt dacă apar anomalii ale funcțiilor hepatice sau icter; tulburări tromboembolice, pierderi bruște parțiale sau complete ale vederii, diplopie, edem papilar, leziuni vasculare ale retinei, migrenă; precauții la femeile tinere, IC, IR, epilepsie, migrenă, diabet; evitarea expunerii la soare; sarcină și alăptare.

RA: Perturbări ale ciclului menstrual: amenoree, hemoragii neregulate; creștere în greutate, ușoară cefalee, senzație neplăcută în abdomen, tensiune sau sâni dureroși, nervozitate, cloasmă, amețeli, grețuri și galactoree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L02AB01

LATANOPROSTUM
LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM

MEGACE® BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. 160 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (S/P-RF)

MEGACE® BRISTOL-MYERS SQUIBB; Susp. orală 40 mg/ml; ct. × 1 fl. × 240 ml (S/P-RF)

MEGESIN® 40 mg; MEGESIN® 160 mg SINDAN SRL; Cpr. 40 mg, 160 mg; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cpr. (S/P-RF)

Ind: Trat. paliativ al carcinomului avansat de sân sau endometru.

Dz: Cancer de sân: 160 mg/zi. Cancer de endometru: 40-320 mg/zi.

Cind: Ca test de diagnostic pentru sarcină; hipersensibilitate la megestrol acetat.

Al: Supraveghere atentă; copii, precauție la pacienții cu antecedente de boli tromboembolice, diabet preexistent; sarcină și alăptare.

RA: Creștere în greutate, tromboflebite și embolie pulmonară, inhibiția suprarenalei, hTA, greață, vărsături, amețeli sau slăbiciune; IC, edeme, metroragii, reluarea creșterii tumorale (cu sau fără hipercalcemie), dispnee, hiperglicemie, intoleranță la glucoză, alopecie, HTA, sindrom de tunel carpian, bufeuri, transpirații și rash.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AC06

LEFLUNOMIDUM
LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM

MELARTRIN® 15 mg TERAPIA SA; Cpr. 15 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MELOX 7,5 mg; MELOX 15 mg MEDOCHEMIE; Cpr. 7,5 mg, 15 mg; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MELOXICAM LPH 7,5 mg; MELOXICAM LPH 15 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 7,5 mg, 15 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)

MELOXICAM 7,5 mg; MELOXICAM 15 mg MAGISTRA C&C; Sup. 7,5 mg, 15 mg; ct. × 2 blist. × 3 sup. (P-6L)

MELOXICAM 7,5 mg; MELOXICAM 15 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 7,5 mg, 15 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MOVALIS® BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 7,5 mg, 15 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MOVALIS® BOEHRINGER INGELHEIM; Sup. 7,5 mg, 15 mg; ct. × 1 folie × 6 sup. (P-6L)

MOVALIS® BOEHRINGER INGELHEIM; Sol. inj. 15 mg/1,5 ml; ct. × 3, 5 sau 10 f. × 1,5 ml (P-RF)

RECOXA ZENTIVA AS; Cpr. 15 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. simptomatic al artritei reumatoide, osteoartritelor dureroase; alte stări inflamatorii.

Dz: 7,5-15 mg/zi. IR severă și dializă: maxim 7,5 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la meloxicam, acid acetilsalicilic sau alte AINS; astm, polipi nazali, angioedem sau urticarie după adm. de acid acetilsalicilic sau alt AINS; ulcer peptic activ, IH severă, IR severă nedializată, copii și adolescenți sub 15 ani; sarcină și alăptare.

Al: Precauții în antecedente de boală ale tractului gastrointestinal superior, leziuni ale rectului sau anusului; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante.

RA: Dispepsie, greață, vomă, dureri abdominale, constipație, flatulență, diaree, esofagită, ulcer gastrointestinal, sângerări gastrointestinale oculte sau macroscopice, anemie, tulburări ale valorilor sanguine, inclusiv ale leucocitelor, leucopenie, trombocitopenie, prurit, rash cutanat, stomatită, urticarie, fotosensibilitate, crize de astm la indivizi tratați în prealabil cu acid acetilsalicilic sau alte AINS, delir, cefalee, vertij, tinitus, toropeală, edem, HTA, palpații, flush.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01AA03

LERCANIDIPINUM
LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM

ALKERAN® GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 2 mg; ct. × 1 fl. × 25 cpr. (S/P-RF)

Ind: Trat. mielomului multiplu, seminom și metastazele lui, reticulosarcom, angioendoteliom malign, tumori osoase și al adenocarcinomului ovarian avansat sau al ascitei după neoplasmele de ovar, carcinom de sân avansat; policitemia vera.

Dz: *Int.:* Mielom multiplu: 0,15 mg/kg și zi în doze divizate, pentru 4 zile, repetat la intervale de 6 săpt. Adenocarcinom ovarian: 0,2 mg/kg și zi timp de 5 zile, repetat la intervale de 4-8 săpt. Carcinom de sân avansat: 0,15 mg/kg sau de 6 mg/m² și zi timp de 5 zile, repetat la intervale de 6 săpt. Policitemia vera: inducția remisiunii 6-10 mg/zi timp de 5-7 zile, apoi 2-4 mg/zi, întreținere 2-6 mg pe săpt.

Cind: Hipersensibilitate la melphalan; stadiile terminale ale bolii; leucopenie; afecțiuni grave ale aparatului cardiovascular, hepatice sau renale.

Al: Copii; monitorizarea hemoleucogramei; precauție după radioterapie sau chimioterapie, afectare renală; risc leucemogen; interacțiuni medicamentoase cu acid nalidixic, ciclosporină, sarcină și alăptare.

RA: Depresia măduvei osoase, asociată cu leucopenie și trombocitopenie; greață și vărsături; stomatită, urticarie, edem, rash cutanat, reacții anafilactice, 2 cazuri de stop cardiac, fibroză pulmonară, anemie hemolitică, alopecie, amenoree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LETROZOLUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRIMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM

Cod ATC: N06DX

EXIBA® 10 mg/g H. LUNDBECK A/S; Sol. orală în picături 10 mg/g; ct. × 1 fl. × 20, 50 sau 100 g (*P-RF*)

EXIBA® 10 mg H. LUNDBECK A/S; Cpr. film. 10 mg; ct. × 2, 4 sau 8 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)

Ind: Produs indicat în tratamentul pacienților cu boala Alzheimer moderat severă până la severă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LEUPRORELINUM
LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM

Cod ATC: G03GAN0

MENOGON FERING; Pulb. liof. pt. sol. inj. 75 u.i. FSH/75 u.i. LH; ct. × 10 fl. pulb. + 10 f. solv. × 2 ml (*P-RF*)

Ind: *Femei*: inducerea ovulației. *Bărbați*: stimularea spermatogenezei la bărbați cu hipogonadism hipogonadotrop primar sau secundar.

Dz: Inj. i.m. *Femei*: Schema 1: 3 doze echivalente de hCG în zile alternative. La o femeie cu menstruație, se adm. inițial în zilele 7, 8 și 9 ale ciclului. Schema 2: inj. zilnice cu hCG, până la obținerea unui răspuns adecvat. *Bărbați*: 75-150 ui de 3 ori/săpt., minimum 4 luni.

Cind: *Femei*: disgenezie ovariană, uter absent, menopauză precoce, ocluzie tubară. *Bărbați*: tumori testiculare și pituitare.

Al: Se monitorizează concentrația de estrogen plasmatic sau urinar; trebuie excluse anomaliile anatomice ale organelor genitale sau endocrinopatiile nongonadale; prudență în hipotiroidism, deficit androcortical, hiperprolactinemie sau tumori pituitare.

RA: La femei, reacție locală la locul inj., febră și artralгии. La bărbați, ginecomastie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G04CX03

LEVAMISOLUM
LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINOPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM

IPERTROFAN S.P.A.; Cpr. film. 50.000 UI; ct. × 1 fl. × 30 cpr. **(P-6L)**
IPERTROFAN 40 S.P.A.; Cpr. film. gastrorez 150.000 UI (40 mg); ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
Ind: Trat. tulburărilor funcționale care însoțesc hipertrofia benignă de prostată.
Dz: 40 mg/zi seara, în cicluri de 30 zile.
Cind: Hipersensibilitate la mepartricin.
RA: Foarte rar gastralgie, greață, vomă sau diaree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

LEVETIRACETAMUM
LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N01BB03

MEPIVASTE SIN 3% ESPE DENTAL MEDIZIN GmbH; Sol. inj. 30 mg/ml; ct. × 50 f. cartuş × 1,7 ml (S)

OPTOCAIN 3% MOLTENI DENTAL; Sol. inj. 3%; ct. × 50 cartuşe × 1,8 ml (S)

SCANDONEST 3% PLAINE SPECIALITES SEPTODONT; Sol. inj. 3%; ct. × 50 cartuşe - seringă × 1,8 ml (S)

Ind: Anestezie locală în variate tratamente şi intervenţii chirurgicale stomatologice.

Dz: Doza uzuală: 1-2 ml soluţie 3%, putând creşte în funcţie de intervenţie (de exemplu în infiltraţii sau pentru blocarea nervilor periferici). Soluţia trebuie injectată lent, cu o viteză de aproximativ 1 ml/minut, după aspiraţie. Doza maximă zilnică este de 7 mg clorhidrat de mepivacaină/kg (fără a depăşi

400 mg). La *copii*, doza se stabileşte în funcţie de greutate corporală şi vârstă; doza recomandată este de 5 mg clorhidrat de mepivacaină/kg.

Cind: Hipersensibilitate la mepivacaină sau la oricare dintre excipienţii produsului. Copii sub o lună. Porfirie hepatică. Epilepsie necontrolată prin tratament.

Al: Se recomandă evitarea administrării produsului la pacienţii trataţi cu anticoagulante. Administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate sau injectarea intravenoasă accidentală rapidă pot provoca reacţii toxice. Nu se recomandă administrarea prin infiltraţie a anesteziei locale în zonele infectate sau inflamate. Prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică, hipoxie, hiperpotasiemie sau acidoză, precum şi cu antecedente de hipertermie malignă. *Atenţionare pentru sportivi:* produsul conţine un principiu activ care poate determina o reacţie pozitivă la testele antidoping.

Sarcină şi alăptare: se recomandă evitarea administrării în timpul sarcinii; se excretă în laptele matern în cantităţi foarte mici, se recomandă prudenţă la administrarea produsului în perioada de alăptare. Poate afecta negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

RA: Reacţiile adverse care pot să apară după administrarea mepivacainei sunt similare cu cele raportate la alte anestezice locale de tip amidic. Aceste reacţii sunt, în general, dependente de doză: nervozitate, agitaţie, tremor, nistagmus, cefalee, logoree, greaţă, tahipnee, urmată de apnee, efect inotrop negativ şi hipotensiune arterială. Dozele mari pot produce vasodilataţie, colaps, tulburări de conducere, bradicardie, bloc atrio-ventricular, aritmii ventriculare. Reacţiile alergice, foarte rare, sunt reprezentate de erupţii cutanate, prurit, edeme sau reacţii de tip anafilactic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05BC01

LEVOCABASTINUM
LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM

MEPROBAMAT ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Stări de anxietate și tensiune psihică, sindrom psihovegetativ; spasm muscular; hipnogen în hiposomnii.

Dz: *Adulți:* oral, 400-1200 mg/zi. *Copii: 3-7 ani:* 100-200 mg de 1-3 ori/zi; *7-15 ani:* 200-400 mg de 1-3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la meprobamat, stări precomatoase și comatoase, intoxicații acute cu substanțe deprimante centrale, epilepsie, miastenii, porfirii, dependență la meprobamat sau la alte deprimante centrale (în antecedente); copii sub 3 ani.

Al: Prudență în IH, IR, bătrâni și debilitați; interacțiuni medicamentoase cu barbiturice, alte hipnotice, anticoagulante cumarinice, contraceptive orale, rifampicină și griseofulvină; sarcină și alăptare, șoferi și activități de precizie.

RA: Somnolență, deprimare a performanțelor (în special la doze mari), anorexie, greață, vomă, diaree, cefalee, hTA, reacții alergice (rar); convulsii; toleranță și dependență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LEVOCETIRIZINUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM

Cod ATC: R06AD07**PRIMALAN** LAB. PIERRE FABRE; Sirop 0,05%; ct. × 1 fl. × 60 ml (*P-RF*)**PRIMALAN® 5 mg; PRIMALAN® 10 mg** LAB. PIERRE FABRE; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)**Ind:** Trat. simptomatic al manifestărilor alergice: rinită (ex.: boala fânului, rinită nesezonieră), conjunctivită, urticarie.**Dz:** *Adulți și copii peste 12 ani:* 5 mg dimineața și seara sau 10 mg seara. *Copii 6-10 ani:* 2,5 mg dimineața și seara sau 5 mg seara, *Copii 10-12 ani:* 2,5 mg dimineața și 5 mg seara sau 7,5 mg seara. *Copii sub 6 ani:* 1,25 mg/ 5 kg și zi.**Cind:** Agranulocitoză cronică sau recentă, glaucom, tulburări de micțiune, alergie antihistaminice, asociere cu IMAO.**Al:** Prudență în febră, afecțiune hepatică, vârstnici, epilepsie, expunere îndelungată la soare; interacțiuni medicamentoase cu deprimante ale SNC; șoferi și activități de precizie.**RA:** Reacții alergice cutanate (eritem, eczeme, purpură, urticarie), edeme Quincke, fotosensibilizare, somnolență, scăderea vigilenței, confuzie, halucinație, uscăciunea gurii, tulburări de vedere, retenție de urină, constipație, palpitații, agitație, nervozitate, insomnie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPRMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM

Cod ATC: L01BB02**PURI-NETHOL** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 50 mg; ct. × 1 fl. × 25 cpr. (S/P-RF)**Ind:** Trat. leucemiei acute: inducerea remisiunilor și în terapia de întreținere din leucemia limfoblastică acută și din leucemia mielocitară acută; trat. leucemiei granulocitare cronice.**Dz:** 2,5 mg/kg și zi. Când se adm. simultan allopurinol și 6-mercaptopurină, este esențial ca doza de 6-mercaptopurină să se reducă la un sfert.**Cind:** Având în vedere importanța trat., nu există Cind absolute.**Al:** Monitorizarea hemoleucogramei și funcțiilor hepatice, la primul semn de scădere importantă a numărului leucocitelor și al trombocitelor trat. trebuie întrerupt imediat; monitorizarea nivelului acidului uric în sânge și urină; riscului carcinogenetic teoretic; interacțiuni medicamentoase cu allopurinol, warfarină; sarcină și alăptare.**RA:** Supresia medulară cu leucopenie și trombocitopenie, necroză hepatică și stază biliară; anorexie, greață, vărsături; pancreatită; ulcerații la nivelul mucoasei bucale și rar ulcerații la nivelul mucoasei intestinale; febră medicamentoasă și rash.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM

Cod ATC: J01DH02

MERONEM IV 500 mg; MERONEM IV 1 g ASTRAZENECA; Pulb. pt. sol. inj. i.v. 500 mg și 1 g; ct. × 10 fl. × 20 sau 100 ml (S/P-RF)

MERONEM (i.m.) ASTRAZENECA; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 2 ml (S/P-RF)

Ind: Infecții produse de specii bacteriene sensibile la meropenem: pneumonii, infecții ale tractului urinar; infecții intraabdominale; infecții ginecologice; infecții cutanate și ale țesuturilor moi; meningite; septicemii.

Dz: *Adulți:* 500 mg i.v. la fiecare 8 ore în trat. pneumoniei, infecțiilor tractului urinar, infecțiilor ginecologice, infecțiilor cutanate și ale țesuturilor moi; 1 g i.v. la 8 ore în trat. pneumoniilor nosocomiale, peritonitei, infecțiilor suspectate la pacienții neutropenici și septicemiei. În meningită, 2 g la 8 ore. Pentru ajustarea dozelor în IR. *Copii:* 3 luni - 12 ani, 10-20 mg/kg la 8 ore i.v., în meningită 40 mg/kg la 8 ore.

Cind: Hipersensibilitate la meropenem.

Al: Hipersensibilitate încrucișată între alți carbapenemi și betalactamine, peniciline și cefalosporine; prudență în afecțiuni hepatice, colită, copii sub 3 luni, copii cu funcție renală sau hepatică alterată; interacțiuni medicamentoase cu probenecid; sarcină și alăptare.

RA: Reacții la locul de injectare: inflamație, tromboflebită, durere; rash, prurit, urticarie; dureri abdominale, grețuri, vărsături, diaree; colita pseudo-membranoasă; trombocitemie reversibilă, eozinofilie, trombocitopenie și neutropenie; test Coombs, direct sau indirect, pozitiv; reducerea timpului parțial de tromboplastină; creșteri reversibile separate sau combinate ale concentrației serice de bilirubină, transaminaze, fosfatază alcalină și dehidrogenază lactică; cefalee, parestezii; convulsii; candidoză orală și vaginală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LEVODROPROIZINUM
LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM

Cod ATC: A07EC02

SALOFALK® 250, SALOFALK® 500 DR. FALK PHARMA; Cpr. film. gastrorez. 250 mg, 500 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

SALOFALK® 250, SALOFALK® 500 DR. FALK PHARMA; Sup. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 folii × 5 sup. (**P-6L**)

SALOFALK® 4 g/60 ml DR. FALK PHARMA; Susp. rectală 6,6%; ct. × 7 fl. × 60 g susp. (**P-6L**)

Ind: Colită ulcerosă și proctită în tratamentul episoadelor acute și pentru prevenirea recidivelor. Boala Crohn în tratamentul episoadelor acute. Inflamația canalului anal.

Dz: *Oral:* în inflamație acută se adm. cu suficient lichid câte 2 cp. de 250 mg sau câte 1 cp. de 500 mg, dimineața, la prânz și seara, cu o oră înaintea meselor. În formele severe ale bolii doza poate fi dublată. *Terapie de întreținere:* se administrează 250 mg dimineața, la prânz și seara. *Rectal:* câte 2 sup. de 250 mg dimineața, la prânz și seara, sau câte 1 sup. de 500 mg dimineața și la prânz. În momentul remisiei simptomelor acute doza trebuie redusă la 1 supozitor de 250 mg de trei ori pe zi pentru a preveni recidivele.

Cind: Acidul 5-aminosalicilic nu se va administra în caz de: hipersensibilitate la acidul salicilic și derivații săi. Tulburări hepatice și renale severe, ulcer gastroduodenal, diateză hemoragică (predispoziție la sângerare). De asemenea, nu va fi administrat sugarilor și copiilor mici datorită insuficientei experiențe la această grupă de vârstă.

Al: Trebuie efectuată o hemoleucogramă completă și examenul de urină. Ca o conduită generală, se recomandă teste cu 14 zile înainte de începerea tratamentului și apoi de 2-3 ori la intervale de 4 săptămâni. Dacă rezultatele sunt normale sunt necesare la fiecare 3 luni sau la apariția unor semne de boală următoarele teste: ureea serică (BUN) și nivelul creatininei ca și sedimentul urinar. Pacienții trebuie să fie monitorizați pentru creșterea valorilor methemoglobinei. La pacienții cu tulburări ale funcției pulmonare, în special astm bronșic, este necesară supravegherea dozei. La pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la sulfasalazină tratamentul cu mesalazină poate fi început numai sub strictă supraveghere medicală. Dacă apar semne acute de intoleranță: crampe, durere abdominală acută, febră, cefalee severă și urticarie, tratamentul trebuie întrerupt imediat. Nu se va administra în primele trei luni de sarcină decât la indicația strictă a medicului. Dacă tratamentul este necesar, se va întrerupe alăptarea.

RA: Efecte adverse gastrointestinale: rar disconfort abdominal, diaree, flatulență, greață, vomă. Efecte adverse SNC: în cazuri izolate amețeli și dureri de cap. Reacții de hipersensibilitate: rar reacții de hipersensibilitate care nu sunt dependente de doză și sunt comune acidului salicilic și derivaților săi (rash alergic, febră medicamentoasă, bronhospasm, peri- și miocardită, pancreatită acută și nefrită interstițială). Sporadic cazuri de alveolită alergică și pancolită. Rar artralгии și mialгии, modificări ale hemoleucogramei (neutropenie și trombocitopenie, methemoglobinemie). Foarte rar creșterea transaminazelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V03AF01

LEVOFLOXACINUM
LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM

UROMITEXAN® 400 mg BAXTER ONCOLOGY; Sol. inj. 100 mg/ml; ct. × 15 f. × 4 ml (S)

UROMITEXAN® 400 mg; UROMITEXAN® 600 mg TEMMLER PHARMA; Cpr. film. 400 mg, 600 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Sistemic: Protecția împotriva leziunilor căilor urinare în terapia cu ifosfamidă, ciclofosfamidă și trofosfamidă. Inh./instilații: bronșite cronice obstructive, astmatiforme, emfizematoase, bronșiectazii, mucoviscidoză; pt. îngrijirea intensivă, în cadrul anesteziei și reanimării; sinuzita maxilară.

Dz: Sistemic: inj. i.v. 20% la debutul curei de citostatice, apoi 2, respectiv 6 ore, se adm. int. câte 40% din doză. Inh./instilații: aerosoli, 600-1200 mg de 1-4 ori/zi; instilații pe sondă endotraheală 60-120 mg.

Cind: Sistemic: hipersensibilitate la mesna. Inh./instilații: Astm fără stază a secrețiilor.

Al: Prudență în starea de rău astmatic, bolnavi slăbiți, copii, vârstnici; sarcină și alăptare.

RA: Sistemic: reacții anafilactice și hiperemice, rash cutanat, prurit, eritem cutanat și al mucoaselor, edem urticarian, exantem până la formarea de vezicule, enantem, creșteri tranzitorii ale transaminazelor hepatice, febră, torpoare, grețuri, vărsături, hTA, tahicardie. Inh./instilații: stază a secrețiilor fluidificate, poate favoriza bronhoconstricția la astmatici, senzație de arsură retrosternală, tuse iritativă, greață; poate colora dinții în galben.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N02BB02

LEVOMEPROMAZINUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM

ALGOCALMIN® 500 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 500 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
ALGOCALMIN® 1 g/2 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 1 g/2 ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml (P-RF)
ALGOREMIN REMEDIA ROMANIA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
ALGOZONE OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 500 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
ALINDOR LAROPHARM SRL; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
ANALGIN 500 mg EUROPHARM SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
METAMISOL EEL BIO EEL SRL; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
NEVRALGIN PHARMAPLANT BIOGALENICA SRL; Sol. orală 45%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)
NOVALGIN® HOECHST; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
NOVALGIN® HOECHST; Sol. inj. 500 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml (P-RF)
NOVOCALMIN ANTIBIOTICE SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
NOVOCALMIN ANTIBIOTICE SA; Sup. 300 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (OTC);
SINTOCALMIN SINTOFARM SA; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)

Ind: Trat. simptomatic al durerii de etiologii diverse (mai ales origine spastică), al febrei ce nu răspunde la alte antipiretice.

Dz: *Adulți:* oral 0,5-1 g de 1-2 ori/zi sau inj. i.m. 2-5 ml de 1-2 ori/zi sau i.rect. 1-3 g/zi. *Copii:* oral 0,125-0,75 mg/zi, după vârstă sau i.rect. 0,3-0,9 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la pirazolone și la AINS, antecedente de agranulocitoză, porfirie hepatică, deficiență congenitală în glucozo 6-fosfat-dehidrogenază.

Al: Prudență în astm bronșic, infecții frecvente ale căilor respiratorii superioare, rinite și rinosinuzite frecvente, teren atopic; interacțiuni medicamentoase cu ciclosporina, alcool; sarcină și alăptare.

RA: Leucopenie, trombocitopenie, granulocitopenie, agranulocitoză, tulburări ale funcției renale, manifestată prin oligurie, anurie, proteinurie și nefrită interstițială.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A14AA03

LEVONORGESTRELUM
LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM

NAPOSIM® 5 mg TERAPIA SA; Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Stimularea anabolismului protidic, creșterea masei și tonusului muscular, îmbunătățirea troficității sistemului osos. *Medicina generală:* sindroame de deficit protidic, astenii, stări cașectice de denutriție, stări de involuție caracteristice vârstei, convalescență, infecții acute și cronice, osteoporoză, sindroame hipercorticosuprenale sau hipogonadice, tireotxicoză, tratament prelungit cu cortizon, nefroză, insuficiență renală etc. *Pediatrie:* distrofii, convalescență, imaturitate și prematuritate, întârziere în creștere, osteogeneză imperfectă. *Chirurgie:* perioada de consolidare a fracturilor, tratament pre- și postoperator la bolnavi cu stare generală precară, arsuri și escare.

Dz: *Adulți:* doza de atac: în medie, 10-20 mg/zi; doza de întreținere: 5-10 mg/ zi. *Copii:* 0-2 ani: 0,04 mg/kg corp/zi; 2-6 ani: 0,5 mg/kg corp/zi; 6-14 ani:

1 mg/kg corp/zi. În perioada de creștere, metandienona se administrează discontinuu, o dată la 2-3 zile, sau zilnic timp de 4 săptămâni și apoi 4-6 săptămâni pauză.

Cind: Cancer de prostată.

Al: Se utilizează la femei și copii numai cu indicație medicală strictă și cu multă prudență; atenție la bolnavii cu insuficiență cardiacă, hipotensiune arterială, insuficiență renală, epilepsie. Folosirea la sportivi este interzisă (reacție pozitivă la testele de control antidopaj). Nu se asociază cu deprimante ale sistemului nervos central. Nu se recomandă în sarcină.

RA: În cazul tratamentelor prelungite, metandienona poate determina la bărbați apariția unor efecte androgene reduse; la femei tulburări ale ciclului menstrual. Rarele cazuri de icter hepatotoxic semnalate impun efectuarea testelor de disproteinemie în cursul tratamentului cu metandienonă. Doze de peste 50 mg pot determina stări de neliniște, uneori euforie, valuri de căldură. Toate aceste simptome dispar la diminuarea dozei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10BA02

LEVOSIMENDANUM
LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM

DIAFORMIN® 850 mg TERAPIA SA; Cpr. 850 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
DIGUAN® 500 mg SICOMED SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
DIPIMET 500 mg ANTIBIOTICE SA; Cpr. 500 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
GLUCOPHAGE 500 mg; GLUCOPHAGE 850 mg; GLUCOPHAGE 1000 mg MERCK SANTE; Cpr. film. 500 mg, 850 mg, 1000 mg (P-6L)
MEGUAN® 500 mg; MEGUAN® 850 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. film. 500 mg, 850 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
MEDIFOR 850 mg OKASA PHARMA PRIVATE LTD; Cpr. film. 850 mg; ct. × 4 blist. × 14 cpr. (P-6L)
METFOGAMMA 500; METFOGAMMA 850 WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. 500 mg și 850 mg; ct. × 3 sau 12 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 3, 6, 9 sau 12 blist. × 10 cpr. (P-6L)
METFORMIN AL 500; METFORMIN AL 850 ALIUD PHARMA; Cpr. film. 500 mg, 850 mg; ct. × 3 sau 12 blist. × 10 cpr.; ct. × 2, 4 sau 8 blist. × 15 cpr. (P-6L)
METFORMIN LPH® 500 mg; METFORMIN LPH® 850 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 500 mg sau 850 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)
SIOFOR 500; SIOFOR 850; SIOFOR 1000 BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. film. 500 mg, 850 mg, 1000 mg; ct. × 3, 6 sau 12 blist. × 10 cpr. (500 mg); ct. × 2, 4 sau 8 blist. × 15 cpr. (850 mg, 1000 mg) (P-6L)
Ind: Diabet zaharat non insulino-dependent (de tip 2), în special la pacienții obezi, când nu se poate exercita un control metabolic eficient numai prin dietă și exercițiu fizic.
Dz: Inițial 0,5-1,0 g clorhidrat de metformină/zi; se crește treptat până la cel mult 3 g/zi.
Cind: Afectarea funcției renale; afectarea funcției hepatice; acidoza metabolică decompensată, precomă sau comă diabetică cetoică sau hiperosmolară; insuficiență funcțională cardiovasculară severă; boala arterială ocluzivă periferică; insuficiență respiratorie; stări hipoxice; retinopatie diabetică depășind stadiul 1; stări catabolice cum sunt cele datorate unor neoplazii; infecții acute sau cronice severe; alcoolism; hipersensibilitate la clorhidratul de metformină.
Al: Trat. se întrerupe: înaintea anesteziei generale, examinărilor radiologice cu substanțe de contrast, în diete de privare, în cazul programării unei sarcini sau în timpul sarcinii și al alăptării; prudență la vârstnici, IR, tulburări ale funcției hepatice; interacțiuni medicamentoase cu insulină, alte antidiabetice orale, antiinflamatorii nesteroidiene, IMAO, oxitetraciclină, IEC, fibrati, ciclofosamidă, beta-blocante, simpatomimetice, cimetidina, glucocorticoizi; combinații estroprogestative, anticoncepționale orale, glucagon, hormoni tiroidieni, tiazide și diuretice de ansă, diazoxid, fenotiazine, acid nicotinic, colestiramina, fenprocumonă, alcool etilic; sarcină și alăptare.
RA: Grețuri, vărsături, dureri abdominale, flatulență, scădere în greutate, diaree, gust metalic, cefalee, vertij.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LEVOSULPIRIDUM
LEVOTHYROXINUM
LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM

Cod ATC: N07BC02

SINTALGON® 2,5 mg SICOMED SA; Cpr. 2,5 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. (P-TS)

Ind: Dureri traumatice; dureri reumatice; dureri neoplazice; colică saturnină, hepatică, renală. IMA, EPA; tuse convulsivă.

Dz: *Adulți:* 2,5-10 mg/zi, maxim 40 mg/zi. *Copii peste 4 ani:* 0,625-2,5 mg/zi, după vârstă.

Cind: Abdomen acut; stază bronșică; afecțiuni cardiace decompensate; IR; traumatisme cranio-cerebrale, stări septice; copii sub 4 ani.

Al: Prudență în analgeziei obstetricale și ca anestezic de bază în narcoză; dependență; interacțiuni medicamentoase cu morfina; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Euforie, deprimarea respirației.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01BA01

LEVOTHYROXINUM
 LIDOCAINUM
 LINCOMYCINUM
 LINEZOLIDUM
 LISINAPRILUM
 LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
 LOPERAMIDUM
 LORATADINUM
 LORAZEPAMUM
 LORNOXICAM
 LOSARTANUM
 LOVASTATINUM
 LUTROPINUM ALFA
 LYNSTRENOLUM
 MACROGOLUM
 MAGNESII CITRAS
 MAGNESII OROTAS
 MANNITOLUM
 MAPROTILINUM
 MEBENDAZOLUM
 MEBEVERINUM
 MECLOZINUM
 MEDAZEPAMUM
 MEDROXYPROGESTERONUM
 MEGESTROLUM
 MELOXICAMUM
 MELPHALANUM
 MEMANTINUM
 MENOTROPINUM
 MEPARTRICINUM
 MEPIVACAINUM
 MEPROBAMATUM
 MEQUITAZINUM
 MERCAPTOPURINUM
 MEROPENEMUM
 MESALAZINUM
 MESNUM
 METAMIZOLUM NATRICUM
 METANDIENONUM
 METFORMINUM
 METHADONUM
METHOTREXATUM

ABITREXATE AB/C; Sol. inj. 25 mg/ml; ct. × 1 fl. × 20 ml; ct. × 5 f. × 2 ml (S)
ANTIFOLAN® 2,5 mg SINDAN SRL; Cpr. 2,5 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (S/P-RF)
ANTIFOLAN® 50 mg SINDAN SRL; Pulb. pt. sol. inj./perf. 50 mg; ct. × 1 fl. (S)
METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg; METHOTREXAT "EBEWE" 1000 mg; METHOTREXAT "EBEWE" 5000 mg EBEWE PHARMA; Conc. pt. sol. inj./perf. 100 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml (500 mg), ct. × 1 fl. × 10 sau 50 ml (S)
METHOTREXAT "EBEWE" 5 mg; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (S/P-RF)
METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg; METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg EBEWE PHARMA; Sol. inj./perf. 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 1 sau 5 ml (S)

Ind: Trat. în coriocarcinom gestațional, corioadenom și molă hidatiformă; profilaxia meningitei leucemice; trat. în cancer de sân, cancerelor epidermoide ale capului și gâtului, micosis fungoid în stadiu avansat și cancer de plămân, îndeosebi tipul scuamos și cu celule mici. Trat. limfoamelor non-hodgkiniene în stadiu avansat. Prolungirea perioadelor de remisiune la pacienții cu osteosarcom nemetastazat. Psoriazis sever. Poliartrita reumatoidă: forme severe active.

Dz: Coriocarcinom și boli trofoblastice similare: oral, zilnic 5-30 mg pentru un ciclu de 5 zile, aceste cicluri se repetă, când este necesar, de 3-5 ori. După normalizarea hCG se adm. încă 1-2 cicluri de trat. Leucemie: inducția remisiunii 3,3 mg/m²; întreținere 30 mg/m² săpt., în 2 prize. Meningita leucemică: la copii intratecal 12 mg/m² (maximum 15 mg). Limfoame: oral 10-25 mg/zi timp de 4-8 zile; stadiul III 0,625-2,5 mg/kg zilnic. Micosis fungoid: 2,5-10 mg zilnic, timp de săpt. sau luni. Osteosarcom: atac 12 g/m². Psoriazis și poliartrita reumatoidă: 5-15 mg pe săpt.

Cind: Sarcină și alăptare; alcoolici; hepatită alcoolică; sindroame de imunodeficiență; discrazii sanguine preexistente; hipersensibilitate la metotrexat.

Al: Prudență în osteosarcom, femei de vârstă fertilă, afectarea funcției renale, ulcer peptic, colită ulceroasă, leziuni hepatice preexistente, infecții active, radioterapie, vârstnici, copii; monitorizarea hemogramei, funcției renale și hepatice; interacțiuni medicamentoase cu AINS, fenitoină, sulfonamide, cisplatin, tetraciclină, cloramfenicol, acid folic, trimetoprim-sulfametoxazol, substanțe hepatotoxice.

RA: Stomatită, vărsături, diaree, deshidratare, anemie, leucopenie și/sau trombocitopenie, hepatotoxicitate, hipogamaglobulinemie, leucoencefalopatie, fenomene de arahnoidită chimică, tuse seacă, pneumonie nespecifică, IR acută, gingivită, faringită, cefalee, amețeală, vedere încețoșată, afazie, hemipareză, paraliză, convulsii, disfuncții cognitive, anorexie, greață, vărsături, diaree, hematemeză, ulceratii și sângerare gastrointestinală, enterită, rash eritematos, prurit, urticarie, fotosensibilitate, modificări pigmentare, alopecie, echimoze, telangiectazii, acnee, furunculoză, azotemie, cistită, hematurie, afectarea spermatogenezei și ovo-genezei, oligospermie tranzitorie, tulburări menstruale, leucoree, sterilitate, avort.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LIDOCAINUM
LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINOPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRIMIDINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM

Cod ATC: C02AB01**DOPEGYT** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-6L)**Ind:** HTA.**Dz:** Oral, inițial 250 mg de 2 ori/zi, întreținere 500 mg - 2 g/zi.**Cind:** Boli hepatice active (hepatită acută, ciroză activă), stări depresive grave, feocromocitom, hipersensibilitate la metildopa, anemie hemolitică.**Al:** Prudență la hepatici, anginoși, IR, bătrâni; se controlează probele hepatice și hemograma; interacțiuni medicamentoase cu alcool, litiu, alte antihipertensive, anestezice generale; sarcină și alăptare.**RA:** Sedare, somnolență, oboseală, cefalee, pozitivarea testului Coombs, amețeli și alte simptome de hTA ortostatică, edeme și creștere în greutate, bradicardie, congestie nazală, greață, vomă, constipație sau diaree, flatulență, pancreatită, inflamația glandelor salivare, mărirea sânilor, galactoree, amenoree, diminuarea libidoului, impotență, erupții cutanate, artralгии, mialгии, parestezii, febră, eozinofilie, pozitivarea unor probe funcționale hepatice, icter; necroză hepatică gravă, anemie hemolitică, fenomene parkinsoniene, tulburări psihice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LINCOMYCINUM
LINEZOLIDUM
LISINAPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS

Cod ATC: M02AX10

UNGUENT CU NICOTINAT DE METIL GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Ung. 3%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)

Ind: Dureri articulare reumatice cronice, mialgii, nevralgii, dureri traumatice articulare și musculare, furuncule și panariții în stadiu inițial; afecțiuni vasculospastice periferice; bronșite cronice; tendință la alopecie.

Dz: Aplicații cutanate de 2-3 ori/zi, cu masaj ușor.

Cind: Boli inflamatorii ale pielii, artrită obliterantă, microangiopatie diabetică gravă.

Al: Se va evita contactul cu ochii și mucoasele.

RA: Dozele excesive sau aplicarea pe regiuni sensibile pot fi cauză de iritație locală marcată.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H02AB04

LINEZOLIDUM
 LISINOPRILUM
 LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
 LOPERAMIDUM
 LORATADINUM
 LORAZEPAMUM
 LORNOXICAM
 LOSARTANUM
 LOVASTATINUM
 LUTROPINUM ALFA
 LYNESTRENOLUM
 MACROGOLUM
 MAGNESII CITRAS
 MAGNESII OROTAS
 MANNITOLUM
 MAPROTILINUM
 MEBENDAZOLUM
 MEBEVERINUM
 MECLOZINUM
 MEDAZEPAMUM
 MEDROXYPROGESTERONUM
 MEGESTROLUM
 MELOXICAMUM
 MELPHALANUM
 MEMANTINUM
 MENOTROPINUM
 MEPARTRICINUM
 MEPIVACAINUM
 MEPROBAMATUM
 MEQUITAZINUM
 MERCAPTOPURINUM
 MEROPENEMUM
 MESALAZINUM
 MESNUM
 METAMIZOLUM NATRICUM
 METANDIENONUM
 METFORMINUM
 METHADONUM
 METHOTREXATUM
 METHYLDOPUM
 METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM

DEPO-MEDROL 40 mg/ml; DEPO-MEDROL 80 mg/2 ml[®] PHARMACIA & UPJOHN; Susp. inj. metilprednisolon acetat 40 mg/ml, 80 mg/2 ml; ct. × 1 fl. × 1 sau 2 ml (**P-RF**)

LEMOD SOLU 20 mg; 40 mg; 125 mg; 500 mg HEMOFARM; Liof. pt. sol. inj. 20 mg, 40 mg, 125 mg, 500 mg metilprednisolon succinat sodic; ct. × 15 fl. + 15 f. solv. × 1 ml (20 mg, 40 mg), ct. × 1 fl. × 1 f. solv. × 2 ml (125 mg), ct. × 1 fl. × 1 f. solv. 7,8 ml (500 mg) (**P-RF**)

MEDROL[®] 4; MEDROL[®] 16; MEDROL[®] 32 PHARMACIA & UPJOHN; Cpr. 4 mg, 16 mg, 32 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (4 mg), ct. × 5 blist. × 10 cpr. (16 mg), ct. × 5 blist. × 10 cpr. (32 mg) (**S/P-RF**)

SOLU-MEDROL[™] PHARMACIA & UPJOHN; Liof. + Solv. pt. pulb. pt. sol. inj. 500 mg/7,8 ml metilprednisolon succinat sodic; ct. × 1 fl. pulb. × 1 f. solv. × 7,8 ml (**P-RF**)

SOLU-MEDROL[™] ACT-O-VIAL[™] PHARMACIA & UPJOHN; Pulb. liof. pt. sol. inj. 40 mg/1 ml; 125 mg/2 ml; 250 mg/4 ml metilprednisolon succinat sodic; ct. × 1 fl. bicompartimentat ACT-O-VIAL[™] (compartiment inferior) pulb. 40 mg; 125 mg sau 250 mg + (compartiment superior) 1 ml; 2 ml sau 4 ml solvent pt. reconstituire (**S/P-RF**)

Ind: Osteoartrita posttraumatică, sinovita din osteoartrită, poliartrita reumatoidă inclusiv poliartrita reumatoidă juvenilă, bursita acută și subacută, epicondilita, tenosinovita acută nespecifică, artrita gutoasă acută, artrita psoriazică, spondilita anchilopoietică. Anumite cazuri de lupus eritematos sistemic (și nefrită lupică), cardită reumatică acută, dermatomiozită sistemică/polimiozită, poliarterită nodoasă, sindrom Goodpasture. Pemfigus, eritem multiform sever, dermatită exfoliativă, dermatită buloasă herpetiformă, dermatită seboreică severă, psoriazis sever, mycosis fungoides. Astmul bronșic, dermatita de contact, dermatita atopică, boala serului, rinita alergică sezonieră sau perenă, reacțiile de hipersensibilitate la medicamente, reacțiile urticariene posttransfuzionale, edemul laringian acut neinfecțios. Herpes zoster oftalmic, irită, iridociclită, coriorietinită, uveită posterioară difuză și coroidită, nevrită optică, oftalmie simpatică, inflamația camerei anterioare, conjunctivită alergică, ulcere corneene marginale alergice, keratită. Colita ulcerosă, enterita regională. Sarcoidoză pulmonară simptomatică (activă), berilioză, tuberculoză pulmonară fulminantă sau miliară, sindrom Loeffler, pneumonie de aspirație. Transplant de organ, anemia hemolitică imună, purpura trombocitopenică idiopatică la adulți, trombocitopenia secundară la adulți, eritroblastopenia, anemia hipoplasică congenitală; trat. paleativ în leucemii și limfoame la adulți, leucemii acute la copii. Provocarea diurezei sau înlăturarea proteinuriei din sindromul nefrotic fără uremie, de tip idiopatic sau din lupusul eritematos. Edem cerebral determinat de tumori primare sau metastatice și/sau asociat cu terapia chirurgicală, radioterapia sau determinat de traumatism cranian; episoade acute de scleroză multiplă; traumatism acut al măduvei; șocul din insuficiența corticosuprarenală; șocul hemoragic, traumatic și chirurgical, care nu răspunde la terapia standard. Meningita tbc cu blocaj subarahnoidian; profilaxia stărilor de greață și vomă provocate de chimioterapia antineoplazică. Insuficiență CSR cronică și acută; preoperator sau în cazul unor traumatisme sau boli severe la pacienți cu insuficiență CSR; hiperplazie congenitală a suprarenalei; tiroidită nesupurativă; hipercalcemie paraneoplazică. Terapie adjuvantă în: sinovita din osteoartrită; artrita reumatoidă; bursita acută și subacută; artrita gutoasă acută; epicondilita; tenosinovita acută nespecifică; osteoartrita posttraumatică. Cicatrice

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D07AC14

LISINOPRILUM
LODOXAMIDUM
LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT

ADVANTAN SCHERING AG; Unguent 0,1%; ct. × 1 tub × 15 g (*P-RF*)

ADVANTAN® MILK SCHERING AG; Emulsie cut. 1%; ct. × 1 tub × 20 sau 50 g (*P-RF*)

Ind: Eczemă endogenă (dermatită atopică, neurodermatită), eczemă de contact, degenerativă, dishidrotică, eczemă vulgară, eczemă la copii.

Dz: Se aplică o dată pe zi pe suprafața afectată; maxim 12 săptămâni la *adulți* și 4 săptămâni la *copii*.

Cind: Procese cutanate specifice tuberculoase sau sifilitice, boli virale; la gravide și la femeile care alăptează indicațiile clinice vor ține seama de raportul beneficiu-risc.

Al: Produsul nu trebuie să vină în contact cu ochii. Se va evita utilizarea pe suprafețe întinse și timp îndelungat.

RA: *Local:* prurit, arsură, eritem, vezicule; mai rar foliculită, hipertricoză, dermatită periorală, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03FA01

LODOXAMIDUM
 LOMEFLOXACINUM
 LOPERAMIDUM
 LORATADINUM
 LORAZEPAMUM
 LORNOXICAM
 LOSARTANUM
 LOVASTATINUM
 LUTROPINUM ALFA
 LYNESTRENOLUM
 MACROGOLUM
 MAGNESII CITRAS
 MAGNESII OROTAS
 MANNITOLUM
 MAPROTILINUM
 MEBENDAZOLUM
 MEBEVERINUM
 MECLOZINUM
 MEDAZEPAMUM
 MEDROXYPROGESTERONUM
 MEGESTROLUM
 MELOXICAMUM
 MELPHALANUM
 MEMANTINUM
 MENOTROPINUM
 MEPARTRICINUM
 MEPIVACAINUM
 MEPROBAMATUM
 MEQUITAZINUM
 MERCAPTOPURINUM
 MEROPENEMUM
 MESALAZINUM
 MESNUM
 METAMIZOLUM NATRICUM
 METANDIENONUM
 METFORMINUM
 METHADONUM
 METHOTREXATUM
 METHYLDOPUM
 METHYLII NICOTINAS
 METHYLPREDNISOLONUM
 METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM

CERUCAL® AWD PHARMA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-6L)

CERUCAL® AWD PHARMA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 ml (P-RF)

METOCLOPRAMID SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 4 blist. × 10 cpr. (P-6L)

METOCLOPRAMID TERAPIA SA; Cpr. 10 mg; ct. × 4 blist. × 10 cpr. (P-6L)

METOCLOPRAMID TERAPIA SA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml (P-RF)

METOCLOPRAMID BIOFARM SA; Sol. orală 0,665%; ct. × 1 fl. × 20 ml (P-6L)

METOCLOPRAMID 10 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 40 sau 1000 cpr. (S/P-6L)

METOCLOPRAMID 10 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 2 blist. × 20 cpr. (P-6L)

METOCLOPRAMID TERAPIA SA; Sol. orală 0,7%; ct. × 1 fl. × 20 ml (P-6L)

METOCLOPRAMID 10 mg FARMEX COMPANY; Cpr. 10 mg; ct. × 4 blist. × 10 cpr. (P-6L)

PRAMIDIN® 10; PRAMIDIN® 20 CRINOS; Aerosol nazal 10 mg/doză, 20 mg/doză; ct. × 1 fl. × 2 ml, respectiv ct. × 1 fl. × 4 ml (P-6L)

Ind: Profilaxia și trat. stărilor de greață și vomă; trat. tulburărilor de motilitate ale porțiunii superioare a tractului gastrointestinal; trat. gastroparezei diabetice; facilitarea unor procedee diagnostice; trat. sughițului.

Dz: *Int.:* Sdr. cu hipomobilitate gastrică: 10 mg de 4 ori/zi. Esofagită de reflux: 10-15 mg 4 ori/zi. Sughiț: 10-20 mg de 4 ori/zi, timp de 7 zile. Pentru procedee diagnostice: 10-20 mg i.v. cu aproximativ 10 minute înaintea examinării. Antiemetic: 5-10 mg de 3 ori/zi. *Copii 5-14 ani:* 2,5-5 mg de 3 ori/zi. *Sugari și copii sub 3 ani:* 0,5-1 mg/kg și zi, în 3 prize. *Inj.:* Greață și vărsături, tulburări de motilitate, gastropareză diabetică 10 mg i.m. sau i.v. de 3-4 ori/zi. *Copii 3-14 ani:* 0,1 mg/kg și zi; maxim 0,5 mg/kg și zi. Greață și vărsături posttrat. cu citostatice: 2 mg/kg în perf. i.v.

Cind: Hipersensibilitate la metoclopramidă; feocromocitom; ileus mecanic, perforații intestinale și hemoragii gastro-intestinale; tumori dependente de prolactină; epilepsie, motorii extrapiramidale; copii sub 2 ani (inj.).

Al: Prudență la copii și tineri, vârstnici, IR, IH; interacțiuni medicamentoase cu levodopa (Cind), alcool etilic, antihipertensive, antidepresive triciclice, analgezice opioide, antihistaminice H1, barbiturice, benzodiazepine, neuroleptice, anticolinergice, digoxină, cimetidină, sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Somnolență, nervozitate, oboseală, cefalee, amețeală, anxietate, neliniște, diaree, stări depresive, sindrom extrapiramidal, ginecomastie, galactoree, tulburări menstruale, tulburări parkinsoniene, diskinezie tardivă, methemoglobinemie, iritații locale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C07AB

LOMEFLOXACINUM
LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM

BETALOC ASTRAZENECA; Sol. inj. 1 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml (**S**)
BETALOC® ZOK 25 mg; BETALOC® ZOK 50 mg; BETALOC® ZOK 100 mg ASTRAZENECA; Cpr. ret. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (25 mg), ct. × 1 fl. × 30 cpr. sau ct. × 2 blist. × 14 cpr. (50 mg, 100 mg) (**P-6L**)
BETAPROL 50; BETAPROL 100 AC HELCOR SRL; Cpr. 50 mg sau 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
BLOXAN KRKA; Cpr. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
EGILOK EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (**P-6L**)
METOPROLOL 50 mg; METOPROLOL 100 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
METOPROLOL LPH® 25 mg; METOPROLOL LPH® 50 mg, METOPROLOL LPH® 100 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 2, 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (**S/P-6L**)
METOPROLOL 25 mg; METOPROLOL 50 mg; METOPROLOL 100 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
METOPROLOL 50 mg; METOPROLOL 100 mg TERAPIA SA; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
METOPROLOL 100 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 100 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (**P-6L**)
METOPROLOL AL 50; METOPROLOL AL 100 ALIUD PHARMA; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 3, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
METOPROLOL 50; METOPROLOL 100 VIM SPECTRUM SRL; Cpr. 50 mg sau 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
VASOCARDIN® 50; VASOCARDIN® 100 SLOVAKOFARMA; Cpr. 50 mg, 100 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
VASOCARDIN® SR 200 ZENTIVA AS; Cpr. elib. prel. 200 mg; ct. × 3, 6 sau 10 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

Ind: HTA; profilaxia crizelor de angină de efort; IMA; eretism cardiac; aritmii supraventriculare (tahicardie, flutter și fibrilație atrială, tahicardie joncțională) și aritmii ventriculare (extrasistole ventriculare, tahicardie ventriculară).

Dz: Oral: 50-200 mg/zi. Inj.: Aritmii: inițial 5 mg i.v., repetat la 5 min, maxim 20 mg. IMA: 5 mg i.v. în bolus, de 3 ori la intervale de 5 minute.

Cind: Forme severe de astm bronșic și BPCO, IC care nu răspunde la trat., șoc cardiogen, BAV de gradul II sau III neinvestigat, angor Prinzmetal, boala nodului sinusal, bloc sinoatrial, bradicardie sinusală (sub 45-50 bătăi/min), forme severe de sindrom Raynaud și afecțiuni arteriale periferice, feocromocitom netratat, hTA, hipersensibilitate la metoprolol, antecedente de reacții anafilactice.

Al: Prudență la copii, IC, BAV gradul I, diabet zaharat, psoriazis, anestezie generală, tireotoxicoză, ciroză hepatică, IH, sportivi; monitorizarea TA; în cardiopatie ischemică trat. trebuie întrerupt gradat; interacțiuni medicamentoase cu amiodarona, anestezice generale, blocante ale canalelor de calciu, chinidină, disopiramidă, baclofen, cimetidina, lidocaină, antiacide, substanțe de contrast iodate, AINS, antidepresive triciclice, neuroleptice, glucocorticoizi, fenobarbital și rifampicină; sarcină și alăptare.

RA: Astenie, senzația de răceală în extremități, bradicardie, tulburări digestive (epigastralgie, greață, vărsături), insomnie, coșmar, încetinirea conducerii AV sau mărirea gradului unui BAV preexistent, IC, agravarea

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LOPERAMIDUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM

Cod ATC: J01XD01, G01AF01, P01AB01**DEFLAMON®-FLEBO** S.P.A.; Sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (S)**EFLORAN®** KRKA; Sol. perf. 500 mg/100 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (S)**FLAGYL® 250 mg** LAB. AVENTIS; Cpr. film. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**FLAGYL** LAB. AVENTIS; Ovule 500 mg; ct. × 2 blist. × 5 ovule (P-RF)**FLAGYL®** LAB. AVENTIS; Susp. orală 125 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 120 ml (P-RF)**METRONIDAZOL** ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)**METRONIDAZOL A 5 g/l; METRONIDAZOL B 5 g/l** INFOMED FLUIDS SRL; Sol. perf. A (în glucoză); Sol. perf. B (în clorură de sodiu); ct. × 1 fl. × 200 ml, ct. × 200 fl. × 200 ml (S)**METRONIDAZOL 250 mg** ARENA GROUP SA; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)**METRONIDAZOL 500 mg** B. BRAUN MELSUNGEN AG; Sol. perf. 500 mg/100 ml; ct. × 10 fl. × 100 ml (S)

Ind: Trat. infecțiilor severe provocate de germeni sensibili la metronidazol: Bacteroides, inclusiv B. fragilis, coci gram-pozitiv anaerobi - Peptostreptococcus, majoritatea clostridiilor, inclusiv C. difficilis. Trat. cazurilor grave de amibiază cu localizare intestinală sau hepatică. Lambliază, trichomoniază urogenitală, vaginite nespecifice.

Dz: Amibiaza. *Adulți:* 1,5 g/zi, int., în 3 prize, timp de 7 zile consecutiv. *Copii:* 30-40 mg/kg și zi, int., în 3 prize, timp de 7 zile consecutiv. *Trichomoniază. Femei* (uretrite și vaginite cu Trichomonas): doză unică 2 g, int., sau trat. mixt timp de 10 zile consecutiv, 500 mg/zi oral și i.vag. 500 mg/zi. Se va trata concomitent și partenerul. *Bărbați* (uretrite cu Trichomonas): doză unică 2 g/zi int. sau 500 mg/zi, int., timp de 10 zile consecutiv. *Lambliază.* 5 zile consecutiv. *Adulți:* 750-1000 mg/zi, int. *Copii:* 2-5 ani: 250 mg/zi int. 5-10 ani: 375 mg/zi int. 10-15 ani: 500 mg/zi, int. *Vaginite nespecifice.* 500 mg/zi int. și i.vag. 500 mg/zi timp de 7 zile. Infecții cu germeni anaerobi. *Adulți:* 1-1,5 g/zi. *Copii:* 20-30 mg/kg și zi. Inj. *Curativ: Adulți și copii peste 12 ani:* 500 mg de ori 2-3/zi, perf. i.v. *Copii sub 12 ani:* 7,5 mg/kg de 3 ori/zi. *Profilactic: Adulți și copii peste 12 ani:* Doza pentru o dată este de 500 mg. *Copii mai mici de 12 ani:* Doza pentru o dată este de 7,5 mg/kg. I.rect: *Adulți:* 1 g la 8 ore, timp de 5-10 zile. *Copii:* 2-10 ani, 0,5-1 g/zi, 10-15 ani, 0,5 g la 8 ore timp de 5-10 zile.

Cind: Hipersensibilitate la metronidazol, la alți derivați de nitroimidazol; afecțiuni cerebrale organice; sarcină și alăptare.

Al: Prudență în IR severă, afecțiuni hepatice grave, trat. lungi; interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante orale, fluorouracil, alcool etilic.

RA: Senzație de gust metalic, limbă saburală, anorexie, greață, varsături, dureri epigastrice, diaree, urticarie, prurit, bufeuri vasomotorii; tulburări neuropsihice-cefalee, vertij, ataxie, confuzie mintală, convulsii; pancreatită reversibilă; leucopenie, neuropatii senzitive periferice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM

Cod ATC: C01BB02**MEXILETIN 200 mg** LABORMED PHARMA SA; Cps. 200 mg; ct. × 2, 6 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)**MEXITIL® 200 mg** BOEHRINGER INGELHEIM; Cps. 200 mg; ct. × 10 blist. × 10 cps. (P-RF)**Ind:** Aritmii ventriculare.**Dz:** i.v. încărcare: 0,1 mg/kg și min; întreținere: 0,01 mg/kg și min. Int: încărcare: 400 mg; întreținere: 400-800 mg, până la 1200 mg/zi.**Cind:** Primele 3 luni de sarcină, post-IMA, șoc cardiogen, BAV de gradul II-III, hipersensibilitatea la mexiletin sau la anestezice locale.**Al:** Prudență în disfuncție sinusală, tulburări de conducere intracardiacă, bradicardie, hTA, IC, ciroză hepatică decompensată, IR severă; interacțiuni medicamentoase cu alte antiaritmice, opioide, inhibitori sau inductori enzimatici, teofilină, cafeină; alăptare; șoferi și activități de precizie.**RA:** Disconfort gastric, afectarea simțului gustativ, greață, vărsături, toropeală, disartrie, nistagmus, tulburări oculare de adaptare, ataxie, secuse musculare, parestezii, convulsii, cazuri izolate de stări confuzionale pasagere, agravarea aritmiei, erupții cutanate, ulceratii esofagiene.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LORAZEPAMUM
LORNOXICAM
LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM

Cod ATC: N06AX03

MIANSERIN 10 mg; MIANSERIN 30 mg TERAPIA SA; Dj. 10 mg, 30 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (10 mg), ct. × 2 blist. × 10 dj. (30 mg) **(P-RF)**

MIANSERIN 10 DE SITIN; MIANSERIN 30 DE SITIN DESITIN; Cpr. film. 10 mg, 30 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

MIANSERIN REMEDICA; Cpr. film. 10 mg, 30 mg; ct. × 10 blist. × 10 cpr. (10 mg), ct. × 2 blist. × 10 cpr. (30 mg) **(P-RF)**

Ind: Depresie.

Dz: *Adulți:* inițial 30-40 mg zilnic, întreținere 30-90 mg zilnic. *Vârstnici:* inițial maxim 30 mg zilnic.

Cind: Manie, hipersensibilitate la mianserină.

AI: Poate precipita hipomania; control hematologic, prudență în diabet, IC, IH, IR, glaucom cu unghi îngust, hipertrofie de prostată; interacțiuni medicamentoase cu alcool, betanidina, clonidina, metildopa, guanetidina sau propranololul; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Discrazii sanguine, convulsii, hipomanie, hTA, dereglări ale funcțiilor ficatului, artralgie, edem, ginecomastie, stare de toropeală, tulburări de vedere, gură uscată, constipație.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LORNOXICAM
 LOSARTANUM
 LOVASTATINUM
 LUTROPINUM ALFA
 LYNESTRENOLUM
 MACROGOLUM
 MAGNESII CITRAS
 MAGNESII OROTAS
 MANNITOLUM
 MAPROTILINUM
 MEBENDAZOLUM
 MEBEVERINUM
 MECLOZINUM
 MEDAZEPAMUM
 MEDROXYPROGESTERONUM
 MEGESTROLUM
 MELOXICAMUM
 MELPHALANUM
 MEMANTINUM
 MENOTROPINUM
 MEPARTRICINUM
 MEPIVACAINUM
 MEPROBAMATUM
 MEQUITAZINUM
 MERCAPTOPURINUM
 MEROPENEMUM
 MESALAZINUM
 MESNUM
 METAMIZOLUM NATRICUM
 METANDIENONUM
 METFORMINUM
 METHADONUM
 METHOTREXATUM
 METHYLDOPUM
 METHYLII NICOTINAS
 METHYLPREDNISOLONUM
 METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
 METOCLOPRAMIDUM
 METOPROLOLUM
 METRONIDAZOLUM
 MEXILETINUM
 MIANSERINUM
MICONAZOLUM

Cod ATC: A01AB09, G01AF04, D01AC02

DERMOZOL PHARCO PHARM.; Gel 2%; ct. × 1 tub × 15 g (P-RF)

GYNOZOL 200; GYNOZOL 400 PHARCO PHARM.; Cps. vag. moi 200 mg sau 400 mg; ct. × 2 blist × 3 cps., respectiv ct. × 1 blist × 3 cps. (P-RF)

MEDACTER FARAN LAB.; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 30 g (P-RF)

MEDACTER FARAN LAB.; Cremă vaginală 2%; ct. × 1 tub × 78 g (P-RF)

MICONAL ECOBI ECOBI PHARMACEUTICI; Cremă vag. 2%; ct. × 1 tub × 78 g + aplicator; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 30 g (P-RF)

MICONAL ECOBI ECOBI PHARMACEUTICI; Ovule 50 mg; ct. × 3 blist. × 5 ovule (P-RF)

MICONAL ECOBI ECOBI PHARMACEUTICI; Cps. vag. 1,2 g; ct. × 1 blist. × 2 cps. (P-RF)

MICONAL ECOBI LAVANDA VAGINALĂ ECOBI PHARMACEUTICI; Sol. ext. 0,2%; ct. × 5 fl. × 150 ml + 5 canule (P-RF)

MICOTOP gel 2% EUROPHARM SA; Gel 2%; ct. × 1 tub × 40 g (P-RF)

MONAZOLE 7 TECHNILAB; Cremă vag. 2%; ct. × 1 tub × 50 g × 7 aplicatoare (P-RF)

MYCOHEAL DAR AL DAWA; Cremă vag. 2%; ct. × 1 tub × 50 g + aplicator (P-RF)

MYCOHEAL 200 DAR AL DAWA; Sup. vag. 200 mg; ct. × 1 folie × 7 sup., ct. × 2 folii × 3 sau 4 sup. (P-RF)

Ind: Trat. vulvovaginitelor micotice (în special candidozice) suprainfectate sau nu de o floră bacteriană grampozitivă. Aplicat pe piele în trat. pitiriazisului și a dermoepidermitelor infecțioase; trat. acneei.

Dz: Ext. vag: 50-1200 mg, în funcție de starea clinică. **Cutanat:** se aplică de 2 ori/zi, dimineața și seara. **Int.:** 1 g de 1-3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la miconazol nitrat, la alți derivați imidazolici.

Al: Prudență în sarcină și alăptare.

RA: Ext.: fenomene de sensibilizare sau iritații locale; i.vag: arsuri și iritație vaginală, crampe pelviene, erupții cutanate și cefalee. **Int.:** greață și diaree, rareori erupții cutanate pruriginoase.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LOSARTANUM
LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM

Cod ATC: N05CD08

DORMICUM® HOFFMANN LA ROCHE; Sol. inj. 1 mg/ml; ct. × 10 f. × 5 ml; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (S)

DORMICUM® 7,5 mg HOFFMANN LA ROCHE/TERAPIA SA; Cpr. film. 7,5 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

FULSED INJECTION RANBAXY LAB.; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 fl. × 5 sau 10 ml (S)

MIDAZOLAM 5 mg/ml TERAPIA SA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (S)

MIDAZOLAM TORREX 1 mg/ml; MIDAZOLAM TORREX 5 mg/ml TORREX PHARMA; Sol. inj. 1 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 sau 5 ml; sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 1, 3 sau 10 ml (S)

Ind: Int.: Tulburări ale ritmului somnului și insomnie. Inj.: Preanestezie, înainte de procedurile diagnostice sau de operațiile efectuate sub anestezie locală. Sedare de durată în terapie intensivă. Inducția sau menținerea anesteziei.

Dz: Int.: Adulți: 7,5-15 mg. Pacienți în vârstă, debilitați, cu IR și/sau IH 7,5 mg. Inj.: Adulți: 0,07-0,01/kg; Copii: 0,15-0,20 mg/kg; Bătrânii și tărâți: 0,025-0,05 mg/kg.

Cind: Hipersensibilitate la benzodiazepine.

Al: Nu este indicat în trat. primar al insomniei, în psihoze și în depresiile psihice severe; prudență în leziuni cerebrale organice, insuficiență respiratorie severă, miastenia gravis, boli obstructive pulmonare, IR, IC congestivă, prematuri și nou-născuți; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină, eritromicină, neuroleptice, tranchilizante, antidepresive, hipnotice, analgetice, anestezice, alcool, ciclosporină, amiodaronă, neuroleptice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Fenomene de dependență, episoade amnezice, hTA, tahicardie, depresie respiratorie, apnee, stop respirator și/sau cardiac; hipersensibilitate generalizată, agitație, hiperactivitate și agresivitate, convulsii tonico-clonice și tremor muscular, amnezie anterogradă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

LOVASTATINUM
LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM

Cod ATC: C01CA17

GUTRON NYCOMED; Cpr. 2,5 mg, 5 mg; ct. × 1 sau 5 blist. × 10 cpr. (2,5 mg), respectiv ct. × 2 blist. × 10 cpr. (5 mg) (**P-6L**)

Ind: Tulburări ale reglării circulației sanguine și tulburări circulatorii datorate acumulării unor mari cantități de sânge în venele extremităților inferioare, hTA. Incontință urinară datorată insuficienței funcției sfincterului vezical, tulburări ale ejaculării.

Dz: Int.: 1,25-5 mg de 2-3 ori/zi; inj. i.v.: 5 mg de 1-2 ori/zi.

Cind: HTA, tumori medulo-suprarenale, nefrită acută, IR severă, glaucom, hipertrofie de prostată, obstrucție mecanică în micțiune, hipertiroidism.

Al: Prudență în modificări severe organice ale inimii și ale sistemului vascular, tulburări de ritm, IR; sarcină și alăptare.

RA: Aritmii, dureri precordiale, urticarie, piloerecție, bradicardie, senzații de frig și necesitate de a micționa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06AX17

LUTROPINUM ALFA
LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM

IXEL LAB. PIERRE FABRE; Cps. 25 mg, 50 mg; ct. × 4 blist. × 14 cps. (P-RF)

Ind: Trat. episoadelor depressive majore.

Dz: 50 mg de 2 ori/zi; pt. ajustarea dozei în IR.

Cind: Hipersensibilitate la milnacipran, copii sub 15 ani, asociere cu IMAO.

Al: Prudență în obstacol la evacuarea vezicală, idei suicidare, IR, HTA, afecțiuni cardiace; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, sumatriptan, simpatomimetice, digoxină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Vertij, transpirație abundentă, anxietate, bufeuri, disurie, grețuri, vărsături, uscăciunea gurii, constipație, tremor, palpitații, sindrom serotoninergic, riscul suicidului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01XX09

LYNESTRENOLUM
MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM

MILTEX BAXTER ONCOLOGY; Sol. ext. 60 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml + pipetă (S/P-RF)

Ind: Modificări cutanate maligne în cancerul de sân.

Dz: Sol. se aplică extern, la nivelul zonei afectate.

Cind: Iradiere concomitentă, noduli mari și în profunzime; sarcină și alăptare.

Al: Prudență în trat. lungi; controale oftalmologice.

RA: Iritații cutanate, prurit, eritem, uscăciunea pielii cu descuamare, arsură dureroasă, creștere ușoară a creatininei serice, transaminazelor, leucocitelor, trombocitelor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D11AX01

MACROGOLUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM

ALOPEXY LAB. PIERRE FABRE; Sol. ext. 2%; ct. × 1 fl. × 15 sau 60 ml + pipetă (OTC)
HAIRGROW DAR AL DAWA; Sol. capilară 2%; ct. × 1 fl. pulverizator × 50 ml (OTC)
REGAINE® PHARMACIA & UPJOHN; Sol. cut. 2%; ct. × 1 fl. × 60 ml + 3 tipuri de aplicator-dozator (OTC)

Ind: Alopecie androgenică.

Dz: Se aplică 20 mg de 2 ori/zi pe aria afectată a scalpului, începând din centrul acesteia.

Cind: Hipersensibilitate la minoxidil.

Al: Prudență la copii sub 18 ani și la vârstnici peste 65 ani, alte afecțiuni dermatologice, supravegherea cardiovasculară; este lipsit de eficacitate în alopecie areata; interacțiuni medicamentoase cu minoxidil adm. oral; sarcină și alăptare.

RA: Descuamare, eritem, dermită, uscarea pielii, hipertricoză (apărută în alte regiuni), senzație de arsură, prurit, sensibilitate crescută a pielii, rinită, erupții cutanate, eritem generalizat, edem facial, vertij, parestezii, cefalee, senzație de oboseală, nevrită, edeme, alterări ale gustului, infecții auriculare (otită externă), tulburări de vedere, iritație la nivelul ochiului, alopecie neregulată, dureri toracice, modificări ale TA și pulsului, hepatită, litiază renală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MAGNESII CITRAS
MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM

Cod ATC: N06AX11

ESPRITAL® 15; ESPRITAL® 30; ESPRITAL® 45 ZENTIVA AS; Cpr. film. 15 mg, 30 mg, 45 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
MIRTAZAPIN STADA 30 mg; MIRTAZAPIN STADA 45 mg STADA; Cpr. film. 30 mg, 45 mg; ct. × 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
MIRZALUX 15 mg; MIRZALUX 30 mg; MIRZALUX 45 mg HEXAL AG; Cpr. film. 15 mg, 30 mg, 45 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
MIRZATEN® 15; MIRZATEN® 30; MIRZATEN® 45 KRKA; Cpr. film. 15 mg, 30 mg, 45 mg; ct. × 3, 6 sau 9 blist. × 10 cpr. (P-RF)
REMERON® SOLTAB 15 mg; REMERON® SOLTAB 30 mg; REMERON® SOLTAB 45 mg ORGANON; Cpr. dispersabile 15 mg, 30 mg, 45 mg; ct. × 1, 3, 5, 8 sau 16 blist. × 6 cpr. (P-RF)

Ind: Depresie.**Dz:** Inițial 15 mg/zi, crescut treptat apoi.**Cind:** Hipersensibilitate la mirtazapină.**Al:** Prudență în epilepsie, afecțiuni hepatice, afecțiuni renale, afecțiuni cardiace, hTA, schizofrenie, depresie, diabet zaharat, glaucom, adenom de prostată; interacțiuni medicamentoase cu alcool; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.**RA:** Leucopenie, somnolență, creșterea apetitului; creștere ponderală; vertij, convulsii, criză maniacală, edeme la nivelul membrelor inferioare, colorație icterică a tegumentelor și mucoaselor, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01DC03

MAGNESII OROTAS
MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM

MUTAMYCIN® BRISTOL-MYERS SQUIBB; Pulb. liof. pt. sol. inj. 5 mg, 20 mg (**S**)

Ind: Adenocarcinom gastric sau pancreatic metastatic.

Dz: 20 mg/m i.v. în doză unică, la interval de 6-8 săpt.

Cind: Hipersensibilitate la mitomicină, trombocitopenie, tulburări de coagulare, risc de hemoragie.

Al: Monitorizare a hemogramei; prudență în sarcină și alăptare.

RA: Trombocitopenie și/sau leucopenie, inflamație la locul injectării, stomatite, alopecie, rash, necroză cutanată, eritem tardiv și/sau ulceratii la locul injectării, hipercreatininemie, dispnee, tuse neproductivă, infiltrate pulmonare, insuficiență respiratorie acută, sdr. hemolitic-uremic, edem pulmonar, tulburările neurologice, HTA, IC congestivă, febră, anorexie, greață și vărsături, cefalee, tulburări de vedere, confuzie, amețeală, astenie, edeme, tromboflebită, hematemeză, diaree, dispnee acută și bronhospasm sever.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

COD ATC: L01DB07

MANNITOLUM
MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM

GENEFADRONE GENEPHARM SA; Conc. pt. sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S)

NOVANTRONE WYETH LEDERLE; Sol. perf. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (S)

ONKOTRONE® BAXTER ONCOLOGY; Conc. pt. sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5, 10, 12,5 sau 15 ml (S)

Ind: Carcinom mamar, limfoame nehodgkiniene, leucemia acută mieloidă, carcinom hepatic primitiv.

Dz: i.v: inițial 14 mg/m², repetat după 21 zile. La pacienții cu depresie medulară sau stare generală alterată 12 mg/m².
Leucemia acută: inducție 10-12 mg/ m² și zi timp de 5 zile consecutiv. Doza cumulată maximă este de 200 mg/m².

Cind: Hipersensibilitate la mitoxantronă; sarcină și alăptare.

Al: Prudență în pancitopenie, infecții severe, IH sau IR gravă, antecedente de cardiopatie severă, trat. anterior cu antracicline și/sau iradiere mediastinală; monitorizare hematologică și hepatică; interacțiuni medicamentoase cu alte citostatice.

RA: Depresie medulară, leucopenie, trombocitopenie, anemie, grețuri și vărsături, alopecie, modificări tranzitorii ale ECG, scăderea fracției de ejeție a ventriculului stâng, IC, stomatită, mucozită, reacții de hipersensibilizare, inapetență, diaree, dureri abdominale, hemoragii gastrointestinale, astenie, amenoree, febră, dispnee, manifestări neurologice nespecifice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MAPROTILINUM
MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM

Cod ATC: M03AC10**MIVACRON®** GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 sau 10 ml (S)**Ind:** Adjuvant al anesteziei generale, pentru a facilita intubarea traheală și ventilația mecanică.**Dz:** *Adulți:* inj. iv: 0,07-0,15 mg/kg - efectiv clinic de aproximativ 15 min. *Perf. iv:* 8-10 mg/kg și min. *Copiii 2-12 ani:* 0,07-0,1 mg/kg. Pt. ajustarea dozelor în funcție de vârstă, greutate, afectarea renală sau hepatică.**Cind:** Hipersensibilitate la mivacurium, copii sub 2 ani, sarcină.**Al:** Prudență în deficit de colinesterază plasmatică, astm, hipovolemie, miastenia gravis, cașectici; interacțiuni medicamentoase cu anestezice inhalatorii, aminoglicozide, polimixine, spectinomicina, tetraciline, lincomicina, clindamicina, propranolol, blocați ai canalelor de calciu, lidocaină, procainamidă, chinidină, furosemid, manitol, acetazolamidă, săruri de magneziu, ketamină, săruri de litiu, trimetafan, hexametoniu, IMAO, ecotiophate iodide, pancuroniu, organofosforice, anticolinesterazice, anumiți hormoni, bambuterol, propranolol, oxprenolol, antiaritmice, clorochină, D-penicilinamină, trimetafan, clorpromazină, steroizi, fenitoină și litiu; alăptare.**RA:** Eritem, urticarie, hTA, tahicardie trecătoare sau bronhospasm, reacții anafilactice sau anafilactoide.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MEBENDAZOLUM
MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM

Cod ATC: L03AA03**LEUCOMAX®** SCHERING PLOUGH EUROPE; Liof. pt. sol. inj. 150 µg, 300 µg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 f. solv. × 1 ml (S/P-RF)

Ind: Reducerea severității neutropeniei după trat. cu efect mielosupresor, alte stări de insuficiență medulară, transplant autolog de măduvă osoasă (TMO), la pacienții considerat cu risc crescut pentru neutropenie severă prelungită și la cei la care transplantul s-a soldat cu eșec.

Dz: *Chimioterapie anticanceroasă:* 5-10 µg/kg și zi, inj. s.c. (tratamentul se instituie numai la 24 ore după ultima doză de citostatic și continuă 7-10 zile). *Sindroame mielodisplazice/anemie aplastică:* 3 µg/kg o dată/zi. *TMO:* 10 µg/kg și zi perf. i.v. timp de 4-6 ore, maxim 30 zile, începând din ziua care urmează TMO.

Cind: Hipersensibilitate la rHuGM-CSF, neoplazii ale seriei mieloide. Utilizare concomitentă cu radioterapie cu câmp larg, deoarece pacienții tratați cu factor de stimulare a coloniilor de granulocite macrofage (GM-CSF) au prezentat incidența crescută a reacțiilor adverse pulmonare, inclusiv decese. În scopul creșterii intensității dozei de chimioterapie citotoxic dincolo de schemele stabilite. Purpură trombocitopenică idiopatică. Hemopatii mieloide (pacienții cu peste 5% mieloblaști în măduva osoasă și/sau în sângele periferic după încheierea chimioterapiei).

Al: Dacă apar reacții de hipersensibilitate acută gravă, trat. va fi întrerupt imediat și nu se va relua niciodată. Prudență în boală respiratorie preexistentă, istoric de afecțiune autoimună, copii; monitorizarea numărului de trombocite și a hematocritului; interacțiuni medicamentoase cu medicamentele care se fixează de albuminele serice în proporție mare; sarcină și alăptare.

RA: Febră, greață, dispnee, diaree, erupții cutanate, reacție la locul injectării (în cazul adm. subcutanate), vărsături, fatigabilitate, anorexie, durere osteomusculară, astenie, durere toracică nespecifică, stomatită, cefalee, hipersudorație, durere abdominală, prurit, amețeli, edeme ale extremităților, parestezii, mialgii, anafilaxie, bronhospasm, IC, aritmii supraventriculare, tulburări cerebrovasculare, confuzie, convulsii, hTA, tulburări de ritm, hipertensiune intra-craniană, hidropericard, pericardită, hidrotorax, edem pulmonar și sincopă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

MEBEVERINUM
MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01DX12**MOL SI HEXAL® 4 mg** HEXAL AG; Cpr. 4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)**MOL SI HEXAL® RETARD** HEXAL AG; Cpr. elib. prel. 8 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Angină pectorală stabilă și instabilă însoțită de insuficiență ventriculară stângă; angină pectorală în stadiu acut de infarct miocardic (numai după stabilizarea circulației); angină pectorală atunci când alte medicamente nu sunt indicate, nu sunt tolerate sau nu au fost suficient de eficace, ca și la pacienții în vârstă.

Dz: Doza se stabilește în funcție de gravitatea afecțiunii și de răspunsul terapeutic al pacientului. Dacă nu este altfel prescris, la *adulți* 8 mg zilnic. În cazuri moderate ca gravitate este suficientă o doză de 4-6 mg molsidomin zilnic, în unele cazuri mai severe este indicată o doză de 16 mg/zi. O doză zilnică mai mare de 16 mg nu trebuie depășită. Comprimatele trebuie administrate nesfărâmate, cu cantități suficiente de lichid, independent de ora meselor.

Cind: Hipersensibilitate la molsidomin sau la celelalte componente inactive; insuficiență circulatorie sistemică acută (de ex. șoc, insuficiență ventriculară stângă cu presiune diastolică scăzută); infarct miocardic acut cu presiune diastolică scăzută; tensiune arterială patologic scăzută (hipotensiune severă, tensiune sistolică mai mică de 100 mmHg); afecțiuni pulmonare obstructive însoțite de hipoxie (bronșită cronică sau astm bronșic asociat cu tulburări respiratorii). În cazul unui infarct miocardic acut, medicamentul poate fi administrat numai sub monitorizare continuă a parametrilor cardiovasculari. Molsidomina comprimate nu este indicată în crizele acute de angină pectorală.

Al: Administrarea concomitentă de alcool, antihipertensive, antagoniști de calciu, medicamente antihipertensive sau alte vasodilatatoare poate crește efectul hipotensiv al molsidominei. Molsidomina poate fi administrată în timpul sarcinii numai la recomandarea expresă a medicului. Poate afecta capacitatea de reacție astfel încât abilitatea de a conduce vehicule, de a folosi utilaje sau de a lucra în condiții nesigure este redusă.

RA: Ocazional, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, tulburări ortostatice, tahicardie până la colaps circulator și șoc. La începutul tratamentului poate apărea ocazional cefaleea, dar care de obicei se atenuează pe parcursul tratamentului. În cazuri izolate pot apărea greața și vertijul. Reacții de hipersensibilitate: în cazuri izolate pot apărea reacții de hipersensibilitate (efecte adverse cutanate și astm). Potențial cancerigenic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MECLOZINUM
MEDAZEPAMUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM

Cod ATC: D07XC03, R01AD09, R03BA07

ASMANEX® TWISTHALER® 200 µg; ASMANEX® TWISTHALER® 400 µg SCHERING PLOUGH EUROPE; Pulb. inhal. 200 µg/doză, 400 µg/ doză; ct. × 1 dispozitiv de adm. × 30 sau 60 doze (200 µg); ct. × 1 dispozitiv de adm. × 14, 30 sau 60 doze (400 µg) **(P-6L)**

ELOCOM SCHERING PLOUGH EUROPE; Cremă 0,1%, Ung. 0,1%; ct. × 1 tub × 15 sau 20 g; Sol. cut. 0,1%; ct. × 1 fl. × 20 ml **(P-RF)**

NASONEX SCHERING PLOUGH EUROPE; Aerosol 50 µg/doză; ct. × 1 fl. × 60 sau 140 doze **(P-6L)**

Ind: *Cutanat:* psoriazis şi dermatite atopice. *Nazal:* rinita alergică sezonieră şi perenă, episoade acute de sinuzită. *Pulb. inhal.:* Trat. de lungă durată al astmului bronşic persistent.

Dz: *Cutanat:* se aplică pe zona afectată, o dată/zi. *Nazal:* Rinita alergică sezonieră şi perenă: *Adulţi şi adolescenţi:* 100 (50-400) µg în fiecare nară, o dată/zi. *Copii 3-11 ani:* 50 µg în fiecare nară, o dată/zi. *Sinuzită:* *Adulţi şi adolescenţi:* 100-200 mg de 2 ori/zi. *Pulb. inhal.:* Adm. exclusiv prin inhalare. *Adulţi şi copii > 12 ani.* Astm bronşic uşor-moderat persistent: 400 µg o dată pe zi, seara sau în 12 prize de câte 200 µg. Astm bronşic sever: iniţial

400 µg de 2 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la mometazonă furoat, la alţi corticosteroizi, intoleranţă la lactoză, intoleranţă ereditară la galactoză, deficit Lapp de lactoză sau malabsorbţie de glucoză-galactoză.

Al: *Cutanat:* pot apărea efectele secundare care au fost raportate la utilizarea sistemică a corticosteroizilor, prudenţă la copii. *Nazal:* prudenţă în intervenţie chirurgicală recentă în sfera nazală, trat. de lungă durată, tbc pulmonară activă sau latentă, infecţii fungice netratate, infecţii bacteriene, infecţii virale sistemice, infecţii oculare cu *Herpes simplex*. Sarcină şi alăptare. *Pulb. inhal.:* Atenţie în cazul pacienţilor care sunt transferaţi de la trat. cu glucocorticoizi adm. sistemic, la trat. cu furoat de mometazonă inhalator. Terapia nu se întrerupe brusc. Prudenţă în sarcină şi alăptare.

RA: *Cutanat:* paretezii, prurit, semne de atrofie a pielii, arsuri, foliculită, reacţie acneiformă, iritaţie, hipertricoză, hipopigmentare, dermatită periorală, dermatite alergice de contact, infecţii secundare. *Nazal:* epistaxis, secreţie mucoasă sanguinolentă sau striuri de sânge, faringite, senzaţie de arsură şi iritaţie nazală. *Pulb. inhal.:* Candidoză, disfonie, faringită, cefalee, reacţii de hipersensibilitate (rash, urticarie, prurit, eritem şi edem la nivelul ochilor, feţei, buzelor şi gâtului).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R03DC03

MEDAZEPAMUM
 MEDROXYPROGESTERONUM
 MEGESTROLUM
 MELOXICAMUM
 MELPHALANUM
 MEMANTINUM
 MENOTROPINUM
 MEPARTRICINUM
 MEPIVACAINUM
 MEPROBAMATUM
 MEQUITAZINUM
 MERCAPTOPURINUM
 MEROPENEMUM
 MESALAZINUM
 MESNUM
 METAMIZOLUM NATRICUM
 METANDIENONUM
 METFORMINUM
 METHADONUM
 METHOTREXATUM
 METHYLDOPUM
 METHYLII NICOTINAS
 METHYLPREDNISOLONUM
 METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
 METOCLOPRAMIDUM
 METOPROLOLUM
 METRONIDAZOLUM
 MEXILETINUM
 MIANSERINUM
 MICONAZOLUM
 MIDAZOLAMUM
 MIDODRINUM
 MILNACIPRANUM
 MILTEFOSINUM
 MINOXIDILUM
 MIRTAZAPINUM
 MITOMICINUM
 MITOXANTRONUM
 MIVACURIUM
 MOLGRAMOSTIMUM
 MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
MONTELUKASTUM

SINGULAIR® MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. **(P-RF)**

SINGULAIR® MERCK SHARP & DOHME; Cpr. mast. 4 mg, 5 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 7 cpr. (4 mg); ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (5 mg) **(P-RF)**

SINGULAIR® MERCK SHARP & DOHME; Granule 4 mg; ct. × 7 sau 28 plicuri **(P-RF)**

Ind: Profilaxia și tratamentul cronic al astmului bronșic la adult și copil. Profilaxia simptomelor diurne și nocturne ale astmului bronșic. Tratamentul pacienților cu astm bronșic indus de aspirină. Profilaxia bronhoconstricției indusă de efort. Ameliorarea simptomelor diurne și nocturne ale rinitei alergice sezoniere.

Dz: *Adulți □□15 ani cu astm bronșic și/sau rinită alergică sezonieră:* doza zilnică 10 mg, adm. oral seara, la culcare. *Copii între 6 și 14 ani cu astm bronșic și/sau rinită alergică sezonieră:* doza zilnică 5 mg, adm. oral seara, la culcare. La această grupă de vârstă nu este necesară ajustarea dozei. *Copii între 2 și 5 ani cu astm bronșic și/sau rinită alergică sezonieră:* doza zilnică 4 mg, adm. oral seara, la culcare. Montelukast poate fi asociat unui regim de tratament deja existent.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.

Al: Comprimatele nu trebuie folosite în tratamentul crizelor de astm. Pacienții trebuie sfătuiți să aibă la îndemână medicația de urgență corespunzătoare. Nu trebuie să înlocuiască brusc tratamentul cu glucocorticoizi administrați pe cale inhalatorie sau orală. La pacienții tratați cu antiastmatice, inclusiv antagoniști ai receptorilor pentru leucotriene, reducerea dozei de glucocorticoizi administrați sistemic (monitorizare clinică) a fost urmată, în cazuri rare, de eozinofilie, vasculită cu rash, agravare a simptomatologiei pulmonare, complicații cardiace și/sau neuropatie, uneori diagnosticată ca sindrom Churg-Strauss și vasculită sistemică eozinofilică. *Sarcină și alăptare:* nu se administrează în timpul sarcinii și alăptării, decât dacă este absolut necesar.

RA: Rar reacții de hipersensibilitate (inclusiv reacții anafilactice, angioedem, prurit, rash, urticarie și, foarte rar, infiltrat eozinofilic hepatic), tulburări ale viselor și halucinații, somnolență, iritabilitate, agitație, insomnie și foarte rar, convulsii; greață, vărsături, dispepsie, diaree; mialgii, inclusiv crampe musculare, tendință accentuată la sângerare, tendință la hematoame și edeme.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AX22

NIFLURIL BRISTOL-MYERS SQUIBB; Sup. 400 mg, 700 mg; ct. × 2 folii × 4 sup. (P-6L)

Ind: Tratamentul simptomatic de lungă durată al poliartritei reumatoide juvenile și la adulți, anumite artroze dureroase și invalidante, tratamentul simptomatic de scurtă durată a puseelor acute ale artrozelor, tratamentul durerii pe durata manifestărilor inflamatorii în sfera ORL și stomatologică.

Dz: Copii 6-30 luni: ½ sup. (200 mg) de doua ori pe zi; 30 luni-12 ani: 1 sup. 400 mg și zi fără a se depăși 3 sup. pe zi. În indicații ORL și stomatologice trat. nu trebuie să depășească 3-4 zile. Pentru adulți și copii după vârsta de 12 ani: 1 sup. de 700 mg de două ori pe zi.

Cind: Absolute: sensibilitate (alergie) la AINS, ulcer gastro-duodenal în evoluție, insuficiență hepatică severă și renală severă, copii mai mici de 6 luni (pentru sup. de 400 mg) și copii sub 12 ani (pentru sup. de 700 mg).

Al: Monitorizare atentă a pacienților aflați sub tratament cu anticoagulante. Utilizare cu precauție în afecțiuni de natură infecțioasă (poate masca simptomatologia).

RA: Tulb. gastro-intestinale (vărsături, diaree, dureri epigastrice, ulcere, perforații, colită hemoragică, hemoragii oculte); reacții de hipersensibilizare (tulb. dermatologice: rash, urticarie, prurit, purpura, cazuri rare de eritem polimorf și vezicule (sd. Stevens-Johnson, sd. Lyell), foarte rar fotosensibilizare). Tulb. respiratorii (crize de astm mai ales alergici la aspirină și alte AINS). Tulb. generale: hTA, șoc anafilactic. Efecte asupra SNC (vertij-rar). Efecte renale (insuficiență renală acută, nefrită interstițială, sd. nefrotic-rar). Efecte pe sist. osos (cazuri rare de fluoroză osoasă după trat. îndelungate cu doze crescute). Modif. ale constantelor biologice (în mod excepțional pot fi influențate testele hepatice și trombocitopenie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N02AA01

MEGESTROLUM
MELOXICAMUM
MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM

MORFINĂ 20 mg/ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml (**P-TS**)
MST CONTINUS® 10 mg; MST CONTINUS® 30 mg; MST CONTINUS® 60 mg; MST CONTINUS® 100 mg; MST CONTINUS® 200 mg MUNDIPHARMA; Cpr. film. elib. mod. 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 2 blist. × 30 cpr. (**P-TS**)
SEVREDOL LAB. NAPP; Cpr. film. 10 mg, 20 mg; ct. × 4 blist. × 14 cpr. (**P-TS**)
VENDAL® RETARD 10 mg; VENDAL® RETARD 30 mg; VENDAL® RETARD 60 mg; VENDAL® RETARD 100 mg LANNACHER; Cpr. film. ret. 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (**P-TS**)

Ind: *Int.* dureri acute și cronice intense și foarte intense, precum cele provocate de tumori, dureri miocardice și postoperatorii. *Inj.* dureri neoplazice și tabetice; intoxicație cu atropină; EPA, IMA.

Dz: *Int.:* inițial 30 mg de 2 ori/zi, crescut la nevoie la 200-300 mg/zi. *Inj.:* *Copii:* 3-6 ani: 1-2 mg de 1-2 ori/zi s.c.; 7-15 ani: 3-7 mg de 1-2 ori/zi s.c. *Adulți:* 0,01-0,02 g pentru o dată, s.c.

Cind: Hipersensibilitate la morfină, dependență în antecedente, astm bronșic, stază bronșică, situații în care trebuie evitată depresia centrului respirator, porfirie hepatică acută, pancreatită, abdomen acut, stenoze ale tractului gastrointestinal, după colecistectomie, hipertensiune intracraniană, traumatisme cerebrale, feocromocitom, ileus paralytic, hipertrofie de prostată, colită ulceroasă cronică, hipermotilitatea colonului, epilepsii, intoxicații, copii mici.

A!: Prudență la copii, vârstnici, IR, IH, mixedem, IC, travaliu; risc de dependență cu toleranță; interacțiuni medicamentoase cu deprimante centrale, alcool, fenotiazine, IMAO, cimetidină, pentazocină; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Greață și vărsături, sedare, constipație, apatie, inhibarea centrului tusei, bronhospasm, spasm al sfincterului Oddi, sughiț, bradicardie, spasm piloric, hTA predominant ortostatică, mioză, urticarie, exantem, transpirație, uscăciunea mucoasei bucale, modificări ale libidoului și potenței, dificultăți la micțiune, deprimare respiratorie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01MA14

MELOXICAMUM
 MELPHALANUM
 MEMANTINUM
 MENOTROPINUM
 MEPARTRICINUM
 MEPIVACAINUM
 MEPROBAMATUM
 MEQUITAZINUM
 MERCAPTOPURINUM
 MEROPENEMUM
 MESALAZINUM
 MESNUM
 METAMIZOLUM NATRICUM
 METANDIENONUM
 METFORMINUM
 METHADONUM
 METHOTREXATUM
 METHYLDOPUM
 METHYLII NICOTINAS
 METHYLPREDNISOLONUM
 METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
 METOCLOPRAMIDUM
 METOPROLOLUM
 METRONIDAZOLUM
 MEXILETINUM
 MIANSERINUM
 MICONAZOLUM
 MIDAZOLAMUM
 MIDODRINUM
 MILNACIPRANUM
 MILTEFOSINUM
 MINOXIDILUM
 MIRTAZAPINUM
 MITOMICINUM
 MITOXANTRONUM
 MIVACURIUM
 MOLGRAMOSTIMUM
 MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
 MONTELUKASTUM
 MORNIFLUMATUM
 MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM

AVELOX® BAYER AG; Cpr. film. 400 mg; ct. × 5, 7, 10, 25, 50, 70, 80 sau 100 cpr. (S/P-RF)

AVELOX® BAYER AG; Sol. perf. 400 mg/250 ml; ct. × 1 sau 5 fl. (S)

Ind: Tratamentul infecțiilor determinate de germeni sensibili: infecții ale tractului respirator: acutizarea bronșitelor cronice, pneumonia nozocomială, sinuzitele acute; infecții necomplicate ale tegumentelor și anexelor.

Dz: Durata tratamentului depinde de severitatea bolii și de rezultatul testelor clinice și bacteriologice; se recomandă administrarea timp de 5 zile în acutizarea bronșitelor cronice, 10 zile în pneumonia nozocomială, 7 zile în sinuzitele acute și 7 zile în infecțiile necomplicate ale tegumentelor și anexelor. Doza recomandată pentru toate indicațiile este de 400 mg moxifloxacină o dată pe zi; această doză nu trebuie depășită. Comprimatele trebuie înghițite întregi cu o cantitate suficientă de lichid, independent de orarul meselor. Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici, la cei cu insuficiență hepatică ușoară sau moderată, la cei cu insuficiență renală (inclusiv pentru clearance al creatininei 30 ml/min și 1,73 m²). *Copii:* Administrarea moxifloxacinei la copii și adolescenți în perioada de creștere este contraindicată.

Cind: Hipersensibilitate la moxifloxacină, la alte chinolone sau la oricare dintre excipienți; sarcină și alăptare; copii și adolescenți. Moxifloxacina nu este recomandată la pacienții cu insuficiență hepatică severă.

Al: S-a demonstrat că moxifloxacina poate prelungi, la unii pacienți, intervalul QT. De aceea, acest medicament trebuie evitat la pacienții cu intervalul QT prelungit, cu hipokaliemie necorectată și la pacienții tratați cu antiaritmice din clasa IA (de ex. chinidină, procainamidă) sau clasa III (de ex. amiodaronă, sotalol), datorită lipsei de experiență. Nu trebuie exclus însă un efect aditiv al moxifloxacinei cu medicamentele ce prelungesc intervalul QT cum ar fi: cisapridă, eritromicină, antipsihotice și antidepresivele triciclice. În timpul terapiei cu chinolone pot să apară convulsii, inflamații și rupturi ale tendoanelor, în special la vârstnici și la pacienții tratați cu glucocorticoizi. Pacienții trebuie sfătuiți să evite expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete și la soare. Administrarea moxifloxacinei la gravide și femei care alăptează este contraindicată. Pacienții trebuie avertizați că, înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, trebuie să-și testeze reactivitatea.

RA: Dureri abdominale, cefalee, greață, diaree, vărsături, dispepsie, tulburări ale gustului, amețeală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C02AC05

MELPHALANUM
MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM

MOXOGAMMA WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. 0,2 mg, 0,3 mg, 0,4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr.; ct. × 2 sau 4 blist. × 25 cpr. **(P-6L)**

MOXONIDIN AL 0,2; MOXONIDIN AL 0,3; MOXONIDIN AL 0,4 ALIUD PHARMA; Cpr. film. 0,2 mg, 0,3 mg sau 0,4 mg; ct. × 3 sau 5 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

PHYSIOTENS 0,2; PHYSIOTENS 0,3; PHYSIOTENS 0,4 SOLVAY PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 0,2 mg, 0,3 mg, 0,4 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. **(P-6L)**

Ind: HTA esențială sau primară.

Dz: Inițial 0,2 mg/zi, dimineța, apoi doza poate fi mărită la 0,4-0,6 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la moxonidină, sindromul de sinus bolnav, bloc sino-atrial, BAV de grad II sau III, bradicardie severă, IC gravă, afectare coronariană severă, IR severă.

Al: Prudență în IR moderată; trat. nu trebuie întrerupt brusc; interacțiuni medicamentoase cu betablocante și alte hipotensive, alcool, sedativelor, hipnotice, antidepresive triciclice, IMAO; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee și senzație de uscăciune a gurii, oboseală, astenie, amețală, greață și tulburări ale somnului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MEMANTINUM
MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM

Cod ATC: D06AX09, R01AX06**BACTROBAN** GLAXO SMITHKLINE; Ung. 2%; ct. × 1 tub × 15 g; Ung. nazal 2%; ct. × 1 tub × 3 g (*P-RF*)**Ind:** Ung.: Infecții bacteriene cutanate, de ex. impetigo, foliculite și furunculoze. Ung. nazal: Eliminarea stării de purtător nazal de stafilococi, inclusiv *Staphylococcus aureus* metilino-rezistent (MRSA).**Dz:** Ung.: se aplică pe zona afectată de 3 ori/zi, timp de 10 zile. Ung. nazal: se aplică în porțiunea anterioară a narinelor, de 2-3 ori/zi, timp de 5-7 zile.**Cind:** Hipersensibilitate la mupirocină.**Al:** Ung.: se evită contactul cu ochii; prudență în afecțiuni renale moderate sau severe. Ung. nazal: se evită contactul cu ochii. Sarcină și alăptare.**RA:** Senzație de arsură, usturime și prurit la locul aplicării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AA06

MENOTROPINUM
MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM

CELLCEPT 1 g/5 ml HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. pt. susp. orală

1 g/5 ml; ct. × 1 fl. × 110 g (S/P-RF)

CELLCEPT 250 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cps. 250 mg; ct. × 10 sau 30 blist. × 10 cps. (S/P-RF)

CELLCEPT 500 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 500 mg; ct. × 5 sau 15 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

CELLCEPT 500 mg HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. conc. sol. perf. 500 mg/fl.; ct. × 4 fl. (S/P-RF)

MYFORTIC 180 mg; MYFORTIC 360 mg NOVARTIS PHARMA; Cpr. film. gastroz. 180 mg, 360 mg; ct. × 5, 10, 12 sau 25 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Profilaxia rejecției de organ și trat. recidivei rejecției, la pacienții cu transplante renale alogene.

Dz: Profilaxia rejecției: 2 g/zi (1 g × 2 ori/zi). *Trat. recidivei rejecției:* 1,5 g de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la mycofenolat mofetil sau la acid mycofenolic.

Al: Risc de dezvoltare a limfoamelor sau a altor neoplazii; susceptibilitate crescută la infecții; monitorizare hematologică; prudență la copii; interacțiuni medicamentoase cu aciclovir, antiacide, colestiramină, probenecid, sarcină și alăptare.

RA: Diareea, leucopenia, starea septică și voma, infecții, durere abdominală, febră, toracalgii, cefalee, lombalgie, astenie, anemie, leucopenie, trombocitopenie, anemie hipocromă, leucocitoză, infecții ale tractului urinar, necroză tubulară renală, hematurie, HTA, hiperpotasemie, hiperglicemie, hipofosfatemie, hipercolesterolemie, edeme periferice, constipație, greață, dispepsie, moniliază orală, dispnee, faringită, tuse frecventă, *Herpes simplex*, acnee, amețeli, insomnie, tremor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MEPARTRICINUM
MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM

Cod ATC: B01AB06

FRAXIPARINE® 0,3 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 2850 UI anti-factor Xa/0,3 ml; 3800 UI anti-factor Xa/0,4 ml; 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml; 7600 UI anti-factor Xa/0,8 ml; ct. × 10 seringi preumplute × 0,3 ml, 0,4 ml, 0,6 ml sau 0,8 ml **(S/P-RF)**

Ind: Profilaxia tulburării tromboembolice în chirurgia generală sau ortopedică; la pacienții cu risc crescut (insuficiență respiratorie și/sau IC), spitalizați în serviciul de terapie intensivă. Trat. tulburărilor tromboembolice. Prevenția coagulării în timpul hemodializei. Trat. anginei instabile și al infarctului de miocard fără undă Q.

Dz: Inj. sc. în peretele abdominal antero-lateral, alternativ în partea dreaptă și stângă o dată pe zi. *Profilaxia tulburărilor tromboembolice: Chirurgie generală:* inițial 0,3 ml cu 12 ore înainte de intervenție, apoi 1 doză unică zilnică de 0,3 ml minimum 7 zile; profilaxia se continuă de-a lungul perioadei de risc și cel puțin până la externarea pacientului. *Chirurgie ortopedică:* inițial cu 12 ore înainte de intervenție și la 12 ore după terminarea ei, adaptate la greutatea corporală (sub 50 kg, 0,2 ml/zi preoperator și până în ziua a 3-a și 0,3 ml/zi din ziua a 4-a; între 50-69 kg, 0,3 ml/zi preoperator și până în ziua a 3-a și 0,4 ml/zi din ziua a 3-a; peste 70 kg, 0,4 ml/zi preoperator și 0,4 ml/zi din ziua a 4-a). Trat. trebuie continuat minim 10 zile sau de-a lungul perioadei de risc. *Pacienți internați în secții de terapie intensivă:* sub 70 kg - 0,4 ml/zi, peste 70 kg - 0,6 ml/zi. *Trat. tulburărilor tromboembolice:* inj. sc. de 2 ori pe zi (la 12 ore), de obicei timp de 10 zile, în doză ajustată la greutatea corporală (sub 50 kg - 0,4 ml/zi; 50-59 kg - 0,5 ml/zi; 60-69 kg - 0,6 ml/zi; 70-79 kg - 0,7 ml/zi; 80-89 kg - 0,8 ml/zi; peste 90 kg - 0,9 ml/zi). Trat. anticoagulant oral este inițiat cât mai curând posibil, dacă nu există nici o contraindicație și nu trebuie întrerupt înainte de a se atinge INR urmărit. *Prevenția coagulării în timpul hemodializei:* doză unică, în linia arterială, la începutul fiecărei ședințe. La pacienții fără risc hemoragic crescut, se dau ca doze inițiale: sub 50 kg - 0,3 ml; 50-69 kg - 0,4 ml; peste 70 kg - 0,6 ml. La pacienții cu risc hemoragic, ședințele de dializă pot fi efectuate cu dozele reduse la jumătate. În cazul ședințelor care durează mai mult de 4 ore, poate fi adm. în timpul dializei o doză suplimentară mai mică. *Trat. anginei instabile și al infarctului de miocard fără undă Q:* inj. sc. de 2 ori/zi (la 12 ore), în asociere cu aspirină în doză de până la 325 mg/zi. Doza inițială se dă în bolus i.v. de 86 UI anti-Xa/kg și este urmată de doze inj. s.c. de 86 UI anti-Xa/kg. Durata uzuală a trat. este 6 zile, iar doza ajustată în funcție de greutatea corporală (sub 50 kg - 0,4 ml; 50-59 kg - 0,5 ml; 60-69 kg - 0,6 ml; 70-79 kg - 0,7 ml; 80-89 kg - 0,8 ml; 90-99 kg - 0,9 ml; peste 100 kg - 1 ml).

Cind: Hipersensibilitate la nadroparină; antecedente de trombocitopenie datorată nadroparinei; sângerare în curs sau risc hemoragic crescut, corelate cu tulburări de hemostază, cu excepția coagulării intravasculare diseminate neindusă de heparină; leziuni organice susceptibile de sângerare (ulcerul peptic activ); AVC hemoragic; endocardită infecțioasă acută. Sarcină. Alăptare.

Al: Monitorizarea numărului de trombocite. Testele de agregare plachetară in vitro au doar o valoare limitată. IH ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MEPIVACAINUM
MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPYRINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYL NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM

Cod ATC: C04AX21

DUSODRIL 100 mg; DUSODRIL 200 mg MERCK LIPHA SANTE; Cps. 100 mg, cpr. film. cu elib. prel. 200 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cps. sau cpr. (P-6L)

Ind: Tulburări circulatorii periferice arteriale și venoase. Trat. trebuie să se efectueze numai în cazul în care nu sunt necesare alte măsuri terapeutice (un antrenament de mers și/sau măsuri de lărgirea lumenului vaselor).

Dz: 200 mg de 3 ori/zi, cu mult lichid.

Cind: IC decompensată (afectarea mușchiului cardiac); IMA; tulburări grave legate de efort la nivelul inimii; angina pectorală avansată (cu dureri toracice); hemoragii arteriale; hTA (TA sistolică sub 90 mmHg); tulburări în ortostatism (senzație de amețală respectiv afazie la trecerea din clinostatism în ortostatism); AVC hemoragic recent; ischemie cerebrală tranzitorie (aparitii temporare de insuficiență circulatorie cerebrală). Sarcină. Alăptare.

Al: Pacienți cu tendință spre spasme cerebrale, crize spastice și diabet zaharat.

RA: Insomnii, neliniște, amețeli, tulburări gastrointestinale (greață și diaree), esofagită, hTA, tulburări în ortostatism (amețeli, respectiv pierderea cunoștinței prin schimbarea din poziția culcat în poziția în picioare), și/sau o creștere a glicemiei. Rareori: oboseală, amețeli, reacții alergice, parestezii și cefalee. În cazuri izolate au fost semnalate crize de angină pectorală, edeme, tulburări de micțiune, dereglări ale ritmului cardiac și necroza acută a celulelor hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D01AE22

MEPROBAMATUM
MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLYUM
NAFTIFINUM

EXODERIL® SANDOZ GmbH; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15 g (*P-RF*)

EXODERIL® SANDOZ GmbH; Sol. ext. 1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (*P-RF*)

Ind: Micoze cutanate (*Tinea corporis, Tinea inguinalis*); micoze interdigitale (*Tinea manum, Tinea pedum*), onicomicoze; candidoze cutanate; pityriasis versicolor; dermatomicoze inflamatorii.

Dz: Aplicații locale la nivelul tegumentelor sau unghiilor o dată/zi la nivelul zonei afectate, precum și a zonelor învecinate după ce în prealabil acestea au fost curățate și uscate. Pentru prevenirea recurențelor se adm. încă cel puțin 2 săpt. de la vindecarea clinică.

Cind: Hipersensibilitate la naftifină sau la alcool benzilic (conservant).

Al: A se evita contactul cu ochii a produsului Exoderil cremă.

RA: Sporadic, semne de iritație locală (senzație de uscăciune, căldură și apariția eritemului). Reacțiile secundare sunt întotdeauna reversibile și nu necesită întreruperea trat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MEQUITAZINUM
MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM

Cod ATC: V03AB02**NALORPHINE** S.E.R.B.; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml (S)**Ind:** Antidot în intoxicația acută cu morfină, hidromorfonă, metadonă, petidină și alte opioide.**Dz:** i.v. adulți 1-2 f., repetat la nevoie la fiecare 10-15 min, până la maxim 8 f. (în intoxicațiile grave); *copii nou-născuți:* 0,25-1 mg în vena ombilicală; *1-12 ani:* 0,2 mg/kg corp, maxim 10 mg i.v.; se poate inj. și s.c. sau i.m.**Cind:** Alergie la nalorfină, morfinomanie și alte stări de dependență la opioizi (cu excepția dozelor mici, care pot fi adm. în scop diagnostic).**RA:** Injectată fără legătură cu opioidele provoacă sedare, somnolență, ușoară deprimare respiratorie, uneori anxietate, chiar tulburări psihotice; adm. la morfinomani declanșează un sindrom de abstință grav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01XA11

MERCAPTOPURINUM
MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM

KERATYL® 1% LAB. CHAUVIN; Sol. oft. 1%; ct. × 1 fl. × 5 ml (*P-6L*)**Ind:** Cicatrizant în leziuni corneene.**Dz:** Instilații 2 picături × 4-5 ori/zi.**Cind:** Hipersensibilitate. Sarcină.**Al:** Substanță dopantă.**RA:** Irritații locale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MEROPENEMUM
MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM

Cod ATC: S01GA01, R01AA08**NAFA-GAL®** TERAPIA SA; Sol. oft. 0,03%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)**PROCLIN** ANKERPHARM GROUP CHAUVIN; Sol. oft. 0,03%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)**RINOFUG** MEDUMAN SA; Sol. nazală 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)**RINOGUT®** TERAPIA SA; Sol. nazală 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)

Ind: Conjunctivitele acute și cronice nebacteriene, în special alergice, conjunctivite vechi, inflamații ale marginilor pleoapelor și în rinite.

Dz: De 2-3 ori/zi o pic. în sacul conjunctival, respectiv la nivelul mucoasei nazale. Utilizarea se încheie după 10 zile, sau se întrerupe pentru 5 zile.

Cind: Hipersensibilitate la substanțele din compoziția produsului.

Al: În timpul trat. cu aceste picături de ochi nu se poartă lentile de contact moi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MESALAZINUM
MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLYUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM

Cod ATC: M01AE02**MOMENDOL AZIENDE CHIMICHE**; Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 blist. × 12 cpr. (OTC)**REUXEN 250 mg; REUXEN 500 mg AC HELCOR SRL**; Cpr. 250 mg și 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Afecțiuni reumatice inflamatorii: artrite reumatoide, osteoartrite, spondilartrite anchilozante, sd. Fiessinger-Leroy-Reiter, reumatismul psoriazic, poliartrite reumatoide juvenile; afecțiuni reumatice degenerative: artroze dureroase și invalidante; afecțiuni reumatice extraarticulare: bursite, periartrite, tendinite, fibrozite, spondilite cervicale, sinovite; guta acută, pseudoguta, alte osteo-artropatii metabolice (boala Paget, sindrom Bartter etc.); dismenoree primară, durere post-partum; leziuni traumatice ale țesuturilor moi, luxații, întinderea/ruperea tendoanelor; diferite stări dureroase incluzând traume, intervenții chirurgicale; trat. adjuvant al manifestărilor inflamatorii ORL, ortodontostomatologice, pneumologice; febra (neinfecțioasă) în special la copii peste 2 ani.

Dz: *Adulți* - artrite reumatoide, osteoartrite, spondilartrite anchilozante: 250-500 mg × 2/zi, dimineța și seara; temporar 1500 mg/zi, pe durata puseelor acute. Guta acută: inițial 750 mg apoi 250 mg la 8 h până ce criza trece (24-48 h); dureri slabe - moderate, dismenoree primară, tendinite, bursite acute, alte indicații: inițial 500 mg apoi 250 mg, la 6-8 h, maxim 1250 mg/zi; criza de migrenă: inițial 750 mg; la nevoie 250-500 mg, la minim 30 min; profilaxia migrenei: 500 mg de 2 ori/zi; dacă nu apare nici un efect terapeutic după 4-6 săpt., trat. se întrerupe; *Copii* (peste 25 kg): artrite juvenile: 10 mg/ kg/zi, dimineța și seara; ca analgezic și antipiretic: inițial 10 mg/kg urmată de 2,5-5,0 mg/kg, la 8 h. După prima zi, doza zilnică nu va fi mai mare de 15 mg/kg. Adm. se face în timpul sau după mese, preferabil cu lapte sau pansamente gastrice.

Cind: Hipersensibilitate la naproxen; reacții alergice demonstrate ca astm bronșic, rinite, la alte AINS în special aspirina; ulcer peptic activ, sângerări gastrointestinale; IH severă, IR sau IC. Copii sub 2 ani. Sarcină și lactație.

Al: Antecedente de ulcer peptic și/sau hemoragii digestive sau alți factori de risc cunoscuți a fi asociați ulcerului peptic (fumatul, alcoolismul etc.), mai ales la vârstnici și în cazul dozelor ridicate; IR: monitorizare creatinină serică și/sau Cl creatinină; când Cl creatinină < 20 ml/min nu se adm; IH (alcoolism cronic, ciroze): controlul periodic al testelor hepatice; HTA și/sau IC (atenție la edeme periferice); vârstnici (dozele minime eficiente); afecțiuni de natură infecțioasă sau care comportă un risc infecțios. Supraveghere timp de sângerare. Risc de sângerare gastrointestinală ce poate debuta brusc, fără semne prealabile, cu posibilă perforare intestinală. Nu se adm. concomitent acid acetilsalicilic sau alte AINS datorită riscului crescut de RA. șoferi și activități de precizie.

RA: Mai grave la pacienții cu antecedente de ulcer peptic și/sau hemoragii gastrice. Frecvent reacții gastrointestinale: constipație, dureri abdominale, arsuri, greață; mai rar: anorexie, diaree, flatulență, stomatite; vomă, sângerări gastrointestinale și/sau perforații sau ulceratii peptice cu hemoragie sau perforări. Rareori reacții SNC: oboseală, cefalee, vertij, somnolență; reacții hepatice: alterarea testelor funcției hepatice; foarte rar: hepatita colestatică, citolitică sau mixtă, reversibile la întreruperea trat.; reacții renale: glomerulonefrite, nefrite interstițiale,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MESNUM
METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM

Cod ATC: N02CC02**NARAMIG®** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 2,5 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr. (P-6L)**Ind:** Trat. migrenelor.**Dz:** Un cpr. la primul semn al crizei migrenoase. Dacă după această primă doză simptomatologia persistă, se renunță la adm. compusului. Dacă migrena dispare dar simptomele reapar ulterior, se poate adm. încă un cpr. după minim 4 ore de la prima adm. Doza maximă permisă este de 5 mg în 24 ore.**Cind:** Alergie la naratriptan sau la excipienți; la antibioticele sulfonamidice. Copii, adolescenți sau persoane peste 65 ani. Sarcină. Alăptare. *oferi și activități de precizie.**Al:** Se întrerupe adm. altor antimigrenoase (sumatriptan, zolmitriptan, ergotamină) cu minim 24 ore înaintea adm. naratriptanului. Precauție în HTA, afecțiuni hepatice sau renale. Risc crescut de afecțiuni cardio-vasculare la persoane cu: diabet, hipercolesterolemie, obezitate, angină, ATS coronariană, sau la fumători. Prudență în antecedente de AVC.**RA:** Senzație de furnicătură, căldură, opresiune, constricție, durere la nivelul diferitelor regiuni ale corpului, inclusiv torace și gât. Tulburări de vedere. Tulburări de ritm cardiac, palpitații, oboseală. Amețeală, somnolență, greață, vărsături. Foarte rar - reacții alergice: erupții cutanate, edem la nivelul feței, limbii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METAMIZOLUM NATRICUM
METANDIENONUM
METFORMINUM
METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM

Cod ATC: A01AB10, G01AA02, D01AA02

PIMAFUCIN® ASTELLAS PHARMA; Ovule 100 mg; ct. × 1 folie × 3 ovule (P-RF)

PIMAFUCIN® ASTELLAS PHARMA; Cremă 2%; ct. × 1 tub × 30 g (P-RF)

Ind: Cremă: infecții ale pielii, unghiilor și ale patului unghial, intertrigo, infecție interdigitală cu *Candida albicans* și alte microorganisme sensibile la natamicină; în extinderea vaginitei candidozice la regiunea inghinală; rash-ul scutecelor. Sol.: candidozele dezvoltate în urma unui trat. prelungit cu antibiotice; otomicoze sau otite externe; candidoza unghiilor și a pielii. Ovule: vaginita produsă de *Candida albicans*.

Dz: Cremă: 1-4 aplicări/zi în regiunea afectată timp de 2-3 săptăm. Sol. în otomicoze: 2-3 picături în ureche după o prealabilă curățire a acesteia; în dermatomicoze: 1-2 picături de 3-4 ori/zi. Ovule: seara înainte de culcare se introduce adânc în vagin un ovul, timp de 3-6 zile. Trat. se întrerupe în timpul ciclului menstrual și se reia după oprirea sângerării.

Cind: Natamicină cremă și picături nu au contraindicații. Natamicină ovule vaginale: Preparatul conține și alcool etilic. În caz de hipersensibilitate la acest compus, trat. trebuie întrerupt.

RA: Crema nu are efecte adverse. Picături: Rareori ușoară iritație sau o senzație de arsură la nivelul mucoasei, pe locul aplicării. Ovule: Rareori hipersensibilizare la alcool etilic. O senzație ușoară de arsură locală după introducerea ovulului poate fi percepută, dar acest lucru nu împiedică continuarea terapiei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V08AA01

METANDIENONUM
 METFORMINUM
 METHADONUM
 METHOTREXATUM
 METHYLDOPUM
 METHYLII NICOTINAS
 METHYLPREDNISOLONUM
 METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
 METOCLOPRAMIDUM
 METOPROLOLUM
 METRONIDAZOLUM
 MEXILETINUM
 MIANSERINUM
 MICONAZOLUM
 MIDAZOLAMUM
 MIDODRINUM
 MILNACIPRANUM
 MILTEFOSINUM
 MINOXIDILUM
 MIRTAZAPINUM
 MITOMICINUM
 MITOXANTRONUM
 MIVACURIUM
 MOLGRAMOSTIMUM
 MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
 MONTELUKASTUM
 MORNIFLUMATUM
 MORPHYNUM
 MOXIFLOXACINUM
 MOXONIDINUM
 MUPIROCINUM
 MYCOPHENOLATUM
 NADROPARINUM
 NAFTIDROFURYLUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS

GASTROGRAFIN® SCHERING AG; Sol. gastroenter. 37%; ct. × 1 fl. × 100 ml (S/P-RF)

ODISTON 75% ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. amidotrizoat de metilglucamină 6,804 g/10 ml și amidotrizoat de sodiu 0,825 g/10 ml; ct. × 10 f. × 10 ml (S/P-RF)

UROGRAFIN® 76% SCHERING AG; Sol. inj. 76%; ct. × 10 f. × 20 ml (S/P-RF)

Ind: Sol. int.: Evidențierea tractului gastro-intestinal. Diagnosticul precoce al unei perforații nevizibile radiologic sau al unei insuficiențe anastomotice la nivelul esofagului, al tractului gastro-intestinal, ca și pentru trat. unui ileus meconial. Tomografia computerizată a abdomenului. Sol. inj.: În urografia i.v. și retrogradă. În angiografie utilizând angiografia de substrație digitală (pentru coronarografie numai soluția 76%) și reprezentarea cavităților corporale.

Dz: Oral la adulți și copii peste 10 ani: 60-100 ml. Urografia i.v. la adulți și la tineri pentru fiecare kg de greutate corporală până la 1 ml sol. 76% (max. 100 ml). Viteza de inj. diferă după scopul urmărit: 1-2 min. în urografiile obișnuite, 15 secunde pentru urografia minutată, 10-15 min. în adm. în perf.

Cind: Hipertiroidie manifestă sau latentă, gușă nodulară. Hipersensibilitate față de substanțele de contrast ce conțin iod; tulburare funcțională gravă hepatică sau renală, IC, emfizem pulmonar, ATS cerebrală, diabet zaharat care necesită trat., o suferință cerebrală însoțită de convulsii, plasmocitom, pacienții deshidratați. Sarcină.

Al: Testarea sensibilității la iod (obligatorie). Echilibrarea prealabilă a unei tulburări hidroelectrolitice. medicație cu alfa-blocanți datorită pericolului unor crize de HTA în feocromocitom. Sugari și copii mici.

RA: Sol. orală: Uneori diaree. Agravarea enterită sau colită preexistentă. În caz de aspirare, posibilitatea unui edem pulmonar. Sol. inj.: Rare reacții de intoleranță: bronhospasm, reacții anafilactoide, tulburări circulatorii acute; sunt necesare: hidrocortizon hemisuccinat, oxigen, acid epsilon-aminocaproic, antihistaminice, parasimpatolitice și stimulante cardiocirculatorii. Mai pot apărea: greață, vărsături, hipersalivație, sughiț, hiperemia feței, parestezii, dureri pe traiectul venei și erupții urticariene. Întrucât reacțiile adverse par a fi mai frecvente la bolnavii anxioși, agitați, se recomandă liniștirea psihicului bolnavului prin convingere sau premedicarea lui cu sedative sau tranchilizante.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METFORMINUM
 METHADONUM
 METHOTREXATUM
 METHYLDOPUM
 METHYLII NICOTINAS
 METHYLPREDNISOLONUM
 METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
 METOCLOPRAMIDUM
 METOPROLOLUM
 METRONIDAZOLUM
 MEXILETINUM
 MIANSERINUM
 MICONAZOLUM
 MIDAZOLAMUM
 MIDODRINUM
 MILNACIPRANUM
 MILTEFOSINUM
 MINOXIDILUM
 MIRTAZAPINUM
 MITOMICINUM
 MITOXANTRONUM
 MIVACURIUM
 MOLGRAMOSTIMUM
 MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
 MONTELUKASTUM
 MORNIFLUMATUM
 MORPHYNUM
 MOXIFLOXACINUM
 MOXONIDINUM
 MUPIROCINUM
 MYCOPHENOLATUM
 NADROPARINUM
 NAFTIDROFURYLUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS

Cod ATC: M01CB01

TAUREDON® 10; TAUREDON® 20; TAUREDON® 50 ALTANA PHARMA AG; Sol. inj. 4,53 mg aur, 9,06 mg aur, 22,65 mg aur; ct. × 5 f. × 0,5 ml (*P-RF*)

Ind: Poliartrite cronice, artrită reumatoidă juvenilă, artrită psoriazică.

Dz: Inj. i.m. profund (intragluteal) în 3 faze: de testare, de saturare și de menținere. *Adulți:* Inițial 3 f. a 10 mg, apoi 3 f. a 20 mg. Începând cu a 7-a f. se vor folosi 50 mg de 2 ori/săpt. Doza totală, cumulată de la începutul terapiei, va fi de 1600 mg (maxim 2000 mg) aurotiomalat de sodiu. După obținerea efectului terapiei doza de întreținere va fi 100 mg/lună (2 f. a 50 mg adm. odată, sau câte o f. a 50 mg la 2 săpt.). Terapia este de lungă durată (luni sau ani). *Copii:* Prima fază: 0,7-1 mg/kg/săpt.; faza de întreținere: 1 mg/kg de 1 sau 2 ori/lună. Doza de întreținere va fi de 1 mg/kg din 2 în 2 săpt., la 3-4 săpt., odată cu scăderea activității bolii. Terapia se întrerupe dacă după 6 (max. 9) luni nu se observă nici o ameliorare a bolii.

Cind: Discrazii sanguine, hipersensibilitate la sărurile de aur, tulburări ale funcției renale, afectare gravă a funcției hepatice, alergii la metale grele, tbc pulmonară activă, colagenoze (LED, panarterită nodoasă, sclerodermie, dermatomiozită), colită ulceroasă, diabet zaharat. Sarcină și alăptare. Menopauză.

Al: Se examinează periodic pielea și mucoasele. Înaintea începerii trat.: HLG și proteinuria. În primele 3 luni: examen de urină și număr de leucocite, iar din 2 în 2 săpt.: HLG, gamma-GT, fosfatază alcalină și creatinină. Imunogramă înainte de începerea terapiei și din 3 în 3 luni. La pacienții cu factor antinuclear pozitiv acesta se va controla la interval de 6 luni. Examenul radiologic pulmonar o dată pe an. Atenție la: prurit, erupții tegumentare, modificări ale mucoaselor, sângerări, metroragii, diaree, scăderea acuității vizuale, dispnee acută, tuse seacă însoțită sau nu de febră. Evitarea expunerii prelungite la radiații solare.

RA: Apar în principal pe tegumente și mucoase, în sistemul hematopoietic, rinichi, plămâni, tractul gastrointestinal și ochi. Frecvente: dermatite, stomatite, prurit, proteinurie, trombocitopenie, leucopenie, anemie. Ocazionale: probe biologice hepatice alterate, colestază, fotosensibilizare, căderea părului, simptome de pancreatită. Rare: forme severe evolutive de dermatită (ex. dermatită exfoliativă) și stomatită, nefropatie la sărurile de aur, afectarea hematopoiezei (anemie aplastică, pancitopenie). Extrem de rar (ocazional): enterocolite cu diaree apoasă, chiar sanguinolentă cu dureri abdominale colicative, bronșiolite, alveolite (cu dispnee acută), fibroză pulmonară, necroză hepatocitară, lichen rubra planus, conjunctivite, depozite de aur în corneea, ulceratii corneene, semne de imunosupresie cu scăderea imunoglobulinelor, anemie hemolitică cu sau fără icter, neuropatii periferice care se manifestă ca tulburări de sensibilitate, de coordonare (ataxie) sau cu mioclonii; afectarea nervilor cranieni (facial, abducens, trigemen) cu manifestări ca diplopia, hipotonia mușchilor feței și în special a pleoapei superioare și tulburări de sensibilitate la acest nivel, "encefalopatia la sărurile de aur" (depresie, anxietate, dezorientare, insomnie, tulburări de vorbire, halucinații), reacții neurotoxice la nivelul ochiului (afectarea nervului optic sau a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METHADONUM
METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS

Cod ATC: V03AB03

EDETAMIN® 1000 mg TERAPIA SA; Sol. inj. 10%; ct. × 3 sau 5 f. × 10 ml (S)

Ind: Intoxicație acută și cronică cu plumb; intoxicații cu crom, cobalt, cupru, fier, mangan, mercur, nichel, plutoniu, toriu, zinc.

Dz: Perf. i.v. lente cu sol. diluată izotonică de clorură de sodiu sau glucoză 0,3-0,5%, 30-50 mg/kg/zi, în cure de 2-3 zile, cu pauze de 2-3 zile; în encefalopatia din intoxicația cu plumb se inj. i.m. câte 25 mg, maxim 35 mg de 2 ori/zi, cu adaos de procaină.

Cind: Insuficiență renală.

Al: Datorită acțiunii sale iritante și riscului de tromboflebită, se inj. i.v. lent sau în perf. prelungită. Nu se adm. oral. Se adm. cu prudență în tbc și la cei cu bilanț deficitar în potasiu. Sarcină.

RA: Greață, diaree, colici abdominale, hTA, congestie nazală, mialgii; inj. i.v. rapidă provoacă uneori somnolență, cefalee, vertij, vomă, febră, iar în caz de edem cerebral poate fi cauză de accidente letale prin creșterea bruscă a presiunii intracraniene; trat. repetat poate provoca nefroză toxică sau dermatită; adm. i.v. de sol. concentrate poate determina tromboflebită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METHOTREXATUM
METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM

Cod ATC: B05BB01

CLORURĂ DE SODIU 0,9% FRESENIUS KABI GmbH; Sol. perf. 0,9%; fl. × 250 sau 500 ml (S)
CLORURĂ DE SODIU 0,9% m/v HELVETICA PROFARM SA; Sol. perf. 0,9%; ct. × 10 fl. monobloc PEJD × 500 ml (S)
CLORURĂ DE SODIU 5,85% B. BRAUN MELSUNGEN AG; Conc. pt. sol. perf.; ct. × 20 fl. × 20 sau 100 ml (S)
CLORURĂ DE SODIU 0,9% B. BRAUN MELSUNGEN AG; Sol. perf.; ct. × 10 fl. Ecoflac plus × 100, 250, 500 sau 1000 ml (S)
CLORURĂ DE SODIU 0,9% INFOMED FLUIDS; Sol. perf. 0,9%; ct. × 10 pungi × 250, 500, 1000 sau 2000 ml (S)
CLORURĂ DE SODIU/VIOSER VIOSER SA; Sol. perf. 0,9%; fl. × 1000 ml (S)
CLORURĂ DE SODIU 0,9% HEMOFARM; Sol. perf. 0,9%; ct. × 10 fl. × 500 ml (S)
SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 0,9%; ct. × 5 sau 10 f. × 10 ml (S/OTC) - Cod ATC: V07AB
SODIUM CHLORIDE BAXTER HEALTH CARE; Sol. perf. 0,9%; Sac PVC × 500 sau 1000 ml (S)

Ind: Trat. deshidratărilor izotone sau hipotone prin pierdere de lichid extracelular (diureză excesivă, gastroenterite, dietă cu restricție salină, vărsături frecvente, pareze intestinale postoperatorii, diaree profuză, arsuri întinse, boală Addison etc.). Solvent sau diluant pentru electroliți sau medicamente compatibile.

Dz: Perf. i.v. Concentrația și doza se stabilesc în funcție de vârstă, greutatea corporală, starea clinică a bolnavului și de necesarul de lichide și electroliți. Viteza de perfuzie 7,7 ml/kg și oră (180 pic./min și 70 kg). Doza zilnică medie este de 1000 ml/zi și 70 kg greutate.

Cind: Stări de hiperhidratare, hipernatremie, hipokaliemie, acidoză.

Al: Soluțiile perfuzabile de clorură de sodiu nu trebuie utilizate dacă soluția este tulbure, dacă ambalajul este perforat, sau există scurgeri de sol. Prudență în: IC și IR gravă, EPA, HTA, eclampsie, vârstnici, copii mici, sarcină. Se va evita adm. excesivă.

RA: Hipernatremie și hipercloremie. În caz de perfuzie prea rapidă poate produce diureză și diaree osmotică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METHYLDOPUM
METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM

Cod ATC: A01AA01, A12CD01

FLUOROSTOM BIOFARM SA; Sol. bucală 0,275% (trusa = fl. × 250 ml sol. buc. + 25 pahare + recipient dozator 10 ml + 50 șervețele hârtie + pungă colectoare) (**S**)

OSSIN® GRUNENTHAL GmbH; Dj. ret. 40 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 dj. (**P-6L**)

ZYMAFLUOR® 1/4 mg; **ZYMAFLUOR**® 1 mg NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Cpr. 0,25 mg, 1 mg; ct. × 1 fl. × 400 cpr. (1/4 mg), ct. × 1 fl. × 250 cpr. (1 mg) (**OTC**)

Ind: Prevenirea cariei dentare.

Dz: Fluorura de sodiu trebuie adm. regulat, fără întreruperi, de la 2 săpt. la 18 ani, prin înghițire sau dizolvată într-un pahar de apă sau suc de fructe (însă nu lapte), o dată/zi, seara, în funcție de vârstă: 2 săpt.-2 ani: 0,25 mg/zi; 2-3 ani: 0,5 mg/zi; 4-5 ani: 0,75 mg/zi; peste 6 ani: 1 mg/zi; în timpul sarcinii 1 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții fluorurii de sodiu.

Al: Trebuie avută în vedere posibilitatea unor surse adiționale de fluor pentru a preveni supradozarea. În zonele în care sarea de bucătărie sau apa sunt fluorinate (peste 0,7 mg/litru), fluorura de sodiu se recomandă a fi adm. doar în cursul sarcinii.

RA: Rareori iritație cutanată (eritem, urticarie), care dispare la întreruperea trat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METHYLII NICOTINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS

Cod ATC: B05XA02, B05ZAN1**BICARBONAT DE SODIU 8,4% B. BRAUN MELSUNGEN AG;** Sol. perf. 8,4 %; ct. × 20 fl. × 100 ml (S)**Ind:** Acidoză metabolică, hiperkaliemie.**Dz:** Dozele se stabilesc în funcție de etiologie.**Cind:** Acidoza respiratorie.**Al:** Adm. strict i.v. lent. Supravegherea echilibrului hidroelectrolitic și acidobazic. În caz de hipokaliemie se asociază o sare de potasiu.**RA:** Alcaloză metabolică, hipokaliemie. Risc de încărcare sodică în cazul unei eliminări renale sau extrarenale insuficiente.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V09FX03

METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)

RADIOIODURĂ (¹³¹I) DE SODIU INCDFIN "HORIA HULUBEI"; Cps. 3,7 MBq, 1,85 MBq, 0,925 MBq; ct. metalică sigilată cu 1, 2 sau 3 containere de Pb conținând fiecare 1 fl. × 10, 15 sau 20 cps. × 3,7 MBq, 1,85 MBq, 0,925 MBq (**S**)

RADIOIODURĂ (¹³¹I) DE SODIU INCDFIN "HORIA HULUBEI"; Sol. orală 0,37-3,7 GBq/cm³; ct. metalică × 1 container Pb × 1 fl. sticlă (**S**)

Ind: Aprecierea localizării, formei și dimensiunilor tiroidei, a funcționalității țesutului tiroidian restant după tiroidectomii subtotale sau tratament cu radioiod. Pentru diagnosticul: hipertiroidiei, gușei endemice, megatiroidiei, tireotxicozei factitiei; adenomului toxic, carcinomului tiroidian și/sau metastazelor radiocaptante, hipotiroidiei (diagnostic diferențial forme primare și secundare), tiroiditelor acute și subacute (și urmărirea evoluției sub tratament), distrofiilor endemice tireopate (determinării avidității pentru ioduri), ectopiei tiroidiene (tiroida sublinguală, retrosternală sau "în ovar"). Cancer tiroidian, preoperator și postoperator, pentru evaluarea țesutului tiroidian restant și a metastazelor locale sau la distanță. Determinarea timpului de înjumătățire al iodului tiroidian în vederea stabilirii dozei terapeutice.

Dz: Activitatea uzuală este de 0,037 MBq/kg, administrată oral (în apă, lapte, soluție glucoză 10% sau suc de lamâie); administrarea se face dimineața, înainte de prima masă a zilei.

Cind: Sarcina și alăptarea. Tineri sub 18 ani, dacă diagnosticul nu oferă avantaje mai mari decât riscul potențial al efectelor iradierii. Anemii și leucopenii severe. A doua fază a ciclului menstrual. Pacienți cu tiroida saturată cu ¹³¹I datorită expunerii la cantități mari de iod inactiv (prin aport alimentar sau medicamentos). Afecțiuni cu indicații restrictive pentru diagnosticul cu ¹³¹I: stări precanceroase multiple, neoplazii maligne în evoluție, leziuni cutanate cu potențial de malignizare, boli psihice și ale sistemului nervos, nevroze manifeste, epilepsie, tulburări de comportament, etilism cronic, toxicomanii.

Al: Nu trebuie exclusă posibilitatea apariției accidentelor alergice; se recomandă ca în trusa de urgență a fiecărui laborator de medicină nucleară să existe în permanență medicația necesară acestui tip de reacție adversă (antihistaminice, hemisuccinat de hidroclorid, soluții perfuzabile de ser fiziologic și glucoză 5%, adrenalină, miofilin etc.).

RA: Ocazional pot să apară reacții alergice și parotidite de iradiere (senzații de vărsături, ușoare eriteme, prurit, uscăciune a gurii), reacții inflamatorii locale datorate unor tiroidite de iradiere, oboseală, somnolență, scăderea apetitului. Rar pot să apară tireotxicoze, insomnie, stare de agitație psihomotorie. Pot să apară anemie aplastică și complicații hematologice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM

Cod ATC: C07AB12

NEBILET® BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. 5 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 7 sau 14 cpr.; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (P-6L)

Ind: HTA esențială.

Dz: *Adulți* 5 mg/zi. Efectul antihipertensiv devine evident după 1-2 săptăm. de trat. În IR sau *peste 65 ani* 2,5 mg/zi. La nevoie, maxim 5 mg/zi, în timpul mesei, la aceeași oră a zilei.

Cind: Hipersensibilitate la nebivololol, tulburări ale funcției hepatice, în șoc cardiogen, IC netratată, sindrom de nod sinusal, tulburări în sistemul de conducere (bloc de sinus atrial, bloc AV de gradul 2 și 3), bronhospasm și astm bronșic în antecedente, tumoră netratată a glandei suprarenale (feocromocitom), bradicardie, sub 50 bătăi/min. Sarcină și alăptare. Copii.

Al: Pacienți peste 75 ani; în cardiopatia ischemică trat. se va întrerupe treptat timp de 1-2 săptăm. Diabet: Nu influențează nivelul glicemiei dar poate masca simptomele de hipoglicemie. Hipertiroidism: Poate fi mascată o frecvență cardiacă crescută.

RA: Foarte rar: cefalee, vertij, diaree, greață, edeme. Efectele adverse tipice ale b-blocantelor pot apărea doar în cazuri foarte rare: puls scăzut, scăderea TA, IC.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AE04

METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM

VIRACEPT® 250 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 270 cpr. (S/P-RF)

VIRACEPT® 625 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 625 mg; ct. × 1 fl. × 120 cpr. (S/P-RF)

VIRACEPT® 50 mg/g HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. susp. 50 mg/g pulbere; ct. × 1 fl. × 144 g pulb. (S/P-RF)

Ind: În combinație cu analogi nucleozidici antiretrovirali, în trat. pacienților infectați cu HIV-1, adulți sau copii.

Dz: Oral, la mese. *Adulți și copii peste 13 ani:* 750 mg de 3 ori/zi. *Copii de 13 ani și mai mici:* 20-30 mg/kg pe doză, adm. de 3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la nelfinavir sau la oricare din excipienți. Concomitent cu medicamente cu indice terapeutic îngust și care se metabolizează de către sistemul enzimatic CYP3A4. Prin inhibiție competitivă a metabolismului acestor medicamente, este posibil să apară efecte adverse serioase și/sau amenințătoare de viață ca aritmiile cardiace (ex. terfenadină, astemizol, cisaprid), sedare prelungită sau depresie respiratorie (ex. triazolam, midazolam). Sarcină. Alăptare.

Al: Disfuncție hepatică sau renală semnificativă. Copii sub 2 ani. Posibilități crescute de sângerare la pacienții hemofilici.

RA: Cel mai frecvent diaree. Mai rar: erupții cutanate, flatulență, greață, dureri abdominale, astenie. Parametrii de laborator: scăderea neutrofilelor, creșterea limfocitelor, creșterea creatinkinazei, creșterea ALT.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N07AA01

METOPROLOLUM
METRONIDAZOLUM
MEXILETINUM
MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM

MIOSTIN LABORMED PHARMA SA; Cpr. 15 mg; ct. × 1, 3 sau 100 blist. × 20 cpr. (S/P-6L)

MIOSTIN® 0,5 mg/1 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 0,5 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml, ct. × 10 f. × 1 ml (S/P-RF)

Ind: Miastenia gravis (test de diagnostic și trat. simptomatic). Antagonist al d-tubocurarinei și al derivatului său metil. Ileus paralic postoperator. Retenție urinară postoperatorie. Tulburări vasculare periferice (sindrom Raynaud, tromboangeita obliterantă). Poliomieliță și alte boli cu tulburări neuromusculare. Adjuvant în: megacolon; hipertiroidism și miopie tireotoxică; migrene și prevenirea acceselor de tahicardie paroxistică; prevenirea trombozelor. Rinită atrofică.

Dz: Cpr: 15 mg oral la 2-4 ore. F: i.v. lent, cu atropină la îndemână. **Adulți:** miastenia gravis: 0,5-1 mg s.c. sau i.v. lent, de câteva ori pe zi (doza totală zilnică 5-20 mg); pentru decurarizare: 0,5-2,5 mg i.v. (împreună cu 0,5-1 mg atropină); ileus paralic: 0,25-0,5 mg s.c., eventual i.v. lent la fiecare 4-6 ore. **Copii:** 0,125-1 mg inj.

Cind: Obstrucție mecanică intestinală sau urinară, astm bronșic, boala Parkinson; intoxicația cu suxametoniu și alte curarizante depolarizante. Alăptare.

Al: Epilepsie. Ulcer gastroduodenal, diaree. Bradicardie, infarct miocardic recent, IC. Hipotensiune. Tireotxicoză. Sarcină.

RA: Crampe abdominale, spasme ale musculaturii striate, hipersalivație, mioză, uneori chiar stări de colaps. Toate aceste simptome pot fi prevenite și evitate prin adm. de 0,6 mg atropină sulfurică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

METRONIDAZOLUM
 MEXILETINUM
 MIANSERINUM
 MICONAZOLUM
 MIDAZOLAMUM
 MIDODRINUM
 MILNACIPRANUM
 MILTEFOSINUM
 MINOXIDILUM
 MIRTAZAPINUM
 MITOMICINUM
 MITOXANTRONUM
 MIVACURIUM
 MOLGRAMOSTIMUM
 MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
 MONTELUKASTUM
 MORNIFLUMATUM
 MORPHYNUM
 MOXIFLOXACINUM
 MOXONIDINUM
 MUPIROCINUM
 MYCOPHENOLATUM
 NADROPARINUM
 NAFTIDROFURYLUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
 NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM

Cod ATC: J01GB07, S01AA23

NETROMYCINE® SCHERING PLOUGH EUROPE; Sol. inj. 50 mg/2 ml, 200 mg/2 ml; ct. × 1 fl. × 2 ml; Sol. inj. 150 mg/1,5 ml; ct. × 1 fl. × 1,5 ml (**P-RF**)

NETTACIN® S.I.F.I.; Sol. oft. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml; ct. × 15 fl. unidoză × 0,3 ml (**P-RF**)

Ind: *Adm. inj.:* trat. bacteriemiei, septicemiei (inclusiv cea neonatală), a infecțiilor grave ale căilor respiratorii, renale și ale tractului genito-urinar, cutanate și ale țesuturilor moi, a infecțiilor oaselor și ale articulațiilor, arsurilor, plăgilor și infecțiilor perioperatorii, abdominale (inclusiv peritonitei), ale tractului gastrointestinal cauzate de: *Escherichia coli*, *Klebsiella-Enterobacter-Serratia sp.*, *Citrobacter sp.*, *Proteus sp.* (indol pozitiv și negativ), *Pseudomonas aeruginosa* și *Staphylococcus sp.* (coagulazo-pozitivi și negativi, inclusiv tulpini penicilino- și metilicilino-rezistente) și *Neisseria gonorrhoeae*. Se poate asocia cu carbenicilina sau ticarcilina, în trat. infecțiilor cu *Pseudomonas aeruginosa*, sau cu o beta-lactamină în trat. endocarditei streptococice, precum și la nou-născuții cu septicemie sau cu pneumonie stafilococică. Este eficientă în trat. infecțiilor cauzate de microorganisme rezistente la alte aminoglicozide. *Adm. conjunctivală:* Infecții oculare externe și ale anexelor, produse de către germeni sensibili la netilmicină, inclusiv cei producători de enzime acetilante și fosforilante.

Dz: *Inj. i.v. sau i.m.* în 2-3 doze egale zilnice; concentrația maximă măsurată între 30 min. și o oră de la adm., se estimează a fi între 4 și 12 μg/ml; maxim 16 μg/ml. Durata uzuală a trat.: 7-14 zile. *Adulți cu funcție renală normală:* infecții urinare sau infecții sistemice care nu prezintă risc letal 4-6 mg/kg/zi, adm. în 2-3 doze egale, la 8-12 ore sau o dată/zi. În infecții cu risc letal 7,5 mg/kg/zi, în 3 doze egale, la 8 ore. *Prematuri sau nou-născuți la termen, în vârstă de până la o săptăm.:* 6 mg/kg/zi (3,0 mg/kg, o dată la 12 ore). *Nou-născuți mai mari de o săptăm. și sugari:* 7,5-9 mg/kg/zi (2,5-3 mg/kg, o dată la 8 ore). *Copii:* 6-7,5 mg/kg/zi (2-2,5 mg/kg, o dată la 8 ore). *Pacienți cu funcție renală alterată:* fie mărirea intervalului între doze prin multiplicarea nivelului creatininei serice (mg/100 ml) cu 8, fie micșorarea dozelor. După adm. dozei inițiale (încărcare), o metodă orientativă de determinare a dozelor adm. la interval de 8 ore este împărțirea dozei uzuale recomandate la nivelul creatininei serice. *Adm i.v.:* în IC congestivă, boli hematologice, arsuri grave sau bolnavi cu masă musculară redusă. Se diluează în 50-200 ml de ser fiziologic sau într-o sol. sterilă de glucoză 5%, cu perfuzare pe o durată de o jumătate de oră până la două ore sau inj. direct i.v. lent, în 3-5 min. Regimuri speciale de dozare: *Gonoreea*, la bărbați și femei: doză unică inj. i.m. de 300 mg, câte o jumătate de doză în fiecare fesă. *Infecții urinare necomplicate:* doză unică zilnică i.m. de 3 mg/kg, timp de 7-10 zile. *Hemodializați:* la sfârșitul fiecărei perioade de dializă 2 mg/kg. *Adm. conjunctivală:* se instilează 1-2 picături de 3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitatea sau reacțiile toxice grave la netilmicină sau la alte aminoglicozide. Sarcină. Alăptare.

A!: Netilmicina nu va fi amestecată cu alte medicamente. Monitorizare funcție renală și acustică, mai ales la pacienții cu funcție renală alterată, la vârstnici sau la adm. de doze mari. Reacție aversivă de urină: dozarea

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MEXILETINUM
 MIANSERINUM
 MICONAZOLUM
 MIDAZOLAMUM
 MIDODRINUM
 MILNACIPRANUM
 MILTEFOSINUM
 MINOXIDILUM
 MIRTAZAPINUM
 MITOMICINUM
 MITOXANTRONUM
 MIVACURIUM
 MOLGRAMOSTIMUM
 MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
 MONTELUKASTUM
 MORNIFLUMATUM
 MORPHYNUM
 MOXIFLOXACINUM
 MOXONIDINUM
 MUPIROCINUM
 MYCOPHENOLATUM
 NADROPARINUM
 NAFTIDROFURYLUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
 NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM

Cod ATC: J05AG01

VIRAMUNE® BOEHRINGER INGELHEIM; Susp. orală 50 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 240 ml + seringă × 5 ml + dispozitiv de adaptare a seringii la flacon (**S/P-RF**)

VIRAMUNE® BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 200 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (**S/P-RF**)

Ind: Terapia combinată antivirală pentru pacienții infectați cu HIV-1 aflați în stadiu de imunodeficiență avansată sau progresivă.

Dz: 2 luni până la 8 ani: 4 mg/kg o dată/zi timp de 2 săptăm., urmată apoi de 7 mg/kg de 2 ori/zi. Doza zilnică totală maximă 400 mg/zi, indiferent de vârsta pacientului. 8-16 ani: 4 mg/kg o dată/zi timp de 2 săptăm., urmată apoi de 4 mg/kg de 2 ori/zi, maxim 400 mg/zi. Peste 16 ani: 200 mg o dată/zi, în primele 14 zile, urmată de 200 mg, de 2 ori/zi, în asociere cu cel puțin alte două produse antiretrovirale, care nu au mai fost adm. anterior pacientului. Pacienților cărora le-a apărut rash cutanat în timpul celor 14 zile de testare, în care li se adm. doza de 200 mg/zi (4 mg/kg/zi la copii), nu trebuie să li se mai mărească doza de nevirapină până la dispariția rash-ului. Pacienții care au întrerupt trat. cu nevirapină pentru o perioadă mai mare de 7 zile trebuie să reînceapă cu doza recomandată inițial, folosind 200 mg/zi (4 mg/kg/zi la copii) în primele 14 zile de testare, urmată de 200 mg de 2 ori/zi (4-7 mg/kg, de 2 ori/zi) la copii, funcție de vârstă.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. IH și IR. Sarcină și alăptare.

Al: În cazul pacienților tratați cu nevirapină au apărut reacții cutanate grave și care au pus în pericol viața, inclusiv sindrom Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică, uneori fatale. Pacienții trebuie informați că cea mai importantă reacție adversă a nevirapinei este apariția oricărei forme de rash, mai ales în primele 6 săptăm. de la începerea trat. Trat. trebuie întrerupt în cazul formelor grave de rash cutanat sau însoțit de febră, pustule, leziuni bucale, conjunctivită, edem facial, sudorație, mialgii sau artralгии, stare generală alterată. Au apărut cazuri de hepatotoxicitate gravă, inclusiv hepatită fulminantă fatală. Adm. trebuie întreruptă la cei cu modificări moderate sau severe ale testelor funcției hepatice și reluată cu prudență. Adm. trebuie întreruptă definitiv dacă la o nouă adm. reapar alterări moderate sau severe ale funcției hepatice. Se monitorizează ALT și AST, în special pe parcursul primelor 6 luni de trat. Adm. nevirapinei nu vindecă infecția HIV-1; pacienții pot să prezinte în continuare afecțiuni asociate cu infecția HIV-1 în stadiu avansat, inclusiv infecții oportuniste. Terapia cu nevirapină nu a redus riscul de transmitere a HIV-1 prin contact sexual sau prin contaminare sanguină. Contraceptivele orale și alte metode hormonale de contracepție nu trebuie folosite ca metode contraceptive unice la femeile cărora li se adm. nevirapină, deoarece există riscul unei sarcini. *oferi și activități de precizie.

RA: Adulți: rash, greață, oboseală, febră, cefalee, somnolență, vărsături, diaree, dureri abdominale și mialgii. Creșterea ALT, AST, GGT, bilirubinei totale și fosfatazei alcaline. Uneori icter, hepatotoxicitate gravă, inclusiv cazuri letale de hepatită fulminantă. Erupții cutanate eritematoase maculopapuloase, cu sau fără prurit; reacții

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C04AE02

MIANSERINUM
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM

NICERGOLINA LPH® 5 mg; NICERGOLINA LPH® 10 mg; NICERGOLINA LPH® 30 mg LABORMED PHARMA; Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 30 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 15 cpr. **(S/P-6L)**

NICERIUM® 10 HEXAL AG; Dj. 10 mg; ct. × 1 blist. × 25 dj. **(P-6L)**

NICERIUM® 15; NICERIUM® 30 Uno HEXAL AG; Cps. cu elib. modif. 15 mg, 30 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

NILOGRIN® 10 mg; NILOGRIN® 30 mg POLFA; Cpr. film. 10 mg, 30 mg; ct. × 1 blist. × 30 cpr., respectiv ct. × 1 fl. × 30 cpr. **(P-6L)**

SERMION® PHARMACIA & UPJOHN; Dj. 30 mg; ct. × 2 blist. × 15 dj. **(P-6L)**

SERMION® PHARMACIA & UPJOHN; Liof. pt. sol. inj. 4 mg; ct. × 4 fl. liof. + 4 f. solv. × 4 ml **(S/P-RF)**

SINERGOLIN® 10 mg SINTOFARM SA; Dj. 10 mg; ct. × 1 fl. × 20 dj. **(P-6L)**

Ind: Tulburări cerebrale vasculare sau metabolice acute și cronice (ATS cerebrală, tromboza și embolia cerebrală, ischemia cerebrală tranzitorie). Tulburări vasculare periferice acute și cronice (arteriopatie obliterantă a membrilor, sindrom Raynaud, alte sindroame de insuficiență circulatorie periferică). Cefalee. Adjuvant în trat. HTA, iar pe cale parenterală și în crizele hipertensive.

Dz: Oral: 5-10 mg de 3 ori/zi la intervale regulate pe perioade lungi de timp, între mese. Inj. i.m.: 2-4 mg de 2 ori/zi. Perf. i.v. lentă: 4-8 mg/doză în 100 ml ser fiziologic sau glucoză. Inj. intraarterial: 4 mg/doză în 10 ml ser fiziologic, adm. timp de 2 min. Se poate începe trat. pe cale parenterală și continu pe cale orală.

Cind: Hipersensibilitate la nicergolină. Hemoragii acute, infarct miocardic recent, hTA severă.

Al: Nicergolina poate să potențeze efectul medicamentelor antihipertensive. După adm. parenterală este indicat ca pacientul să rămână în repaus câteva minute, mai ales la debutul trat. Sarcină. Alăptare. *oferi și activități de precizie.

RA: Hipotensiune și vertij (după adm. parenterală), ușoare tulburări gastrice, senzație de căldură și roșeață cutanată, somnolență, insomnie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM

Cod ATC: C08CA05

ADALAT CR 20; ADALAT CR 30; ADALAT CR 60 BAYER AG; Cpr. elib. modif. 20 mg, 30 mg, 60 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

ADALAT® RETARD BAYER AG; Cpr. ret. 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

CORDIPIN 10 mg KRKA; Cpr. 10 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

CORINFAR 10 RETARD; CORINFAR 20 RETARD AWD PHARMA; Cpr. ret. 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

EPILAT RETARD E.I.P.I.C.O.; Dj. 20 mg; ct. × 1 sau 2 folii × 10 dj. (P-6L)

NIFEDIPIN ALKALOID 10 mg ALKALOID AD; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 cpr. (S/P-6L)

NIFECARD XL 60 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. cu elib. prel. 60 mg; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

NIFEDIPIN 10 mg TERAPIA SA; Dj. 10 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)

NIFEDIPIN RETARD 20 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

NIFEDIPIN 10 mg LAROPHARM SRL; Dj. 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (P-6L)

Ind: Angină vasospastică (angina Prinzmetal, angina variantă) - în monoterapie; angină pectorală cronică stabilă (angina de efort); HTA esențială.

Dz: Doza trebuie atinsă treptat, începând cu doze inițiale mici. *Angina pectorală vasospastică și angina cronică stabilă:* 20 mg de 2 ori/zi, posibil și 40 mg de 2 ori/zi. Doza zilnică maximă 80 mg. *HTA esențială:* 10 mg de 2 ori/zi, cu creștere treptată la 40 mg de 2 ori/zi. Doza zilnică 80 mg. Cpr. retard se adm. după mese. Intervalul între 2 adm. este de 12 ore (dimineața și seara). Dacă sunt necesare adm. mai frecvente, intervalul între două adm. nu va fi mai scurt de 4 ore.

Cind: *ocul cardiovascular; stenoza aortică severă; angina pectorală instabilă; IMA (în primele 4 săpt.); hipersensibilitate cunoscută la nifedipină. Sarcină. Alăptare.

Al: hTA (valori sistolice sub 90 mmHg); IC decompensată. Risc de hTA la pacienții dializați, cu hipertensiune malignă, IR ireversibilă și hipovolemie. Se reduce doza la cei cu funcție hepatică alterată și care prezintă concomitent afecțiuni severe cerebro-vasculare. *oferi și activități de precizie.

RA: În primele săpt. de trat. poate să apară poliurie. În caz de IR se poate produce o înrăutățire temporară a funcției renale. La pacienții cu HTA sau afecțiuni coronariene, întreruperea bruscă a trat. poate declanșa criză hipertensivă sau ischemie miocardică ("fenomenul de rebound"). Mai ales la începutul trat. pot să apară cefalee, flush (congestia feței sau a pielii) și senzație de căldură, crize de angină pectorală. S-au semnalat: obnubilare, palpitații, tahicardie, scăderea TA, edeme ale membrelor inferioare, amețeală, fatigabilitate și parestezii. Rareori apar tulburări gastrointestinale: grețuri, flatulență și diaree; reacții cutanate ca prurit, urticarie, exantem, dermatită exfoliativă. În cazul unui trat. de lungă durată la pacienții vârstnici s-a semnalat ginecomastie reversibilă. Foarte rar modificări ale

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MIDAZOLAMUM
MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM

Cod ATC: G01AX05**MACMIROR** DOPPEL FARMACEUTICI; Dj. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj. (P-RF)**Ind:** Infecții urinare - cistite, uretrite, prostatite, pielonefrite - și infecții vulvo-vaginale cu floră mixtă - *Trichomonas*, *Candida*, bacterii sensibile.**Dz:** Oral, în vaginite 4 dj./zi timp de 10 zile (se recomandă și trat. partenerului); în infecțiile urinare 6 dj./zi, timp de 10 zile, la nevoie 8 dj./zi, 20 de zile; doza zilnică se adm. în 3-4 prize, la mese.**Cind:** Hipersensibilitate cunoscută nifuratel.**Al:** Trat. prelungit poate induce sensibilizări, caz în care adm. trebuie să fie întreruptă. În timpul trat. se vor evita băuturile alcoolice (posibilitatea de reacții de tip disulfiram).**RA:** Rareori greață, vomă, diaree, erupții cutanate alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MIDODRINUM
MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM

Cod ATC: A07AX03**ERCEFURYL® 200 mg** SANOFI~SYNTHELABO; Cps. 200 mg; ct. × 2 blist. × 14 cps. (*P-RF*)**Ind:** Diaree acută de origine presupus bacteriană, în absența fenomenelor invazive. Trat. nu se substituie unei rehidratări.**Dz:** *Adulți:* 4 cps./zi în 4 prize, maxim 7 zile.**Cind:** Orice antecedent de reacție alergică la derivatele de nitrofuran. Prematuri și nou-născuți până la 1 lună.**Al:** În caz de diaree infecțioasă cu manifestări clinice sugerând un fenomen invaziv, trebuie prevăzută o antibioticoterapie sistemică. Indicația nu justifică un trat. prelungit.**RA:** Reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AX17

MILNACIPRANUM
MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM

AFLOGEN FARAN LAB.; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

AULIN® 100 mg CSC PHARMACEUTICALS; Cpr. 100 mg; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 10 cpr., ct. × 1 blist. × 3 cpr. (P-RF)

AULIN® CSC PHARMACEUTICALS; Gran. pt. susp. orală 100 mg/plic; ct. × 3, 6, 10, 15 sau 30 plicuri (P-RF)

COXTRAL ZENTIVA AS; Cpr. 100 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

LEMESIL ANFARM HELLAS; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

NIMESIL LABORATORI GUIDOTTI SpA; Gran. pt. susp. orală 100 mg/plic; ct. × 9, 15 sau 30 plicuri (P-RF)

NIMESULID 100 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

NIMESULID ARENA GROUP SA; Cpr. 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

NIMESULID TERAPIA SA; Cpr. 100 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

NIMESULID LPH® 100 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 100 mg; ct. × 1 sau 200 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Trat. inflamațiilor articulare, bolilor reumatice, în procesele inflamatorii ale țesuturilor moi, în dureri și inflamații postoperatorii și posttraumatice. Pentru scăderea febrei și pentru atenuarea durerilor cauzate de inflamația acută a căilor respiratorii superioare, cavității bucale, tractului urogenital și durerilor menstruale.

Dz: Pentru copiii mai mari de 12 ani și adulți, 1 cpr. de 2 ori/zi, maxim 400 mg/zi.

Cind: Sensibilitate cunoscută la nimesulid. Ulcer gastric sau duodenal. Funcție hepatică alterată. Alăptare.

A!: La pacienții cu funcția renală alterată, se adm. numai în cazul în care Cl la creatinină este mai mare de 30 ml/min. Prudență la copiii mai mici de 12 ani, gravidele în ultimul trimestru de sarcină și bolnavii sensibili la alt AINS sau aspirină.

RA: Arsuri epigastrice trecătoare. În cazuri izolate pot să apară reacții alergice cutanate, cefalee, greață sau vărsături.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C08CA06

MILTEFOSINUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM

DILCEREN® SLOVAKOFARMA; Sol. perf. 0,2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml (S)
NEMOTAN MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 30 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
NIMODIPIN LAROPHARM SRL; Cpr. 30 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
NIMOTOP® BAYER AG; Sol. perf. 0,2 mg/ml; ct. × 1 sau 5 fl. × 50 ml + set perf. (S)
NIMOTOP® BAYER AG; Cpr. film. 30 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Prevenirea și trat. deficiențelor ischemice neurologice cauzate de spasme vasculare cerebrale, hemoragii subarahnoidiene de origine anevrismală sau traumatică. Trat. tulburărilor funcțiilor cerebrale la vârstnici cu simptome pronunțate cum ar fi pierderea memoriei, alterarea capacității de efort și concentrare și labilitate psihică

Dz: În hemoragia subarahnoidiană de origine anevrismală: 5-14 zile de trat. cu sol. perf., început la maxim 4 zile după hemoragie, apoi oral 6 × 60 mg/zi la 4 ore interval timp de 7 zile. În hemoragia subarahnoidiană de origine traumatică: 7-10 zile de trat. cu sol. perf. apoi oral 6 × 60 mg/zi la 4 ore interval timp de 11-14 zile. Trat. tulburărilor cerebrale datorate vârstei: oral timp de câteva luni. Nimodipinul sol. perf. se adm. în perf. continuă i.v. via cateter central folosind o pompă de perfuzie. Instilații în ventriculii cerebrali: intraoperator o sol. de nimodipin diluată proaspăt preparată (1 ml de nimodipin sol. perfuzabilă și 19 ml sol. Ringer lactat) încălzită la temperatura corpului (a sângelui) poate fi instilată intraventricular.

Cind: Alterare severă a funcțiilor hepatice (ciroză hepatică). Nu se adm. asociată cu medicamente antiepileptice (fenobarbital, fenitoină sau carbamazepină).

Al: Precauție în caz de edem cerebral generalizat sau o creștere marcată a presiunii intracraniene (HIC). La pacienții vârstnici cu afecțiuni multiple, în caz de alterare severă a funcției renale (rata filtrării glomerulare < 20 ml/min) și în caz de alterare severă a funcțiilor cardiovasculare, trebuie supravegheare atentă. Precauție la pacienții cu hTA (presiunea sistolică mai mică decât 100 mmHg). Sarcină. *oferi și activități de precizie.

RA: Greață, rareori ileus paralic (modificări de tranzit intestinal datorate parezei intestinale); amețeală, cefalee, senzație de slăbiciune; în rare cazuri pot apărea simptome de hiperactivitate a SNC caracterizate prin agitație motorie crescută, excitație, agresivitate sau transpirație. În cazuri izolate s-au observat hiperkinezie și stări depresive. Mai pot apărea: scădere marcată a TA, în special când valorile inițiale sunt crescute, flush, senzație de căldură, edeme periferice, bradicardie sau, mai rar, tahicardie. Foarte rar trombocitopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C08CA07**BAYMYCARD** BAYER AG; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**Ind:** Angină pectorală cronică stabilă, HTA.**Dz:** De 2 ori câte 5-10 mg/zi, în timpul meselor, pentru ambele indicații. Se poate crește treptat doza zilnică la 2 × 20 mg nisoldipină. Pentru întreruperea trat., doza se reduce treptat, în special când s-a ajuns la doze mari.**Cind:** Risc de șoc la pacienții cărora li se adm. rifampicină sau fenitoină cronic. În caz de hipersensibilitate la orice component al tabletei. Nu se asociază cu suc de grapefruit. Sarcină și alăptare. Copii.**Al:** La începutul trat. pot apărea foarte rar crize de angină sau chiar IMA. În caz de funcție hepatică diminuată activitatea nisoldipinei poate fi potențată și prelungită; se începe cu o doză cât mai mică (1 × 5-10 mg/zi), iar pacientul trebuie monitorizat pe durata trat. Siguranța nisoldipinei la pacienții cu IC nu a fost stabilită. Precauție la pacienții cu TA foarte scăzută (presiune sistolică mai mică decât 90 mmHg) și la pacienții cu stenoză aortică severă; șoferi și activități de precizie.**RA:** Apar mai ales la începutul trat. sau în urma unor doze mari, dar sunt în general ușoare și tranzitorii: cefalee, vasodilatație, amețeală, palpitații, tahicardie, dispnee, durere toracică, angină pectorală, hTA, edeme periferice, astenie, greață, dispepsie, diaree, parestezii, rash și prurit, modificarea testelor hepatice. Foarte rar pot apărea: poliurie, hiperplazie gingivală, ginecomastie, dermatite fotosensibile.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MIRTAZAPINUM
MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM

Cod ATC: N05CD02

NITRAZEPAM LPH® 2,5 mg; NITRAZEPAM LPH® 5 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 2,5 mg, 5 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-RF)**

NITRAZEPAM 5 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Tulburări de somn - insomnie, somn agitat și neodihnit, adormire dificilă - și stări de tensiune emoțională, suprasolicitare nervoasă, anxietate, depresii psihice, care sunt însoțite de tulburări ale ritmului normal veghe-somn. Tulburări de somn la bătrâni și copii.

Dz: Se va folosi doza minimă eficientă, pe o durată de maxim 4 săptăm. și, dacă este posibil, intermitent. Nu se recomandă un trat. cronic, de lungă durată. Întreruperea unui trat. mai îndelungat se va face într-o perioadă mai lungă de timp. **Oral: Adulți:** 5 mg seara la culcare - la nevoie, până la 10 mg în condiții ambulatorii și 20 mg în staționar. **Vârstnici:** 2,5-5 mg/zi. **Copii 6-14 ani:** 5 mg/zi. **Copii 1-6 ani:** 1,25-2,5 mg/zi.

Cind: Alergie la benzodiazepine, insuficiență pulmonară acută, deprimare respiratorie, miastenie gravă, psihoză cronică, depresie, tulburări de personalitate.

Al: Prudență la bătrâni, bolnavi cu insuficiență respiratorie cronică și cu ATS cerebrală avansată (doze mici). Primul trimestru de sarcină. *oferi și activități de precizie.

RA: Dereglează mai puțin ca hipnoticele barbiturice modelul fiziologic al somnului; uneori somnolență sau vertij la trezire (mai ales când se adm. repetat); bătrânii pot prezenta stări confuzionale (se recomandă doze mici); mai rar scăderea libidoului, hipotonie musculară, amețeli, artralгии (trat. îndelungat cu doze mari). Utilizarea abuzivă prelungită poate fi cauză de dependență de tip barbituric.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C08CA08

MITOMICINUM
MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLYUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM

LUSOPRESS LUSO FARMACO; Cpr. 20 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)
UNIPRES® 10; UNIPRES® 20 KRKA; Cpr. 10 mg, 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. HTA.

Dz: 20 mg o dată/zi, eventual 10 mg de 2 ori/zi. La nevoie, se poate crește, treptat, până la 20 mg de 2 ori/zi. Doza zilnică maximă - 40 mg. La vârstnici și în IH se începe cu 10 mg o dată/zi, crescând, la nevoie, până la 20 mg o dată/zi sau 10 mg de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la nitrendipină sau alți antagoniști de calciu cu structură dihidropiridinică, IMA în primele 4 săpt., angină pectorală instabilă, șoc cardiogen. Sarcină și alăptare.

Al: La vârstnici, în IH sau la cei ce primesc deja alte antihipertensive se începe cu doze mici. Prudență la pacienții cu hTA, IC decompensată și stenoză aortică marcată. *oferi și activități de precizie.

RA: Frecvent: edeme ale gleznelor, amețeli, bufeuri și congestie facială, cefalee care dispare la adm. cronică, dar obligă la întreruperea trat. în 5-10% din cazuri. Mai rar tahicardie și palpitații, hTA ortostatică, oboseală, grețuri și prurit. Poate provoca creșterea natriurezei și diurezei în primele zile de trat. Uneori creșteri ale fosfatazelor alcaline. La coronarieni poate provoca dureri precordiale, care survin la 15-30 min. după adm. Această reacție adversă, rară, impune întreruperea trat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MITOXANTRONUM
MIVACURIUM
MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLYUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM

Cod ATC: C01DA02**NITRODERM® TTS 5** NOVARTIS PHARMA; Sist. transderm. 25 mg/ 10 cm²; ct. × 10 plicuri × 1 sist. transderm. (P-6L)**NITROGLICERINĂ** ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 0,5 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (P-6L)**NITROMINT RETARD** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. ret. 2,6 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (P-6L)**NITROMINT® sublingual** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Aerosol 0,4 mg/ doză; ct. × 1 fl. × 10 g (180 doze) (P-6L)**TRINITRO SAN** MERCK KGaA; Conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (S)

Ind: Cpr. obișnuite (bucale): trat. crizelor de angină pectorală, trat. preventiv pe termen foarte scurt (sau precritic) al crizelor anginoase. Trat. profilactic al crizelor de angină pectorală. *Formele ret.:* Profilaxia și trat. anginei de efort și vasospastice. În insuficiența cardiacă pentru suplimentarea trat. digitalic și diuretic. Forma ret. nu se adm. în trat. atacului de angină pectorală. *Aerosol:* Prevenirea atacului anginos prin adm. înainte efortului fizic. Terapia adjuvantă în cazurile urgente de IC stângă (astm cardiac). Pentru scăderea presiunii de umplere în IMA. *Sol. inj.* IMA cu și fără insuficiență ventriculară stângă. Insuficiență ventriculară stângă cu EPA și subacut. Criză hipertensivă cu decompensare cardiacă.

Dz: Cpr. bucale: Perlingual câte 1/2-1 cpr. în timpul crizelor de angină pectorală sau imediat înainte efortului provocator. Doza se poate repeta după 15 minute. Dacă după adm. a 3 doze sub formă de cpr. criza de angină nu cedează, se recomandă prezentarea la medic pentru suspiciune de IMA. *Dispozitive transdermice:* Se aplică pe piele într-o zonă sănătoasă, uscată și curată, cu pilozitate redusă. Se începe cu Nitroderm TTS 5, câte un sistem pe zi. Ulterior, în cazul unui răspuns nesatisfăcător, se poate trece la Nitroderm TTS 10, un sistem zilnic. Dacă apar fenomene de tahifilaxie, se folosește trat. intermitent, cu interval liber de 8-12 ore pe zi, mai ales în cursul nopții. *Cpr. ret.:* uzual 1 cpr. de 2 ori/zi înainte de masă (dimineată și la prânz). Dacă este necesar doza se poate crește la 2-3 cpr. de 2 ori/zi. În IC trebuie făcută o pauză de câteva zile după o perioadă de trat. de 1-2 săpt. *Aerosol:* în atac anginos se adm. 1-2 doze sublingual, în poziție șezândă. Dacă este necesar doza se poate majora la maximum 3 doze în decurs de 15 min. Pentru prevenire trebuie aplicată o doză cu 5-10 min înainte de exercițiul fizic. *Sol. inj.:* 0,75-8 mg nitroglicerină/oră; se va începe întotdeauna cu doze mici. Se monitorizează TA sistolică și diastolică, frecvența cardiacă și dacă este nevoie: presiunea arterială pulmonară sistolică și diastolică, presiunea de umplere a ventriculului stâng, debitul cardiac și EKG (măsurarea segmentului ST). Trinitrosan poate fi adm. numai sub formă de perfuzie. Diluția într-o sol. perfuzabilă compatibilă este de cel puțin 1:4, iar durata trat. se poate extinde la 3 zile sau mai mult.

Cind: IC, glaucom, tromboză coronariană acută, ramolism cerebral, hTA posturală, hipertensiune intracraniană, idiosincrazie la Nitroglicerină; stări de șoc și colaps, anemii grave. Infarct miocardic cu presiune de umplere scăzută; insuficiență circulatorie (șoc, colaps); edem pulmonar toxic (adm. i.v.); cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; hTA marcată. Sarcină și alăptare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MIVACURIUM
 MOLGRAMOSTIMUM
 MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
 MONTELUKASTUM
 MORNIFLUMATUM
 MORPHYNUM
 MOXIFLOXACINUM
 MOXONIDINUM
 MUPIROCINUM
 MYCOPHENOLATUM
 NADROPARINUM
 NAFTIDROFURYLYUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
 NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM

Cod ATC: A02BA04**NIZATIDIN 150 mg** VIM SPECTRUM; Cps. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-6L)**NIZOTIN® 150 mg; NIZOTIN® 300 mg** SICOMED SA; Cps. 150 mg, 300 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 3 blist. × 9 cps. (P-6L)

Ind: Trat. ulcerului duodenal și gastric benign activ, pentru o perioadă de 4-8 săpt. Terapia de întreținere în ulcerul duodenal cronic, după vindecarea ulcerului duodenal activ. Înainte de adm. trat. trebuie exclusă posibilitatea ulcerărilor gastrice maligne. Trat. esofagitei diagnosticate endoscopic, inclusiv a esofagitei erozive și ulcerative și asociată cu pirozis datorat refluxului gastroesofagian pe o perioadă de 12 săpt. Diminuează pirozis-ul prezent la pacienții cu reflux gastroesofagian după prima zi de trat. Nizatidina adm. inj. este indicată, ca o alternativă de scurtă durată, pentru pacienții spitalizați aflați în imposibilitate de a primi medicație pe cale orală.

Dz: Terapeutic 300 mg/zi; profilactic 150 mg/zi. *Dozaj în IR moderată și severă:* Ulcer duodenal activ și ulcer gastric benign activ sau reflux gastro-esofagian: Cl creatinină 20-25 ml/min - 150 mg/zi; Cl creatinină < 20 ml/min - 150 mg odată la 2 zile. Pacienți cu reflux gastro-esofagian, pentru care sunt necesare doze mai mari: Cl creatinină 20-25 ml/min - 150 mg de 2 ori/zi; Cl creatinină < 20 ml/min - 150 mg/zi. *Terapie de întreținere:* Cl creatinină 20-50 ml/min - 150 mg o dată la 2 zile; Cl creatinină < 20 ml/min - 150 mg la 3 zile. Ajustarea dozei i.v.: Ulcer duodenal activ sau gastric benign activ: Cl creatinină 20-50 ml/min - 120-150 mg/zi; Cl creatinină < 20 ml/min - 75 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la nizatidină sau la alți antagoniști de receptori histaminici H2. Sarcină și alăptare.

Al: Răspunsul simptomatic la terapia cu nizatidină nu exclude existența unei formațiuni gastrice maligne. Prudență în IR sau IH.

RA: Rareori reacții de hipersensibilitate sau de șoc anafilactic. Cazuri rare de leziuni hepatice colestatice și/sau la nivel hepatocelular, reversibile la încetarea trat. Ocazional anemie, urticarie, dureri de cap, amețală și transpirații.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

MOLGRAMOSTIMUM
MOLSIDOMINUM
MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03DB04**LUTENYL®** LAB. THERAMEX; Cpr. 5 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Corectează tulburările ginecologice determinate de insuficiența luteală - cicluri neregulate, amenoree secundară, menometroragii, hemoragii uterine funcționale (perimenopauză), sindrom premenstrual, dismenoree, mastodinie, hiperplazie endometrială, trat. menopauzei instalate (în asociere cu estrogeni).

Dz: 5 mg/zi timp de 10 zile pe ciclu (din ziua a 16-a până în ziua a 25-a inclusiv).

Cind: Primul trimestru de sarcină, antecedente tromboflebitice, alterări grave ale funcției hepatice.

Al: Pentru tratarea dismenoreei, hemoragiilor uterine, amenoreei este necesar să fie dovedit caracterul funcțional al acestor tulburări. Există riscuri tromboembolice. Trebuie întreruptă adm. produsului în caz de tulburări oculare așa cum ar fi pierderea unilaterală a vederii, diplopie, leziuni vasculare retiniene, accidente tromboembolice venoase sau trombotice simple, cefalee importantă. Prudență la bolnavii cu antecedente de infarct miocardic sau boli cerebrovasculare, HTA și diabet zaharat. Alăptare.

RA: Modificarea menstruației, amenoree, sângerări intercurrente; excepțional: creștere în greutate, insomnie, pilozitate, tulburări gastrointestinale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MOLSIDOMINUM
 MOMETASONUM
 MONTELUKASTUM
 MORNIFLUMATUM
 MORPHYNUM
 MOXIFLOXACINUM
 MOXONIDINUM
 MUPIROCIUM
 MYCOPHENOLATUM
 NADROPARINUM
 NAFTIDROFURYLUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
 NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM

Cod ATC: J01MA06, S01AX12**EPINOR** E.I.P.I.C.O.; Cpr. film. 400 mg; ct. × 2 blist. × 7 cpr. (P-RF)**FLUSEMINAL** ANFARM HELLAS; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (P-RF)**GRENIS** GENEPHARM SA; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (P-RF)**H-NORFLOXACIN 400 mg** AC HELCOR SRL; Cpr. film. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**NOLICIN®** KRKA; Cpr. film. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**NORFLOX** CIPLA; Sol. oft./auric. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)**NORFLOX-400** CIPLA; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)**NORFLOXACIN** ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (P-RF)**NORFLOXACIN 400 mg** LAROPHARM SRL; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)**NORFLOXACINĂ-400** ARENA GROUP SA; Cps. 400 mg; ct. × 1 fl. × 10 sau 1000 cps. (S/P-RF)**NORFLOXACINĂ LPH® 400 mg** LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 400 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Trat. infecțiilor cu tulpini bacteriene sensibile la norfloxacină: infecții complicate și necomplicate ale aparatului urinar; gastroenterită; infecție gonococică endocervicală și uretrală; prostatită.

Dz: *Adulți:* uretrită gonococică 800 mg în priză unică. În prostatită uzual 400 mg la 12 ore, timp de 28 zile. În infecțiile necomplicate ale aparatului urinar câte 400 mg la 12 ore, timp de 3 zile. În cazul infecțiilor complicate ale aparatului urinar câte 400 mg la 12 ore, timp de 10-21 zile. În gastroenterita bacteriană câte 400 mg la 8-12 ore, timp de 5 zile. În caz de IR, pentru un Cl creatinină < 30 ml/min - 400 mg o dată/zi. Se adm. pe stomacul gol (cu o oră înainte sau cu 2 ore după masă).

Cind: Hipersensibilitate la norfloxacină sau la un alt chimioterapic din grupa chinolonelor sau la oricare dintre componentii produsului; tendinopatie provocată de fluorochinolone în antecedente. Copii. Sarcină. Alăptare.

Al: La doze mari (1200 și 1600 mg) și în caz de urină alcalină (pH > 7) s-a observat cristalurie. Cu toate că după dozele uzuale (câte 400 mg de 2 ori/zi la adult) nu s-a observat cristalurie, trebuie asigurată o hidratare adecvată, pentru menținerea unui debit urinar de 1200-1500 ml/zi. Precauție la pacienții cu accident vascular și boală cerebrovasculară gravă în antecedente. În timpul trat. pot să apară foarte rar tendinite, care pot evolua spre ruptură de tendon, îndeosebi a celui achilian. Apariția lor impune oprirea adm. produsului și instituirea unui trat. adecvat. Evitarea expunerii la soare sau la UV. În timpul trat. de lungă durată și/sau în cazul infecțiilor nozocomiale se pot selecta tulpini rezistente, în special dintre *Staphylococcus* și *Pseudomonas*. Prudență la pacienții cu miastenienă gravis, la cei cu antecedente de convulsii sau în cazul prezenței factorilor care predispun la apariția convulsiilor.

RA: Arsuri retrosternale, dureri și crampe abdominale, greață, diaree, anorexie, colită pseudomembranoasă, pancreatită (rar); rash, prurit, fotosensibilizare, purpură vasculară, dermatită exfoliativă, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, foarte rar sindrom Lyell; mialgii și/sau artralгии, rar tendinită în special achiliană, care poate să

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

MOMETASONUM
MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLYUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A07AA02

NISTATINĂ ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 500000 U.I.; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
STAMICIN® 500 000 U.I. ZENTIVA ROMANIA; Cpr. film. 500 000 U.I.; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)

Ind: Tratamentul candidozelor digestive cu excepția candidozei esofagiene la imunodeprimați, pentru tratamentul candidozei vaginale și cutanate precum și pentru combaterea candidozei intestinale asociate, pentru profilaxia candidozei la grupele cu risc crescut: prematuri imunodeprimați în special în cazul administrării antibioticelor cu spectru larg sau metronidazol, pacienți tratați cu chimioterapice antineoplazice sau corticosteroizi timp îndelungat.

Dz: Pentru tratamentul *candidozelor digestive* sunt uzual recomandate următoarele doze. *Adulți:* 4000000-6000000 u.i. pe zi, fracționat în 3-4 prize. *Copii peste 6 ani:* 1000000-4000000 u.i. pe zi, fracționat în 3-4 prize. Se recomandă administrarea produsului între mese, evitându-se asocierea cu alimente. Tratamentul se continuă cel puțin 24 de ore după vindecarea clinică. În cazul candidozei bucofaringiene se recomandă sfărâmarea comprimatelor înaintea înghițirii lor și menținerea în cavitatea bucală cât mai mult timp pentru realizarea unui contact direct și prelungit cu leziunile. Pentru tratamentul *candidozelor cutaneo-mucoase* uzual sunt indicate 2-3 aplicații pe zi folosind unguente sau suspensii conținând 100000 u.i./g.

Cind: Hipersensibilitate la nistatină și la alte antifungice polienice sau la oricare dintre componentii produsului.

Al: După stabilirea diagnosticului de certitudine este necesară identificarea și înlăturarea factorilor favorizanți pentru prevenirea recidivelor. *Sarcină și alăptare:* Nistatina se administrează în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar. Nu se cunoaște dacă nistatina se excretă în laptele matern. Deoarece practic nu se absoarbe din tractul digestiv, nistatina se poate administra în timpul alăptării, cu precauție însă, datorită posibilității apariției efectelor adverse la sugar (diaree etc.).

RA: Administrată local, tegumentar, nistatina este foarte bine suportată. În cazul administrării orale medicamentul poate produce uneori grețuri, vomă, diaree (la dozele mari), rareori reacții alergice (la nistatină sau la candidina eliberată prin distrugerea ciupercii).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V03AB13

MONTELUKASTUM
MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM

TOXOGONIN® MERCK KGaA; Sol. inj. 250 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (S)

Ind: Intoxicații cu compuși organofosforici.

Dz: Inițial atropină: 2-5 mg i.v. la 5-15 min. La *copii* - doză unică: 1-3 mg. După atropinizare se adm. i.v. 250 mg obidoximă, cu repetiție o dată sau de 2 ori la 2 ore. Nu se va adm. obidoxima mai târziu de 6 ore de la intoxicație. La *copii* - doze unice de 4-8 mg/kg.

Cind: Intoxicații cu insecticide carbamice.

Al: Miastenia gravă (poate precipita criza). Trat. se va face întotdeauna sub protecție cu atropină.

RA: Senzație de tensiune și căldură la nivelul capului, după injecția i.m. Senzație de răceală a nasofaringelui, după inhalare și la nivelul pielii după atingere. Posibil amețeli, somnolență, tulburări de vedere, cefalee, greață, tahicardie, HTA, hiperventilație, parestezii, slăbiciune musculară; injectarea prea rapidă poate induce laringospasm și rigiditate musculară.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

MORNIFLUMATUM
MORPHYNUM
MOXIFLOXACINUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLYUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H01CB02**SANDOSTATIN®** NOVARTIS PHARMA; Sol. inj. 0,1 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (**S/P-RF**)**SANDOSTATIN LAR 10 mg; SANDOSTATIN LAR 20 mg; SANDOSTATIN LAR 30 mg** NOVARTIS PHARMA; Pulb. + solv. pt. sol. inj. (i.m.) cu elib. prel. 10 mg, 20 mg, 30 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 seringă preumplută × 2,5 ml solv. + 2 ace (**S/P-RF**)

Ind: Acromegalie. Ameliorarea simptomelor asociate cu tumorile endocrine gastroenteropancreatice: tumori carcinoidice cu sindrom carcinoid; glucagonoame; gastrinoame, sindrom Zollinger-Ellison, în asociere cu anti H2 cu sau fără antiacide; HTA.

Dz: Acromegalie: Inițial 0,05-0,1 mg, sc la 8-12 ore. Dozarea va fi în funcție de nivelului GH și de simptomele clinice și toleranță. Doza zilnică optimă: 0,2-0,3 mg; doza max. 1,5 mg/zi. Dacă în decurs de 3 luni nu se obțin scăderi semnificative ale GH și nici o ameliorare a simptomelor, se întrerupe trat. *Tumori endocrine gastroenteropancreatice:* Inițial 0,05 mg 1-2 ori pe zi sc; doza poate fi crescută treptat până la 0,1-0,2 mg de trei ori pe zi. Dozele de întreținere trebuie ajustate individual.

Cind: Hipersensibilitate la medicament. Sarcină și alăptare.

Al: Arsură, usturime la locul inj.; Anorexie, greață, diaree, meteorism. Apariția calculilor biliari, colestază.

RA: Reacțiile locale: durere, senzație de înțepătură, usturime și arsură la locul inj., cu hiperemie și edem. Efectele secundare gastrointestinale: disconfort abdominal, anorexie, greață, vomă, crampe abdominale, balonare abdominală, flatulență, scaune moi, diaree și steatoree. Adm. prelungită poate duce la formarea de calculi biliari. Rar, la adm. cronică, poate apărea hiperglicemie persistentă. Adm. i.v. prea rapidă poate determina flush și bradicardie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

INFO

Cauta descriere

DCI

DESCRIERE

INFO

MOXIFLOXACINUM
 MOXONIDINUM
 MUPIROCINUM
 MYCOPHENOLATUM
 NADROPARINUM
 NAFTIDROFURYLUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
 NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM

Cod ATC: N05AH03

ZYPREXA ELI LILLY; Cpr. film. 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg; ct. × 4 sau 8 blist. × 7 cpr. (P-RF)

ZYPREXA ELI LILLY; Pulb. pt. sol. inj. 10 mg; ct. × 1 fl. × 10 mg (S/P-RF)

ZYPREXA VELOTAB 5 mg; ZYPREXA VELOTAB 10 mg; ZYPREXA VELOTAB 15 mg; ZYPREXA VELOTAB 20 mg ELI LILLY;
Cpr. orodispersabile 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg; ct. × 8 blist. × 7 cpr. (P-RF)

Ind: Schizofrenie - trat. de întreținere la pacienții care au răspuns la trat. inițial. Trat. episoadelor maniacale moderate - severe. Prevenirea recurențelor la pacienții cu tulburare bipolară.

Dz: Schizofrenie. Prevenirea recurențelor în tulb. bipolară: doza inițială zilnică unică de 10 mg/zi, indiferent de orarul meselor. Episoade maniacale: Doza inițială este de 15 mg ca doză zilnică unică în monoterapie sau 10 mg pe zi în terapia asociată. Ulterior, ajustare pe baza răspunsului clinic 5-20 mg/zi. Doză inițială mai mică (5 mg/zi) la peste 65 de ani, sex feminin, nefumători, IH.

Cind: Hipersensibilitate la oricare din ingredientele produsului; glaucom cu unghi îngust. Alăptare. *oferi și activități de precizie.

Al: Hipertrofie de prostată sau ileus paraltic; ALT și/sau AST crescute, IH, trat. asociat cu medicamente cu potențial de hepatotoxicitate; scăderi ale leucocitelor și/sau neutrofilelor, hipereozinofilie, depresia măduvei osoase cauzată de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie, afecțiuni mieloproliferative, istoric de convulsii. Se întrerupe în caz de sindrom neuroleptic malign. Dacă apar semne de diskinezie tardivă, trebuie redusă doza. Asociere cu prudență cu alte medicamente cu acțiune centrală, cu alcool, sau cu substanțe care măresc intervalul QT, în special la vârstnici. HTA posturală rară. Sarcină. Copii sub 18 ani.

RA: Frecvente: somnolență și creștere în greutate. Ocazionale: amețală, apetit crescut, edeme periferice, hTA ortostatică și efecte anticolinergice tranzitorii, ușoare, creșteri asimptomatice ale transaminazelor hepatice. Rar: fotosensibilizare, ginecomastie, galactoree, mărirea sânilor; variații hematologice asimptomatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM

Cod ATC: S01GX09**OPATANOL®** ALCON; Sol. oft. 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (*P-RF*)**Ind:** Conjunctivite alergice.**Dz:** Adult și copil peste 3 ani: 1 picătură × 2 ori/zi. Durata maximă de trat. 4 luni.**Cind:** Hipersensibilitate la olopatadină sau la excipienții produsului.**RA:** Iritații, keratite, edem local, fotofobie, senzație de ochi sau nas uscat, cefalee, astenie, amețeală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A02BC01

MUPIROCINUM
MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM

EPIRAZOLE E.I.P.I.C.O.; Cps. enter. 20 mg; ct. × 1 fl. × 16 cps. (P-6L)
GLAVERAL HELP PHARMACEUTICALS Ltd.; Cps. enter. 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. (P-6L)
HELICID 20 ZENTIVA SA; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps sau 28 cps (P-6L)
HELICID 40 INF ZENTIVA SA; Liof pt. sol. perf. 40 mg; ct. × 1 fl. (S)
LOSEC ASTRAZENECA; Pulb. liof. pt. sol. inj. 40 mg; ct. × 5 fl. (P-RF)
LOSEC® MUPS ASTRAZENECA; Cpr. film. gastroz. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 1 fl. × 14 cpr. (10 mg), ct. × 1 fl. × 7 cpr. (20 mg, 40 mg) (P-6L)
ODASOL GENEPHARM SA; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. (P-6L)
OMEDAR® DAR AL DAWA; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. (P-6L)
OMEPRAZOL LPH® 20 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-6L)
OMEPRAZOL ANTIBIOTICE/LAB. BELMAC; Cps. enter. 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-6L)
OMEPRAZOL 20 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cps. (P-6L)
OMEPRAZOL LYKA LABS Ltd.; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. (P-6L)
OMEPRAZOL 20 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 1 fl. × 14 cps. (P-6L)
OMERAN EUROPHARM SA; Cps. enter. 20 mg; ct. × 2 sau 50 blist. × 10 cps. (S/P-6L)
OMEZ DR. REDDY'S LAB. Ltd.; Cps. enter. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
ORTANOL® LEK PHARMACEUTICALS; Cps. gastroz. 20 mg, 40 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 7 cps. (P-6L)
ORTANOL® S LEK PHARMACEUTICALS; Cps. gastroz. 10 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 7 cps. (P-6L)
RISEK GULF PHARM.; Cps. enter. 20 mg; ct. × 1 fl. × 10 sau 14 cps. (P-6L)
ULTOP KRKA; Cps. enter. 20 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. (P-6L)
ULZOL PLIVA; Cps. gastroz. 20 mg; ct. × 2 blist. × 7 cps. (P-6L)

Ind: Ulcer duodenal, gastric sau eroziuni gastro-duodenale asociate trat. cu AINS; eradicare *Helicobacter pylori* în ulcerul peptic; reflux gastro-esofagian simptomatic; dispepsie asociată hipersecreției acide; sindrom Zollinger-Ellison; pacienți cu risc de aspirație a conținutului gastric în timpul anesteziei generale.

Dz: Cps. enter. se înghit întregi, o dată pe zi, dimineața, împreună cu lichid. *Ulcer duodenal:* 20 mg 2-4 săptăm. În caz de răspuns terapeutic slab - 40 mg, 4 săptăm. Pentru prevenirea recăderii 10 mg. La nevoie, se crește la 20-40 mg. *Ulcer gastric:* 20 mg, 4-8 săptăm. În caz de răspuns terapeutic slab - 40 mg, 8 săptăm. Pentru prevenirea recăderii - 20 mg. La nevoie, se crește la 40 mg. *Ulcer gastric, duodenal sau eroziuni gastro-duodenale asociate trat. cu AINS:* 20 mg, 4-8 săptăm. Pentru prevenirea apariției se dau 20 mg. *Eradicarea Helicobacter pylori - Triplă terapie:* Omeprazol (O) 20 mg, amoxicilină (A) 1 g și claritromicină (C) 500 mg, de 2 ori/zi, 1 săptăm.; sau O: 20 mg, C: 250 mg și metronidazol 400 mg (sau tinidazol 500 mg), de 2 ori/zi, 1 săptăm.; sau O: 40 mg o dată/zi asociat cu A: 500 mg și metronidazol 400 mg ambele adm. de 3 ori/zi 1 săptăm. *Dublă terapie:* O: 40 mg de 1-2 ori/zi asociat cu A: 1,5 g/zi sau cu C: 500 mg de 3 ori/zi 2 săptăm. *Esofagita de reflux:* 20 mg o dată pe zi 4-8 săptăm. În esofagita de reflux

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

MYCOPHENOLATUM
NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: A04AA01](#)

DANOFRAN T3A 4 mg; DANOFRAN T3A 8 mg T3A PHARMA GROUP; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1 f. × 2 sau 4 ml (S/P-RF)

EMESET 4 mg/2 ml; EMESET 8 mg/4 ml CIPLA; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 sau 4 ml (S/P-RF)

OSETRON DR. REDDY'S LAB. Ltd.; Cpr. film. 4 mg, 8 mg; ct. × 10 cpr. (P-RF)

OSETRON DR. REDDY'S LAB. Ltd.; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 sau 4 ml (S/P-RF)

ZOFRAN® GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 4 mg, 8 mg; ct. × 6 sau 10 cpr. (P-RF)

ZOFRAN® GLAXO SMITHKLINE; Sol. parent. 2 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 sau 4 ml (S/P-RF)

Ind: Grețuri și vărsături produse de citostatice și radioterapie sau postoperatorii.

Dz: Greață și vărsături produse de citostatice și radioterapie. **Adulți:** 8 mg/zi adm. i.v. sau i.m. lent, înaintea chimio- sau radioterapiei. Pentru protejarea față de efectul emetic întârziat sau prelungit (după 24 de ore) se dă oral. Dozele între 8-32 mg se adm. în perf. i.v., diluată în 50-100 ml sol. salină izotonă adm. în cel puțin 15 min. Alternativ, se pot da 8 mg înaintea chimioterapiei, în inj. lentă i.v. sau i.m., urmată de 2 doze de 8 mg inj. i.v. sau i.m. la intervale de 2-4 ore sau în perf. continuă, 1 mg/oră, timp de până la 24 ore. Se poate asocia un glucocorticoid inj. i.v. înaintea chimioterapicului. **Copii:** doză unică i.v. de 5 mg/m² înaintea chimioterapiei. Se continuă adm. 5 zile după terminarea curei de citostatice. **Pentru prevenirea și trat. grețurilor și vărsăturilor post-operatorii. Adulți:** 4 mg inj. i.m. sau i.v. lent, în faza de inducție a anesteziei și postoperator. **Copii:** i.v. lent 0,1 mg/kg, maxim 4 mg, înainte sau după inducția anesteziei.

Cind: Hipersensibilitate la ondansetron sau la oricare dintre componentii produsului. Sarcină și alăptare.

Al: Pacienți cu afecțiuni hepatice: doza maximă 8 mg/zi. Hipersensibilitate la tropisetronă și alte antiserotonice. În caz de obstrucție intestinală subacută.

RA: Frecvent cefalee, bufeuri, sughiț; ocazional creșteri asimptomatice ale transaminazelor; constipație; reacții de hipersensibilitate, chiar șoc anafilactic; tulburări vizuale tranzitorii și amețeli la adm. rapidă; reacții extrapiramidale, distonii, convulsii; dureri anginoase, aritmii, bradicardie, hTA; reacții locale la nivelul inj. i.v.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NADROPARINUM
NAFTIDROFURYLUM
NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM

Cod ATC: A08AB01

XENICAL® HOFFMANN LA ROCHE; Cps. 120 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 21 cps. *(P-RF)*

Ind: Trat. obezității (se asociază cu un regim moderat hipocaloric).

Dz: 120 mg la cele trei mese principale ale zilei, înainte, în timpul sau până la o oră după masă. Trat. poate dura maxim 2 ani.

Cind: Sindrom de malabsorbție cronică, colestază, alergie la orlistat sau oricare dintre componentele preparatului. Copii. Sarcină și alăptare.

Al: Scăderea greutateii poate necesita modificarea dozelor medicamentelor folosite pentru alte afecțiuni. Steatoree.

RA: Incontință a fecalelor, flatulență, scaune grase sau uleioase.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NAFTIDROFURYLUM
 NAFTIFINUM
 NALORPHINUM
 NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
 NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM

Cod ATC: J01XD03

TIBERAL HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. **(P-RF)**

Ind: Trichomoniază; amibiază intestinală și extraintestinală (în special abcesul amibian al ficatului); lambliază.

Dz: Trichomoniază (formă acută), doză unică: 3 cpr. seara. Trichomoniază (formă cronică), 5 zile, câte 1 cpr. dimineața și seara, după mese. Pentru evitarea reinfestării, partenerul trebuie supus aceluiași trat. La copii, 25 mg/kg/zi. Amibiază și lambliază: 5-10 zile câte un cpr. dimineața și seara (după mese); copii până la un an: 1/4 cpr. × 2/zi; de la 1 la 6 ani: 1/2 cpr. × 2/zi; de la 7 la 12 ani: 3/4 cpr. × 2/zi dimineața și seara, după mese. În cazuri grave dozele zilnice pot fi crescute și chiar dublate.

Cind: Afecțiuni neurologice și hipersensibilitate față de acest medicament. Primele luni de sarcină.

RA: Vertij, cefalee și tulburări gastrointestinale; rar reacții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NAFTIFINUM
NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM

[Cod ATC: J05AH02](#)

TAMIFLU® 12 mg/ml HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. pt. susp. orală 12 mg/ml; ct. × 1 fl. × 30 g pulb. pt. susp. orală (*P-RF*)

TAMIFLU® 75 mg HOFFMANN LA ROCHE; Cps. 75 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (*P-RF*)

Ind: Prevenția și tratamentul gripei. Se poate utiliza concomitent cu paracetamol, acid acetilsalicilic, ibuprofen. Nu modifică eficiența vaccinului anti-gripal.

Dz: Cps.: Pentru tratarea gripei se administrează o capsulă cât de repede după prescripție și apoi câte o capsulă de două ori pe zi (de obicei una dimineața și una seara timp de 5 zile). Este important ca acest ciclu de 5 zile să fie complet. Prevenția gripei: o doză dimineața la micul dejun (o dată pe zi). Capsulele se înghit întregi, cu apă.

Pulb. pt. susp. orală: Copii cu vârsta 1-3 ani: prescrierea se face în funcție de greutatea corporală: greutate mai mică sau egală cu 15 kg, 30 mg de două ori pe zi (timp de 5 zile); greutate mai mult de 15 kg și până la 23 kg, 45 mg de două ori pe zi (timp de 5 zile); greutate mai mare de 23 kg și până la 40 kg, 60 mg de două ori pe zi (timp de 5 zile); greutate mai mult de 40 kg, 75 mg zilnic (timp de 5 zile). *Copii cu vârsta de 13 ani și mai mare:* pentru tratament: 75 mg de două ori pe zi timp de cinci zile; pentru prevenție: 75 mg o dată pe zi. O doză de 75 mg necesită administrarea de două doze de suspensie orală: una de 30 mg și una de 45 mg.

Cind: Alergie la oseltamivir sau la oricare dintre excipienți.

Al: Alergie la alte medicamente, tratament cu alte medicamente concomitent, inclusiv cele cumpărate fără prescripție (excepție: paracetamol, ibuprofen sau acid acetilsalicilic), afecțiuni renale, intoleranță ereditară la fructoză. Acest medicament conține sorbitol, care este o formă de fructoză. Medicul trebuie atenționat în caz de sarcină sau alăptare.

RA: Cele mai obișnuite sunt greața, vărsăturile și durerile de stomac. Aceste efecte adverse apar mai ales după prima doză de medicament și de obicei dispar pe măsura continuării tratamentului. Frecvența acestor efecte adverse este redusă dacă medicamentul va fi luat odată cu alimentele. Efectele adverse mai puțin frecvente la copii cu vârsta între 1 și 12 ani care pot fi cauzate și de gripă, sunt diareea, inflamația urechii, inflamarea plămânilor, sinuzita, bronșita, agravarea astmului pre-existent, sângerări ale nasului, tulburări la nivelul urechilor, inflamarea pielii, inflamarea ganglionilor limfatici și conjunctivita. Mai puțin frecvente la adulți și adolescenți (copii cu vârsta de 13 ani și mai mare): greață, diaree, bronșită, amețeală, stare de oboseală, dureri de cap și tulburări de somn. Trebuie informat medicul dacă adultul sau copilul se simt frecvent rău sau dacă simptomele gripei se accentuează și starea febrilă continuă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NALORPHINUM
NANDROLONUM
NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM

Cod ATC: A03AB06**SPASMOMEN** BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. film. 40 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. film. **(P-6L)****Ind:** Afecțiuni spastice ale tractului gastrointestinal: sindrom de colon iritabil, gastrită, gastroduodenită, enterită, esofagită. Preparat înaintea investigației endoscopice.**Dz:** 40 mg de 2-3 ori/zi.**Cind:** Hipersensibilitate cunoscută la medicament.**Al:** Glaucom, hipertrofie de prostată, stenoză pilorică. Sarcină și alăptare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01CF04

NANDROLONUM
 NAPHAZOLINUM
 NAPROXENUM
 NARATRIPTANUM
 NATAMYCINUM
 NATRII AMIDOTRIZOAS
 NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM

OXACILINĂ ANTIBIOTICE SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (P-RF/S)

OXACILINĂ EUROPHARM SA; Cps. 250 mg; ct. × 1 blist. × 12 cps. (P-RF)

OXACILINĂ FORTE FARMEX COMPANY; Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)

OXACILINĂ ARENA GROUP SA; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (250 mg), ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (500 mg) (P-RF)

OXACILINĂ 250 mg; OXACILINĂ FORTE 500 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps., respectiv ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)

OXACILINĂ; OXACILINĂ FORTE LEK PHARMATECH; Cps. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (250 mg); ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (500 mg) (S/P-RF)

OXACILINĂ FORTE MARK PHARMACEUTICS; Cps. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)

OXACILINĂ ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 250 mg, 500 mg, 1 g; ct. × 50 sau 100 fl. (S/P-RF)

OXALIN EUROPHARM SA; Cps. 500 mg; ct. × 2 blist. × 6 cps. (P-RF)

Ind: Infecții provocate de germeni sensibili la oxacilină: ale aparatului respirator; ORL; cutanate; osoase. Septicemii și endocardite, în continuarea trat. parenteral.

Dz: Oral: *Adulți:* 500-1000 mg la 6 ore. *Copii:* 50-100 mg/kg/zi, fracționat, la 6 ore. Se adm. cu ½ oră înainte de masă. Parenteral: inj. i.m. sau i.v. 1 g la 12 ore. Maxim 12 g/zi. *Copii:* 50 mg/kg/zi fracționat în 4 prize. În infecții grave se poate crește până la 300 mg/kg/zi.

Cind: Alergie la oxacilină, la alte peniciline sau la oricare dintre componentii produsului.

Al: Anamneză atentă înaintea începerii trat. Risc de alergie încrucișată cu cefalosporinele. La nou-născuți risc de hiperbilirubinemie, chiar icter nuclear. Sarcină și alăptare.

RA: Relativ frecvent reacții alergice: febră, urticarie, eozinofilie, edem Quincke. Ocazional tulburări digestive: greață, vărsături, diaree. Rareori, enterocolită pseudomembranoasă, nefropatie interstițială acută imunoalergică, anemie, leucopenie și trombocitopenie reversibile, creșteri moderate ale valorilor serice ale transaminazelor. Foarte rar șoc anafilactic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

NAPHAZOLINUM
NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01XA03

ELOXATIN® 5 mg/ml SANOFI~SYNTHELABO; Pulb. pt. sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 1 fl. de 36 ml × 50 g, ct. × 1 fl. de 50 ml × 100 g (S)

Ind: Trat. de primă linie al cancerului colorectal metastazat (asociat cu 5-fluorouracil și acid folinic).

Dz: Numai la adulți - 85 mg/m² perf. i.v., în timp de 2-6 ore, repetat la 2 săpt. Perfuzia de oxaliplatină o va preceda întotdeauna pe cea de 5-fluorouracil. În cazul unei extravazări, adm. se întrerupe imediat.

Cind: Hipersensibilitate la oxaliplatină, mielosupresie anterioară primei cure de trat., neuropatie senzitivă cu deficit funcțional, IR severă. Sarcină. Alăptare.

Al: Adm. numai sub supraveghere medicală. Afectarea funcției renale. Manifestări alergice la alți compuși ai platinei. Monitorizarea neurotoxicității, în special în cazul asocierii cu alte med. neurotoxice, cu reducerea dozajului de la 85 la 65 mg/m². În caz de diaree gravă sau neutropenie (neutrofile < 1,5 × 10⁹/l/mm) sau trombocitopenie (trombocite < 50 × 10⁹/l), în afara reducerii dozei uzuale de 5-fluorouracil, este necesară și reducerea cu 25% a dozei de oxaliplatină. Hemograma se va repeta înaintea fiecărei noi cure.

RA: În monoterapie (130 mg/m², la 3 săpt.) are o toxicitate hematologică redusă. Asociat cu 5-fluorouracil și acid folinic crește incidența apariției neutropeniei și trombocitopeniei. Greață, vărsături și diaree puțin severe. Creșterea enzimelor hepatice. Toxicitate neurologică frecventă: neuropatie periferică senzitivă cu disestezie și/sau parestezie a extremităților. Apariția durerilor și/sau a deficitului funcțional necesită scăderea dozei sau chiar întreruperea trat. Disestezie laringofaringiană acută în timpul perfuziei, accentuată de frig, dar ușor reversibilă. Rar reacții alergice. Foarte rar ototoxicitate, scăderea acuității vizuale, anomalii ale funcției renale, alopecie, inflamații locale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AE12

NAPROXENUM
NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM

DAYRUN® CSC PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 600 mg; ct. × 1, 3 sau 6 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

Ind: Artrită reumatoidă, osteoartrită, spondilită anchilopoietică, afecțiuni musculo-articulare, cum ar fi "umărul dureros acut", puseu acut de gută.

Dz: Doza zilnică recomandată este de 1200 mg oxaprozină, o dată pe zi. Uneori poate fi necesară administrarea a 1800 mg, în două prize, 1200 mg dimineața și 600 mg seara.

Cind: Hipersensibilitate la oxaprozină, antecedente de hipersensibilitate la acid acetilsalicilic sau la alte AINS, ulcer gastro-duodenal, sarcină și alăptare, copii sub 16 ani.

Al: Trebuie evaluat raportul risc/beneficiu în caz de: antecedente de ulcere și hemoragii gastro-intestinale, insuficiență renală, pacienți cu tulburări de coagulare, afecțiuni hepatice, hipertensiune arterială și/sau obezitate, astm bronșic.

RA: Hipersensibilitate. Tulburări digestive: dureri abdominale, constipație sau diaree, greață, vărsături, ulcer gastro-duodenal și/sau hemoragii gastro-duodenale. Tulburări sanguine: anemie, trombocitopenie, leucopenie. Tulburări cardio-vasculare: edeme, variații ale tensiunii arteriale, angină pectorală, flushing facial. Tulburări musculoscheletice: dureri de spate, artralгии. Tulburări respiratorii: tuse, dispnee. Tulburări renale: nefrită interstițială acută, disurie, hematurie, insuficiență renală. Tulburări nervoase: anxietate, somnolență sau confuzie, tulburări ale somnului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NARATRIPTANUM
NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM

Cod ATC: N03AF02

TRILEPTAL® 150 mg; TRILEPTAL® 300 mg; TRILEPTAL® 600 mg NOVARTIS PHARMA; Cpr. film. 150 mg, 300 mg, 600 mg; ct. × 3, 5, 10, 20 sau 50 blist. × 10 cpr. (P-6L/S)

Ind: Tratamentul crizelor epileptice parțiale însoțite sau nu de convulsii tonico- clonice generalizate secundar.

Dz: *Adulți* - Inițial, 8-10 mg/kg/zi, în două prize. Doza poate fi mărită treptat, cu 600 mg/săptămână. Efectele terapeutice sunt observate la doze între 600 mg/zi și 2400 mg/zi. *Copii mai mari de 6 ani* - 8-10 mg/kg/zi, în două prize. Dacă este indicat clinic, doza poate fi marită cu maximum 10 mg/kg/zi, la intervale de aproximativ o săptămână, de la doza de început, până la maxim al dozei de 46 mg/kg/zi, pentru a obține răspunsul clinic dorit.

Cind: Hipersensibilitate la oxcarbazepină sau la oricare dintre excipienți. Sarcină (poate produce malformații fetale grave, de ex. gura de lup) și alăptare.

Al: S-a constatat o scădere a concentrației plasmaticice de sodiu (< 125 mmol/l), de obicei asimptomatice și care nu necesită ajustarea terapiei. Experiența dobândită în urma studiilor clinice arată că natremia revine la valori normale atunci când doza de Trileptal este redusă, tratamentul este întrerupt sau pacientul este supus unor restricții (de exemplu, reducerea cantității de fluide ingerate). Scade eficacitatea contraceptivelor orale. La ingerarea de alcool, se poate potența efectul sedativ.

RA: Foarte frecvente - amețeli, cefalee, somnolență, oboseală, greață, vărsături, diplopie. Frecvente - astenie, agitație, amnezie, apatie, ataxie, tulburări de concentrare, confuzie, depresie, nistagmus, tremor, constipație, diaree, dureri abdominale, acnee, alopecie, rash, hiponatremie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R05DB09

NATAMYCINUM
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMIUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM

PAXELADINE BEAUFOUR IPSEN; Cps. 40 mg; ct. × 1 fl. × 15 cps. (OTC)

PAXELADINE BEAUFOUR IPSEN; Sirop 0,2%; ct. × 1 fl. × 125 ml (OTC)

Ind: Tuse seacă și iritativă de diverse etiologii: gripală, rinofaringită, traheită, laringită, bronhopneumopatie, rujeolă, tuse convulsivă. Tuse spasmodică și reflexă.

Dz: *Adulți:* 2-5 lg/zi. *Copii:* sirop: 1 lg/10 kg/24 ore (până la 4 ani: 1-2 lg/zi, între 4-15 ani: 2-3 lg/zi).

Al: În cazul unei adm. masive, monitorizarea funcției respiratorii și cardiovasculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V03AN

NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM

OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT LINDE GAZ; Gaz; butelie × 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 40 l, 50 l (S)

OXIGEN MEDICINAL LICHID LINDE GAZ; Lichid; ambalaj fix-stocator criogenic (S)

OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ; Gaz; butelie × 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 40 l, 50 l (S)

OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT ARTEGO SA; Gaz; butelie × 40 l (S)

OXIGEN NW 32 MESSER ROMANIA GAZ; Gaz; cisternă criogenică; stocator criogenic (S)

Ind: Iminență de asfixie în: pneumonie, infarct pulmonar și cardiac, emfizem și scleroză pulmonară, astm bronșic, tetanos, EPA, anevrism arteriovenos, uremie, intoxicații cu monoxid de carbon, cianuri, hidrogen sulfurat, nitriți, clorați.

Dz: Dependentă de indicația medicului.

Cind: Adm. în cazul unui pacient aflat sub chimioterapie (în special bleomicină).

Al: Se păstrează în cilindri de oțel, vopsiți în albastru.

RA: Pneumotorax, nevrita optică, sinuzită acută, ruptura traumatică a timpanului, convulsii; explozie și incendiu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NATRII AUROTHIOMALAS
 NATRII CALCII EDETAS
 NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM

Cod ATC: S01HA02

NOVESINE 0,4% NOVARTIS PHARMA; Sol. oft. 0,4%; ct. × 1 fl. × 10 ml (S)

Ind: Anestezia de suprafață a corneei în extracția corpurilor străini corneeni superficiali și profunzi, în tonometrie, gonioscopie și alte examinări cu scop diagnostic, precum și în chirurgia oculară.

Dz: *Anestezia superficială a corneei:* extracția corpurilor străini corneeni superficiali: 3 picături timp de 5 min; extracția corpurilor străini corneeni profunzi: 5-10 picături la 30-60 secunde; tonometrie, gonioscopie: 1-6 picături. *Anestezia locală:* 3 picături în 5 minute. Aplicarea picăturilor trebuie să se limiteze strict la pregătirea intervențiilor chirurgicale oftalmologice sau a examinărilor diagnostice.

Cind: Hipersensibilitate la oxibuprocaină.

Al: Nu este compatibil cu soluția de fluoresceină cu care precipită. Administrare strict sub supraveghere medicală.

RA: Ușoară senzație pasageră de arsură. Rar hiperemie tranzitorie. Aplicarea necontrolată poate produce în scurt timp leziuni ale epiteliului corneean.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NATRII CALCII EDETAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM

Cod ATC: G04BD04**DRIPTANE® 5 mg** LAB. FOURNIER; Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist. × 30 cpr. (P-RF)

Ind: Adulți: senzație imperioasă de urinare la femei, în cazurile de vezică instabilă, cu excepția incontinenței urinare de efort - vezică neurologică spastică. Copii peste 5 ani: Enurezis prin imaturitate vezicală (prezența tulburărilor urinare diurne). Vezică spastică neurogenă.

Dz: Adulți: 5 mg de 2-3 ori/zi. Pentru *vârstnici* *țarați*: 5 mg de 2 ori/zi. Copii peste 5 ani: Vezică neurologică: 5 mg de 2 ori/zi. Enurezis nocturn: 5 mg de 2-3 ori/zi. Ultima doză adm. seara înainte de culcare.

Cind: Glaucom, disurie datorată unui sindrom obstructiv, miastenie severă, dificultăți de formare a jetului urinar datorate adenomului de prostată, boli intestinale (inclusiv obstrucții intestinale și colite), hipertiroidie. Copii sub vârsta de 5 ani. Sarcină, alăptare și perioadă de preconcepție.

Al: Poate fi necesară întreruperea trat. sau ajustarea dozei la copii. *oferi și activități de precizie.

RA: De tip anticolinergic: uscăciunea gurii, constipație, vedere încețoșată, senzație de rău, arsuri gastrice, înroșirea feței (în special la copii) și dificultăți în formarea jetului urinar. Mai rar pot apărea toropeală, amețală, palpitații, piele uscată, senzație de golire incompletă a vezicii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NATRII CHLORIDUM
 NATRII FLUORIDUM
 NATRII HYDROGENI CARBONAS
 NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM

Cod ATC: N02AA05

OXYCONTIN® 10 mg; OXYCONTIN® 20 mg; OXYCONTIN® 40 mg; OXYCONTIN® 80 mg MUNDIPHARMA; Cpr. film. cu elib. modif. 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg; ct. × 1 fl. × 20 sau 56 cpr, ct. × 4 blist. × 14 cpr. **(P-TS)**

Ind: Tratamentul durerilor moderate și severe.

Dz: Comprimatele se înghit întregi, nu se mestecă. *Adulți, vârstnici și copii peste 12 ani:* doza inițială uzuală pentru pacienți cu durere severă și care nu poate fi controlată de opioide ușoare este de 10 mg la fiecare 12 ore. Pentru pacienții care au primit morfină orală înainte de terapie se va res-pecta următoarea schemă echianalgezică: 10 mg de oxicononă orală sunt echivalente cu 20 mg morfină orală. La pacienți cu insuficiență hepatică și renală, doza inițială va fi administrată cu prudență. *Copii sub 12 ani:* nu se recomandă.

Cind: Depresie respiratorie, traumatisme craniene, ileus paraltic, abdomen acut, evacuare gastrică întârziată, obstrucții respiratorii severe, astm bronșic, hipercarbie, sensibilitate la oxicononă, boli hepatice acute sau insuficiență hepatică, insuficiență renală, tratament concomitent cu IMAO sau mai puțin de 2 săptămâni de la întreruperea lui. Nu se recomandă administrarea preoperator sau în primele 24 de ore postoperator.

Al: Se reduce doza în hipotiroidism. Precauții în utilizarea la pacienți dependenți de opioide, cu presiune intracraniană crescută, hipotensiune, hipovolemie, boli ale tractului biliar, pancreatită, boli inflamatorii intestinale, hipertrofie a prostatei, insuficiență adrenocorticală, alcoolism acut, boli renale sau hepatice cronice, pacienți tratați. Nu se administrează la pacienți cu ileus paraltic, iar dacă acesta apare în cursul tratamentului se va întrerupe imediat administrarea. Nu se administrează cu 24 ore înaintea unei intervenții chirurgicale. Se utilizează cu precauție după intervenții chirurgicale pe abdomen. Interacțiuni cu: tranchilizante, sedative, anestezice, hipnotice, alcool, relaxante musculare și antihipertensive, IMAO, cimetidină. Nu se recomandă administrarea în sarcină și la femei care alăptează. Poate afecta capacitatea de a conduce și de a mânui utilaje.

RA: Reacții adverse comune: constipație, greață, amețeală, vărsături, cefalee, uscăciunea gurii, transpirație, astenie, urticarie, prurit. Pot apărea toleranță și dependență (toleranța este minimală). La unii pacienți pot apărea: vertij, dezorientare, schimbări de dispoziție, palpitații, halucinații, bronhospasm și colici, disurie, spasme ureterale sau biliare. Foarte rar s-a observat hipotensiune sau bradicardie relevantă.

Intoxicația se manifestă prin: pupile punctiforme, depresie respiratorie și hipotensiune. În cazuri severe, pot apărea colaps circulator și comă profundă. Tratament în supradozarea masivă: naloxonă 0,8 mg intravenos. Se repetă la intervale de 2-3 minute, dacă este necesar, sau în perfuzie - 2 mg la 500 ml de soluție salină sau 5% dextroză (0,004 mg/ml). Supradozare mai puțin severă: naloxonă 0,2 mg intravenos urmată de creșteri de 0,1 mg la 2 minute dacă este necesar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R01AA05

NATRII FLUORIDUM
NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM

AFRIN® SCHERING-PLOUGH EUROPE; Aerosol 0,05%; ct. × 1 fl. × 15 sau 20 ml **(OTC)**
NAFAZIN JUPHAR; Sol. nazală 0,025%, 0,05%; ct. × 1 fl. × 10 ml **(OTC)**
NASIVIN® 0,025%; NASIVIN 0,01%; NASIVIN 0,05% MERCK KGaA; Sol. nazală 0,025%, 0,01%, 0,05%; ct. × 1 fl. × 5 ml (0,025%); ct. × 1 fl. × 10 ml (0,01%, 0,05%) **(OTC)**
NASIVIN® MERCK KGaA; Aerosol nazal 0,05%; ct. × 1 fl. + nebulizator × 10 ml **(OTC)**
RINOXIN TIS FARMACEUTIC; Sol. ext. 0,025%, 0,05%; ct. × 1 fl. × 10 g **(OTC)**
WICK SINEX PROCTER & GAMBLE; Aerosol nazal 0,05%; ct. × 1 fl. × 15 ml **(OTC)**

Ind: Trat. simptomatic al congestiei nazale în: rinita non-alergică, rinita alergică sezonieră și perenă, afecțiuni sinuzale (prin facilitarea eliminării secrețiilor), otita medie (ca adjuvant). Nu se utilizează ca trat. de întreținere.

Dz: *Adulți și copii peste 6 ani:* 2-3 pic., în fiecare nară, de 2 ori/zi, dimineața și seara.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenți. Glaucom cu unghi închis; pacienți în trat. cu IMAO; rinită uscată sau atrofică; după hipofizectomie transsfenoidală sau după o intervenție la nivel nazal sau bucal cu afectarea durei mater. Sarcină și alăptare.

Al: HTA, afecțiuni coronariene, hipertiroidism sau diabet zaharat. Pacienți care reacționează puternic la adrenergice (insomnie, vertij, tremurături, aritmie cardiacă). Se adm. maxim 3-5 zile; utilizarea prelungită și excesivă conduce la hiperemie secundară și rinită cronică.

RA: Locale: Ocazional, senzație de arsură și iritare la nivelul nasului și gâtului. În utilizare excesivă și prelungită: uscăciunea mucoasei nazale, hiperemie secundară și o rinită iatrogenă. Generale: Greață, cefalee, insomnie, bradicardie și rareori palpitații. Izolat manifestări alergice sistemice și tulburări pasagere ale vederii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NATRII HYDROGENI CARBONAS
NATRII IODIDUM (131 I)
NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM

Cod ATC: H01BB02**OXITOCINĂ S** SICOMED SA; Sol. parent. 1 UI/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml (**S**)**OXYTOCIN** FERRING LECIVA; Sol. inj. 1 UI/ml; ct. × 5 f. × 2 ml; Sol. inj. 5 UI/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (**S**)

Ind: Declanșarea travaliului, în caz de inerție uterină sau când sarcina implică riscuri majore pentru mamă și copil, expulzia placentei și controlul hemoragiilor post-partum sau postabortum; în cadrul operației cezariene; pentru efectuarea "testului de provocare" prin oxitocină.

Dz: Declanșarea travaliului - perf. i.v. 5 u.i. în 500 ml sol. glucozată 5% - inițial 2-4 pic./min și, dacă răspunsul uterin este insuficient după 15-20 min, se crește progresiv cu 2-4 pic/min, până la cel mult 40 pic. (sau 20 miliunități)/min; se poate inj. și i.m. 0,5-1 UI la 1/2-1 oră. Pentru controlul metroragiei post-partum se inj. s.c., i.m. sau i.v. (lent, cu prudență) 2-4 UI. În operația cezariană se inj. i.m. 4-12 UI (după extragerea copilului).

Cind: Hipertonie uterină, intervenție cezariană în antecedente sau alte cicatrice uterine mari, multipare, placenta praevia, disproporție cefalo-pelvină importantă, malpoziție fetală, suferință fetală evidentă, toxemie severă.

Al: HTA; toxemie gravidică. Inj. i.v. necesită prudență.

RA: Con tracția tetanică a miometrului (cu suferință fetală, ruptură uterină); cefalee, amețeli, tahicardie, dureri anginoase, edeme.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NATRII IODIDUM (131 I)
 NEBIVOLOLUM
 NELFINAVIRUM
 NEOSTIGMINI BROMIDUM
 NETILMICINUM
 NEVIRAPINUM
 NICERGOLINUM
 NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYNINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
PACLITAXELUM

Cod ATC: L01CD01

PACLITAXEL OMEGA LAB.; Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5, 16,7 sau 50 ml (S)

PAXENE® IVAX PHARMACEUTICALS; Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5, 16,7, 25 sau 50 ml (S)

SINDAXEL® 30 mg/5 ml; **SINDAXEL**® 100 mg/16,67 ml; **SINDAXEL**® 260 mg/43,33 ml SINDAN SRL; Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5, 16,67 sau 43,33 ml (S)

TAXOL® BRISTOL-MYERS SQUIBB; Conc. pt. sol. perf. 6 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (S)

Ind: Cancerul pulmonar non-microcelular (cu celule "non small" NSCLC). Cancerul ovarian. Cancerul mamar. Sarcomul Kaposi la pacienții cu sindrom de imunodeficiență.

Dz: Premedicație: dexametazonă 20 mg oral (sau echivalentul) cu 12 și 6 ore înainte de paclitaxel, difenhidramină 50 mg i.v. cu 30-60 min înainte și cimetidină (300 mg) sau ranitidină (50 mg) i.v. cu 30-60 min înainte. Trat. de primă linie al cancerului ovarian: 135 mg/m², în perfuzie 24 h, urmat de cisplatin 75 mg/m², la 3 săpt. Trat. de linia a doua al cancerului ovarian și mamar: 175 mg/m² în perfuzie 3 h la un interval de 3 săpt. Trat. de primă linie al NSCLC: 175 mg/m² în perfuzie de 3 h, urmată de un compus de platină, la un interval de 3 săpt. Trat. sarcomului Kaposi la pacienții cu sindrom de imunodeficiență: 135 mg/m² în perfuzie de 3 h la un interval de 3 săpt. sau 100 mg/m² în perfuzie de 3 h la interval de 2 săpt.

Cind: Reacții de hipersensibilitate severă la paclitaxel. Neutropenie, sub 1500/mm³ (sub 1000/mm³ la pacienții cu sarcom Kaposi). Sarcină și alăptare.

Al: Adm. sub supraveghere medicală, cu trusă anti-șoc la îndemână. În cazul reacțiilor grave de hipersensibilitate, se va întrerupe imediat perfuzia și se va începe trat. simptomatic. Examine hematologice frecvente; nu se adm. dacă neutrofilele < 1500/mm³ și trombocitele sub 100000/mm³. În caz de neutropenie severă sau neuropatie periferică severă dozele se reduc cu 20%.

RA: Neutropenie severă cel puțin 7 zile, infecții oportuniste. Trombocitopenie. Anemie. Reacții de hipersensibilitate severă cu posibilă evoluție letală. Modificări ale ECG. HTA, manifestări trombotice severe, hTA asociată cu șoc septic, cardiomiopatie și tahicardie asociate cu febră. Crize epileptice, encefalopatie, tulburări de vedere, neuropatie vegetativă și motorie cu ileus paralytic. Alopecie. Greață, vărsături, diaree și mucozite, obstrucție intestinală, perforații și tromboză mezenterică. Creșteri marcante ale GOT, fosfatazei alcaline sau bilirubinei. Necroză și encefalopatie hepatică. Creștere reversibilă a creatininei serice. Reacții locale - edem, durere, eritem și indurație; ocazional, extravazarea poate duce la celulită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M03AC01

NEBIVOLOLUM
NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM

PAVULON N.V. ORGANON; Sol. inj. 2 mg/ml; ct. × 1, 10, 25, 50 sau 100 f. × 2 ml (S)

Ind: Miorelaxant (adjuvant al anesteziei generale și în vederea ușurării ventilației mecanice); oprirea convulsiilor în tetanos.

Dz: I.v. inițial la *adulti* 50-100 μg/kg, apoi 10-20 μg/kg. *Copil:* inițial 60-100 μg/kg, apoi 10-20 μg/kg.

Cind: Hipersensibilitate la produs.

Al: În situații care cresc intensitatea și durata efectului curarizant: hipokaliemie, hipermagneziemie, hipocalcemie, IR, deshidratare, acidoză metabolică, hipoproteinemie, cașexie, miastenienă gravă, distrofie miotonică, după poliomielită, cancer (îndeosebi cancer pulmonar); hipotermia scade efectul curarizant, reîncălzirea îl crește. Prudență la hepatici, hipertensivi, sarcină, icterul obstructiv.

RA: Paralizia musculară durabilă sau apnee, tahicardie, hipersecreții, rareori HTA, bronhospasm, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

NELFINAVIRUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYININUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A02BC02**CONTRALOC** ALTANA PHARMA AG; Cpr. film. gastrorez. 20 mg, 40 mg; ct. × 1 fl. × 14 sau 28 cpr. (P-RF)**CONTRALOC® i.v.** ALTANA PHARMA AG; Liof. pt. sol. inj. 40 mg (P-RF)**Ind:** Trat. ulcerului duodenal; ulcerului gastric; refluxului esofagian și al simptomelor asociate; trat. și profilaxia esofagitei de reflux.**Dz:** Adm. internă: Trat. ulcerului duodenal: 20 mg/zi, 4 săptămâni. Trat. ulcerului gastric: 20 mg/zi, 4-8 săptămâni. Trat. refluxului esofagian: 20 mg/zi; deși simptomele pot să dispară după 2-4 săptămâni, pentru vindecarea leziunilor poate fi nevoie de 4-8 săptămâni de trat. Trat. și profilaxia esofagitei de reflux: 20 mg/zi; dacă apar recăderi, doza poate fi crescută la 40 mg/zi; se recomandă revenirea la doza inițială după ameliorarea simptomelor. Durata trat. nu trebuie să depășească 1 an. La pacienții cu IH nu trebuie depășită doza de 20 mg/zi. Adm. i.v.: se recomandă numai dacă adm. pe cale orală a antisecretoarelor nu este posibilă. Doza recomandată: 40 mg/zi. Soluția (ca atare sau după diluare cu 100 ml soluție salină izotonă sau cu glucoză 5% sau 10%) se va adm. în timp de 2-15 minute. Imediat ce este posibilă adm. orală, trat. i.v. trebuie întrerupt, administrându-se 40 mg po. Durata trat. nu trebuie să depășească 8 săptămâni. Pacienți cu IH gravă: 20 mg/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la pantoprazol sau la oricare dintre excipienții produsului; femei care alăptează.**Al:** Adm. internă: Nu se recomandă în trat. tulburărilor gastrointestinale ușoare. Înaintea începerii tratamentului, se impune excluderea malignității leziunii cu localizare gastrică sau esofagiană. Diagnosticul de esofagită de reflux trebuie confirmat endoscopic. Trebuie avut în vedere riscul de dezvoltare a bacteriilor la nivelul stomacului în timpul trat. cu antisecretoare. În IH sunt necesare monitorizarea funcției hepatice și, eventual, ajustarea dozelor. Nu au fost stabilite siguranța și eficacitatea produsului la copii. Adm. i.v.: Numai dacă nu este posibilă administrarea pe cale orală. La vârstnici sau la pacienții cu IR nu se vor administra doze mai mari de 40 mg/zi. La pacienții cu IH trebuie monitorizate valorile enzimelor hepatice. În cazul creșterii enzimelor hepatice trat. cu pantoprazol i.v. trebuie întrerupt. Atenție în sarcină și alăptare.**RA:** Adm. internă: cefalee, diaree, constipație, flatulență, prurit și reacții alergice. Rareori greață, amețală și tulburări de vedere. S-au raportat cazuri de edeme periferice, febră, mialgii, depresie și creșteri ale enzimelor hepatice și ale trigliceridelor. Adm. i.v.: ocazional cefalee sau diaree. Rareori greață, durere în etajul abdominal superior, flatulență, rash cutanat, prurit și amețală. S-au raportat cazuri de edem, febră, tromboflebită, depresie și tulburări de vedere.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03AD01

NEOSTIGMINI BROMIDUM
NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONIUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM

CLORHIDRAT DE PAPAVERINĂ *FABIOL SA*; Cpr. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

PAPAVERINĂ *SICOMED SA*; Sol. inj. 40 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml **(S/P-RF)**

PAPAVERINĂ 40 mg/ml *TERAPIA SA*; Sol. inj. 40 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml **(S/P-RF)**

PAPAVERINĂ *ARENA GROUP SA*; Cpr. 100 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. **(P-6L)**

PAPAVERINĂ 100 mg *LAROPHARM SRL*; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

PAPAVERINĂ 100 mg *LABORMED PHARMA SA*; Cpr. 100 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-6L)**

PAPAVERINĂ 100 mg *SICOMED SA*; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

PAPAVERINĂ 100 mg *SINTOFARM SA*; Cpr. 100 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. **(P-6L)**

Ind: Colici intestinale, biliare și ureterale; dismenoree. Tulburări circulatorii cerebrale și periferice.

Dz: Oral 100 mg de 2-4 ori/zi. Inj. i.m. sau s.c (dilat și lent, în 2-3 minute) 40-80 mg la 6 ore. În perf. i.v. (în soluție clorurată sau glucozată izotonă, la pH max 6), 40-200 mg o dată.

Cind: Hipersensibilitate la papaverină. BAV. Hipertensiune intracraniană. Sarcină și alăptare.

Al: Bolnavi cu tahicardie, glaucom, adenom de prostată și vârstnici predispuși la constipație cronică. Șoferi și activități de precizie.

RA: Tahicardie, congestia feței, somnolență, constipație. Rar, în trat. prelungit pot crește transaminazele și fosfatasa alcalină. Inj. i.v. poate produce aritmii, BAV, colaps, deprimare respiratorie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N02BE01

NETILMICINUM
NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM

ADOL JUPHAR; Sirop 120 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 60 ml (OTC)
CALPOL® suspensie pt. copii mici GLAXO SMITHKLINE; Susp. orală 120 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
CALPOL® șase plus suspensie GLAXO SMITHKLINE; Susp. orală 250 mg/ 5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
EFFERALGAN 80 MG; EFFERALGAN 150 MG BRISTOL-MYERS SQUIBB; Supoz. 80 mg, 150 mg; ct. × 2 folii × 5 supoz. (OTC)
EFFERALGAN PEDIATRIC 3% BRISTOL-MYERS SQUIBB; Sol. orală, 60 mg/2 ml; ct. × 1 fl. × 90 ml (OTC)
EFFERALGAN® 500 BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. eff. 500 mg; ct. × 4 blist. × 4 cpr. (OTC)
N-PARACETAMOL NORDFARM PRODUCT; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (OTC)
PANADOL® GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 500 mg; ct. × 1 blist. × 12 cpr. (OTC)
PANADOL® GLAXO SMITHKLINE; Cpr. eff. 500 mg; ct. × 6 folii × 2 cpr. eff. (OTC)
PANADOL® BABY GLAXO SMITHKLINE; Susp. orală 120 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 sau 300 ml (OTC)
PANADOL® RAPIDE GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 500 mg; ct. × 1 blist. × 10 sau 14 cpr. (OTC)
PARACETAMOL ANTIBIOTICE SA; Sup. 125 mg, 250 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (OTC)
PARACETAMOL 125 mg; PARACETAMOL 250 mg EUROPHARM SA; Sup. 125 mg, 250 mg; ct. × 2 sau 50 blist. × 5 sup. (S/OTC)
PARACETAMOL 500 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
PARACETAMOL FARMEX COMPANY; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
PARACETAMOL ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
PARACETAMOL EUROPHARM SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
PARACETAMOL ARENA GROUP SA; Cpr. 500 mg; ct. × 1, 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
PARACETAMOL FABIOL SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
PARACETAMOL OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)
PARACETAMOL SINTOFARM; Cpr. 100 mg; ct. × 1 folie × 20 cpr. (OTC)
PARACETAMOL SINTOFARM; Sup. 500 mg; ct. × 2 blist. × 5 sup. (OTC)
PARACETAMOL ANTIBIOTICE SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
PARACETAMOL EXTRA FORT PHARMEX ROM IND.; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (OTC)
PARACETAMOL LPH® 500 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/OTC)
PARACETAMOL PT. COPII TERAPIA SA; Sol. orală 120 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (OTC)
PARACETOL TIS FARMACEUTIC; Sol. orală 2,4%; ct. × 1 fl. × 110 g (OTC)
PARAMIDOL PHARMEX ROM IND.; Cpr. mast. 80 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. mast. (OTC)
PERFALGAN 10 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB; Sol. perf. 10 mg/ml; ct. × 12 fl. × 100 ml (S)
SANADOR LAROPHARM SRL; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 6 cpr. (OTC)

Ind: Durere ușoară și medie. Febră.

Doz: Copii: 4-6 ani: 120-150 mg/4-6 ore; 6-12 ani: 150-200 mg/4-6 ore; 12-18 ani: 200-300 mg/4-6 ore; Adulti: 500-1000 mg/4-6 ore; Maximum: 4 g/24 ore.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NEVIRAPINUM
NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM

Cod ATC: M01AH04

DYNASTAT PHARMACIA; Pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg, 40 mg; ct. × 1, 3 sau 5 fl. pulb. + 1, 3 sau 5 f. solv. *(P-RF)*

Ind: Trat. pe termen scurt al durerilor post-operatorii.

Dz: 40 mg i.v. în bolus sau i.m. profund; apoi 20-40 mg la 6-12 ore; doza maximă 80 mg/zi. La *vârstnici < 50 kg și IH moderată*: ½ din doza normală.

Cind: Antecedente de bronhospasm, rinită, edem angioneurotic, urticarie provocată de AINS. Sarcină. IH severă. Ulcer gastroduodenal. IC congestivă.

RA: HTA sau hTA; dureri lombare; edeme; dispepsie, flatulență; agitație, insomnie, prurit; oligurie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06AB05

NICERGOLINUM
NIFEDIPINUM
NIFURATELUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM

ALS-PAROXETIN APOTEX INC.; Cpr. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ARKETIS MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
PAROXETIN AL ALIUD PHARMA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-RF)
PAROXETIN STADA STADA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-RF)
SEROXAT GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-RF)
SEROXAT LIQUID GLAXO SMITHKLINE; Susp. orală 20 mg/10 ml; ct. × 1 fl. × 150 ml (P-RF)

Ind: Depresie, inclusiv depresia severă și reactivă și depresia însoțită de anxietate. Efect începând din a 2-a săpt. de trat. Tulburări obsesiv-compulsive. Atacuri de panică cu sau fără agorafobie. Anxietate socială/fobie socială.

Dz: Depresie: 20 mg/zi; se poate crește cu 10 mg/zi, până la maximum 50 mg/ zi. Tulburări obsesiv-compulsive: 40 mg/zi, maximum 60 mg/zi. Atacuri de panică: 40 mg/zi, maximum 60 mg/zi. Inițial se adm. o doză minimă pt. a reduce posibilitatea agravării simptomatologiei. Anxietate socială/fobie socială: 20 mg/ zi, maximum 50 mg/zi. Se adm. odată pe zi dimineața, la masă. Vârstnici: maximum 40 mg/zi. La pacienții cu IR severă și IH se adm. doza minimă recomandată.

Cind: Hipersensibilitate la paroxetină. Copii. Asocierea cu alcool.

A!: Nu se asociază inhibitori de MAO, medicație pe bază de triptofan. Prudență la asocierea cu neuroleptice. Precauție în caz de manie, afecțiuni cardiace, epilepsie, convulsii, glaucom. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.

RA: Grețuri, somnolență, transpirații, tremurături, astenie, uscarea mucoasei bucale, insomnie, disfuncții sexuale, constipație, diaree și diminuarea apetitului. Rar: amețeli, rash, glaucom acut, retenție urinară, trombocitopenie, sindrom serotoninergic (agitație, confuzie, diaforeză, halucinații, hiperreflexie, mioclonus, tahicardie, tremurături) și simptome sugestive pentru hiperprolactinemie (galactoree); hiponatriemie reversibilă mai ales la vârstnici. Creșterea enzimelor hepatice cu rare anomalii hepatice severe. Rareori tulburări de sângerare, variații tensionale, confuzie, convulsii și reacții de fotosensibilizare. Ocazional tulburări extrapiramidale la pacienți cu tulburări de fond ale funcțiilor motorii sau cu medicație neuroleptică. Întreruperea bruscă a trat.: amețeli, tulburări senzoriale, tulburări de somn, agitație sau anxietate, grețuri și transpirații.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01MA03

NIFEDIPINUM
 NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
PEFLOXACINUM

ABAKTAL LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 400 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

ABAKTAL LEK PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 80 mg/ml; ct. × 10 f. × 5 ml (P-RF)

PROFLOX CIPLA; Sol. oft. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (P-RF)

Ind: La adult, în infecții severe cu bacili gram-negativ și cu stafilococi: septicemie și endocardită; meningită; infecții respiratorii și din sfera ORL, renale, ginecologice, abdominale și hepato-biliare, osteo-articulare, cutanate; uretrita gonococică și nespecifică.

Dz: 800 mg/zi oral în 2 prize, dimineța și seara, în timpul meselor. Uretritele gonococice - 800 mg în doză unică. Calea i.v.: perf. lent (peste o oră), după diluarea în 250 ml de glucoză 5% de 2 ori/zi, dimineța și seara. Nu se va dilua în soluție hidrosalină sau altă soluție ce conține ioni clorură. Nu se amestecă în perfuzie cu alte medicamente. Adm. i.v. 8 mg/kg: de 2 ori/zi în absența ascitei sau a sindromului icteric; o dată/zi în prezența sindromului icteric; o dată la 36 ore în caz de ascită; o dată la 48 ore când coexistă ascita cu sindromul icteric; la vârstnici 400 mg/zi, la 12 ore.

Cind: Alergie la chinolone; deficit de G-6-PDH; copii; sarcină și alăptare.

A!: Se va evita expunerea la radiații solare sau UV. Se reduce efortul fizic, se preferă repausul la pat pe durata trat. Miastenia gravis; IH severă; vârstnici; predispoziție la tendinite induse de chinolone; pacienții sub trat. cronic cu corticosteroizi și cei cu predispoziție la convulsii.

RA: Reacții cutanate alergice și de fotosensibilizare la radiații solare sau UV. Dureri articulare și musculare, tendinite. Trombocitopenie, rar neutropenie. Tulburări neurologice: cefalee, insomnie, convulsii și tulburări de conștiință. Tulburări digestive: gastralgii, vărsături. În caz de durere sau inflamarea tendonului lui Achile se oprește adm. și se recomandă repaus la pat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NIFURATELUM
 NIFUROXAZIDUM
 NIMESULIDUM
 NIMODIPINUM
 NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A

Cod ATC: L03AB11

PEGASYS® 135 µg; PEGASYS® 180 µg HOFFMANN LA ROCHE; Sol. inj. 135 µg/ml; 180 µg/ml; ct. × 1, 4 sau 12 seringi preumplute × 0,5 ml (*S/P-RF*)

Ind: Trat. hepatitei cronice tip C confirmată histologic la pacienții adulți cu valori crescute ale transaminazelor și cu ARN-VHC seric pozitiv, precum și la pacienții cu ciroză compensată (în asociere cu ribavirină). Această asociere este indicată atât la pacienții care nu au urmat un trat. anterior, cât și la cei care au fost tratați și au răspuns inițial la trat. cu interferon alfa, dar la care boala a recidivat după oprirea trat. Monoterapie îndeosebi în caz de intoleranță sau contraindicație a tratamentului cu ribavirină.

Dz: Tratamentul trebuie inițiat doar de către un medic cu experiență în trat. Doza recomandată: 180 µg, o dată pe săpt. s.c. la nivelul abdomenului sau coapsei în asociere cu ribavirină administrată oral sau în monoterapie. Ribavirina trebuie administrată în timpul mesei. IR: doza inițială de 135 µg; se reduce în cazul apariției RA.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă, interferoni sau la oricare dintre excipienții produsului; hepatită autoimună; disfuncție hepatică severă sau ciroză hepatică decompensată; nou-născuți și copii până la 3 ani; antecedente de afecțiune cardiacă severă, incluzând afecțiune cardiacă instabilă sau necontrolată în ultimele 6 luni; afecțiuni psihice severe preexistente, depresie; sarcină și alăptare.

Al: În cazul asocierii cu ribavirină, se efectuează teste de lab. înaintea inițierii și în timpul trat. Trat. se poate institui în cazul următoarelor valori inițiale: nr. trombocite > 90000/ mm³; nr. absolut de neutrofile > 1500/mm³. Testele hematologice trebuie repetate după 2 și 4 săptămâni, iar testele biochimice trebuie efectuate la 4 săptămâni. Prudență la pacienții cu istoric de depresie. Se recomandă ca la pacienții cu disfuncții cardiace preexistente să se efectueze ECG înaintea începerii trat. Dacă apar modificări ale statusului cardiovascular, tratamentul trebuie suspendat sau întrerupt. Apariția anemiei la pacienții cu boli cardiovasculare poate necesita reducerea dozei sau întreruperea adm. Se întrerupe adm. la pacienții la care apar semne de decompensare hepatică în timpul trat.

RA: Generale - sindrom pseudogripal, letargie, frison, bufeuri, slăbiciune, herpes simplex. Neuropsihice - afectarea memoriei, disgeuzie, parestezii, hipoestezie, tremor, tulburări emoționale, tulburări ale dispoziției, nervozitate, agresivitate, scăderea libidoului, impotență sexuală. Musculo-scheletice - dureri osoase, lombalgii, cervicalgii. Cutanate - erupții cutanate, eczemă, psoriazis, urticarie, fotosensibilitate, hipsudorație. Cardiovasculare - palpitații. Respiratorii - infecții ale căilor respiratorii, rinită, rinofaringită, congestia sinusurilor, congestie pulmonară, dispnee de efort. Gastrointestinale - vărsături, dispepsie, gastrită, flatulență, uscăciunea gurii, ulceratii orale. Oftalmologice - xeroftalmie, inflamația globului ocular, dureri oculare. Hematologice - limfadenopatie, anemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYININUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L03AB10

PEGINTRON SCHERING-PLOUGH EUROPE AG; Pulb. + solv. pt. sol. inj., 50 µg/0,5 ml, 80 µg/0,5 ml, 100 µg/0,5 ml, 120 µg/0,5 ml, 150 µg/0,5 ml; ct. × 1, 4, 6 sau 12 pen-uri + 1, 4, 6 sau 12 ace pt. injecție + 2, 8, 12 sau 24 tampoane dezinfectante (S/P-RF)

Ind: Trat. hepatitei cronice C (în asociere cu ribavirină). Această combinație este indicată la pacienții naivi ca și la pacienții care au răspuns la tratament cu interferon alfa-2b în monoterapie, dar care au recăzut ulterior. Monoterapie, în special în caz de intoleranță sau contraindicație la ribavirină.

Dz: Adm. s.c. săptămânal. Doza se stabilește în funcție de utilizarea sa în combinație cu ribavirină sau în monoterapie. *Terapie combinată:* Pegintron 1,5 µg/kg/săptămână + ribavirină cps. de 2 ori/zi. În funcție de greutatea corporală: sub 40 kg: Pegintron 50 µg/săpt. + 800 mg ribavirină/zi; 40-50 kg: Pegintron 80 µg/săpt. + 800 mg ribavirină/zi; 51-64 kg: Pegintron 80 µg/săpt. + 800 mg ribavirină/zi; 65-75 kg: Pegintron 100 µg/săpt. + 1000 mg ribavirină/zi; 76-

85 kg: Pegintron 120 µg/săpt. + 1000 mg ribavirină/zi; peste 85 kg: Pegintron 150 µg/săpt. + 1200 mg ribavirină/zi. *Monoterapie:* 0,5-1,0 µg/kg/săptămână. Durata tratamentului: Se recomandă ca pacienții să fie tratați inițial 6 luni.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau orice tip de interferon sau la oricare dintre excipienți; femei gravide; femei care alăptează; afecțiuni psihice severe, tentativă de suicid; istoric de afecțiune cardiacă preexistentă severă, inclusiv afecțiune cardiacă instabilă sau necontrolată, în ultimele șase luni; afecțiuni medicale severe debilitante, inclusiv IRC; hepatită autoimună; disfuncție hepatică severă sau ciroză hepatică decompensată; afecțiuni tiroidiană preexistentă, dacă aceasta nu poate fi controlată prin terapie convențională; epilepsie.

Al: Atenție la pacienții care sunt predispuși să dezvolte tulburări autoimune. Precauție la cei cu tulburări oftalmologice, incluzând hemoragiile retiniene, scotoamele și obstrucția arterei sau venei retiniene; diabet zaharat sau HTA, ICC în antecedente; tulburări psihice, în special depresie, tentativă suicid.

RA: La nivelul întregului corp: sindrom pseudogripal - cefalee, oboseală, frison, astenie, febră, durere toracică, durere în CSD, stare de rău. Gastrointestinale: greață, anorexie, dispepsie. Musculoscheletale: mialgii, artralгии. Psihice: depresie, iritabilitate, insomnie, anxietate, agitație. Respirator: tuse neproductivă, rinită, dispnee. Hematologic: anemie, leucopenie. Reproducător: hemoragii, tulburări menstruale. Endocrin: hipotiroidism. Sistem nervos: parestezii. Cardiovascular: tahicardie, palpitații. Tegumente și anexe: Transpirație abundentă, prurit, erupții. Altele: amețeală, senzație de gură uscată.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01BA04

NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM

ALIMTA® 500 mg LILLY FRANCE; Pulb. pt. sol. perf. 500 mg; ct. × 1 fl. **(S)**

Ind: Cancer pulmonar, cu alt tip de celule decât cu celule mici, avansat local sau metastazat, după chimioterapie anterioară. Mezotelion pleural nerezecabil, în asociere cu cisplatin.

Dz: Perfuzie i.v., sub supravegherea unui medic specialist oncolog

Cind: Hipersensibilitate. Alăptare. Vaccinare

RA: Sanguine (anemie, leucopenie, trombocitopenie), digestive (greață, vărsături, diaree, anorexie), astenie, erupții cutanate, stomatită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01DA05

NIMODIPINUM
NISOLDIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYININUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERYTHRITYLI TETRANITRAS

NITROPECTOR® TERAPIA SA; Cpr. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)

Ind: Profilaxia și trat. de lungă durată al anginei pectorale.

Dz: *Adulți:* 50 mg de 2-3 ori/zi; maximum 240 mg zilnic, cu 30 min înaintea meselor.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de nitroderivați; insuficiență circulatorie acută (șoc, colaps circulator); hTA severă; șoc cardiogen; IMA. Trat. crizelor de angină pectorală. Sarcină. Alăptare.

Al: Cardiomiopatie obstructivă hipertrofică, pericardită constrictivă, tamponadă cardiacă; IC stângă; hTA cu valori sistolice sub 90 mmHg; predispoziție la tulburări circulatorii ortostatice; stenoză aortică și/sau mitrală; afecțiuni cu hipertensiune intracraniană. Șoferi și activități de precizie.

RA: La începutul trat. pot apărea presiune temporală și cefalee, care dispar la câteva zile de trat. Ocazional hTA ortostatică asociată cu obnubilare, vertij și astenie, tahicardie reflexă. Rareori tulburări gastrointestinale, reacții alergice cutanate. Rar, stare de colaps cu bradicardie și sincope, ca și hTA marcată cu accentuarea simptomelor de angină pectorală. Risc de dezvoltare a toleranței.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N02AD01

NISOLDIPINUM
 NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM

FORTRAL® KRKA; Cpr. 50 mg; ct. × 1 fl. × 20 sau 100 cpr. **(P-RF)**

FORTRAL® KRKA; Sol inj. 30 mg/ml; ct. × 2 suporturi PVC × 5 f. **(P-RF)**

FORTWIN® RANBAXY LAB.; Sol. inj. 30 mg/ml; ct. × 10 sau 100 f. × 1 ml **(S/P-RF)**

SALDOREN® SICOMED SA; Sol. inj. 30 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml **(P-RF)**

Ind: Dureri moderate sau severe, acute sau cronice, în traumatisme, după intervenții chirurgicale, în IMA, în colici (ureterală, biliară); ca medicație preanestezică și pentru suplimentarea anesteziei chirurgicale.

Dz: Oral, 50-100 mg (după mese), la 3-5 ore; în durerile puternice se inj. s.c., i.m. sau i.v. 30 mg la 3-4 ore, maximum 1 mg/kg o dată pt. inj. s.c. sau i.m. și 0,5 mg/kg pt. inj. i.v.

Cind: Alergie la pentazocină, traumatisme craniene, leziuni ale creierului, hipertensiune intracraniană, stări convulsive, insuficiență respiratorie, sindrom abdominal acut de cauză necunoscută, IH gravă, intoxicație acută cu alcool, delirium tremens; copii mai mici de 12 ani. Alăptare.

Al: Bătrâni; astm bronșic, IH și IR, colecistită acută, pancreatită; bolnavi cu infarct de miocard care prezintă greață și vomă; în intervențiile pe căile biliare; instabilitate emoțională sau farmacodependență în antecedente. Se vor evita băuturile alcoolice. Substanță dopantă. Sarcină.

RA: Frecvent greață, vomă, amețeli, sedare, euforie, cefalee, sudorație; rareori anorexie, constipație sau diaree, tinitus, tulburări de vedere, coșmaruri, insomnie, hTA, tahicardie, deprimare respiratorie, erupții cutanate alergice, eozinofilie, granulocitopenie. Injectarea repetată poate provoca local indurație și scleroză. Potențialul de a dezvolta dependență este moderat pentru calea parenterală și slab pentru calea orală; poate declanșa sindromul de abinență la morfinomani.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C04AD03

NITRAZEPAMUM
 NITRENDIPINUM
 NITROGLYCERINUM
 NIZATIDINUM
 NOMEGESTROLUM
 NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM

AGAPURIN® SR 400 ZENTIVA AS; Cpr. ret. 400 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

ANGIOPENT 200 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

ANGIOPENT 400 EP; ANGIOPENT 600 EP AC HELCOR SRL; Cpr. film. cu elib. prel. 400 mg, 600 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

PENTOXIFILIN 100 mg ARENA GROUP SA; Dj. 100 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 dj. **(S/P-6L)**

PENTOXIFILIN 100 mg TERAPIA SA; Dj. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. **(P-6L)**

PENTOXIFILIN 100 mg TERAPIA SA; Conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml **(S/P-RF)**

PENTOXI RETARD® 400 mg TERAPIA SA; Cpr. film cu elib. prel. 400 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

TRENTAL® AVENTIS PHARMA; Dj. cu elib. prel. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj. **(P-6L)**

Ind: Tulburări circulatorii periferice arteriale și venoase de natură aterosclerotică sau diabetică; arteriopatie cronică obliterantă (stadiul II); tulburări trofice în sindromul post-trombotic, ulcer de gambă, gangrenă, degerături. Tulburări ale circulației cerebrale: sindrom ischemic, vertij, cefalee, tulburări de memorie și atenție, diminuarea capacității intelectuale. Tulburări circulatorii la nivel ocular și al urechii interne.

Dz: Oral sau combinat. Oral: 200-1200 mg/zi, doză de întreținere în timpul sau după mesele principale. Parenteral: Inițial se testează reacția pacientului, prin adm. a 2,5 ml sol. inj. diluată cu 7,5 ml ser fiziologic. În perf. i.v. inițial o fiolă în 250-500 ml sol. perf. (NaCl 9‰, levuloză 5%, glucoză sau înlocuitori ai masei sanguine), în 90-180 min. În zilele următoare, dozele pot fi crescute cu câte 50 mg (2,5 ml sol. inj.), până la max. 300 mg (15 ml)/zi. În caz de tulburări grave de circulație se pot face 2 perfuzii pe zi.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la derivați xantini. IM recent, hemoragii masive, scleroză cerebrală și coronariană cu hipertensiune. Sarcină. Alăptare.

Al: La bolnavii hipertensivi cu labilitate vasculară se dau doze progresive; în insuficiență cardiacă, adm. se va face în volume mici. În IR, maximum 800 mg/zi; în caz de hemoragie oculară, trat. va fi întrerupt imediat; în doze mari la diabetici poate crește secreția de insulină. Șoferi și activități de precizie.

RA: Frecvente tulburări gastro-intestinale (greață, vomă, arsuri, dureri epigastrice, diaree) și erupții pruriginoase. Rar, la doze mari, tahicardie, scăderea tensiunii arteriale, angină pectorală, senzație de căldură. În cazuri izolate, trombocitopenie, hemoragii cutanate și ale tractului digestiv.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

NITRENDIPINUM
NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNIUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C09AA04

PRESTARUM® LAB. SERVIER; Cpr. perinopril terț-butilamină 4 mg, 8 mg; ct. × 1 blist. × 30 cpr. (4 mg), ct. × 2 blist. × 15 cpr. (8 mg) **(P-6L)**

PRESTARUM® LAB. SERVIER; Cpr. perindopril arginină 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. **(P-6L)**

Ind: Trat. HTA și IC. Prevenirea recurenței AVC.

Dz: HTA: Perindopril arginină 5-10 mg, priză unică; perindopril terț-butilamină 4 mg, o dată, dimineața, maximum 8 mg; IC: Perindopril arginină 2,5-5 mg, priză unică; perindopril terț-butilamină 2 mg dimineața, putând crește până la 4 mg după o lună de trat. **Prevenirea recurenței AVC:** Perindopril arginină 2,5 mg pe zi timp de două săptămâni, apoi crescută la 5 mg în priză unică zilnică timp de alte două săptămâni, înaintea introducerii indapamidei; perindopril terț-butilamină 2 mg zilnic timp de 2 săptămâni, crescând la 4 mg o dată pe zi pentru încă alte 2 săptămâni înainte de introducerea indapamidei.

Cind: Sarcină, alăptare, copii.

Al: Asocierea cu diuretice antialdosteronice (risc de hiperpotasemie).

RA: Cefalee, amețeli, vertij, parestezii, tulburări psihice sau de somn, tulburări de vedere, țuitori în urechi, hipotensiune arterială, tuse (frecvent descrisă ca fiind uscată și iritativă), dispnee, tulburări gastro-intestinale (greață, dureri abdominale, vărsături, constipație), tulburări de gust, prurit, erupții cutanate, oboseală și crampe musculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: P03AC04

NITROGLYCERINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM

NIX GLAXO SMITHKLINE; Cremă capilară 1%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)

Ind: Trat. împotriva păduchilor de cap.

Dz: Utilizare după spălarea, limpezirea și uscarea părului. Cantitatea aplicată, după agitarea flaconului, trebuie să satureze întregul păr și scalpul (în special în spatele urechilor și pe ceafă). Se lasă pe păr 10 minute apoi se limpește cu apă. Reluarea trat. este necesară dacă se observă păduchi vii la 7 zile sau mai mult după prima aplicare. Păduchii de cap se îndepărtează cu un pieptene adecvat.

Cind: Copii sub 2 luni.

Al: Întreruperea utilizării în caz de iritarea pielii sau de infecții. Nu se aplică în apropierea ochilor și în contact cu mucoasele. Sarcină. Alăptare.

RA: Mâncărimea, înroșirea sau inflamarea scalpului; manifestări astmatiforme.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NIZATIDINUM
NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM

Cod ATC: N02AB02**MIALGIN® 100 mg/2 ml ZENTIVA ROMANIA;** Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml (**P-TS**)**Ind:** Dureri puternice în colici, IMA, cancer, dureri postoperatorii, pregătirea anesteziei generale și a intervențiilor chirurgicale, analgezia obstetricală (în special în prezența contracțiilor uterine); EPA.**Dz:** *Analgezic: Adulți:* s.c. sau i.m. 25-100 mg sau 25-50 mg inj. i.v. lent. La copii, 0,5-2 mg i.m. *Analgezie în obstetricală:* 50-100 mg i.m. sau s.c. (odată cu apariția contracțiilor uterine la intervale regulate); se poate repeta după 1-3 ore. *Medicație preoperatorie:* 50-100 mg i.m. sau s.c. cu 1 oră înainte de operație; la copii 0,5-2 mg/kg. *Ca adjuvant în anestezia generală:* 10-25 mg inj. i.v. lent. *Doze recomandate:* 100 mg o dată și 300 mg/zi.**Cind:** Alergie, deprimare respiratorie marcată, traumatisme craniene și hipertensiune intracraniană, intoxicație acută cu alcool și delirium tremens, mixedem. Copii sub 3 ani.**Al:** Copii peste 3 ani; sarcină (depresie respiratorie la nou-născut); bătrâni și bolnavi cu afecțiuni hepatice și renale; șoc, hipotiroidism, hipertrofie de prostată, pacienți cu tahicardie supraventriculară sau antecedente de convulsii.**RA:** Doze terapeutice: slăbiciune, amețeli, sudorație, uscăciunea gurii, uneori greață și vomă, rareori hTA ortostatică, deprimare respiratorie, retenție de urină; în IR - tremor, mioclonus, convulsii. Doze mari (peste 200 mg): fenomene de excitație centrală. Risc de dependență, dar toleranța apare mai lent; sindromul de abstință apare mai repede, este de durată mai scurtă, iar manifestările sunt mai slabe. Midriază.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N03AA

NOMEGESTROLUM
NORFLOXACINUM
NYSTATINUM
OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM

FENOBARBITAL 15 mg; FENOBARBITAL 100 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 15 mg, 100 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr., respectiv ct. × 1 blist. × 25 cpr. **(P-RF)**

FENOBARBITAL 200 mg/2 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 10%; ct. × 5, 10 sau 100 f. × 2 ml **(S/P-RF)**

Ind: Sedativ în stări de hiperexcitabilitate, afecțiuni medicale sau chirurgicale care necesită sedare, insomnii, epilepsie (marele rău epileptic), convulsii la sugari, copii și adulți; în cadrul medicației preanarcotice, adjuvant al fototerapiei în icterul neo-natal.

Dz: *Adulți*, sedativ, 15 mg la 4 ore; hipnotic: 100 mg seara (în insomniile grave și la agitați 300 mg/zi); în boala Basedow 50 mg/zi; anticonvulsivant, în intoxicațiile cu stricnină, în tetanos 2-3 f./zi i.m.; în epilepsie inițial 50 mg de 2-3 ori/zi, apoi 200-300 mg/zi fracționat până la dispariția convulsiilor; maximum 300 mg o dată și 600 mg/zi; *copii*: sedativ 6 mg/kg/zi în 3 prize oral sau i.m., anticonvulsivant 3-5 mg/kg, oral sau i.m.; maximum 300 mg.

Cind: Stări precomatoase și comatoase, Parkinson, intoleranță la fenobarbital, IR, IC, IH gravă, diabet, porfirie latentă.

Al: Nu se injectează i.v. datorită solventului.

RA: Fenomene paradoxale de excitație nervoasă și urticarie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01CE02

NORFLOXACINUM
 NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

OSPEN® 500, OSPEN® 1000, OSPEN® 1500 SANDOZ GmbH; Cpr. film. 500000 UI, 1000000 UI, 1500000 UI
 fenoximetilpenicilină sare de potasiu; ct. × 1 blist. × 12 cpr., ct. × 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-RF)**
OSPEN® 400 SANDOZ GmbH; Sirop 400000 UI/5 ml; ct. × 1 fl. × 60 ml **(P-RF)**
PENICILINĂ V 1000000 EUROPHARM SA; Cpr. 1000000 UI; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Trat. curativ infecții ușoare sau moderate cu germeni sensibili: respiratorii, ORL, stomatologice și cutanate. Profilaxia recidivelor RAA.

Dz: *Adulți:* 2-4 milioane UI pe zi, oral, fracționat în 3-4 prize; *Copii:* 50000-100000 UI/kg/zi, oral, fracționat în 3-4 prize.

Cind: Alergie la peniciline și la cefalosporine, hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului.

A!: Manifestările alergice apărute impun întreruperea trat. Foarte rar, reacții anafilactice severe, uneori fatale. Prescrierea se face după o anamneză atentă (antecedentele de reacții alergice la peniciline și cefalosporine). În IRA, doza se adaptează în funcție de creatininemie și de Cl creatinină. Atenție la conținutul în potasiu al produsului. Sarcină. Alăptare.

RA: Reacții alergice: febră, urticarie, eozinofilie, edem Quincke, foarte rar șoc anafilactic; digestive: greață, vărsături, diaree; hematologice: anemie, trombocitopenie, leucopenie, tulburări de coagulare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

NYSTATINUM
 OBIDOXIMI CHLORIDUM
 OCTREOTIDUM
 OFLOXACINUM
 OLANZAPINUM
 OLOPATADINUM
 OMEPRAZOLUM
 ONDANSETRONUM
 ORLISTATUM
 ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYNINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENILBUTAZONUM

Cod ATC: M01AA01

FENILBUTAZONĂ EUROPHARM SA; Sup. 250 mg; ct. × 2 sau 50 blist. × 5 sup. (S/P-6L)
FENILBUTAZONĂ SINTOFARM SA; Sup. 250 mg; ct. × 2 blist. × 3 sau 5 sup. (P-6L)
FENILBUTAZONĂ ANTIBIOTICE SA; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 20 sau 40 g (OTC)
FENILBUTAZONĂ GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 45 g (OTC)
FENILBUTAZONĂ HYPERION SA; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 40 g (OTC)
FENILBUTAZONĂ MK MARK PHARMACEUTICS SRL; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 35 sau 50 g (OTC)
FENILBUTAZONĂ OZONE LABORATORIES Ltd.; Cremă 4%; ct. × 1 tub × 35 sau 50 g (OTC)

Ind: Trat. de scurtă durată (sub 7 zile), al puseelor acute de reumatism abarticular și al radiculalgiiilor severe. Trat. de lungă durată în spondilartrita ankilopoietică și alte afecțiuni inflamatorii cronice înrudite. Trat. crizei de gută.

Dz: *Intrarectal:* *Adulți și copii peste 15 ani:* În puseele acute de reumatism abarticular: 250 mg de 2-3 ori/zi, 1-2 zile, apoi 250mg/zi, maximum 7 zile. În spondilartrita ankilopoietică: 250 mg/zi. În criza de gută: inițial 500 mg, apoi 250 mg la 6 ore, maximum 3 zile. *Topic:* Pe tegumente, de 2-3 ori/zi, fricționând zona interesată. Înaintea primei aplicări se testează sensibilitatea pe o zonă cutanată restrânsă.

Cind: Alergie la fenilbutazonă și la alți compuși derivați de pirazonă. Manifestări de tip idiosincrazic la acidul acetilsalicilic și la alte AINS. Ulcer gastroduodenal. IH severă. IR severă. IC. HTA necontrolată medicamentos. Diateze hemoragice, hemopatii în antecedente sau manifeste. Afecțiuni tiroidiene. LED. Antecedente recente de rectite sau de rectoragii. Adm. topică este contraindicată în diverse dermatite sau ulceratii; supurații (abcese, flegmoane); sensibilizare la fenilbutazonă și la anticoagulante de tip heparinic. Sarcină. Alăptare. Vârstnici. Copii.

Al: Reacții hematologice grave, uneori letale (agranulocitoza). Apariția febrei, anginei, hemoragiilor cutanate spontane impune oprirea trat. și verificarea formulei sanguine. Monitorizarea formulei sanguine înainte de începere și pe parcursul trat. cronic (la 2-4 săptăm.). În cazul scăderii numărului de leucocite, trombocite sau eritrocite se întrerupe trat. Trat. se întrerupe în caz de: reacții alergice, anafilactoid; iritație gastrică și/sau intestinală; creșterea enzimelor hepatice. Datorită retenției hidrosaline se supraveghează volumul diurezei, funcția renală și starea aparatului cardiovascular. Atenție la dozele mari și în condițiile folosirii îndelungate. Intrarectal afectează mucoasa; nu se adm. prelungit. Șoferi și activități de precizie.

RA: *Cardiovasculare:* rar edeme, HTA, IC congestivă. *Gastro-intestinale:* greață, vărsături, epigastralgie, gastrită, dureri abdominale, diaree; posibile ulceratii gastrice, uneori activarea ulcerului. *Reacții de hipersensibilitate:* rareori reacții anafilactice sau anafilactoid, edem Quincke, dispnee și agravarea astmului, vasculite. *Neuropsihice:* rareori cefalee, somnolență, vertij, tulburări senzoriale, vizuale, tinitus. *Cutanate:* rareori erupții, prurit, urticarie, purpură, fotosensibilizare, eritem. *Hematologice:* rareori anemie, trombocitopenie, neutropenie; foarte rar pancitopenie, aplazie medulară cu evoluție letală posibilă. *Hepatice:* rareori creșterea transaminazelor, hepatită cu icter; foarte rar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OBIDOXIMI CHLORIDUM
OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM

Cod ATC: S01FB01**NILEFRIN®** TERAPIA SA; Sol. oft. 5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (*P-RF*)

Ind: Vasoconstrictor, decongestionant și midriatic în oftalmologice (dilație pupilară în uveite, diverse proceduri chirurgicale, refracție fără cicloplegie, fundoscopie și alte proceduri diagnostice).

Dz: Vasoconstricție și dilatație pupilară: după o pic. de anestezic local, o pic. sol. pe limbul superior dă o dilatație rapidă și puternică a pupilei cu reducerea congestiei în patul capilar. Se poate repeta instilația peste o oră. Uveite: sinechii posterioare: se asociază cu atropină o pic. sol. pe suprafața superioară a corneei, cu repetiție la o oră. Glaucom: la pacienții miotici cu glaucom cu unghi deschis. Chirurgie: cu 30-60 min preoperator. Refracție: se adm. la 5 min după cicloplegice (homatropină, ciclopentolat, tropicamidă, atropină). Examinare oftalmoscopică: o pic. sol. instilată în fiecare ochi, cu midriază în 15-30 min. Dilația durează 1-3 ore. Proceduri diagnostice: Testul de provocare a închiderii unghiului în glaucom. Retinoscopie: Testul albirii: 1-2 pic sol. în ochiul injectat. După 5 min se examinează albirea perilimbică.

Cind: Unghi îngust anatomic; glaucom cu unghi îngust. Copii cu greutate mică la naștere și bătrâni cu boli grave cardiovasculare sau cerebrale. În timpul intervențiilor chirurgicale când bariera epitelială corneeană a fost deranjată. Hipersensibilitate cunoscută la fenilefrină.

Al: Glaucom. Dilatarea pupilei la pacienții vârstnici după dezlipire de retină sau chirurgie a cataractei. La vârstnici pot apărea flocoane pigmentare tranzitorii în umoarea apoasă. Expunerea prelungită la aer sau lumină puternică poate cauza degradarea (soluția este brună sau conține precipitați).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OCTREOTIDUM
OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS

Cod ATC: R02AAN0

FENOSEPT 0,3 mg TERAPIA SA; Cpr. de supt 0,3 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/OTC)

Ind: Profilaxia și trat. infecțiilor buco-faringiene (stomatită, faringită, laringită, gingivită, parodontită); după intervenții chirurgicale, extracții dentare; pentru dezodorizarea cavității bucale.

Dz: *Adulți:* 1 cpr. la 2 ore în faza acută, apoi 1 cpr. de 3-4 ori/zi (cel mult 4 săptăm.). *Copii (peste 2 ani):* 1 cpr. de 3-4 ori/zi.

Cind: Copii sub 2 ani; persoane cu alergie la produs.

Al: Cpr. nu se înghit, ci se lasă să se dizolve lent în gură. Sarcină și alăptare.

RA: Rar, fenomene de iritație locală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OFLOXACINUM
OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM

Cod ATC: N03AB02**FENITOIN 100 mg** GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**PHENYDAN®** DESITIN; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml (**P-RF**)

Ind: Epilepsie majoră, crize focale corticale și unele cazuri de epilepsie psihomotorie; migrenă, nevralgie de trigemen și glosfaringian; aritmii digitale, tahicardii paroxistice, boală Bouveret.

Dz: Oral: profilaxia crizelor de epilepsie: la adult 100 mg de 2 ori/zi, crescând progresiv până la doza eficientă, obișnuit 200-400 mg/zi, cel mult 600 mg/zi (o singură priză, pe nemâncate sau 2 prize, după mese, în caz de iritație gastrică); la copil 5-8 mg/kg/zi (1-2 prize); trat. nevralgiilor: la adult 100 mg de 2-4 ori/zi. Ca antiaritmice: doză de întreținere 100 mg/zi de 3-4 ori.

Cind: Alergie sau intoleranță la fenitoină, leucopenie și anemie marcată, hTA marcată, BAV de gradul II și III. Sarcină - primul trimestru.

Al: IH, IR, IC, insuficiență respiratorie, bolnavi cu accidente cerebro-vasculare în antecedente, cei care primesc hormoni tiroidieni; în epilepsie se dau doze cât mai mici între zilele 20-40 de sarcină.

RA: Anorexie, greață, vomă, epigastralgie, gingivită hipertrofică, hirsutism și acnee, erupții alergice, foarte rar sindroame de tip colagenoză, sd. Stevens-Johnson, LED, icter colestatic, necroză hepatică, hiperglicemie, osteomalacie, hemoragii la nou-născut, leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie, anemie aplastică sau megaloblastică, limfadenopatie. Oprirea bruscă a trat. la epileptici poate declanșa o stare de rău epileptic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OLANZAPINUM
OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM

Cod ATC: B02BA01

FITOMENADIONĂ TERAPIA SA; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (S/P-RF)

Ind: Hipoprotrombinemia congenitală sau consecutivă adm. unor preparate de tip cumarinic; carența de vit. K din IH și icterul obstructiv; tulburările de absorbție intestinală după trat. oral de lungă durată cu antibiotice, sulfamide sau salicilați; intoxicațiile cu warfarină; boala hemoragică a nou-născutului.

Dz: *Adulți:* în urgențe i.v., foarte lent, 2-10 mg/zi; în intoxicația acută cu derivate cumarinice maxim 40 mg/zi; curativ i.m., 5-40 mg/zi. *Nou-născuți și sugari cu boală hemoragică:* profilactic, i.m. 0,5-2 mg/zi sau oral 1-2 mg/zi; curativ, i.m. 1-2 mg/zi.

Cind: Intoleranță la fitomenadionă.

Al: De obicei hipoprotrombinemia din bolile hepatocelulare răspunde slab sau deloc la trat. Nou-născuți și sugari.

RA: Inj. i.v. rapidă: sudorație, congestia feței, dispnee, cianoză, tahicardie, colaps vascular periferic, sau chiar accidente letale; la nou-născuți, în cazuri rare: hiperbilirubinemie; la pacienții cu afecțiuni hepatice, inj. i.m. repetată - modificări locale cutanate și subcutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01EB01

OLOPATADINUM
OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM

APICARPIN 2%; APICARPIN 4% AMMAN PHARM. IND.; Sol. oft. 2%, 4%; ct. × 1 fl. × 10 ml (**P-6L**)

DROPIL® BRUSCHETTINI; Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 10 ml (**P-6L**)

ISOPTO® CARPINE 2% ALCON; Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 15 ml (**P-6L**)

PILOCARIN® TERAPIA SA; Sol. oft. 2%; ct. × 1 fl. × 10 ml (**P-6L**)

Ind: Glaucom cronic simplu; glaucom acut cu unghi închis; diagnosticul etiologic al midriazei.

Dz: În funcție de valorile presiunii intraoculare și de tipul de glaucom. O dată - 1 pic. sol. 2% sau gel 4% în sacul conjunctival.

Cind: Hipersensibilitate la componentele produsului; iridociclite și alte afecțiuni în care trebuie evitată mioza. Sarcină. Alăptare.

Al: Instilarea repetată și/sau timp îndelungat duce o absorbție semnificativă în circulația sistemică. Nu se adm. la pacienții cu miopie decât după un control al stării retinei periferice. Șoferi și activități de precizie.

RA: Spasm ciliar, hiperemie conjunctivală, lăcrimare, mioză, dificultăți de acomodare în condiții de întuneric; dezlipire de retină și opacități cristaliniene în cazul utilizării îndelungate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OMEPRAZOLUM
ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS

Cod ATC: D11AX15

ELIDEL 1% NOVARTIS PHARMA; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15, 30 sau 100 g (*P-RF*)

Ind: Tratamentul de scurtă durată și controlul pe termen lung al semnelor și simptomelor dermatitei atopice ușoară-moderată (eczemă), la adulți și copii peste 2 ani.

Dz: Adulți și copii mai mari de 2 ani: Se aplică un strat subțire de Elidel 1% pe suprafața cutanată afectată, de două ori pe zi, apoi se masează ușor până la pătrunderea completă în piele. Crema poate fi folosită pe toate suprafețele cutanate, inclusiv cap și față, gât și arii intertriginoase.

Cind: Hipersensibilitate la pimecrolimus, alți macrolactami sau la oricare din excipienții produsului. Copii mai mici de 2 ani. Sarcină.

Al: Nu se aplică pe membranele mucoase. Elidel 1% nu trebuie aplicat sub ocluzie. Crema nu trebuie aplicată pe zone cutanate afectate de infecții acute virale (herpes simplex, varicelă). Prudență în alăptare.

RA: Senzație de arsură la locul aplicării. Iritație, prurit, eritem la locul aplicării. Infecții cutanate (foliculită). Dureri, parestezii, descuamare, uscăciune, edem și agravarea afecțiunii preexistente.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A10BG03

ONDANSETRONUM
ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONIUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM

ACTOS® ELI LILLY; Cpr. 15 mg, 30 mg sau 45 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. **(P-6L)**

Ind: Diabet zaharat de tip 2 (non-insulinodependent): ca monoterapie, la pacienți la care dieta și exercițiile fizice nu controlează adecvat glicemia; asociat insulinei sau unui antidiabetic oral la pacienți la care dieta, exercițiile fizice și antidiabeticul folosit nu controlează adecvat glicemia.

Dz: *Ca monoterapie:* Inițial 15-30 mg o dată/zi, independent de orarul meselor. La nevoie se crește până la 45 mg o dată/zi. *În asociație cu alte antidiabetice:* Sulfoniluree 15-30 mg o dată/zi, fără a modifica doza de sulfoniluree. Dacă pacientul face hipoglicemie, doza de sulfoniluree se scade. Metformină 15-30 mg o dată/zi, fără a modifica doza de metformină. Insulină 15-30 mg o dată/zi, fără a modifica doza de insulină. Atunci când glicemia scade sub 100 mg/100 ml sau apar simptome de hipoglicemie, doza de insulină poate fi scăzută cu 10-25%.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută față de produs. Bolnavi cu diabet de tip 1. Cetoacidoză diabetică. Boală hepatică activă sau nivele crescute ale transaminazelor. Pacienți sub 18 ani. Alăptare.

Al: Monitorizarea valorilor glicemiei și ale HbA1c. Risc de hipoglicemie în caz de asociere cu alte antidiabetice. La pacientele în premenopauză cu anovulație poate determina reluarea ovulației; sunt necesare măsuri contraceptive. Poate provoca scăderea valorilor Hb (cu 2-4%) și ale Ht, începând cu primele 4-12 săpt. de trat.. Edeme ușoare-moderate, expasiunea volumului plasmatic și hipertrofie cardiacă prin creșterea presarcinii. Prudență în prezența retenției hidrosaline și Cl la pacienții cu statut cardiac NYHA (clasele III-IV). Controlul enzimelor hepatice înainte de instituirea trat., la 2 luni în primul an de trat., apoi periodic și atunci când apar simptome care sugerează afectarea hepatică. În situații de stres (febră, traumatisme, infecții, intervenții chirurgicale) se ajustează doza. Sarcină.

RA: Infecții ale căilor aeriene superioare, cefalee, sinuzită, mialgii, agravarea diabetului zaharat, faringită. Edeme mai frecvente la asocierea cu insulină. Hipoglicemie ușoară - moderată. Creșteri ale transaminazelor serice și sporadice și trecătoare ale CPK.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M03AC06

ORLISTATUM
ORNIDAZOLUM
OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONIUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM

ARDUAN RICHTER GEDEON Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 4 mg; ct. × 25 fl. pulb. + 25 f. solv. × 2 ml (S)

Ind: Miorelaxant în anestezia generală, în intervenții chirurgicale unde efectul miorelaxant trebuie să dureze mai mult de 30 min.

Dz: *Adulți*, i.v., în intervențiile chirurgicale de durată medie sau lungă: pentru intubație și miorelaxare 0,06-0,08 mg/kg; în cazul intubației cu succinilcolină 0,04-0,06 mg/kg; în IR - maximum 0,04 mg/kg. Dozele mai mari pot produce un efect prelungit.

Cind: Miastenia gravis.

Al: Adm. numai în unitățile de terapie intensivă bine echipate. Se folosesc numai soluțiile proaspăt preparate.

RA: Bradicardie, mai ales la pacienții care au primit și halotan sau fentanil, concomitent sau în timpul inducerii anesteziei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ORNIDAZOLUM
 OSELTAMIVIRUM
 OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYNINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONIUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM

Cod ATC: N06BX03

LUCETAM® 1 g; LUCETAM® 3 g EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sol. inj. 200 mg/ml; ct. × 10 f. × 5 ml, resp. ct. × 4 sau 20 f. × 15 ml (**P-RF**)

LUCETAM® 1200 mg EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. film. 1200 mg; ct. × 1 fl. × 20 sau 60 cpr. (**P-6L**)

MEMOTAL® 1 g/5 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 200 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 5 ml (**P-RF**)

MEMOTAL® 400 mg SICOMED SA; Cpr. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

N-PIRACETAM NORDFARM PRODUCT; Cpr. 400 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (**P-6L**)

NEUROSTIM 400 mg; NEUROSTIM 800 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. 400 mg, 800 mg; ct. × 40 cpr. (**P-6L**)

NOOTROPIL® U.C.B.; Cps. 400 mg; ct. × 4 blist. × 15 cps. (**P-6L**)

NOOTROPIL® 800 mg, NOOTROPIL® 1200 mg U.C.B.; Cpr. film. 800 mg, 1200 mg; ct. × 4 blist. × 15 cpr. (800 mg), ct. × 3 blist. × 10 cpr. (1200 mg) (**P-6L**)

NOOTROPIL® U.C.B.; Sol. orală 20%; ct. × 1 fl. × 125 sau 200 ml (**P-6L**)

NOOTROPIL® U.C.B.; Sol. perf. 200 mg/ml; ct. × 1 fl. × 60 ml (**S**)

NOOTROPIL® U.C.B.; Sol. inj. 1 g/5 ml; ct. × 12 f. × 5 ml (**P-RF**)

PIRACETAM 400 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM ARENA GROUP SA; Cps. 400 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. (**P-6L**)

PIRACETAM SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 400 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM FABIOL SA; Cpr. 400 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM FARMEX COMPANY; Cpr. 400 mg; ct. × 4 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM 400 mg TERAPIA SA; Cpr. 400 mg; ct. × 4 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM ANTIBIOTICE SA; Cpr. 400 mg; ct. × 2 sau 150 blist. × 10 cpr. (**S/P-6L**)

PIRACETAM 400 mg LAROPHARM SA; Cpr. 400 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM 400 mg; PIRACETAM 800 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 400 mg, 800 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

PIRACETAM LPH® 400 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 400 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (**S/P-6L**)

PIRACETAM AL 800 ALIUD PHARMA; Cpr. film. 800 mg; ct. × 3, 6 sau 12 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

Ind: Deficite cognitive și neurosenzoriale cronice la vârstnici (cu excepția stărilor de demență); vertij; adjuvat în dislexie la copii peste 9 ani; mioclonii corticale postanoxice. Propus ca trat. al urmărilor AVC ischemice.

Dz: În stări de deficite cognitive și neurosenzoriale cronice la vârstnici și în vertij - oral, după mese 2,4 g/zi în 2-3 prize. În AVC ischemice - oral 2,4 g/ zi, maximum 4,8 g/zi în 2-3 prize; la nevoie se adm. parenteral 3-12 g/zi. În mioclonii corticale postanoxice se începe cu 6-8 g/zi, maxim 24 g/zi. În dislexie la copii - 50 mg/kg și zi în 3 prize. Injecțiile se pot adm. i.v. in bolus sau în perf sau i.m. În insuficiența renală, doza de piracetam se ajustează în funcție Cl. creatinină: Cl 40-60 ml/min: 1/2 din doza uzuală; Cl 20-40 ml/min: 1/4 din doza uzuală; Cl < 20 ml/min: Cl.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OSELTAMIVIRUM
OTILONIUM BROMIDUM
OXACILLINUM
OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM

Cod ATC: N04BXN1; C04AX13**PRONORAN® 50 mg** LAB. SERVIER; Dj. cu elib. prel. 50 mg; ct. × 2 blist. × 15 dj. (*P-6L*)

Ind: Tratamentul bolii Parkinson (îndeosebi în formele clinice cu tremor), atât în monoterapie, cât și în asociere cu levodopa; tratament adjuvant la pacienții vârstnici cu deficit patologic cronic cognitiv și neurosenzorial (cu excepția bolii Alzheimer și a altor demențe); tratament adjuvant în claudicația intermitentă din arteriopatia cronică obliterantă.

Dz: Tratamentul bolii Parkinson: Doza inițială este de 50 mg/zi, crescând cu câte 50 mg la 3 zile, până la atingerea dozei de întreținere: în monoterapie: doza de întreținere: 150-250 mg/zi, fracționată în 3-5 prize; în asociere cu levodopa: doza de întreținere este de 100-150 mg/zi, fracționată în 2-3 prize. Pentru celelalte indicații: Doza de întreținere uzuală este de 50-100 mg/zi, fracționată în 1-2 prize.

Cind: Hipersensibilitate la piribedil sau la oricare dintre excipienții produsului. Colaps cardiovascular. Infarct miocardic acut.

Al: Nu se întrerupe adm. antihipertensivelor la pacienții cu HTA dacă primesc și piribetil. La pacienții cu sindrom neuroleptic, administrarea piribedilului nu se recomandă (se va utiliza un anticolinergic central). Este contraindicată asocierea piribedil cu antagoniști dopaminergici - neuroleptice (cu excepția clozapinei) și antiemetice cu efecte extrapiramidale. Nu se recomandă utilizarea piribedil în timpul sarcinii sau alăptării.

RA: Rareori, tulburări digestive minore (greață, vărsături, flatulență) care pot să dispară la ajustarea dozei; foarte rar, stări de confuzie sau de agitație; excepțional hTA ortostatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OTILONIUM BROMIDUM
 OXACILLINUM
 OXALIPLATINUM
 OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYNINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM

Cod ATC: M01AC01, M02AA07, S01BC06

BRUXICAM 0,5% BRUSCHETTINI; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-6L)
FELDENE PFIZER; Cps. 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
FELDENE PFIZER; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 6 f. × 1 ml (P-RF)
FELDENE PFIZER; Gel 0,5%; ct. × 1 tub × 25 g (OTC)
FINALGEL® SPORT BOEHRINGER INGELHEIM; Gel 5%; ct. × 1 tub × 35 g sau 50 g (OTC)
HOTEMIN EGIS PHARMACEUTICALS; Sol. inj. 20 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)
PIROXICAM TERAPIA SA; Cpr. 20 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)
PIROXICAM ANTIBIOTICE SA; Sup. 20 mg și 40 mg; ct. × 2 folii × 3 sup. (P-6L)
PIROXICAM ANTIBIOTICE SA; Cremă 3%; Gel 0,5%; ct. × 1 tub × 35 g, respectiv ct. × 1 tub × 40 g (OTC)
PIROXICAM MK CREMĂ MARK PHARMACEUTICS SRL; Cremă 3%; ct. × 1 tub × 35 g (OTC)
PIROXICAM MK GEL MARK PHARMACEUTICS SRL; Gel 1%; ct. × 1 tub × 25 sau 45 g (OTC)
PIROXICAM ARENA GROUP SA; Cpr. 20 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (P-6L)
PIROXICAM OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
PIROXICAM OZONE LABORATORIES Ltd.; Cremă 3%; ct. × 1 tub × 35 g (P-6L)
PIROXICAM FABIOL SA; Cpr. 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
PIROXICAM 20 mg LAROPHARM SRL; Cpr. 20 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (P-6L)
PIROXICAM LPH® 20 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. 20 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)
PIROXICAM 20 mg AC HELCOR SRL; Cpr. 20 mg piroxicam; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)
PIROXICAM 20 mg SINTOFARM SA; Cpr. 20 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)
PIROXICAM 20 mg SINTOFARM SA; Sup. 20 mg; ct. × 2 blist. × 5 sup. (P-6L)
PIROXSAL® SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 20 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)

Ind: Sistemic: poliartrită reumatoidă, poliartrită reumatoidă juvenilă, osteoartroză, spondilită anchilozantă, afecțiuni musculo-scheletice acute, criză de gută, dureri post-operatorii și post-traumatice acute, dismenoree primară la paciente cu vârsta peste 12 ani; ameliorarea febrei și durerii asociate cu inflamațiile acute ale tractului respirator superior. Local: tendinite, tenosinovită; umăr dureros; contuzii, entorse, luxații.

Dz: Sistemic la adulți: Poliartrită reumatoidă, osteoartroză, spondilită anchilozantă: 20 mg/zi, priză unică. Dozele zilnice: 10-30 mg. Criză de gută: inițial 40 mg; în următoarele 4-6 zile 40 mg/zi, în priză unică sau fracționat. Afecțiuni musculo-scheletice acute: 40 mg/zi în primele 2 zile, în doză unică sau fracționat. În următoarele 7-14 zile de trat., se dau 20 mg/zi. Dureri post-operatorii și post-traumatice: inițial 20 mg/zi, în priză unică. Se poate începe cu 40 mg/zi în primele 2 zile, în doză unică sau fracționat, apoi 20 mg/zi. Dismenoree: inițial 40 mg/zi în priză unică, în primele 2 zile; în următoarele 1-3 zile, doză zilnică unică de 20 mg. Inflamații ale tractului respirator superior: 10-20 mg oral o dată pe zi. Se poate începe cu 40 mg/zi în doză unică, în primele 2 zile; în următoarele 3-5 zile se continuă cu 10-20 mg/zi. Doze la copii peste 15 ani: Poliartrită reumatoidă juvenilă: 26-45 kg - 15 mg/zi > 46 kg -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OXALIPLATINUM
OXAPROZINUM
OXCARBAZEPINUM
OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM

Cod ATC: D06BB04

CONDYLINE ASTELLAS PHARMA; Sol. cut. 0,5%; ct. × 1 fl. × 3,5 ml + 15 dispozitive de aplicare (P-RF)
WARTEC 0,15% STIEFEL LAB. Ltd.; Cremă 0,15%; ct. × 1 tub × 5 sau 10 g (P-RF)

Ind: Condiloamele acuminat externe.

Dz: De 2 ori/zi pe condiloame cu ajutorul unui aplicator inclus în pachet; se repetă timp de 3 zile consecutiv. Se poate repeta maximum 5 săpt. succesive. Nu se pune în contact cu pielea sănătoasă.

Cind: Copii. Asocierea cu alte preparate de podofilină.

Al: După aplicarea soluției, se lasă să se usuce bine pentru evitarea producerii intertrigo-ului. Evitarea contactului cu ochii; dacă totuși s-a produs accidental, ochii se vor clăti foarte bine cu apă. Perilezional se aplică un strat protector de cremă (vaselină, unguent cu zinc). Aplicarea preparatului pe zone extinse de mucoase poate duce la reacții generale. Sarcină. Alăptare.

RA: În ziua a doua și a treia de trat.: eritem dureros și/sau ulcerarea superficială a epiteliului din zona tratată. Durere în timpul aplicării. Edem și balanopostită la pacienții cu vegetații mari în pliul prepușal. Aceste efecte locale se estompează după câteva zile de terapie antiinflamatorie topică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B05AA06

OXAPROZINUM
 OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYNINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM

HAEMACCEL THERASELECT; Sol. perf. 3,5%; ct. × 1 fl. × 500 ml (**S**)

Ind: Substituent de plasmă utilizat pentru a corecta sau a preveni insuficiența circulatorie prin deficit de volum plasmatic/sanguin: șoc hipovolemic, profilaxia șocului în stări hipovolemice datorate pierderilor de sânge și plasmă (de exemplu prin traumatism, arsuri, donare autologă de sânge sau plasmă înaintea unei intervenții chirurgicale), by-pass cardio-pulmonar (circulație extracorporeala), soluție de transport pentru insulină.

Dz: În cazul în care nu există și altă patologie asociată, se recomandă administrarea următoarelor doze: pt. profilaxia șocului 500-1500 ml, în șocul hipovolemic, până la 2000 ml. Administrarea se face în perfuzie i.v.

Cind: Hipersensibilitate.

Al: Haemaccel se va administra numai după o atentă evaluare a raportului risc/beneficiu și cu deosebită prudență în toate situațiile în care creșterea volumului intravascular și consecințele sale (de exemplu: creșterea volumului- bătaie cardiac, a tensiunii arteriale), creșterea volumului interstițial sau hemodiluția pot reprezenta un risc deosebit pentru pacient și anume insuficiența cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, varice esofagiene, edem pulmonar, diateze hemoragice, anurie renală și postrenală.

RA: În cursul sau după perfuzia cu substituenți de plasmă pot apărea ocazional: reacții cutanate tranzitorii (urticarie, papule), hipotensiune arterială, tahicardie, bradicardie, greață vărsături, dispnee, creșterea temperaturii și/sau frisoane. Foarte rar au fost observate cazuri de reacții severe de hipersensibilitate, potențial letale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OXCARBAZEPINUM
 OXELADINUM
 OXIGENUM
 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
 OXYBUTYINUM
 OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM

Cod ATC: D08AG02, G01AX11, S01XA20

BETADINE® ovule EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Ovule 200 mg; ct. × 2 folii × 7 ovule (OTC)
BETADINE® unguent EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Ung. 10%; ct. × 1 tub × 20 g (OTC)
BETADINE® soluție EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sol. cut. 10%; ct. × 1 fl. × 30, 120 sau 1000 ml (OTC)
BETADINE® săpun chirurgical EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sol. cut. 75 mg/ml; ct. × 1 fl. × 120 sau 1000 ml (OTC)
IODINĂ 10% TIS FARMACEUTIC; Sol. ext. 10%; ct. × 1 fl. × 125 ml (OTC)
IODIS-T 10% TIS FARMACEUTIC; Sol. vaginală 10%; ct. × 1 fl. × 125 ml (OTC)
JODISOL DENTAL AS; Sol. pt gargarisme 0,37%; ct. × 1 fl. × 3,6, 80 sau 760 g sol. (OTC)
IDOSEPT® GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Sol. ext. 10%; ct. × 1 fl. × 40 g (OTC)
OCULOTECT® FLUID NOVARTIS PHARMA; Sol. oft. 5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)

Ind: Ovulele vaginale: vaginite acute și cronice, infecții mixte, specifice și nespecifice (Gardnerella, Trichomonas, Candida). Pregătirea preoperatorie. **Soluția:** dezinfectia pielii și mucoaselor; trat. plăgilor aseptice, infecțiilor cutanate bacteriene și fungice; dezinfectia preoperatorie corporală totală sau parțială. **Săpunul:** dezinfectia mâinilor; igiena personalului medical și auxiliar; în laboratoare după contactul cu exsudate și secreții; asepsia preoperatorie a mâinilor. **Unguentul:** arsuri, răni septice și aseptice, ulcere trofice, escare și alte infecții cutanate și dermatoze suprainfectate.

Dz: Un ovul pe zi, 7-14 zile, profund în vagin, seara la culcare; se pot adm. 2 ovule/zi și pentru o perioadă mai lungă. Preoperator, un ovul pe zi, câteva zile înainte de operație. **Soluția** nediluată, sau în diluție de 1/10 în funcție de aplicație. Pentru trat. rănilor, arsurilor, infecțiilor cutanate și ale mucoaselor - diluție 1/10; pentru băile preoperatorii - diluție 1/100 (expunere minimum 2 minute). Diluțiile se prepară ex tempore. **Săpunul** se folosește numai nediluat; pentru practica medicală curentă 5 ml, minim 1 minut, cu clătire abundentă cu apă caldă; preoperator 10 ml timp de 2,5 minute; operația se repetă după spălarea abundentă a mâinilor cu apă sterilă (în total 20 ml polividonă 5 min). **Unguentul:** pe tegumente curate și uscate.

Cind: Alergie la iod, hipertiroidie, dermatită herpetiformă Duhring, înaintea trat. cu iod radioactiv; IR gravă; nou-născuți.

Al: Patologiile tiroidiene (hiperfuncții). Culoarea brună a polividonei îi indică eficacitatea; diminuarea sau dispariția culorii indică scăderea activității antimicrobiene. Polividona se descompune sub influența luminii sau la temperaturi mai mari de 40 de grade. Efectul antimicrobian se exercită la un pH 2-7. Nu se asociază cu preparate topice enzimactice sau pe bază de mercur, sau cu alte antiseptice. Complexul PVP-iod este incompatibil cu agenții reducători, sărurile alcaline și acizii. În cazul săpunului, se testează sensibilitatea în prealabil. Atenție la unguent în patologiile tiroidiene, la vârstnici, la nou-născuți, copii mici, gravide și în perioada alăptării.

RA: În caz de sensibilitate la iod, uneori iritații locale cu caracter tranzitoriu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N04BC05

OXELADINUM
OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM

MIRAPEXIN® PFIZER; Cpr. 0,18 mg, 0,7 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Boala Parkinson idiopatică, ca monoterapie în stadiul incipient al bolii, și în asociere cu levodopa în stadiul avansat al afecțiunii.

Dz: *Trat. inițial.* Dozele se cresc treptat, la fiecare 5-7 zile, de la 0,375 mg/zi adm. în 3 prize egale, până la atingerea efectului terapeutic optim. Orarul de creștere a dozelor: Săpt. I - 0,375 mg/zi; săpt. II - 0,75 mg/zi; săpt. III - 1,5 mg/zi; săpt. IV - 2,25 mg/zi; săpt. V - 3 mg/zi; săpt. VI - 3,75 mg/zi; săpt. VII - 4,50 mg/zi. *Trat. de întreținere.* 1,5-4,5 mg/zi, cu sau fără levodopa. În asociere, se reduce doza de levodopa (cu 27%). Pacienți cu disfuncții renale: Cl creatinină 20-50 ml/min, doză inițială de 0,25 mg/zi (în două prize de 0,125 mg); Cl creatinină < 20 ml/min, 0,125 mg/zi. *Întreruperea trat.* - gradat, în decurs de o săpt.

Cind: Hipersensibilitatea la pramipexol sau la oricare dintre componentele produsului. Alăptare.

Al: hTA ortostatică la care apare toleranță în cazul titrării gradate a dozei adm. Potențarea efectelor secundare de tip dopaminergic ale levodopa (diskinezii). Monitorizarea oftalmologică la intervale regulate, sau când apar anomalii ale vederii. Pacienți sub 18 ani. Ajustarea dozei la pacienții cu afectare renală. Sarcină. Șoferi și activități de precizie.

RA: hTA ortostatică, greață, diskinezie, insomnie, somnolență, halucinații, cefalee, constipație, anormalități onirice și confuzie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OXIGENUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM

Cod ATC: N06BX16**PRAMISTAR®** BERLIN-CHEMIE AG; Cpr. film. 600 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)****Ind:** Tulburări de memorie și de concentrare la vârstnici, de origine degenerativă sau vasculară.**Dz:** 600 mg de 2 ori/zi, dimineața și seara. Efect relevant se obține după 4-8 săpt. de trat.**Cind:** Hipersensibilitate la pramiracetam sau la celelalte componente ale produsului. IR severă. Sarcină. Alăptare.**Al:** IR moderată, ajustarea dozelor. Șoferi și activități de precizie.**RA:** Agitație psihomotorie, insomnie, disforie, indigestie, epigastralgie. Ocazional: amețeli, tremor, incontinență urinară și fecală, confuzie, greață, uscăciunea gurii, crampe musculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM

Cod ATC: C10AA03**LIPOSTAT®** BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cpr. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 3 sau 5 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**PRALIP** LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr.; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

Ind: Boala vasculară aterosclerotică datorată hipercolesterolemiei (în asociere cu o dietă hipolipidică). Reducerea riscului IM recurent și a atacului ischemic tranzitoriu (TIA). Reducerea hiperlipidemiilor totale.

Dz: 10-40 mg o dată/zi la culcare, în afara meselor sau în doze divizate Doza inițială: 10-20 mg. Dacă colesterolul seric este peste 300 mg/dl se adm. inițial 40 mg zilnic. Efectul maximal unei doze este evident după 4 săpt. În caz de asociere cu ciclosporină se adm. inițial 10 mg/zi, maximum 20 mg/zi. Dacă se asociază cu o rășină, pravastatin trebuie adm. cu minim 1 oră înainte de masă sau minim 4 ore după rășină.

Cind: Hipersensibilitatea la orice component al medicamentului. Afectarea funcțiilor hepatice. Sarcină și alăptare.

Al: Funcția hepatică: La începutul terapiei - creșterea enzimelor hepatice; testarea funcției hepatice. Oprirea trat. când GOT și GPT sunt egale sau depășesc de 3 ori limita normală superioară și persistă. Pacienți cu afecțiuni hepatice în antecedente sau alcoolici. Pacienți sub 18 ani.

RA: Urticarie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OXYBUTYINUM
OXYCODONUM
OXYMETAZOLINUM
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM

Cod ATC: P02BA01

CESOL® MERCK KGaA; Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 fl. × 6 cpr. (*P-RF*)

Ind: Infecții determinate de *Taenia saginata*, *Taenia solium*, *Hymenolepsis nana*, *Diphyllobothrium pacificum*.

Dz: Doză unică cu mult lichid în timpul uneia dintre mese. În infecțiile cu *Taenia saginata*, *Taenia solium* și *Diphyllobothrium pacificum*: 10 mg/kg. În infecțiile cu *Hymenolepsis nana*: 15 mg/kg.

Cind: Hipersensibilitate la preparat, cisticercoză intraoculară.

Al: IR și IH. Primele 3 luni de sarcină și alăptare. Șoferi și activități de precizie.

RA: La scurt timp de la ingestie pot apărea dureri abdominale, cefalee, somnolență, amețeli, greață și prurit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C02CA01

OXYCODONUM
 OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZQUANTELUM
PRAZOSINUM

MINIPRESS® 1 mg; MINIPRESS® 2 mg PFIZER; Cpr. 1 mg, 2 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: HTA singur, sau în combinație cu un diuretic sau alte antihipertensive. Poate fi folosit la pacienții cu funcție renală compromisă. Trat. insuficienței ventriculare stângi. Fenomenul și maladia Raynaud. Hiperplazia benignă de prostată; trat. simptomatic al obstrucției urinare cauzate de hipertrofia benignă de prostată.

Dz: Se începe cu o doză mai mică, care se crește progresiv până la un răspuns optim. *HTA:* doza totală zilnică 20 mg adm. de 2-3 ori/zi, asociat cu un diuretic sau un beta-blocant. Ca monoterapie: inițial 0,5 mg seara la culcare, apoi 0,5 mg de 2-3 de ori/zi pentru 3-7 zile. Se crește la 1 mg de 2-3 ori/zi pentru 3-7 zile, dacă nu apar reacții adverse. Apoi, doza va fi mărită gradat până la o doză totală zilnică de 20 mg adm. divizat. Doza de întreținere: 3-20 mg în doze divizate. *Insuficiența ventriculară stângă:* Doza inițială 0,5 mg de 2, 3 sau 4 ori/zi, cu creșteri până la doza 4 -20 mg/zi în doze divizate. *Fenomenul și maladia Raynaud:* Doza inițială 0,5 mg de 2 ori/zi, 3-7 zile. Doza întreținere 1-2 mg de 2-3 ori/zi. *Hiperplazia benignă de prostată:* Doza inițială 0,5 mg de 2 ori/zi, 3-7 zile. Doza întreținere 2 mg de 2 ori/zi.

Cind: Sensibilitate cunoscută la chinazoline. Trat. insuficienței ventriculare stângi datorate obstrucției mecanice (stenoza aortică, stenoza mitrală, embolismul pulmonar și pericardita constrictivă). Copii sub 12 ani.

Al: *HTA:* hTA posturală sau pierderi de conștiență în special la începutul trat. Se dă o doză inițială scăzută, cu o creștere ușoară în prima și a doua săpt. de trat. *Insuficiență ventriculară stângă:* în caz de adm. la pacienți care au primit trat. diuretic energic sau trat. vasodilatator, poate apărea scăderea presiunii de umplere a ventriculului stâng și o scădere semnificativă a debitului cardiac și a tensiunii arteriale. *Fenomenul și maladia Raynaud, hiperplazia benignă de prostată:* monitorizarea tensiunii arteriale.

RA: Amețeli, cefalee, somnolență, slăbiciune, palpitații și greață, care au dispărut frecvent în cazul continuării trat. Rar vărsături, diaree sau constipație, disconfort abdominal, alterări ale funcției hepatice, pancreatită, edeme, hTA ortostatică, dispnee, leșin, tahicardie, nervozitate, vertij, halucinații, depresie, paretezii, rash, prurit, alopecie, lichen plan, polachiurie, impotență, incontinență, priapism, tulburări de vedere, epistaxis, tinitus, uscăciune a gurii, congestie nazală, transpirații, febră, artralгии. În asociere cu glicozide cardiace și diuretice: somnolență, amețeală, hTA posturală, tulburări de vedere, edeme, uscăciunea gurii, palpitații, greață, diaree, impotență, cefalee și congestie nazală. În trat. maladii și fenomenului Raynaud frecvent somnolență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

OXYMETAZOLINUM
 OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZQUANTELUM
 PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM

Cod ATC: H02AB06

SOLU-DECORTIN MERCK KGaA; Pulb. pt. sol. inj. 50 mg, 250 mg; ct. × 3 fl. pulb. + 3 f. solv. × 2 sau 5 ml (*P-RF*)
ULTRACORTENOL NOVARTIS PHARMA; Sol. oft. 5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 5 ml (*P-RF*)

Ind: *Afecțiuni reumatologice:* injecții intraarticulare în artrite inflamatorii, acutizări ale artrozilor; injecții periarticulare în tendinite și bursite; injecții la nivelul părților moi în sindromul de tunel carpian, boala Dupuytren; injecții epidurale în radiculalgii; injecții intradurale în radiculagiile refractare la alte tratamente sau cu ocazia recoltării unei probe de lichid cefalorahidian. *Afecțiuni dermatologice:* cicatrice cheloidă; *Afecțiuni neoplazice:* meningite leucemice și tumorale; *Afecțiuni oftalmologice:* se injectează periocular în boli inflamatorii ale polului anterior al globului ocular. *Afecțiuni ORL:* irigații intrasinusale la pacienții cu sinuzite subacute sau cronice, atunci când se impune drenajul cavităților sinusale.

Dz: În funcție de afecțiunea tratată, se injectează local 12,5-50 mg. Nu se inj. i.v.

Cind: Hipersensibilitate la produs. Tulburări severe ale coagulării. Tratament anticoagulant concomitent. Infecții locale sau sistemice.

Al: Deși se injectează local și absorbția în circulația sistemică este mică, se impun aceleași precauții ca și în cazul glucocorticoizilor administrați sistemic. Au risc mare de RA (inclusiv corticodependență). Tratamentul se face sub control medical și, în măsura posibilului, se va evita administrarea timp îndelungat a dozelor mari. Oprirea bruscă a adm. poate determina exacerbară simptomelor bolii tratate, chiar fenomene de insuficiență suprarenală de aceea se va face prin diminuarea progresivă a dozelor. În situații de stres (intervenții chirurgicale, traumatisme, infecții) se crește doza. Ulcerul gastroduodenal activ reprezintă o contraindicație relativă a corticoterapiei; atunci când adm. glucocorticoizilor este indispensabilă, se recomandă asocierea cu inhibitori ai secreției gastrice acide și evitarea tratamentului prelungit. Dacă apare o infecție în timpul adm., este obligatorie instituirea tratamentului antiinfecțios specific. Pot beneficia de tratament cu glucocorticoizi infecțiile grave însoțite de șoc, formele grave de tuberculoză, encefalitele virale acute. Glucocorticoizii favorizează dezvoltarea osteoporozei. La copii pot întârzia creșterea. Acest efect poate fi minimizat prin evitarea tratamentului îndelungat cu doze mari. Glucocorticoizii pot provoca fenomene de excitație centrală, chiar fenomene psihotice. Diabetul zaharat manifest este o contraindicație relativă. Doze mari și tratament îndelungat pot provoca hipokaliemie. Administrarea glucocorticoizilor necesită prudență la vârstnici, la pacienți cu colită ulceroasă, anastomoze intestinale recente, IR, IH, miastenia gravis. Sportivii trebuie atenționați că glucocorticoizii sistemici sunt incluși pe lista substanțelor dopante. În general, glucocorticoizii trebuie folosiți în timpul sarcinii numai la indicația și sub supravegherea medicului. Deoarece glucocorticoizii se excretă în lapte, alăptarea trebuie evitată în timpul tratamentului.

RA: Infecții locale la locul injecției: artrite, meningite etc. Atrofie localizată a țesuturilor musculare, subcutanate și

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H02AB06

OXYTOCINUM
 PACLITAXELUM
 PANCURONII BROMIDUM
 PANTOPRAZOLUM
 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
 PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
PREDNISONUM

PREDNISON 5 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr.; (P-RF)**PREDNISON** ARENA GROUP SA; Cpr. 5 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)**PREDNISON 5 mg** SINTOFARM SA; Cpr. 5 mg; ct. × 1 fl. × 30 cpr. (P-RF)**PREDNISON 5 mg** GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. 5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Colagenoze: pusee evolutive ale bolilor de sistem: LES, vasculite, polimiozite, sarcoidoză viscerală. Afecțiuni dermatologice: lupus eritematos, pemfigus și pemfigoid bulos, psoriazis grav rezistent la alte trat., forme severe de urticarie acută. Afecțiuni digestive: forme grave de rectocolită hemoragică și boală Crohn, hepatită cronică activă autoimună, hepatită alcoolică acută severă. Afecțiuni endocrine: tiroidită, cazuri selecționate de hipercalcemie. Afecțiuni hematologice: purpură trombocitopenică imunologică severă, anemie hemolitică autoimună, eritroblastopenie, hemopatii maligne limfoide-leucemie limfocitară acută sau cronică, limfoame Hodgkiniene sau non-Hodgkiniene (în asociații polichimioterapice). Afecțiuni neoplazice: pt. combaterea unor efecte secundare dezvoltării neoplaziei și pentru împiedicarea unor reacții adverse la citostatice. Afecțiuni renale: sindrom nefrotic cu leziuni glomerulare minime sau cu hialinoză segmentară și focală primitive, nefropatie lupică stadiile III-IV, sarcoidoză granulomatoasă intrarenală, vasculite cu afectare renală, glomerulonefrite extracapilare primitive. Afecțiuni neurologice: edem cerebral de etiologie tumorală, poliradiculonevrită cronică idiopatică inflamatorie, spasme infantile, scleroză multiplă în puseu, miastenie gravă, meningită tbc (asociat chimioterapiei specifice, ca medicație adjuvantă). Afecțiuni oftalmologice: uveită anterioară și posterioară severă, exoftalmie edematoasă, nevrită optică confirmată (în continuarea unui glucocorticoid intravenos). Afecțiuni ORL: polipi nazali, cazuri selecționate de otită seroasă și de sinuzită, rinite alergice sezoniere (cure scurte), laringită acută severă la copii. Afecțiuni respiratorii: astm bronșic cronic - forme rezistente la medicația uzuală, inclusiv glucocorticoizi inhalatori, pusee acute de astm bronșic (cure scurte), stare de rău astmatic (în continuarea unui glucocorticoid intravenos); BPCO, sarcoidoză evolutivă, fibroză pulmonară interstițială difuză. Afecțiuni reumatologice: forme severe de poliartrită reumatoidă, pusee acute ale bolii artrozice, RAA, nevralgie cervico-brahială severă rebelă. Transplant de organe și măduvă osoasă: profilaxia și trat. rejeteului de grefă și a reacției grefă contra gazdă.

Dz: În situații acute se începe cu doze mari, 30-80 mg/zi, oral la adult și 1-3 mg/kg/zi la copii. În afecțiunile severe cu evoluție prelungită, trat. se continuă cu doza de întreținere, obișnuit 10 mg zilnic (5-15 mg), într-o singură priză, dimineata la sculare. Se încearcă schema de trat. alternativ, o dată la 2 zile. Întreruperea medicației se face prin reducerea progresivă a dozei - cu 1 mg la 1-2 săpt. În boli cronice evolutive se începe cu o doză mică, 5-10 mg/ zi la adult, 0,25-0,5 mg/kg/zi la copii, care se crește progresiv până la realizarea beneficiului terapeutic. Apoi doza se reduce treptat până la doza minimă efecă. Durata trat. depinde de situația clinică.

Cind: Nu există contraindicații absolute ale glucocorticoizilor, atunci când adm. acestora este de importanță vitală. Ulcer gastroduodenal, osteoporoză, psihoze, anumite stări infecțioase, herpes, varicelă, zona zoster, atunci când

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PACLITAXELUM
PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM

Cod ATC: N03AXN1

LYRICA 25 mg; LYRICA 50 mg; LYRICA 75 mg; LYRICA 100 mg; LYRICA 150 mg; LYRICA 200 mg; LYRICA 300 mg PFIZER;
Cps. 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg (*P-RF*)

Ind: Durere neuropată periferică la adulți. Adjuvant în caz de convulsii parțiale, cu sau fără generalizare secundară.

Dz: 150-600 mg/zi, în 2 sau 3 prize.

RA: Amețeală, somnolență, creșterea apetitului, euforie, confuzie, iritabilitate, vedere încețoșată, diplopie, constipație, vomă, neutropenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PANCURONII BROMIDUM
PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE

DESCRIERE

INFO

ALBUMINĂ UMANĂ**Cod ATC: B05AA01***KAMADA Ltd.*; Sol. perf. 20%; ct. × 1 fl. × 50 ml **(S)***CENTEON PHARMA*; Sol. perf. 20%; ct. × 1 fl. × 50 ml **(S)***HUMAN SERUM*; Sol. perf. 20%; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml **(S)***OCTAPHARMA*; Sol. perf. 20% **(S)***UMAN ALBUMIN - KEDRION*; Sol. perf. 20%; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml **(S)***ALBUMINĂ-LFB - LAB. FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DE BIOTECH.*; Sol. perf. 20%; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml **(S)**

Ind: Trat. de urgență al șocului și în alte situații care impun refacerea rapidă a volumului sanguin; stări de hipoproteinemie cu sau fără edeme; în arsurile grave pentru a preveni hemoconcentrația.

Dz: În perf. i.v., inițial 500 ml, se repetă la nevoie; se folosesc sol. încălzite la temperatura corpului.

Cind: Anemie gravă, IC, alergie specifică.

Al: Prudență la bolnavii cu rezervă cardiacă mică sau hipertensivi (viteza perfuziei să nu depășească 100 ml/oră) și în caz de traumatisme (atenție la sângerare).

RA: Rareori greață, vomă, salivație, febră; dacă dozele sunt excesive sau în caz de deficit de pompă cardiacă poate provoca supraîncărcare circulatorie, chiar EP.

BERIATE P**Cod ATC: B02BD02**

AVENTIS BEHRING; Pulb. liofilizată reprezentând Factorul VIII de coagulare, având o activitate specifică de coagulare (F VIII:C) de 250 UI, 500 UI sau 1000 UI; ct. × 1 fl. pulb. + 1 fl. solv. × 2,5 sau 5 ml + 1 set de administrare **(S)**

Ind: Profilaxia și trat. hemoragiilor în: hemofilia tip A (deficiență genetică de Factor VIII), deficiență de Factor VIII dobândită, trat. pacienților cu anticorpi la Factorul VIII.

Dz: Doza inițială: unități necesare = greutate (kg) × procentul (%) de creștere dorit × 0,5. Este posibil să fie necesare doze mai mari decât cele calculate. În terapia de substituție, în cazul intervențiilor chirurgicale majore se monitorizează activitatea Factorului VIII din plasmă. Profilaxia îndelungată a hemoragiilor la pacienții cu hemofilie tip A severă necesită adm. 10-50 UI de Factor VIII/kg la 2-3 zile. După adm. conc. de Factor VIII la hemofilici, este absolut necesară testarea anticorpilor pentru Factorul VIII. Pentru hemofilia inhibitorie este necesară aplicarea unei

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PANTOPRAZOLUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM

Cod ATC: J01FG01

PYOSTACINE 250 mg; PYOSTACINE 500 mg AVENTIS PHARMA; Cpr. film. 250 mg, 500 mg; ct. × 2 blist. × 8 cpr. (P-RF)

Ind: Tratamentul infecțiilor cu germeni sensibili: infecții ORL; infecții bronhopulmonare (în special pneumoniile comunitare); infecții genitale; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții osteo-articulare. În cazul existenței alergiei la antibiotice beta-lactamice, pristinamicina este indicată pentru prevenirea endocarditei bacteriene în cursul tratamentelor stomatologice și în intervențiile ambulatorii.

Dz: *Adulți:* 2-3 g/zi, în 2-3 prize, în timpul meselor. Doza se poate crește până la 4 g/zi. *Copii:* 50 mg/kg/zi, în 2-3 prize. În cazul infecțiilor severe, doza se poate crește până la 100 mg/kg/zi. Profilaxia enocarditei infecțioase: Doză unică, adm. cu o oră înainte de intervenție; la adulți 1 g iar la copii 25 mg/kg.

Cind: Hipersensibilitate la pristinamicină și/sau virginiamicină sau la oricare dintre excipienții produselor. Antecedente de erupție pustuloasă la pristinamicină. Hipersensibilitate sau intoleranță la gluten, datorită prezenței amidonului de grâu.

A!: La începutul trat. eritem febril generalizat, asociat cu pustule, ce impune întreruperea trat. și Cind orice adm. ulterioară. Este posibilă o sensibilizare anterioară la virginiamicină. Atenție la asocierea cu ciclosporină.

RA: Tulburări gastrointestinale, greață, diaree, rar colită pseudomembranoasă, colită acută hemoragică; hipersensibilitate cutanată: rash, urticarie, foarte rar anigoedem; cazuri izolate de pustuloză exantematică acută generalizată.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PARACETAMOLUM
PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AB04, A04ADN1**EMETIRAL® 5 mg ZENTIVA ROMANIA;** Cpr. film. 5 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. **(P-RF)**

Ind: Prevenirea și trat. vărsăturilor: postoperatorii și postanestezice, în uremie, în boala de iradiere, în gastroenterite, ca și în vărsăturile datorate diferitelor medicamente; migrenă, sindrom Ménière; schizofrenie; ca adjuvant pentru trat. de scurtă durată al stărilor de anxietate.

Dz: *Adulți:* antiemetic: 5-10 mg de 2-4 ori/zi; vertij: 15-30 mg/zi, fracționat; după câteva săpt. doza se poate reduce la 5-10 mg/zi; afecțiuni psihotice: câte 10 mg de 2 ori/zi o săpt., apoi se crește treptat până la 75-100 mg/zi, în funcție de răspuns; anxietate: 5 mg de 3-4 ori/zi, maxim 2 săpt. *Copii peste 6 ani:* 5 mg de 2 ori/zi. *Vârstnici:* doze inițiale mici, care se cresc treptat; maxim 40 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la proclorperazină și alte fenotiazine; coma barbiturică și etilică; stări de deprimare ale SNC; stări de deprimare a hematopoiezei; glaucom; adenom de prostată; feocromocitom. Copii sub 6 ani. Sarcină. Alăptare.

Al: Voma morfinică sau postanestezică. Accidentele alergice, icterele grave, sindromul malign impun oprirea medicației. Prudență în ateroscleroză avansată și accidentele cerebrovasculare în antecedente, la vârstnici, la cei cu afecțiuni cardiovasculare grave. Agravează parkinsonismul și epilepsia. Doze mai mici în afecțiuni hepatice și renale. Prudență în hipotiroidie, miastenia gravis, diabet zaharat. Șoferi și activități de precizie.

RA: Sedare, somnolență, tulburări extrapiramidale, hTA ortostatică, întârzierea ejaculării, fenomene atropinice (uscăciunea gurii, constipație, tulburări ale vederii, retenție urinară). Uneori tulburări endocrine: impotență, frigiditate, amenoree, galactoree, ginecomastie, creștere în greutate. Rareori icter colestatic, fotosensibilizare, erupții cutanate alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C05CAX

PARACETAMOLUM
 PARECOXIBUM
 PAROXETINUM
 PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)

ENDOTELON® 150 mg SANOFI~SYNTHELABO; Dj. gastroz. 50 mg, 150 mg extract purificat din sâmburi de struguri (standardizat în oligomeri procianidolici); ct. × 2 blist. × 10 dj. gastroz. (**OTC**)

Ind: Trat. tulburărilor circulatorii din insuficiența veno-limfatică (picioare grele, dureri sau senzații dureroase de picioare obosite înainte de culcare). Trat. unic sau adjuvant al limfedemului și tensiunii cutanate consecutive trat. radiochirurgical al sânului; trat. tulburărilor circulatorii retiniene sau care afectează coroida.

Dz: Insuficiența veno-limfatică: 300 mg/zi în 2 prize dimineața și seara, 20 de zile/lună; limfedem: 300 mg/zi, în trat. continuu; în oftalmologie: 100-150 mg/zi. Cpr. se iau între mese.

Cind: Hipersensibilitate la oligomeri procianidolici sau la unul dintre excipienți. Sarcină. Alăptare.

Al: Evitarea expunerilor la soare, a căldurii excesive, a ortostatismului prelungit, a excesului ponderal. Sunt favorabile: mersul pe jos și utilizarea de ciorapi compresivi adecvați. Dacă simptomele locale persistă sau apar noi manifestări ce ar putea fi legate de o patologie vasculară nediagnosticată (echimoze, purpură etc.), conduita terapeutică trebuie reevaluată.

RA: Manifestări alergice: urticarie, rash cu sau fără prurit, fotosensibilizare, eczemă. Rar angioedem, gastralgii, greață, diaree, cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PARECOXIBUM
PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCIANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA

CAPD/DPCA 2 STAY SAFE

Cod ATC: B05DAN1

FRESENIUS MEDICAL CARE; Sol. dial. perit.; 1 litru conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 15 g; Na⁺ 134,00 mmol/l; Ca²⁺ 1,75 mmol/l; Mg²⁺ 0,50 mmol/l; Cl⁻ 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 83,30 mmol/l. Osmolaritate teoretică 358 mOsm/l. pH 5,5. **(S)**

CAPD/DPCA 3 STAY SAFE

Cod ATC: B05DAN1

FRESENIUS MEDICAL CARE; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dia-liză peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 42,5 g; Na⁺ 134,00 mmol/l; Ca²⁺ 1,75 mmol/l; Mg²⁺ 0,50 mmol/l; Cl⁻ 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 236,10 mmol/l. Osmolaritate teoretică 511 mOsm/l. pH 5,5. **(S)**

CAPD/DPCA 4 STAY SAFE

Cod ATC: B05DAN1

FRESENIUS MEDICAL CARE; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dia-liză peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 22,73 g; Na⁺ 134,00 mmol/l; Ca²⁺ 1,75 mmol/l; Mg²⁺ 0,50 mmol/l; Cl⁻ 101,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 126,20 mmol/l. Osmolaritate teoretică 401 mOsm/l. pH 5,5. **(S)**

CAPD/DPCA 2 A.N.D.Y.-PLUS

Cod ATC: B05DAN1

FRESENIUS MEDICAL CARE; Sol. pt. dial. perit. 1 litru soluție pentru dializă peritoneală conține: clorură de sodiu 5,7860 g; lactat de sodiu 3,9250 g; clorură de calciu dihidrat 0,2573 g; clorură de magneziu hexahidrat 0,1017 g; glucoză anhidră 15 g; Na⁺ 134,00 mmol/l; Ca²⁺ 1,75 mmol/l; Mg²⁺ 0,50 mmol/l; Cl⁻ 103,50 mmol/l; lactat 35 mmol/l; glucoză 83,30 mmol/l. Osmolaritate teoretică 358 mOsm/l. pH 5,5. **(S)**

CAPD/DPCA 3 A.N.D.Y.-PLUS

Cod ATC: B05DAN1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PAROXETINUM
PEFLOXACINUM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03DA04**MASTOPROFEN** ANTIBIOTICE SA; Gel 1%; ct. × 1 tub × 40 g (**P-6L**)**PROGESTOGEL** LAB. BESINS INTERNATIONAL; Gel 1%; ct. × 1 tub × 80 g (**P-6L**)**UTROGESTAN® 100 mg; UTROGESTAN® 200 mg** LAB. BESINS INTERNATIONAL; Cps. moi 100 mg, 200 mg; ct. × 2 blist. × 15 cps. moi (**P-RF**)

Ind: Metroragii funcționale (hiperplazie glandulochistică a mucoasei uterine); fibromatoză uterină cu polimenoree; dismenoree, hiper-, hipo- sau oligomenoree funcțională; amenoree primară sau secundară prin exces sau deficit de hormoni estrogeni (se va asocia trat. cu estrogeni); avort habitual, iminență de avort, sterilitate prin insuficiența luteală.

Dz: I.m., profund. Amenoree, hipo- sau oligomenoree funcțională: 25 mg, la 2 zile în a treia săpt. a ciclului (după pregătire estrogenică). Hipermenoree, dismenoree, sterilitate prin insuficiență luteală: 25 mg în a 5-a și a 3-a zi dinaintea menstruației. Avort habitual: câte 12,5 mg, de 2 ori pe săpt., în primele 4 luni de sarcină. Iminență de avort: 12,5-25 mg/zi, 4 zile, apoi 12,5-25 mg de 2 ori/săpt. până în luna a 4-a de sarcină. Doza maximă 200 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la progesteron, sângerări vaginale nediate diagnosticate, carcinom mamar sau genital, afecțiuni tromboembolice active sau în antecedente, tromboflebită, avort incomplet, hemoragii cerebrale, disfuncții hepatice. Pentru diagnosticarea sarcinii. Alăptare.

Al: Pacienți cu HTA, afecțiuni cardiovasculare, renale, epilepsie, stări depresive, diabet, disfuncții hepatice, porfirie intermitentă acută, migrenă sau sensibilitate la lumină. Trat. va fi întrerupt dacă se instalează o pierdere parțială sau completă a vederii, diplopie, exoftalmie, edem papilar, leziuni vasculare retiniene sau migrene. Poate afecta acuratețea testelor de laborator pentru funcțiile hepatice și/sau endocrine. Sarcină.

RA: Acnee, seboree, reacții alergice și urticarie, prurit vulvar, retenție hidrosalină, tumefacția sânilor, tulburări menstruale, sângerări, greață, vomă, stomatită, icter colestatic, pirexie, insomnie, somnolență, stare depresivă, hirsutism, reacții dureroase la locul injectiei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03CA09

PEFLOXACINUM
 PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONIUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM

COLPOTROPHINE® LAB. THERAMEX; Cps. vag. moi 10 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. moi (**P-RF**)

COLPOTROPHINE® LAB. THERAMEX; Cremă vag. 1%; ct. × 1 tub × 15 g (**P-RF**)

Ind: Atrofie vaginală prin carență estrogenică (dispareunie, prurit), întârzierea cicatrizărilor cervico-vaginale și vulvare după naștere, intervenții chirurgicale, radioterapie.

Dz: 1 cps. vag./zi, timp de 20 zile. Cremă: 1-2 aplicații pe zi, urmate de masaj lejer. Curele de întreținere sunt necesare dacă persistă cauza (menopauză, castrare, anticoncepționale estroprogestative, iradieri).

Cind: Antecedente de cancer estrogenodependent.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R06AD02

PEGINTERFERON ALFA-2A
 PEGINTERFERON ALFA-2B
 PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYL TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONIUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM

ROMERGAN BIOFARM SA; Sirop 0,124%; ct. × 1 fl. × 50 ml (*P-RF*)

ROMERGAN 30 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 30 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (*P-RF*)

Ind: Afecțiuni alergice ale tractului respirator superior, pielii, ochiului sau tractului digestiv; intoleranțe alimentare și medicamentoase; boala serului; reacții anafilactice sau transfuzionale; stări de apatie și insomnie în cursul bolii hipertensive; tulburări de climax; vărsături azotemice; sindrom neurotoxic; encefalite acute; insomnie; adjuvant în sedarea preoperatorie; sedativ în pediatrie.

Dz: *Adulți:* 30 mg, la culcare; maxim 60-120 mg/zi. *Copii:* 1-1,5 mg/kg/zi în 2-3 prize, maxim seara. Durata: adulți: câteva zile - săptăm.; copii: 5-7 zile.

Cind: Hipersensibilitate la fenotiazine, depresii ale SNC, comă, nou-născuți, prematuri. Sarcină. Alăptare. Șoferi și activități de precizie.

Al: Pacienți cu astm, bronșită, bronșiectazii, afecțiuni coronariene grave, glaucom cu unghi îngust, epilepsie, IR, IH, afecțiuni uretro-prostatice, obstrucții piloro-intestinale. Poate masca semnele intoxicației cu salicilați, ale obstrucției intestinale sau ale presiunii intracraniene crescute (prin suprimarea vomei). Se evită expunerea la soare pe durata trat. (risc de fotosensibilitate cutanată). Nu se va adm. bolnavilor tratați cu IMAO în ultimele 14 zile.

RA: Somnolență diurnă, torpoare, amețeli, stări de neliniște, dureri de cap, coșmaruri, dezorientare, creșterea vâscozității secreției bronșice, uscăciunea gurii, anorexie, iritație gastrică, palpitații, hTA, spasme musculare, mișcări involuntare ale capului și feței, constipație, retenție urinară, reacții de fotosensibilizare cutanată, confuzie mintală sau excitabilitate la pacienții vârstnici, hiperexcitabilitate paradoxală la unii copii. Rareori, în adm. de lungă durată: icter, diskinezie tardivă, anemie hemolitică, leucopenie și agranulocitoză.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01BC03

PEGINTERFERON ALFA-2B
PEMETREXEDUM
PENTAERITHRITYL TETRANITRAS
PENTAZOCINUM
PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONIUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONIUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONIUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZICUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCIANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM

PROPAFENON AL 150 ALIUD PHARMA; Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr.; ct. × 2 sau 4 blist. × 25 cpr. (P-RF)

PROPAFENONĂ ARENA GROUP SA; Cpr. 150 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)

RYTMONORM® EBEWE PHARMA; Sol. inj. 3,5 mg/ml; ct. × 5 f. × 20 ml (P-RF)

RYTMONORM® ABBOTT; Cpr. film. 150 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Tahiaritmii supraventriculare simptomatice și care necesită trat.: tahicardii AV și jonctionale, tahicardii supraventriculare în sindromul WPW sau fibrilația atrială paroxistică. Tahiaritmii ventriculare simptomatice severe.

Dz: Doza medie orală zilnică de inițiere și cea de întreținere: 450-600 mg fracționată de 2-3 ori/zi, maxim 900 mg/zi. Dozele se reduc în IR sau IH, la vârstnici sau cu afectări masive ale miocardului. Cpr. se înghit întregi, după masă. Pentru forma inj: doză unică de 1 mg/kg i.v. lent în 3-5 minute. Se poate crește la 2 mg/kg. Intervalul între 2 injecții va fi de 90-120 min. Se va evita amestecul cu ser fiziologic.

Cind: IC manifestă, șoc cardiogen (cu excepția celui produs de aritmie), bradicardie gravă simptomatică; în primele 3 luni după infarctul de miocard sau în caz de insuficiență contractilă, cu excepția pacienților cu tulburări de ritm ventriculare amenințătoare de viață; tulburări de conducere sinoatriale, ASV și intraventriculare de grad înalt; boala nodului sinusal, hTA severă; tulburări electrolitice manifeste (metabolismul potasic); boli pulmonare obstructive grave; miastenia gravis; hipersensibilitate la substanța activă. Sarcină (primele 3 luni). Alăptare.

Al: Sub control cardiologic și ECG, - creșterea duratei complexelor QRS cu mai mult de 20% față de ECG inițială, a intervalului QT cu mai mult de 25%, sau a intervalului PQ cu mai mult de 50% impune reducerea sau oprirea trat. până la normalizarea ECG. Se poate modifica unda de pacing și cea de sensing ale stimulatorului cardiac (se va testa și reprograma funcția stimulatorului cardiac). Supraveghere cardiologică în tulburări de ritm. Atenție la cei cu limitare a funcției ventriculului stâng, cu maladii miocardice structurale. Șoferi și activități de precizie.

RA: Tulburări gastrointestinale (inapetență, senzație de sațietate, greață, vomă, gust amar, senzație de amorțeală în gură), constipație; parestezii, tulburări de vedere, senzație de amețeală și, foarte rar, oboseală, dureri de cap, senzație de neliniște, coșmaruri, tulburări de somn, tulburări psihice cu anxietate și confuzie, ca și simptome extrapiramidale - în special după o doză inițială crescută. Rareori alergii cutanate. Îndeosebi la vârstnici - tulburări ale reglării circulatorii, cu hTA în ortostatism. Efecte mai rare: bradicardie, bloc SA, bloc AV, tulburări ale excitabilității. Efecte deprimante asupra excitabilității și contractilității miocardice. Agravarea IC preexistente. Rareori accelerarea ritmului cardiac, fibrilație și flutter ventricular. Foarte rar colestază prin mecanism de tip hiperergic - alergic; creșterea anticorpilor antinucleari și un sindrom lupus eritematos; leucopenie, trombopenie reversibile. La doze mari diminuarea libidoului și reducerea numărului de spermatozoizi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PEMETREXEDUM
 PENTAERITHRITYL TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONIUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
PROPOFOLUM

Cod ATC: N01AX10

PROPOFOL 1% "FRESENIUS"; PROPOFOL 2% "FRESENIUS" FRESENIUS KABI; Emulsie perf./inj. 1%, 2%; ct. × 5 f. × 20 ml; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (**S**)

PROPOFOL LIPURO 1% B. BRAUN MELSUNGEN AG; Emulsie inj. 10 mg/ml; ct. × 5 f. × 20 ml; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml (**S**)
RECOFOL 10 mg/ml; RECOFOL 20 mg/ml SCHERING AG; Emulsie inj./perf. 10 mg/ml, 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 sau 100 ml; ct. × 5 f. × 20 ml (10 mg/ml); ct. × 5 f. × 10 ml (20 mg/ml) (**S**)

Ind: Sedarea pacienților adulți cu ventilație asistată supuși terapiei intensive. Sedarea conștientă în cursul intervențiilor chirurgicale sau cu scop diagnostic.

Dz: Este necesară asocierea agenților analgezici suplimentari. **Adulți:** Inducerea anesteziei generale - inj. lentă în bolus sau în perfuzie 40 mg la fiecare 10 secunde, până când semnele clinice arată instalarea anesteziei. Majoritatea pacienților adulți sub 55 ani necesită 1,5-2,5 mg/kg. Doza totală necesară poate fi redusă prin scăderea ritmului de adm. (20-50 mg/min). Menținerea anesteziei generale - adm. în perfuzie continuă sau injectare în bolus repetat. Perfuzia continuă: 4-12 mg/kg/oră; injectarea repetată în bolus: creșteri ale dozei cu 25 mg (2,5 ml) până la 50 mg (5 ml). Sedarea în cursul terapiei intensive: perfuzie continuă 0,3-4,0 mg/kg/oră. Sedarea conștientă în cursul intervențiilor chirurgicale sau cu scop diagnostic: 0,5-1 mg/kg, 1-5 min pentru inițierea sedării. Menținerea sedării cu perfuzie: 1,5-4,5 mg/kg/oră. Adicional perfuziei, se adm. în bolus 10-20 mg când e necesară o creștere rapidă a profunzimii sedării. **Vârștrnici:** doze mai scăzute. **Copii:** Inducerea anesteziei generale: *Copii peste 8 ani:* 2,5 mg/kg. Menținerea anesteziei generale: perfuzie sau inj. în bolus repetat 9-15 mg/kg/oră. Sedarea conștientă în cursul intervențiilor chirurgicale sau cu scop diagnostic sau al terapiei intensive: Cind la copii.

Cind: Alergie cunoscută la substanță. Copii sub 3 ani. Sarcină. Alăptare.

Al: Adm. de către personalul medical specializat în anestezie cu monitorizare constantă și asigurarea unei ventilații corespunzătoare și aparate pentru resuscitare. Înaintea externării, pacienților trebuie să li se asigure o perioadă adecvată în scopul revenirii totale după anestezia generală. Atenție la pacienții cu afecțiuni cardiace, respiratorii, renale sau hepatice, hipovolemici sau debilitați. Poate apărea bradicardie și asistolie (se adm. un anticolinergic înaintea inducției sau în cursul menținerii anesteziei). Risc convulsiv la pacienți epileptici. Atenție la cei cu afectarea metabolismului lipidic. Dacă pacientul primește în același timp și alte lipide i.v., trebuie redusă cantitatea luând în considerare totalul lipidelor perfuzate odată cu propofol: 1,0 ml propofol conține aprox 0,1 g lipide. Șoferi și activități de precizie.

RA: *Generale:* în perioada de inducție hTA și apnee tranzitorie, mișcări epileptiforme, convulsii și opistotonus în funcție de doza adm. și de folosirea premedicației. În cursul fazei de revenire, rareori grețuri, vărsături, cefalee. Rareori angioedem, bronhospasm, eritem. Edem pulmonar. Febră. Dezinhibiție sexuală. Decolorarea urinei. *Locale:* Durere locală, rar tromboză și flebită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C07AA05

PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
 PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONIUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONIUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONIUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM

N-PROPRANOLOL 10 mg ARENA GROUP SA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-6L)

PROPRANOLOL BIO EEL SRL; Cpr. 10 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr, respectiv ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

PROPRANOLOL ARENA GROUP SA; Cpr. 40 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-6L)

PROPRANOLOL SICOMED SA; Cpr. 10 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. (P-6L)

PROPRANOLOL SINTOFARM SA; Cpr. 10 mg, 40 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-6L)

Ind: Angină pectorală, îndeosebi angină cronică stabilă (ca trat. de fond) și pentru profilaxia pe termen lung după perioada acută a infarctului miocardic; aritmii cardiace supraventriculare, tahiaritmii digitale; cardiomiopatie obstructivă; HTA esențială, mai ales forme cu circulație hiperkinetică și debit cardiac crescut, forme cu hiperreninemie sau asociat hipopresolului și nefrixului; profilaxia migrenelor; tireotoxicoză; înaintea și în timpul intervențiilor chirurgicale pentru feocromocitom (se asociază obligatoriu un a-blocant); stări anxioase (cu tulburări cardiace), tremor esențial; profilaxia hemoragiilor digestive la cirotici (cu excepția IH severe, cu icter, ascită mare, encefalopatie).

Dz: Se începe cu doze mici, care se cresc progresiv până la obținerea răspunsului terapeutic dorit. În general, 10-40 mg de 3-4 ori/zi. **Copii:** HTA: 1 mg/kg/zi în mai multe doze, până la 2-4 mg/kg/zi. Aritmii, feocromocitom, tireotoxicoză: 250-500 μg/kg de 3-4 ori/zi. Migrenă: (copii sub 12 ani) 20 mg de 2-3 ori/zi; i.v., 25-50 μg/kg, lent, de 3-4 ori/zi. **Adulți:** Afecțiuni cardiace: angina pectorală (de efort, instabilă, angor intricat): 40 mg de 2-3 ori/zi, crescându-se la intervale săptămânale până la 120-140 mg/zi, maxim 320 mg/zi; prevenirea secundară a IMA: în zilele 5-21 post-infarkt 40 mg de 4 ori/zi, 2-3 zile apoi 80 mg de 2 ori/zi, max. 180-240 mg/zi în mai multe prize; aritmii cardiace: fibrilație și flutter atrial (în asociere cu digitale), tahiaritmii cu extrasistole atriale/ventriculare, sincopa; 30-160 mg/zi, maximum 320 mg/zi în mai multe prize. În trat. de urgență al aritmiilor cardiace, i.v. lent, 1 mg/min, repetat la fiecare 2 minute până la maxim 10 mg (la pacienții conștienți) și 5 mg (la pacienții sub anestezie); HTA: de elecție la tineri, cu nivele crescute de renină, în asociere cu diuretice; hipertensiune indusă de sarcină, anevrism aortic disecant: inițial 40-80 mg de 2 ori/zi, apoi se crește până la 160-320 mg/zi, maximum 640 mg/zi. Nu se utilizează pe cale i.v. în urgențele hipertensive. Hipertiroidism: eficace pentru palpații, tremor, anxietate; util în trat. preoperator, în tireotxicoza neonatală; 10-40 mg de 3-4 ori/zi. În tireotoxicoză și crize tirotoxice i.v. 1 mg/min, repetat la 2 minute, până la obținerea răspunsului sau până la o doză maximă de 10 mg (la pacienții conștienți) și 5 mg (la pacienții sub anestezie). Feocromocitom: în asociere cu un a-blocant (tolazolina sau fenoxibenzamina); util în trat. preoperator; 60 mg/zi, 3 zile preoperator în asociere cu alfa-blocant; dacă tumora este inoperabilă, se poate face trat. prelungit cu 30 mg/zi. Stenoza subaortică hipertrofică: medicament de primă alegere: 10-40 mg de 3-4 ori/zi. Hipertensiune portală: trat. profilactic al sângerărilor eso-gastro-intestinale, prevenirea recidivelor hemoragice: 40 mg de 2 ori/zi maximum 160 mg de 2 ori/zi. Migrenă: trat. profilactic, în doze crescând până la obținerea remisiunii: 40 mg de 2-3 ori/zi, se poate crește până la 160-240 mg/zi. Tremor: eficace în special la pacienți de peste 60 de ani (tremor esențial): se poate asocia cu primidona: 40 mg de 2-3 ori/zi. se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N02BB04

PENTAZOCINUM
 PENTOXIFYLLINUM
 PERINDOPRILUM
 PERMETHRINUM
 PETHIDINUM
 PHENOBARBITALUM
 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
 PHENYLBUTAZONUM
 PHENYLEPHRINUM
 PHENYLHYDRARGYRI BORAS
 PHENYTOINUM
 PHYTOMENADIONUM
 PILOCARPINUM
 PIMECROLIMUS
 PIOGLITAZONUM
 PIPECURONII BROMIDUM
 PIRACETAMUM
 PIRIBEDILUM
 PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
 PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM

PROPIFENAZONA ARENA GROUP SA; Cps. 300 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (OTC)

Ind: Febră, dureri ușoare și medii (cefalee, nevralgii dentare, sciatică, dismenoree etc.).

Dz: *Sugari:* intrarectal 100 mg de 2 ori/zi; *copii mici:* 100 mg de 3 ori/zi; *copii peste 6 ani:* 200 mg de 3 ori/zi; *adolescenți și adulți:* 300 mg de 3-4 ori/zi.

Cind: În primul trimestru și ultimele 3 săpt. de sarcină.

RA: Reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PENTOXIFYLLINUM
PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONIUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS

Cod ATC: V03AB14**PROTAMIN SULFAT** GALENIKA A.D.; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 5 f. × 5 ml (S)**Ind:** Neutralizează instantaneu acțiunea anticoagulantă a Heparinei standard și a Fraxiparinei.**Dz:** 1 ml neutralizează 1000 UI heparină standard, iar 0,6 ml neutralizează aproximativ 0,1 ml (950 UI Axa) de Fraxiparine. Se ține seama de heparinemia constatată numai pentru calculul dozei de sulfat de protamină ce urmează a fi injectată. Se adm. i.v. lent.**Al:** Determinarea timpului de protrombină, pentru siguranța că neutralizarea a fost suficientă; dacă nu mai există heparină în circulație, acest timp trebuie să fie normal.**RA:** Persistența hemoragiei după adm. de protamină, prin supradozarea protaminei. hTA și de bradicardie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B03AB09

PERINDOPRILUM
PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONIUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONIUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONIUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONIUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER

FERPLEX® /ITALFARMACO; Sol. orală 800 mg/15 ml; ct. × 10 fl. monodoză × 15 ml (**P-6L**)

Ind: Anemie prin aport deficitar, absorbție scăzută, pierderi acute sau cronice de sânge, infecții. Profilaxia anemiei feriprive din sarcină și alăptare.

Cind: Anemie aplastică sau hemolitică. Pancreatită cronică, ciroză hepatică.

RA: Grețuri, diaree, dureri epigastrice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J04AD01

PERMETHRINUM
PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM

PROMID BIOFARMA PHARM; Dj. 250 mg; ct. × 4 blist. × 10 dj. (S/P-RF)**EKTEBIN®** SANAVITA; Cpr. film. 250 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. film. (S/P-RF)

Ind: Trat. tbc, în caz de rezistență la agenții antituberculoși de primă linie sau când aceștia nu pot fi folosiți din cauza reacțiilor toxice.

Dz: *Adulți:* 750 mg - 1 g/zi, în priză unică la masa de seară sau fracționat, la mese. Se asociază vit. B₆ (50-100 mg/zi) pentru prevenirea polinevritei. *Copii:* 4-5 mg/kg la 8 ore, maxim 750 mg/zi. La hepatici se folosesc doze mai mici. La copii trebuie redusă doza zilnică la aproximativ 1/2 din doza recomandată, atunci când se asociază cu izoniazida.

Cind: Alergie la produs, la etionamidă, izoniazidă, pirazinamidă și acid nicotinic; IH severă; IR severă; afecțiuni convulsivante; psihoze; nevrite periferice, nevrită optică. Sarcină. Alăptare.

Al: Asocierea chimioterapicelor este obligatorie. Gastrita acută, ulcerul gastro-intestinal și afecțiunile intestinale ulcerative sunt Cind relative. Prudență la bolnavii cu antecedente depresive sau psihotice, în IR sau IH ușoare-moderate. Poate îngreuna controlul diabetului. Periodic teste hepatice, oftalmologice și examen neurologic. Șoferi și activități de precizie.

RA: Amețeli, cefalee, nevrite, stare de excitație, depresie și alte tulburări psihotice, convulsii; gust metalic, anorexie, greață, dureri epigastrice, senzație de plenitudine, creșterea transaminazelor, uscăciunea pielii și reacții pelagroide. Ocazional ginecomastie, hipoglicemie la diabetici. Rareori hepatită și icter, tulburări menstruale, impotență, hipotiroidism, afectarea măduvei hematopoietice, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PETHIDINUM
PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT

Cod ATC: N01AX13

PROTOXID DE AZOT MEDICINAL LINDE GAZ MAGYAROSZAG; Gaz inhal.; recipient × 10 l, 14 l, 40 l, 50 l (S)

Ind: Chirurgie (80% protoxid de azot + 20% oxigen): în anestezie generală. Obstetrică (50% protoxid de azot + 50% aer sau oxigen): pentru analgezia nașterii. Alte indicații (35% protoxid de azot în aer sau oxigen): bronhoscopie, debridarea plăgilor, cauterizări, incizări de abcese, schimbarea pansamentelor, analgezie postoperatorie, în trat. tetanosului.

Dz: În chirurgie, în faza de inducție, se adm. după o premedicație adecvată (barbituric cu durată de acțiune scurtă); narcoza chirurgicală se obține cu un anestezic volatil (eter, tricloretilen sau halotan), eventual cu un analgezic narcotic. Pentru miorelaxare se utilizează d-tubocurarina sau alte miorelaxante.

RA: Vărsături, în special la copii. În caz de nerespectare a proporției celor două gaze în amestecul anestezic, apare hipoxia (anoxia) cerebrală. Adm. prelungite duc la afectare medulară până la aplazie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PHENOBARBITALUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM

Cod ATC: R01BA02

SUDAFED GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 60 mg; ct. × 1 blist. × 12 cpr. (OTC)

Ind: Trat. congestiei din afecțiunile căilor respiratorii superioare (răceală, febra fânului sau nas "înfundat").

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 60 mg de 3-4 ori/zi. *Copii (6-12 ani):* 30 mg de 3-4 ori/zi.

Cind: Copii sub 6 ani. Hipersensibilitate la pseudoefedrină.

Al: Alergie; infecție bacteriană; HTA sau alte afecțiuni cardiace; diabet; afecțiuni oculare. Atenționare pentru sportivi: produs dopant. Sarcină și alăptare.

RA: Tulburări de somn și foarte rar halucinații. Eruptii cutanate. Neliniște. Bărbați - dificultăți la urinat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEDEFDRINUM
PYGEUM AFRICANUM

Cod ATC: G04CX01**TADENAN 50 mg** LAB. FOURNIER; Cps. 50 mg; ct. × 3 sau 6 blist. × 10 cps. (P-6L)**Ind:** Trat. unor forme de disurii care pot apărea în hipertrofia benignă a prostatei.**Dz:** 50 mg dimineața și seara, înainte de mese, 6-8 săpt.**A!:** Utilizarea acestui medicament nu se dispensează de examenul medical uzual al prostatei și nu poate înlocui intervenția chirurgicală dacă aceasta este necesară.**RA:** Posibile tulburări digestive.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM

Cod ATC: P02CB01

HELMINTOX® 125 mg; HELMINTOX® 250 mg INNOTECH INT.; Cpr. 125 mg, 250 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr. (125 mg), ct. × 1 blist. × 3 cpr. (250 mg) (**P-RF**)

HELMINTOX® INNOTECH INT.; Susp. orală 125 mg/2,5 ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (**S/P-RF**)

Ind: Trat. infestării cu: Enterobius vermicularis (oxiuri); Ascaris lumbricoides (limbrici); Ankilostoma duodenale; Necator americanus; Trichostrongilus colubriformis și T. Orientalis la adulți și la copii. Se adm. întregii familii sau colectivității odată cu dezinfecția riguroasă a spațiilor de locuit și a îmbrăcăminții.

Dz: 10 mg/kg, doză unică (maxim 1 g). Infestări severe cu Necator americanus: 20 mg/kg o dată pe zi, 2 zile consecutiv, sau 10 mg/kg, o dată pe zi, 3 zile consecutiv. Infestările doar cu Ascaris lumbricoides: doză unică de 5 mg/kg.

Cind: Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre componente. Copii sub 6 luni. Sarcină. Alăptare.

Al: Afecțiuni hepatice preexistente.

RA: Anorexie, crampe abdominale, grețuri, vărsături și diaree; cefalee, somnolență, insomnie și rash. Creșteri minore și tranzitorii ale TGO.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEDEFDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM

Cod ATC: J04AK01**PIRAZINAMIDĂ** ANTIBIOTICE SA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 sau 120 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: tbc pulmonară și extrapulmonară cu germeni rezistenți la isoniazidă și/sau rifampicină în asociere cu antituberculoase majore pentru a se evita instalarea rapidă a rezistenței.

Dz: Oral *adulti* 1,5-2 g /zi sau 30 mg/kg, în 3-4 prize postprandial și 60 mg/ kg, max. 4 g când se adm. bisăpt. *Copii:* 20 mg/kg/zi.

A!: Monitorizarea enzimelor hepatice și funcție renală. Asocierea cu rifampicină și isoniazidă poate da tulburări grave ale funcției hepatice, mai ales la pacienții cu IH. Prudență la bolnavii cu afecțiuni renale, cu hiperuricemie, diabet zaharat. Șoferi și activități de precizie. Se evită expunerea la soare.

RA: Reversibile. Tulburările funcțiilor hepatice dependente de doză; tulburarea metabolismului purinei cu hiperuricemie. Tulburări gastro-intestinale: inapetență, indispoziții epigastrice, vărsături și crampe abdominale. Tulburări de hematopoieză, anemii sideroblastice, trombocitopenie sau porfirie. SNC: cefalee, amețeli, excitații și insomnii. Prin scăderea glicemiei, la diabetici apar dificultăți de echilibrare a insulinei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

Cod ATC: N07AA02

DOSTIRAV® 30 mg; DOSTIRAV® 60 mg PROMEDIC SRL; Cpr. 30 mg, 60 mg; ct. × 1 blist. × 21 cpr. (30 mg), ct. × 1 blist. × 20 cpr. (60 mg) **(S/P-6L)**

MESTINON ICN PHARMACEUTICALS; Dj. 60 mg; ct. × 1 fl. × 20 dj. **(P-6L)**

Ind: Miastenia gravis; atonie intestinală.

Dz: Adult, în miastemie: 120-900 mg/zi, în 3-4 reprize, la 6-8 ore.

Cind: Astm, Parkinson, obstrucție mecanică digestivă și urinară.

Al: Sarcină (primele 3 luni).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A11HA02

PHENYTOINUM
PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM

SICOVIT® B₆ 250 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 250 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. **(P-6L)**

SICOVIT® B₆ 50 mg/2 ml; SICOVIT® B₆ 250 mg/5 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 25 mg/ml, 50 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml, respectiv ct. × 5 f. × 5 ml **(S/P-RF)**

VITAMINA B₆ TERAPIA SA; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 sau 100 f. × 5 ml **(S/P-RF)**

VITAMINA B₆ 50 mg TERAPIA SA; Sol. inj. 25 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml **(P-RF)**

Ind: Anemii aplastice și eritroblastice; anemii hipocrome (rezistente la trat. cu fer); granulopenie de origine toxică sau medicamentoasă; afecțiuni ale SNC cu etiologie aterosclerotică sau encefalitică; trat. preventiv și curativ al polinevritelor de origine toxică sau medicamentoasă, mai ales cea hidrazidică; crampe, hipertonie musculară, miopatie, acrodinie; vărsături, mai ales gravidice, postanestezice sau postroentgenterapice; tremurături idiopatice, senile sau de origine toxică, boala Parkinson, parkinsonism aterosclerotic; etilism acut; dermatită seboreică, acnee, dermite ușoare postroentgeniene; boală aterosclerotică.

Dz: *Adulți:* 50-250 mg/zi, 15-20 zile, oral sau inj. i.m. sau i.v. *Copii:* 20-50 mg, după vârstă și gravitatea cazului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PHYTOMENADIONUM
PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM

Cod ATC: N06BX02

ENCEPHABOL® 100 mg; ENCEPHABOL® FORTE 200 mg MERCK KGaA; Dj. 100 mg, 200 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 dj. (**P-6L**)

ENCEPHABOL® MERCK KGaA; Susp. orală 80,5 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 200 ml (**P-6L**)

ENERBOL PLIVA KRAKOW; Dj. 100 mg; ct. × 1 sau 5 blist. × 20 dj. (**P-6L**)

PIRITINOL TERAPIA SA; Dj. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (**P-6L**)

Ind: Insuficiență cerebrală datorată tulburărilor metabolice și circulatorii ale creierului. Tulburări în dezvoltarea creierului la copii ca o consecință a stresului perinatal. Status posttraumatism cranio-cerebral, atacuri cerebrale vasculare, intoxicații sau encefalite.

Dz: *Adulți* 600 mg/zi. *Copii:* 50-300 mg/zi cel puțin 6-8 săptăm.

Cind: Artrită reumatoidă cu tulburări funcționale severe ale rinichilor și ficatului; modificări importante hematologice; boli autoimune: lupus eritematos, miastenie, pemfigus.

Al: Pentru a evita tulburările de somn, la copii ultima doză nu se adm. după-amiaza târziu sau seara.

RA: Rar - reacții alergice, în special eritem cutanat; febră; tulburări gastrointestinale și hepatice; modificări ale gustului; simptome de supraexcitabilitate; rar, reacții cutanate tip pemfigus sau lichen plan. La pacienți cu artrită reumatoidă, rar, reacții secundare specifice medicației tip penicilamină (proteinurie, reducerea numărului de trombocite și leucocite). Este indicată efectuarea periodică a analizei sângelui și urinei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PILOCARPINUM
PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZICANTHELMUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AH04

SEROQUEL®; SEROQUEL® 300 mg ASTRAZENECA; Cpr. film. 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (P-RF)
SEROQUEL® "4 DAY STARTER PACK" ASTRAZENECA; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (6 × 25 mg, 3 × 100 mg, 1 × 200 mg) (P-RF)

Ind: Tratamentul schizofreniei. Tratamentul episoadelor maniacale din psihoza bipolară.

Dz: Oral, de două ori pe zi, înainte sau după mese. *Adulți, în tratamentul schizofreniei:* doza pentru primele 4 zile de tratament este de 50 mg quetiapină în prima zi, 100 mg quetiapină în a doua zi, 200 mg quetiapină în a treia zi și 300 mg quetiapină în a patra zi. Din a patra zi, doza se crește treptat până la doza eficientă uzuală cuprinsă între 300 - 450 mg pe zi. Aceasta poate fi ajustată în funcție de răspunsul clinic și de tolerabilitatea individuală, cu limite cuprinse între 150-750 mg quetiapină pe zi. În tratamentul episoadelor maniacale din psihoza bipolară: ca monoterapie sau ca terapie adjuvantă în stabilizarea dispoziției, doza totală zilnică în primele patru zile de tratament este de 100 mg (ziua 1), 200 mg (ziua 2), 300 mg (ziua 3), 400 mg (ziua 4). Creșterea ulterioară a dozei până la 800 mg pe zi până în ziua a 6-a nu trebuie să depășească 200 mg pe zi. Doza poate fi ajustată în funcție de răspunsul clinic și de tolerabilitatea fiecărui pacient între 200 mg și 800 mg pe zi. Doza eficientă uzuală este cuprinsă între 400 și 800 mg pe zi.

La *vârstnici* se începe cu 25 mg pe zi. Doza trebuie crescută zilnic cu 25 - 50 mg pe zi până la doza eficientă, care va fi mai mică față de cea a pacienților tineri. La pacienții cu insuficiență renală sau hepatică, se începe cu 25 mg pe zi și se crește zilnic cu 25 - 50 mg până la doza terapeutică eficientă.

Cind: Hipersensibilitate la quetiapină sau la oricare dintre excipienții produsului.

Al: Prudență în administrarea la pacienți cu afecțiuni cardiovasculare cunoscute, boli cerebrovasculare, convulsii în antecedente, *vârstnici*. La apariția semnelor de diskinezie tardivă, de sindrom neuroleptic malign, se întrerupe tratamentul. La întreruperea bruscă a tratamentului cu doze mari, pot apărea: greață, vărsături, insomnie, recurența simptomelor psihotice, mișcări involuntare patologice, de aceea, tratamentul se întrerupe treptat. Interacțiuni cu: carbamazepină, antifungice azolice, antibiotice macrolide. În sarcină se utilizează numai când beneficiul depășește riscurile potențiale. Femeile care alăptează trebuie să întrerupă administrarea în timpul tratamentului. Produce somnolență și afectează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

RA: Frecvent: somnolență, amețeli, uscăciunea gurii, astenie ușoară, constipație, tahicardie, hipotensiune ortostatică și dispepsie. Alte reacții adverse rare, comune antipsihoticelor: sincope, sindrom neuroleptic malign, leucopenie, neutropenie și edeme periferice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PIMECROLIMUS
PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM

Cod ATC: C09AA06

ACCUPRO® 5; ACCUPRO® 10; ACCUPRO® 20 PFIZER; Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
AQURIL® 10 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 10 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-6L)**
QUINAPRIL AL 5; QUINAPRIL AL 10 ALIUD PHARMA; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 sau 10 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
QUINAPRIL SANDOZ 5 mg; QUINAPRIL SANDOZ 10 mg; QUINAPRIL SANDOZ 20 mg; QUINAPRIL SANDOZ 40 mg HEXAL AG; Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 1, 3, 5, 6 sau 10 blist. × 10 cpr.; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cpr. **(P-6L)**

Ind: HTA; IC (adjuvant).

Dz: HTA: inițial 5 mg/zi; doza de întreținere: 20-40 mg/zi, în 2 prize; IR, *vârstnici*: inițial 2,5 mg/zi. IC: inițial 2,5 mg/zi; doza de întreținere: 10-20 mg/zi, în 2 prize.

Cind: Hipersensibilitate la produs sau la alți IEC; sarcină.

RA: Cefalee, amețeli, astenie, erupții, edem angioneurotic, tuse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PIOGLITAZONUM
PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM

Cod ATC: A02BC04

PARIET E/SAI CO.; Cpr. film. gastrez. 20 mg; ct. × 1 blist. × 7 sau 14 cps. (P-RF)

Ind: Ulcerul duodenal activ; ulcerul gastric activ; esofagită de reflux. În asociere cu un trat. antibacterian adecvat în eradicarea *Helicobacter pylori*.

Dz: *Adulți și vârstnici:* Ulcer duodenal activ și ulcer gastric activ: 20 mg, o dată pe zi, dimineața, 2-4 săptăm. Esofagită de reflux: 20 mg, o dată pe zi, 4-8 săptăm. Eradicarea *H. pylori*: asocierile următoare, timp de 7 zile: 20 mg rabeprazol de 2 ori/zi, claritromicină 500 mg de 2 ori/zi și amoxicilină 1 g de 2 ori/zi; 20 mg rabeprazol de 2 ori/zi, claritromicină 500 mg de 2 ori/zi și metronidazol 400 mg de 2 ori/zi. Cpr. film. gastrezistente nu se mestecă sau sfărâmă, ci se înghit întregi.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la rabeprazol, la derivați de benzimidazol sau la oricare dintre componentele produsului; sarcină și alăptare.

Al: Posibilitatea existenței unui proces malign trebuie exclusă înaintea începerii tratamentului. IH severă.

RA: Cefalee, diaree, durere abdominală, astenie, flatulență, rash-ul și uscăciunea gurii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A07XA04

PIPECURONII BROMIDUM
PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM

HIDRASEC 100 mg LAB. FOURNIER; Cps. 100 mg; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 10 cps. **(P-RF)**

HIDRASEC 10 mg; HIDRASEC 30 mg LAB. FOURNIER; Pulb. pt. sol. orală 10 mg, 30 mg; ct. × 10, 16, 20, 30, 50 sau 100 plicuri × 1 g pulb., respectiv ct. × 10, 20, 30, 60 sau 100 plicuri × 3 g pulb. **(S/P-RF)**

Ind: Tratamentul simptomatic al diareei acute la sugari și copii mici, în asociere cu rehidratarea orală.

Dz: Oral, în funcție de greutatea corporală. Doza inițială pentru o dată este de 1,5 mg/kg, care se administrează de 4 ori pe zi. Doza zilnică recomandată este de aproximativ 6 mg /kg, adică aproximativ 42 mg racecadotril/kg pentru o săptămână de tratament. *Sugari de la 1 lună la 9 luni* (până la aproximativ 9 kg): prima zi: 10 mg racecadotril (1 plic de 10 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 10 mg racecadotril (1 plic de 10 mg) de 3 ori pe zi. *Sugari de la 9 luni la 30 luni* (între 9 și 13 kg): prima zi: 20 mg racecadotril (2 plicuri de 10 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 20 mg racecadotril (2 plicuri de 10 mg) de 3 ori pe zi. *Copii de la 30 luni la 9 ani* (între 13-27 kg): prima zi: 30 mg racecadotril (1 plic de 30 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 30 mg racecadotril (1 plic de 30 mg) de 3 ori pe zi. *Copii peste 9 ani* (peste 27 kg): prima zi: 60 mg racecadotril (2 plicuri de 30 mg) de 4 ori pe zi. Zilele următoare: 60 mg racecadotril (2 plicuri de 30 mg) de 3 ori pe zi. *Adulți:* 100 mg racecadotril (o capsulă de 100 mg) administrate inițial și apoi câte 100 mg racecadotril (o capsulă de 100 mg) la începutul meselor principale. Tratamentul va fi urmat până la primul scaun normal, fără a se depăși 7 zile.

Cind: Insuficiență renală sau hepatică, în absența datelor.

Al: Datorită prezenței zaharozei, acest medicament este contraindicat în caz de intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție a glucozei și galactozei sau deficit de sucrază-izomaltază. Prudență în diabet zaharat (produsul conține 0,966 g de zaharoză per plic de 1 g de pulbere). Nu trebuie administrat ca tratament de primă intenție în dizenteria acută, cu prezența de sânge în scaun și febră mare și în diaree ce survine în timpul antibioterapiei cu spectru larg.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PIRACETAMUM
PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM

Cod ATC: G03XC01**EVISTA®** ELI LILLY; Cpr. film. 60 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)**Ind:** Tratamentul și profilaxia osteoporozei la femeile aflate în post-menopauză.**Dz:** 60 mg/zi. Adm. pe termen lung. Se recomandă suplimentarea dietei cu calciu și vitamina D.**Cind:** La femeile cu potențial fertil. Tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară și tromboză venoasă retiniană, în prezent sau în antecedente. Hipersensibilitate la raloxifen. IH, inclusiv colestaza. IR severă. Hemoragii uterine de etiologie necunoscută. La paciențele cu simptome de cancer endometrial.**Al:** La paciențele cu risc de evenimente tromboembolice venoase de orice etiologie trebuie avut în vedere raportul risc/beneficiu. Prudență la paciențele cu antecedente de hipertrigliceridemie (> 5,6 mmol/l) indusă de estrogenii adm. oral, IH, asocierea cu colestiramină.**RA:** Tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară și tromboza venelor retiniene; bufeuri; crampe la nivelul membrelor inferioare; trombocitopenie ușoară. Foarte rar: greață, vărsături, durere abdominală și dispepsie; rash; creșterea tensiunii arteriale; cefalee, inclusiv migrenă; sindrom gripal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C09AA05

PIRIBEDILUM
PIROXICAMUM
PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM

AMPRIIL KRKA; Cpr. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3, 5, 6 sau 9 blist. × 10 cpr. (P-6L)

HARTRIL EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (P-6L)

PIRAMIL SANDOZ GmbH; Cpr. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 1, 2, 3 sau 10 folii × 10 cpr.; ct. × 4 folii × 7 cpr. (P-6L)

RAMIPRIL-AC AC HELCOR SRL; Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

RAMIPRIL STADA STADA ARZNEIMITTEL; Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

RAMIRAN RANBAXY; Cpr. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 folii × 10 cpr. (P-6L)

TRITACE® 2,5 mg; TRITACE® 5 mg; TRITACE® 10 mg AVENTIS PHARMA; Cpr. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

Ind: HTA; IC congestivă; Reducerea mortalității post IMA.

Dz: HTA: Inițial 2,5 mg/zi. Doza se crește cu 1,25 mg la 2-3 săpt. Doza de întreținere: 2,5-5 mg/zi, doza maximă admisă 10 mg/zi. La pacienții cu IR, doza se ajustează în funcție de clearance-ul la creatinină.

Cind: Hipersensibilitate la produs; istoric de edem angioneurotic; stenoză de arteră renală bilateral sau unilateral pe rinichi unic; stenoza aortică sau mitrală; hTA; în cursul dializelor cu membrane poliacrilonitrilice. Sarcină și alăptare.

AI: IC severă (NYHA IV) imediat după IMA. Asocierea cu diuretice. Monitorizare atentă în: HTA severă; IC severă; pacienți pretratați cu diuretice; hipovolemie, hipopotasemie, hiponatriemie; stenoză arterială renală relevantă hemodinamic; pacienți cu risc de hTA ortostatică, IH. Când se adm. simultan cu AINS trebuie anticipate atât scăderea efectului antihipertensiv cât și posibilitatea apariției IR acute. * oferi și activități de precizie.

RA: hTA ortostatică; amețeli, fatigabilitate, slăbiciune, tahicardie, greață, transpirații, tinitus, tulburări vizuale, dureri de cap, anxietate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A02BA02

PIROXICAMUM
 PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
 PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
 PROPANOLOLUM
 PROPYPHENAZONUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEFEDRINUM
 PYGELUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
RANITIDINUM

ARNETIN MEDOCHEMIE Ltd.; Sol. inj. 50 mg/2 ml; ct. × 5 f. × 2 ml (**P-RF**)
DIGEN 75 mg OZONE; Cpr. film. 75 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr. (**OTC**)
DIGEN EFF 150 mg OZONE; Cpr. eff. 150 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. eff. (**P-6L**)
GERTOCLAM FARAN LAB.; Cpr. film. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
HISTAC 75 RANBAXY LAB.; Cpr. film. 75 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 6 cpr. (**OTC**)
HISTAC 150; HISTAC 300 RANBAXY LAB.; Cpr. film. 150 mg, 300 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
HISTAC EVT RANBAXY LAB.; Cpr. eff. 150 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. eff. (**P-6L**)
RANITAL® 150 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 150 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
RANITIDIN ARENA GROUP SA; Cpr. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
RANITIDIN SLAVIA PHARM SRL; Cpr. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
RANITIDIN PHARMEX ROM IND. Cpr. 150 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (**P-6L**)
RANITIDIN OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
RANITIDIN 150 mg; RANITIDIN 300 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. 150 mg și 300 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (150 mg), ct. × 1 blist. × 10 cpr. (300 mg) (**P-6L**)
RANITIDIN 150 mg FABIOL SA; Cpr. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
RANITIDINĂ ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 150 mg; ct. × 2 sau 120 blist. × 10 cpr. (**S/P-6L**)
RANITIDINĂ LAROPHARM SRL; Cpr. film. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
RANITIDINĂ 150 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
RANITINIDINA LPH 75 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 75 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cpr. (**S/OTC**)
RANITINIDINA LPH 150 mg; RANITINIDINA LPH 300 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 150 mg, 300 mg; ct. × 2, 6 sau 100 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (**S/P-6L**),
ROMATIDINE® 150 mg ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 150 mg; ct. × 2 sau 120 blist. × 10 cpr. (**S/P-6L**)
ULCORAN EUROPHARM SA; Cps. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (**P-6L**)
ZANTAC GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 150 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
ZANTAC 75 GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 75 mg; ct. × 1 blist. × 6 cpr. film. (**OTC**)
ZANTAC GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 25 mg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml (**P-RF**)

Ind: Trat. ulcer duodenal și ulcer gastric benign, inclusiv cel indus de AINS. Prevenirea ulcerelor la bolnavii care sunt trat. cu AINS (inclusiv aspirină) și în special la bolnavii cu boală ulceroasă în antecedente. Ulcer postoperator. Esofagita de reflux. Sindrom Zollinger-Ellison. Dispepsie cronică episodică. Profilaxia ulcerului de stres; recurențelor hemoragice după boală ulceroasă; sd. Mendelson.

Dz: Adm. orală: **Adulți:** Ulcerul duodenal și ulcerul gastric benign. Trat. acut: 150 mg de 2 ori pe zi sau 300 mg seara. Vindecarea apare după 4 săpt. de trat. sau după alte 4 săpt. la cei care nu au fost vindecați după primele 4 săpt. În ulcerul duodenal: 300 mg de 2 ori pe zi, 4 săpt. Tratamentul pe termen lung: 150 mg seara. Pentru fumători: 300 mg seara. În ulcerele induse de AINS: 8-12 săpt. de trat. cu 150 mg de 2 ori pe zi sau 300 de mg

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PIROXICAMUM - BETA - CYCLODEXTRINUM
PODOPHYLLOTOXINUM
POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM

Cod ATC: N01AH06**ULTIVA 1 mg; ULTIVA 2 mg; ULTIVA 5 mg** PHARMACIA & UPJOHN; Liof. pt. sol. inj./perf. 1 mg, 2 mg, 5 mg; ct. × 5 fl. (S)

Ind: Analgezic pentru folosirea în timpul inducerii și/sau menținerii anesteziei generale. Pregătirea analgeziei pacienților ventilați mecanic din unitățile de terapie intensivă.

Dz: *Inducerea anesteziei:* Remifentanil trebuie administrat cu o doză standard de agent narcotic ca propofol, tiopental sau izofluran pentru inducerea anesteziei. Produsul poate fi administrat cu o viteză de perfuzare de la 0,5 până la 1 g/kg și minut, cu sau fără injectarea lentă a bolusului inițial de 1 g/kg, administrat în minim 30 secunde. *Menținerea anesteziei la pacienții ventilați:* Datorită instalării rapide a efectului și duratei de acțiune scurte a Ultiva, viteza de administrare în timpul anesteziei poate fi titrată ascendent cu creșteri de la 25% la 100% sau descendent, ca scăderi de la 25% la 50%, la fiecare 2-5 minute pentru a atinge nivelul dorit al răspunsului mediat prin receptori opioizi. În cazul anesteziei ușoare, injecția suplimentară lentă în bolus poate fi administrată la fiecare 2-5 minute. *Medicația concomitentă:* Remifentanilul diminuează cantitățile sau dozele de anestezice, hipnotice și benzodiazepine inhalate necesare pentru anestezie. Dozele următorilor agenți folosiți în anestezie: izofluran, tiopentona, propofol și temazepam au fost reduse cu până la 75% când s-au utilizat în același timp cu remifentanil.

Cind: Deoarece în formula Ultiva este prezentă glicina, utilizarea acesteia epidural și intratecal este contraindicată. Ultiva este contraindicată la pacienții care au hipersensibilitate la orice component al produsului și alti analogi ai fentanilului. Ultiva este contraindicată pentru utilizare ca agent unic de inducere a anesteziei.

Al: Ultiva va fi administrată numai într-o unitate perfect echipată pentru monitorizarea și asistarea funcțiilor respiratorii și cardiovasculare și de personal special instruit pentru utilizarea anestezicelor, recunoașterea și managementul privind efectele adverse ale opioidelor puternice, incluzând resuscitarea respiratorie și cardiacă.

RA: Depresie respiratorie, apnee, bradicardie, hipotensiune arterială, rigiditatea musculaturii scheletice, greață, vărsături, prurit, tremor postoperator.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PODOPHYLLOTOXINUM
 POLYGELINUM
 POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
 PROPRANOLOLUM
 PROPYPHENAZONUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEFEDRINUM
 PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM

Cod ATC: A10BX02

NOVONORM® 0,5 mg; NOVONORM® 1 mg; NOVONORM® 2 mg NOVO NORDISK A/S; Cpr. a 0,5 mg; 1 mg sau 2 mg; ct. × 6 blist. × 15 cpr. (**P-6L**)

Ind: Diabet tip 2 (diabet zaharat insulino-independent) a căror glicemie nu mai poate fi controlată satisfăcător prin dietă, scăderea în greutate și exercițiu fizic. În combinație cu metformin pentru pacienții cu diabet tip 2, atunci când metforminul singur nu permite un control satisfăcător.

Dz: Inițial 0,5 mg. Dacă pacienții sunt transferați de la un alt agent oral hipoglicemic, doza inițială este de 1 mg. Doza maximă recomandată este de 4 mg înainte de mesele principale. Doza maximă totală 16 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la produs, diabet zaharat tip 1, cetoacidoza diabetică, sarcină și alăptare, tulburări severe renale sau hepatice, copii sub 12 ani, vârstnici peste 75 de ani. Asocierea cu: ketoconazol, itraconazol, eritromicină, fluconazol; rifampicină, fenitoină.

Al: Precauție la asocierea cu: IMAO, beta-blocante neselective, IEC, salicilați, octreotide, alcoolul și steroizii anabolizanți, anticoncepționalele orale, tiazidele, corticosteroizii, hormonii tiroidieni și simpatomimetice.

RA: Hipoglicemia ușoară, tulburări vizuale tranzitorii și tulburări gastrointestinale (diaree, greață). Cazuri izolate de creșteri ușoare și tranzitorii ale nivelelor enzimelor hepatice și reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

POLYGELINUM
POVIDONUM IODINATUM
PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGELUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AD07**RAPILYSIN® 10 U** HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. pt. sol. inj. 10 U (S)**Ind:** Terapia trombolitică a IMA (în răstimp de 12 ore după instalarea simptomelor IMA).**Dz:** Trat. trebuie inițiat imediat ce se instalează simptomele de IMA. Doză dublă de injecții de 2×10 U în bolus. Fiecare doză este adm. i.v. lent în timp de mai puțin de 2 minute. A doua doză se adm. la 30 minute după începerea injectării primei doze. Heparina și acidul acetilsalicilic se vor administra concomitent, pentru a reduce riscul de tromboză. Heparină 5000 UI inj. în bolus și urmată de o perfuzie de 1000 UI/oră, începând de la terminarea celei de-a doua doze de reteplase. Se va administra cel puțin 24 ore. Acidul acetilsalicilic: 75-350 mg/zi de la începutul terapiei trombolitice și cel puțin până la externare.**Cind:** În decurs de 3 luni de la hemoragii sau traumatisme severe, de la intervenție chirurgicală majoră, neoplasm intracranian, malformații arteriovenoase sau anevrism; diateză hemoragică cunoscută; HTA severă necontrolată; ulceratie peptică activă, varice esofagiene și alte contraindicații cunoscute pentru terapia fibrinolitica (pancreatită acută, pericardită acută, endocardită bacteriană, retinopatie diabetică hemoragică, sau la pacienți aflați sub tratament cu anticoagulante orale).**Al:** Prudență în: maladii cerebrovasculare, hemoragii recente gastrointestinale sau genitourinare (în ultimele 10 zile), masaj cardiac prelungit sau viguros; stenoză mitrală cu fibrilație atrială, deficiențe hemostatice datorate maladiilor hepatice sau renale severe. Neoplasme cu risc crescut de sângerare, sarcină, tromboflebită septică sau canulă arteriovenoasă ocluzionată la situsuri cu infecție puternică, vârstă înaintată, peste 75 ani. Atenție la asocierea cu: heparină, antagoniștii vitaminei K, medicamente care modifică funcțiile plachetare (cresc riscului de hemoragie).**RA:** Frecvent hemoragie, predominant la situsul de injectare și numai ocazional hemoragie gastrointestinală, gingivală sau genitourinară; rar sângerare retroperitoneală, hemoragie cerebrală și epistaxis. Cardiovascular: aritmii cardiace, tahicardie ventriculară, extrasistole și hTA. Rareori, s-au raportat reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

POVIDONUM IODINATUM
 PRAMIPEXOLUM
 PRAMIRACETAMUM
 PRAVASTATINUM
 PRAZICUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
 PROPRANOLOLUM
 PROPYPHENAZONUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEDEFDRINUM
 PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
RETINOLUM

Cod ATC: A11CA01, S01XA02**OCULOTECT** NOVARTIS PHARMA; Gel oft. 1000 UI/g; ct. × 1 tub × 10 g (P-6L)**SICOVIT® A 10000 UI** SICOMED SA; Dj. 10000 UI; fl. × 50 dj. (P-6L)**SICOVIT® A 300000 UI/1 ml** SICOMED SA; Sol. inj. uleioasă 300 000 UI/ ml; ct. × 10 f. × 1 ml (P-RF)**VITAMIN A 50000 UI** PHARCO PHARM.; Cps. 50000 UI; ct. × 2 sau 4 blist. × 6 cps. (P-6L)**VITAMINA A** BIOFARM SA; Sol. orală 1 500 000 UI/g; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-6L)**VITAMINA A FORTE** BIOFARM SA; Cps. moi 50000 UI; ct. × 2 blist. × 15 cps. (P-6L)

Ind: Carențe specifice, stări de hipo- sau avitaminoză în steatoree, obstrucție biliară, la copilul mic, în sarcină, în perioada de alăptare; unele boli de piele: diskeratoză, boală Darier, psoriazis etc. (tratament local și general); afecțiuni cronice cu modificări structurale și funcționale ale unor epiteli: ozenă, bronșită cronică, stomatite, glosite, gastrită atrofică, rectocolite, litiază renală; prurit vulvar și anal; hemeralopie, xeroftalmie; sindrom premenstrual prin insuficiență luteinică (ca medicație adjuvantă).

Dz: Oral, în stări carentiale, la adulți și copii mai mari de 8 ani, 100000 UI/zi, 3 zile, apoi 50000 UI/zi, 2 săptămâni; doze de întreținere: 10000-20000 UI/zi, 2 luni; copii până la 2 ani: 1000-10000 UI/zi; copii 2-8 ani: 3000-30000 UI/zi, 15 zile; pentru alte indicații, la adult: 100000-300000 UI/zi, la copii: 50000-150000 UI/zi; în sd. premenstrual 150000 UI/zi, 10 zile înaintea menstruației. Inj.: i.m. profund, 150000-300000 UI o dată pe săptămână în deficitul de vitamină A, o dată pe lună ca trat. de întreținere, la 2-6 luni pentru profilaxie; la copiii sub 1 an: 1/2 din doza menționată.

Cind: Hipervitaminoză A.

Al: Se evită sau prudență multă în timpul sarcinii (max. 10000 UI/zi) și în IR. Formele de uz oral nu se absorb la bolnavi cu obstrucție biliară și cu insuficiență a pancreasului exocrin - se recomandă prodrog (palmitat). Absorbția poate fi micșorată când se administrează concomitent neomicină, colestiramină; contraceptivele orale pot crește concentrația plasmatică a vitaminei A.

RA: Trat. îndelungat cu doze mari (100 000 UI) provoacă anorexie, greață, cefalee, iritabilitate, uscarea și descuamarea pielii, prurit, rădarea părului, hepato-splenomegalie, tumefacția dureroasă a oaselor lungi și osteoporoză, hipertensiune intracraniană, tensiunea fontanelii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PRAMIPEXOLUM
PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AB08

CLIVARIN® ABBOTT; Sol. inj. 1432 UI/0,25 ml sau 3436 UI/0,6 ml; ct. × 5 sau 10 seringi preumplute (**P-6L**)

Ind: Profilaxia trombozelor și tromboembolismului (inclusiv la cei cu risc mare). Trat. tromboembolismului venos. Împiedicarea coagulării în cursul hemodializei și a circulației extracorporale.

Dz: *Profilaxia tromboembolismului venos:* 1432 UI/zi, inj. sc. Prima inj. cu 2 ore înaintea operației. Durata trat.: 7-14 zile. *Profilaxia primară a trombozelor și embolismului* la pacienții cu risc crescut de tromboembolism (protezare totală de șold sau genunchi): 3436 UI. Prima inj. cu 12 ore înainte de operație și se va adm. până la mobilizarea totală a pacientului, cel puțin 14 zile. *Trat. tromboembolismului venos* (tromboză venoasă profundă și embolism pulmonar): 3436 UI, de 2 ori pe zi, 5-7 zile.

Cind: Alergie cunoscută la reviparină sodică și/sau alergii la heparină, inclusiv trombocitopenii condiționate alergice.

Al: Diateze hemoragice, endocardită bacteriană, ulcer gastric activ, gută, AVC hemoragic, chirurgie spinală sau oftalmologică, pacienți aflați sub terapie concomitentă cu alte anticoagulante sau inhibitori plachetari. Reviparina nu este interschimbabil cu heparină nefracționată și nici cu alte heparine cu masa moleculară mică. Nu se adm. i.m. (risc de hematoame). Atenție la asocieri cu: AINS, salicilați, anticoagulante orale, dextran. Sarcină și alăptare.

RA: Hemoragii, îndeosebi la nivelul pielii, plăgilor, tractului gastrointestinal și uro-genital. Rar trombocitopenie, necroze cutanate în sfera inj., creșterea transaminazelor serice, LDH și a lipazei. Rar hipersensibilitate sau reacții anafilactice. Folosirea îndelungată induce osteoporoză, mai ales la pacienții cu predispoziție. Foarte rar hipoaldosteronism asociat cu hiperapotasemie și acidoză metabolică, mai ales la pacienții cu IR și diabet zaharat. Reacții tisulare la locul inj. (indurări, înroșiri și mici hematoame).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PRAMIRACETAMUM
PRAVASTATINUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AB04**REBETOL** SCHERING PLOUGH EUROPE; Cps. 200 mg; ct. × 7 blist. × 12 cps; ct. × 14 blist. × 10 sau 12 cps. (P-RF)**REBETOL 40 mg/ml** SCHERING PLOUGH EUROPE; Sol. orală 40 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 100 ml + 1 seringă dozatoare (P-RF)**COPEGUS®** HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 200 mg; ct. × 1 fl. × 28, 42, 112 sau 168 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. adulților cu hepatită cronică C (în asociere cu interferon), care au răspuns în prealabil la tratamentul cu interferon alfa, dar care au prezentat ulterior recădere; trat. hepatitei cronice C evidențiată histologic, netratată anterior, fără decompensare hepatică, cu valori ridicate ale ALT, cu ARN-VHC seric și care prezintă fibroză sau activitate inflamatorie marcată.

Dz: 1000-1200 mg/zi, în două prize, în timpul mesei, în asociație cu interferon alfa-2b (adm. s.c.) 3 milioane UI de 3 ori pe săptămână. Pacienții cu un clearance al creatininei < 50 ml/min nu trebuie tratați cu ribavirină. Nu se recomandă tratamentul cu ribavirină la copii și adolescenți sub 18 ani.

Cind: Hipersensibilitate la ribavirină sau la oricare dintre excipienți. Sarcină. Perioadă de alăptare. Afecțiuni cardiace severe în antecedente, cardiopatie instabilă sau necontrolată, în ultimele 6 luni. Hemoglobinopatii (de ex.: talasemie, siclemie). IRC sau clearance al creatininei < 50 ml/min. Antecedente de boală psihică severă. Disfuncție hepatică severă sau ciroză hepatică decompensată. Afecțiune tiroidiană preexistentă, dacă nu poate fi controlată prin tratament convențional. Sarcină și alăptare.

Al: Potențial teratogen și/sau embriocid semnificativ. În timpul trat. și 4 luni după oprirea acestuia femeile cu potențial fertil și partenerii trebuie să folosească mijloace contraceptive eficace. Pacienții de sex masculin ale căror parteneri sunt însărcinate trebuie să folosească prezervativul pentru a minimaliza pătrunderea de ribavirină în vagin. Monitorizarea funcției cardiace, deoarece anemia asociată cu utilizarea de ribavirină poate determina deteriorarea funcției cardiace sau exacerbară simptomelor coronariene. Atenție la pacienții cu tulburări psihice sau ale SNC, inclusiv depresie clinică; la cei cu HIV care sunt tratați cu zidovudină sau stavudină (asocierea determină o viremie HIV crescută). *oferi și activități de precizie.

RA: Anemie. Hemoliză asociată cu valori crescute ale acidului uric și ale bilirubinei indirecte. Tulburări psihice grave (idee de suicid). Afectarea funcției tiroidiene.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A11HA04

PRAVASTATINUM
 PRAZIQUANTELUM
 PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
 PROPRANOLOLUM
 PROPYPHENAZONUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEFDRIUM
 PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM

RIBOFLAVIN FOSFAT SICOMED SA; Sol. inj. 7 mg/ml; ct. × 5 sau 100 f. × 2 ml (S/P-RF)
SICOVIT® B₂ 10 mg/2 ml SICOMED SA; Sol. inj. 5 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml (P-RF)

Ind: Tulburări de creștere, hemeralopie, keratite, conjunctivite, steatoree, stomatită angulară, cheiloze, glosite, seboree, acnee rozacee, crampe musculare, migrene, hipogalactie.

Dz: Doza profilactică *la adulți*: 2-10 mg/zi, iar cea terapeutică: 10-15 mg/zi. *La copiii sub 2½ ani*: 0,5-2,5 mg/zi; *2½-15 ani* 2,5-10 mg/zi (inj. i.m. profund).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J04AB04

PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINUM
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM

MYCOBUTIN® 150 mg PHARMACIA; Cps. 150 mg; ct. × 2 blist. × 15 cps. (S/P-RF)

Ind: Trat. infecțiilor cauzate de: M. tuberculosis, M. avium intracellulare complex (MAC), precum și de alte micobacterii atipice. Profilaxia infecțiilor cu MAC la pacienții imunodeficitari. În trat. tbc pulmonare recent diagnosticate sau cronice, multi-rezistente, cu sușe de M. tuberculosis rezistente la rifampicină.

Dz: *Monoterapie:* profilaxia infecțiilor cu MAC la pacienții imunodeficitari: 300 mg. *Terapie combinată:* infecții micobacteriene netuberculoase: 450-600 mg/zi, până la 6 luni din momentul negativării culturilor; tbc pulmonară cronică, rezistentă la antibiotice: 300-450 mg timp de până la 6 luni din momentul negativării culturilor din spută; tbc pulmonară diagnosticată recent: 150 mg, 6 luni.

Cind: Hipersensibilitate la rifabutină sau alte rifamicine. În perioada de sarcină și alăptare.

Al: Poate colora roșu-portocaliu urina, tegumentele și secrețiile. Nu se indică purtarea lentilor de contact moi. Atenție în IH sau IR severă (se scad dozele cu 50%). Verificarea periodică a numărului de leucocite și trombocite, precum și a enzimelor hepatice. În timpul tratamentului contracepția orală poate fi ineficientă, pacientele fiind sfătuite să utilizeze alte metode contraceptive.

RA: Sistem digestiv: greață, vărsături, creșterea transaminazelor hepatice, icter. Sistem sanguin și limfatic: leucopenie, trombocitopenie și anemie (mai ales la asocierea cu HIN). Aparat locomotor: artralгии și mialgii. Uneori: febră, erupții cutanate și, ocazional șoc, eozinofilie, bronhospasm.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J04AB02

PRAZOSINUM
 PREDNISOLONUM
 PREDNISONUM
 PREGABALINUM
 PREPARATE DIN SANGE
 PRISTINAMICINUM
 PROCHLORPERAZINUM
 PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCYANIDOLICI)
 PRODUSE PENTRU DIALIZA
 PROGESTERONUM
 PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
 PROPRANOLOLUM
 PROPYPHENAZONUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEFEDRINUM
 PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM

RIFAMPICINĂ ARENA GROUP SA; Cps. 150 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)

RIFAMPICINĂ 150 mg; RIFAMPICINĂ FORTE EUROPARM SA; Cps. 150 mg, 300 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps., ct. × 50 blist. × 10 cps. (300 mg) (S/P-RF)

RIFAN® 150 mg SICOMED SA; Cps. 150 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)

SINERDOL 150 mg; SINERDOL 300 mg ANTIBIOTICE SA; Cps. 150 mg, 300 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (150 mg), ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (300 mg) (P-RF)

Ind: Trat. tbc pulmonare și extrapulmonare. De elecție în boala extensivă sau cavitară, asociată cu cel puțin un antituberculos major. Infecții cu *M. avium* complex și *M. kansasii* (în asociere cu alte substanțe antimicobacteriene). Trat. leprei, forma lepromatoasă sau tuberculoidă, asociat cu un alt medicament antilepros. Infecții cu stafilococul auriu sau *S. epidermidis*, inclusiv germenii rezistenți la metilicină, enterococi, pneumonia cu *Legionella* (asociată cu eritromicina). Profilaxia meningitei meningococice, pentru sterilizarea purtătorilor asimptomatici.

Dz: Trat. tbc pulmonare active: *Regim continuu* (zilnic): Isoniazidă (300 mg/zi la adult; 10-20 mg/kg/zi la copii) + rifampicină (600 mg/zi la adult, 10-20 mg/kg/zi la copii, fără a depăși 600 mg), 9 luni. *Regim intermitent strict supravegheat*: Schema standardizată aplicată în România (administrare bisăptămânală timp de 9 luni): Isoniazidă (15 mg/kg) + rifampicină (750 mg pentru cei cu greutatea < 60 kg, 900 mg peste 60 kg) + etambutol (40-50 mg/kg), 3 luni, apoi isoniazidă + etambutol sau streptomycină, timp de 6 luni. Alte infecții cauzate de microorganisme sensibile: 15-20 mg/kg/zi, repartizate în două prize. Se asociază cu un alt agent antibacterian pentru a preveni dezvoltarea tulpinilor rezistente. Profilaxia infecțiilor meningococice: la *adult* 600 mg la 12 ore, 2 zile; la *copiii de peste un an*: 10 mg/kg la 12 ore, 2 zile.

Cind: Hipersensibilitate la rifampicine, porfirie, IH severă.

Al: Adm. în IH doar în caz de absolută necesitate. Tratamentul intermitent se efectuează sub strictă supraveghere medicală, datorită posibilității apariției reacțiilor imunoalergice. Sarcină și alăptare. Fiind inductor enzimatic, poate reduce eficacitatea: glucocorticoizi, sulfamide antidiabetice, anticoagulante orale, digoxină, combinațiilor estro-progestative, barbiturice, cloramfenicol (se cresc dozele). Crește hepatotoxicitatea isoniazidei. Interferă în determinările microbiologice standard ale acidul folic și vitaminei B₁₂.

RA: Hepatotoxicitatea (hepatită cu icter). Tulburări digestive (greață, vărsături, dureri abdominale, diaree), erupții alergice, prurit, febră, leucopenie, oboseală, somnolență, cefalee, confuzie. Sd. pseudogripal (mecanism imunologic). Scăderea presiunii arteriale, anemie hemolitică acută; IRA, datorată unei necroze tubulare sau unei nefrite interstițiale. S-au semnalat și cazuri de trombocitopenie cu sau fără purpură, reversibilă. Rifampicina colorează în roșu urina, sputa și saliva sau lentilele de contact.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

[Cod ATC: A07AA11](#)

PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM

NORMIX 200 mg ALFA WASSERMANN SpA; Cpr. film 200 mg; ct. × 1 blist. × 12 cpr. (P-RF)

NORMIX 100 mg/5 ml ALFA WASSERMANN SpA; Gran. pt. susp. orală 10 mg/5 ml; ct. × 1 fl. cu gran. pt. 60 ml susp. (P-RF)

Ind: Infecții digestive, profilaxia infecțiilor în chirurgia tubului digestiv, encefalopatia hepatică.

Dz: Pe cale internă: 10-15 mg/kg/zi. Local: unguent 5%.

Cind, A!, RA: Antibiotic din grupul rifampicinei, cu efecte asemănătoare acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C02AC06

PREDNISONUM
PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM

TENAXUM LAB. SERVIER; Cpr. 1 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. **(P-6L)**

Ind: HTA esențiale.

Dz: 1 mg/zi, dimineața. După o lună, doza poate fi crescută la 2 mg/zi, în 2 prize (dimineața și seara), în timpul mesei. Întreruperea tratamentului prin scăderea progresivă a dozei.

Cind: Hipersensibilitate la rilmenidină sau la oricare dintre excipienți. Depresie severă. IR severă, ca o precauție în absența unor date suficiente. Copii.

Al: Pacienții cu IM sau AVC recent, necesită monitorizare medicală periodică. Nu se recomandă consumul de băuturi alcoolice sau asocierea cu IMAO. Prudență în asocierea cu antidepressivele triciclice, deoarece activitatea antihipertensivă a rilmenidinei poate fi parțial antagonizată. Sarcină și alăptare. *oferi și activități de precizie.

RA: Astenie, palpitații, insomnie, somnolență, oboseală, gastralgii, uscăciunea gurii, diaree, erupții cutanate; în mod excepțional: senzație de rece în extremități, hTA ortostatică, tulburări sexuale, anxietate, depresie, prurit, edeme, crampe musculare, greață, constipație, bufeuri.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PREGABALINUM
PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM

Cod ATC: N07XX02**RILUTEK® 50 mg** AVENTIS PHARMA; Cpr. 50 mg; ct. × 4 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)

Ind: Prolungirea vieții sau a timpului până la necesitatea de ventilare mecanică la pacienții cu scleroză laterală amiotrofică. Nu s-a dovedit a fi eficace în stadiile avansate ale ALS și nici în alte boli neuromotorii.

Dz: 100 mg/zi (50 mg la 12 ore).

Cind: Hipersensibilitate la produși. Boli hepatice. Paciente gravide sau care alăptează.

Al: Siguranța și eficacitatea în orice proces neurodegenerativ la copii sau adolescenți, nu au fost stabilite.

RA: Astenia, greața și creșterea valorilor testelor funcțiilor hepatice. Ocazional, neutropenie, asociată uneori cu febră.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PREPARATE DIN SANGE
PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AX08

RISPEN 1 mg; RISPEN 2; RISPEN 3; RISPEN 4 ZENTIVA AS; Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg; ct. × 2, 3 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
RISPOLEPT® 1 mg; RISPOLEPT® 2 mg; RISPOLEPT® 3 mg; RISPOLEPT® 4 mg JANSSEN PHARMACEUTICA; Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

RISPOLEPT JANSSEN PHARMACEUTICA; Sol. orală 1 mg/ml; ct. × 1 fl. × 30 sau 100 ml (P-6L)

RISPOLEPT CONSTA® 25 mg; RISPOLEPT CONSTA® 37,5 mg; RISPOLEPT CONSTA® 50 mg JANSSEN PHARMACEUTICA; Pulb. pt. sol. inj. 25 mg, 37,5 mg, 50 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 seringă preumplută × 2 ml solv. (P-6L)

RISPORAN 1 mg; RISPORAN 2 mg; RISPORAN 3 mg RANBAXY; Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

RISSET 1 mg; RISSET 2 mg; RISSET 3 mg; RISSET 4 mg PLIVA; Cpr. 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. schizofreniei, incluzând primul episod psihotic acut, recăderile, schizofrenia cronică și alte stări. Trat. pe termen lung pentru prevenirea recăderilor în schizofrenia cronică. Trat. tulburărilor de comportament la pacienții cu demență.

Dz: Schizofrenie. *Per os: Adulți:* doza de start 2 mg/zi; doza de întreținere: 4-6 mg. *Vârstnici:* doza de start 0,5 mg, de 2 ori/zi; apoi creșteri de 0,5 mg de 2 ori/ zi până la 1-2 mg de 2 ori/zi. *Boli renale și hepatice:* doza de start 0,5 mg de 2 ori pe zi; doza de menținere: 1-2 mg de 2 ori/zi. *Injectabil:* 25-50 mg la 2 săptămâni.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la produs. *oferi și activități de precizie. Alăptare.

Al: Precauție la pacienți cu afecțiuni cardiovasculare cunoscute (IC, IMA, tulburări de conducere, hipovolemie sau boli cerebrovasculare). În cazul în care apare hipotensiunea, trebuie luată în considerare reducerea dozei. Se recomandă precauție în administrarea risperidonei la pacienții cu boala Parkinson, epilepsie.

RA: Comune: insomnie, agitație, anxietate, cefalee. Rare: somnolență, oboseală, greutate în concentrare, constipație, dispepsie, greață/vomă, dureri abdominale, tulburări de vedere, disfuncții sexuale, incontinență urinară, rinită, rash. Simptome extrapiramidale: tremor, rigiditate, hipersalivație, bradikinezie, akatisie, distonie acută. Ocazional, hTA ortostatică sau HTA, tahicardie reflexă, galactoree, ginecomastie, dereglări ale ciclului menstrual și amenoree, edeme, diskinezie tardivă, sindrom neuroleptic malign, dezechilibre în temperatura corporală și convulsii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AE03

PRISTINAMICINUM
PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR

NORVIR ABBOTT; Cps. 100 mg; ct. × 4 fl. × 84 cps. (S/P-RF)**NORVIR** ABBOTT; Sol orală 80 mg/ml; ct. × 5 fl. × 90 ml (S/P-RF)**Ind:** În asociere cu analogii nucleozidici antiretrovirali în trat. pacienților infectați cu HIV-1, cu imunodeficiență severă sau progresivă.**Dz:** *Adulți:* 600 mg de 2 ori/zi, cps., oral. *Copii (peste 2 ani):* 350 mg/m² sol. orală, de 2 ori/zi, max. 600 mg de 2 ori/zi. Pentru copiii mai mari se poate încerca adm. cps. ca doză de întreținere.**Cind:** Hipersensibilitate cunoscută la produs. IH severă. Asocierea cu: rifabutină, amiodaronă, astemizol, bepridil, bupropionă, chinidină, cisapridă, clozapină, dihidroergotamină, encainidă, ergotamină, flecainidă, meperidină, pimoșid, piroxicam, propafenonă, propoxifen, benzodiazepine, terfenadină și zolpidem. Sarcină și alăptare.**Al:** Prudență la pacienții cu afectări ale funcției hepatice sau renale, pacienții cu hemofilie A și B, pacienții cu hepatită virală de tip B sau de tip C. *oferi și activități de precizie.**RA:** Tulburări digestive: greață, diaree, dispepsie, anorexie, iritație locală la nivelul gâtului, flatulență, uscăciunea gurii, ulceratii bucale. Sistem nervos: amețeală, parestezii, hiperestezie, somnolență, insomnie, anxietate. Piele: rash, prurit, transpirație. Aparat respirator: faringită, agravarea tusei. Aparat cardiovascular: vasodilatație. Sistem musculo-scheletic: mai ales în cazul asocierii cu analogi nucleozidici, valori crescute ale creatininfosfokinazei, mialgii, miozită rar, rabdomioliză. Alte reacții: hiperlipidemie, mialgii, scăderea tiroxinei libere și totale, cazuri rare de anafilaxie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PROCHLORPERAZINUM
PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFDRIUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01CX02

MABTHERA HOFFMANN LA ROCHE; Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml (S)

Ind: Trat. limfoamelor foliculare stadiul III-IV, chimiorezistente sau care au recidivat de două sau mai multe ori după chimioterapie.

Dz: 375 mg/m² suprafață corporală, în perfuzie i.v. o dată pe săptămână, 4 săptămâni. Se instituie o premedicație (analgezic + antihistaminic). Viteza de perfuzie inițială 50 mg/oră; după primele 30 minute, poate fi mărită cu 50 mg/oră, la fiecare 30 minute, doza maximă 400 mg/oră. Perfuzii ulterioare: viteza inițială 100 mg/oră, apoi mărită cu 100 mg/oră, la fiecare 30 minute, doza maximă 400 mg/oră.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componentele acestui produs sau la proteinele murine.

Al: Pacienții cu un număr mare de celule maligne circulante (> 50000 mm³) sau cu o tumoră mare, prezintă un risc crescut de manifestare a unui sindrom sever de eliberare de citokine, de aceea vor fi tratați numai atunci când altă alternativă terapeutică a fost epuizată. Acest sindrom se caracterizează prin: dispnee marcată, bronhospasm, hipoxie și de asemenea de febră, frison, rigiditate, urticarie și angioedem. Precauție la pacienții cu insuficiență respiratorie, afecțiuni cardiace.

RA: Sindromul de eliberare de citokine (50% dintre pacienți) cu febră, frisoane și rigiditate; angioedem, greață, urticarie, astenie, cefalee, rinită, vărsături și dureri la nivelul tumorii, hTA și bronhospasm (10% din cazuri). Agravarea afecțiunilor cardiace preexistente, tulburări hematologice (trombocitopenie, neutropenie, anemie gravă).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PROCYANIDOLUM (OLIGOMERI PROCIANIDOLICI)
PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM

Cod ATC: N06DA03**EXELON** NOVARTIS PHARMA; Cps. 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg; ct. × 2, 4 sau 8 blist. × 14 cps.; ct. × 1 fl. × 250 cps. (P-RF)**EXELON** NOVARTIS PHARMA; Sol. orală 2 mg/ml; ct. × 1 fl. × 120 ml (P-RF)**Ind:** Trat. simptomatic al formelor ușoare și medii de boală Alzheimer.**Dz:** Doza inițială 1,5 mg de 2 ori/zi; după 2 săpt., poate fi crescută la 3 mg de 3 ori/zi. Doza de întreținere: 3-6 mg de 2 ori/zi; maximum 6 mg de 2 ori/ zi.**Cind:** Hipersensibilitate la rivastigmină sau la alți carbamați; IH severă; copii.**Al:** Precauție la pacienții cu sindrom de sinus bolnav sau tulburări de conducere cardiacă (bloc sinoatrial, șV), cu ulcer gastroduodenal activ sau cu predispoziție la aceste afecțiuni, la pacienții cu astm bronșic sau afecțiuni pulmonare obstructive. Nu trebuie asociat cu alte colinomimetice. *oferi și activități de precizie. Sarcină și alăptare.**RA:** Oboseală, astenie, amețeli, greață, vărsături și somnolență; greața, pierderea apetitului, pierderea în greutate; dureri abdominale, traume accidentale, agitație, confuzie, depresie, diaree, dispepsie, insomnie, infecții ale tractului respirator superior și ale tractului urinar. Uneori: transpirație abundentă, indispoziție, tremor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PRODUSE PENTRU DIALIZA
PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM

Cod ATC: N02CC04

MAXALT® 5 mg; MAXALT® 10 mg MERCK SHARP & DOHME; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr., ct. × 2 blist. × 3 cpr. (**P-6L**)

MAXALT-RPD 5 mg; MAXALT-RPD 10 mg MERCK SHARP & DOHME; Liof. oral 5 mg, 10 mg (**P-6L**)

Ind: Trat. crizelor de migrenă, cu sau fără aură (nu în scop profilactic).

Dz: *Adulți:* 10 mg; readministrare la minim 2 ore; max. 30 mg în 24 de ore. Pacienți tratați cu propranolol: 5 mg, maxim 3 doze/zi.

Cind: Hipersensibilitate la rizatriptan sau la oricare dintre componentele produsului; asocierea cu IMAO sau adm. în interval de 2 săptămâni după întreruperea trat. cu IMAO; HTA necontrolată prin trat.; coronaropatii, inclusiv cardiopatie ischemică cronică, cardiopatie ischemică sau angină Prinzmetal. Asocierea cu sumatriptan. Migrenă bazilară sau hemiplegică.

Al: Nu trebuie utilizat pentru trat. cefaleei "atipice", care poate fi asociată cu afecțiuni potențial severe (de ex. accident vascular cerebral, ruptură de anevrism), la care vasoconstricția cerebrovasculară poate fi un factor agravant. *oferi și activități de precizie. Precauție în HTA sau la asocierea cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (risc HTA și vasoconstricție coronariană).

RA: Dureri toracice sau abdominale; palpitații, tahicardie, bufeuri; greață, vomă, uscăciunea gurii, diaree, dispepsie, senzație de sete; dureri occipitale, senzație de greutate sau de tensiune locală, slăbiciune musculară; cefalee, parestezii, scăderea acuității intelectuale, insomnie, hiperestezie, tremor, ataxie, nervozitate, dezorientare; disconfort faringian, dispnee; angioedem, wheezing, urticarie, rash, necroliză toxică epidermică; disgeuzie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PROGESTERONUM
PROMESTRIENUM
PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M03AC09

ESMERON® 10 mg/ml N.V. ORGANON; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 10 fl. × 2,5 sau 10 ml; ct. × 12 fl. × 5 ml; ct. × 4 fl. × 25 ml (S)

Ind: Adjuvant în anestezia generală (facilitează intubarea traheală și asigură relaxarea musculaturii scheletice). Adjuvant în A.T.I. pentru a facilita intubarea și ventilația mecanică.

Dz: *Intubație traheală:* 0,6 mg/kg; doza de întreținere 0,15 mg/kg. Vârstnici, pacienți cu boli hepatice și/renale: doza pentru intubație 0,6 mg/kg. *Utilizarea în secția A.T.I.:* Intubație traheală: aceleași doze descrise anterior. Facilitarea ventilației mecanice: 0,6 mg/kg, după care se adm. în perfuzie 0,2-0,5 mg/ kg/oră. *Pacienți supraponderali sau obezi* (cu greutatea peste 30% din greutatea ideală): dozele trebuie reduse. Rocuroniul se adm. i.v., în bolus sau în perfuzie continuă.

Cind: Antecedente de reacții anafilactice la produs. *oferi și activități de precizie. Nou-născuți.

Al: Este esențial să se asigure o ventilație asistată, iar transmisia neuromusculară să fie monitorizată continuu. Precauție în cazul pacienților cu hipotermie, afecțiuni cardiovasculare, IRA, boli hepato-biliare, miastenia gravis, arsuri, obezi. Condiții care pot potența efectul rocuroniului: hipokaliemia, hipermagneziemia, hipocalcemia, hipoproteinemia, deshidratarea, acidoza, hipercapnia, cașexia. *Potențează efectele:* halotanului, eterului, enfluranului, isofluranului, ciclopropanului, dozelor mari de tiopenal, metohexital, ketamină, fentanil, gamahidroxibutirat, etomidat și propofol sau a altor curarizante antidepolarizante; antibiotice aminoglicozidice, doze mari de metronidazol, diuretice, tiamină, IMAO, chinidină, săruri de magneziu. *Diminuează efectele:* edrofonului, piridostigminei, aminopiridinei, adm. cronică anterioară de glucocorticoizi, fenitoinei sau carbamazepinei, azatioprinei, teofilinei, clorurii de calciu. Sarcină și alăptare.

RA: Reacții anafilactice, dureri la injectare, mai ales în cazul când s-a folosit propofol pentru inducția anesteziei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N04BC04

PROMESTRIENUM
 PROMETHAZINUM
 PROPAFENONUM
 PROPOFOLUM
 PROPRANOLOLUM
 PROPYPHENAZONUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEFEDRINUM
 PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM

REQUIP GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 0,25 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg; ct. × 210 cpr. (0,25 mg); ct. × 1 blist. × 21 cpr. (1 mg, 2 mg, 5 mg) (*P-RF*)

Ind: Tratamentul bolii Parkinson (monoterapie). Asociat cu levodopa pentru a menține sub control posibilele fluctuații și a reduce doza zilnică de levodopa.

Dz: Doza inițială 0,25 mg de 3 ori/zi; creștere săptămânală a dozei până la 3 mg/zi. Când este asociat cu L-dopa, doza de L-dopa poate fi redusă treptat cu 20%.

Cind: Hipersensibilitate la ropinirole. În cursul sarcinii și alăptării.

Al: Precauție la pacienții cu boli cardio-vasculare severe. Pacienții cu tulburări psihotice majore vor fi trat. dacă rap. posibilele avantaje/riscuri > 1. *oferi și activități de precizie.

RA: Somnolență, edeme gambiere, durere abdominală, vomă, sincopă, dispepsie și halucinații, diskinezie, hTA, bradicardie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PROMETHAZINUM
PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM

Cod ATC: N01BB09

NAROPIN ASTRAZENECA; Sol. inj. 2 mg/ml, 10 mg/ml; ct. × 5 f. × 10 sau 20 ml, sac × 100 sau 200 ml (2 mg/ml) (S)

Ind: Anestezia chirurgicală: bloc peridural, inclusiv cezariană; bloc regional. Trat. acut al durerii: perfuzie peridurală continuă sau adm. în bolus, în durerea postoperatorie sau în timpul travaliului.

Dz: Anestezie chirurgicală, bloc regional: 5-30 ml sol. 7,5 mg/ml; Trat. durerii postoperatorii, analgezia în travaliu: 10-20 ml sol. 2 mg/ml.

Cind: Sensibilitate cunoscută la anestezice locale de tip amidic. Copii sub 12 ani. *oferi și activități de precizie.

Al: Procedurile de anestezie regională vor fi efectuate exclusiv în secții dotate cu echipament corespunzător. Precauție la pacienții cu disfuncție hepatică sau renală severă, cu șV parțial sau complet, vârstnici. Sarcină și alăptare.

RA: Reacțiile alergice (uneori foarte grave), neuropatii și disfuncții ale măduvei spinării (sindrom arterial spinal anterior, arahnoidită, cauda equina), toxicitatea sistemică, convulsii, hTA, grețuri, bradicardie, vărsături, parestezii, hipertermie, retenție urinară, obnubilare, rigor, tahicardie, anxietate, hipoestezie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PROPAFENONUM
PROPOFOLUM
PROPRANOLOLUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM

Cod ATC: A10BG02

AVANDIA® 1 mg; AVANDIA® 2 mg; AVANDIA® 4 mg; AVANDIA® 8 mg GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg; ct. × 4 blist. × 14 cpr. (1 mg, 2 mg), ct. × 2 blist. × 14 cpr. **(P-RF)**

Ind: Numai în asociere, pentru trat. diabetului zaharat de tip 2, la pacienții la care monoterapia cu metformină sau sulfoniluree nu controlează suficient glicemia (în asociere cu metformina la pacienții cu obezitate; în asociere cu o sulfoniluree la pacienții care prezintă intoleranță la metformină sau la care metformina este Cind).

Dz: Asociat cu metformină: inițial 4 mg/zi; după 8 săptămâni, doza poate fi crescută la 8 mg/zi. Asociat cu sulfoniluree: 4 mg, 1-2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la produs; IC sau antecedente de IC (stadii NYHA I-IV); IH, asociere cu insulina. Sarcină și alăptare.

Al: Poate provoca retenție hidrică, care poate exacerba sau declanșa IC. Prudență la pacienții cu afecțiuni hepatice, asocierea cu paclitaxel.

RA: Anemie; metabolice (hipoglicemie, hiperglicemie); cefalee; diaree, flatulență, greață, dureri abdominale, dispepsie; fatigabilitate (în asociere cu metformina). În asociere cu sulfonilureea: hipoglicemie, hiperglicemie, creșterea greutatei corporale, tulburări de coagulare, hiperlipidemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PROPOFOLUM
 PROPANOLOLUM
 PROPYPHENAZONIUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEFEDRINUM
 PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINIUM
 ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM

Cod ATC: C10AA07**CRESTOR 10; CRESTOR 20; CRESTOR 40** ASTRAZENECA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (*P-6L*)

Ind: Hipercolesterolemie primară (tip IIa, care include și hipercolesterolemia fami-lială - forma heterozigotă) sau dislipidemie mixtă (tip IIb), ca adjuvant al dietei la pacienții care nu răspund adecvat numai la dietă și la alte metode de tratament non-farmacologic (cum sunt exercițiile fizice, scăderea în greutate). Hipercolesterolemie familială - forma homozigotă, ca tratament adjuvant al dietei și al altor metode de scădere a lipidemiei (de exemplu afereza LDL) sau în cazurile în care aceste tratamente nu sunt adecvate.

Dz: Tratamentul se face individualizat. Doza inițială recomandată este de 10 mg administrată oral, o dată pe zi. Doza poate fi crescută după 4 săptămâni la 20 mg. Doza de 40 mg se utilizează pentru pacienții cu hipercolesterolemie severă, care au un risc cardiovascular crescut.

Cind: Pacienți cu hipersensibilitate la rosuvastatină sau excipienții produsului, boală hepatică activă, incluzând creșterea inexplicabilă, persistentă, a transaminazelor plasmatice și orice creștere a transaminazelor plasmatice care depășește de 3 ori limita superioară a normalului; insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min); miopatie; tratament concomitent cu ciclosporina. În timpul sarcinii și alăptării și la femei aflate în perioada fertilă care nu utilizează măsuri contraceptive corespunzătoare.

AI: A fost evidențiată proteinurie; se evaluează funcția renală la pacienți tratați cu doze de 40 mg. S-au raportat: mialgie necomplicată și miopatie. La doze de 80 mg a fost raportată rabdomioliza. Nu se face tratament cu rosuvastatină în cazul în care valorile CK sunt > 5 ori decât limita superioară normală. Înainte de începerea tratamentului: prudența la pacienți cu insuficiență renală, hipotiroidie, antecedente personale sau heredocolaterale de afecțiuni musculare ereditare, -antecedente de toxicitate musculară la administrarea altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei sau a fibratilor, abuz de alcool etilic, vârstă > 70 ani. În timpul tratamentului pacienții trebuie să raporteze: durerile musculare inexplicabile, hipotonia musculară, crampele (tratamentul se întrerupe dacă conc. CK sunt > 5 ori limita superioară a normalului). Prudența la asocierea cu gemfibrozil, ciclosporină, acid nicotinic, antifungice azolice, inhibitori ai proteazelor și antibiotice macrolidice, warfarină, contraceptive orale și medicație de substituție hormonală, antiacide. Nu se utilizează la pacienți cu afecțiuni acute, sugestive, severe pentru miopatie sau cu predispoziție de a dezvolta insuficiența renală secundară rabdomiolizei (de exemplu sepsis, hipotensiune arterială, intervenție chirurgicală majoră, traumatisme, tulburări severe metabolice, endocrine și electrolitice; crize convulsive necontrolate). Atenție la conducători auto și care utilizează utilaje.

RA: Reacțiile adverse sunt clasificate în funcție de frecvență astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puțin frecvente (>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, < 1/1000). *Frecvente:* cefalee, amețeli, constipație, greață, dureri abdominale, mialgie, astenie. *Rare:* miopatie, reacții de hipersensibilitate, incluzând inclusiv angio-edem. *Mai puțin frecvente:* prurit, rash, urticarie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01FA06

PROPRANOLOLUM
 PROPYPHENAZONIUM
 PROTAMINI SULFAS
 PROTEIN SUCCINILAT DE FER
 PROTIONAMIDUM
 PROTOXID DE AZOT
 PSEUDOEFDRIUM
 PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM

ROKSOLIT ECZACIBASI ILAC; Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

ROXAMED 150 DAR AL DAWA; Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

ROXIHEFA 150 mg; ROXIHEFA 300 mg SANAVITA; Cpr. film. 150 mg, 300 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)

ROXITHROMYCIN AL 150; ROXITHROMYCIN AL 300 ALIUD PHARMA; Cpr. film. 150 mg, 300 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

RULID LAB. ROUSSEL DIAMANT; Cpr. disp. 50 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. disp. (P-RF)

RULID 150 LAB. ROUSSEL DIAMANT; Cpr. film. 150 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. film. (P-RF)

Ind: Infecțiile provocate de germeni sensibili: angină (când tratamentul de elecție cu penicilină nu se poate adm.); sinuzită acută, atunci când nu se pot adm. antibiotice a-lactamice; suprainfectări ale bronșitei acute; acutizări ale bronșitei cronice; pneumopatii, fără semne severe de infecție și în absența simptomelor care să sugereze o etiologie pneumococică; infecții cutanate benigne: dermatoze de tip impetigo, ectima, erizipel, eritasma; infecții genitale non-gonococice.

Dz: *Adulți:* 150 mg, la 12 ore (dimineața și seara), înainte de masă.

Cind: Alergie la roxitromicină sau la alte macrolide; hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului. Asocierea cu alcaloizi ergotaminici vasoconstrictori: ergotamina, dihidroergotamina; cisapridă.

Al: În IH adm. se va face numai dacă este absolut necesar; în acest caz se monitorizează funcția hepatică cu ajustarea dozei. Atenție la asocierea cu benzodiazepine, ciclosporină, teofilină. Perioada de sarcină sau alăptare. *oferi și activități de precizie.

RA: Vărsături, epigastralgie și diaree - foarte rar sanguinolentă; vertij, cefalee, parestezii; creșteri tranzitorii ale transaminazelor, foarte rar hepatită colestatică sau citoliză hepatică; reacții de hipersensibilitate: rash, urticarie, purpură, foarte rar edem Quincke, bronhospasm, reacții anafilactoide.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R03AC02

PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM

ASTHALIN INHALER CIPLA; Susp. inhal. pres. 100 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (**P-6L**)
SALAMOL® EASI-BREATHE IVAX PHARMACEUTICALS; Aerosol susp. inhal. 100 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (**P-6L**)
SALAMOL® INHALER IVAX PHARMACEUTICALS; Aerosol susp. inhal. 100 µg/doză; ct. × 1 fl. × 200 doze (**P-6L**)
SALBUTAMOL E.I.P.I.C.O.; Sirop 2 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 125 ml (**P-6L**)
SALBUTAMOL 4 mg MAGISTRA C&C; Cpr. 4 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)
SALBUTAMOL-T TIS FARMACEUTIC; Sol. orală 0,04%; ct. × 1 fl. × 100 ml (**P-6L**)
VENTOLIN® INHALER CFC-FREE GLAXO SMITHKLINE; Aerosol susp. inhal. 100 µg/doză; ct. × 1 fl. presurizat × 200 doze (**P-6L**)
VENTOLIN® GLAXO SMITHKLINE; Sirop 2 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 150 ml (**P-6L**)
VENTOLIN® GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 0,5 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (**P-6L**)
VENTOLIN DISKUS 200 µg GLAXO SMITHKLINE; Pulb. inhal. 200 µg/doză; ct. × 1 disp. inhal. sub formă de disc × 28 sau 60 doze individuale (**P-6L**)

Ind: *Inhalator:* trat. de urgență și de întreținere precum și profilaxia astmului bronșic, bronșitei și emfizemului. *Oral:* trat. și profilaxia crizelor de astm, bronșitei și emfizemului. *Inj.:* ameliorarea bronhospasmului sever.

Dz: *Inhalator adulți:* bronhospasm acut și episoade intermitente de astm 1-2 inhalări în doză unică. Profilaxie sau trat. de întreținere: 2 inhalări de 3-4 ori/zi. Prevenirea bronhospasmului indus de exercițiu: 2 inhalări înainte de efort. *Copii:* bronhospasm acut, accesele astmatice episodice sau înainte de efort 1 inhalatie. Trat. de întreținere sau profilaxie: 1-2 inhalatii de 3-4 ori/zi. *Oral adulți:* 4-8 mg salbutamol de 3-4 ori/zi. *Copii 2-6 ani:* 2,5-5 ml sirop (1-2 mg salbutamol) de 3-4 ori/zi. *Copii 6-12 ani:* 5 ml sirop (2 mg salbutamol) de 3-4 ori/zi. *Copii peste 12 ani:* 5-10 ml sirop (2-4 mg salbutamol) de 3-4 ori/zi. **Inj.:** S.c. și i.m. 500 mcg (8 mcg/kg), cu repetare la fiecare 4 ore, dacă este necesar. I.v. 250 mcg (4 mcg/kg) injectat încet. Dacă este necesar, doza poate fi repetată.

Cind: Antecedente de hipersensibilitate la oricare din componenți. Produsul inhalator nu se utilizează în trat. amenințării de naștere prematură. Trat. amenințării de avort în primul sau al doilea trimestru de sarcină.

Al: *Inhalator:* tireotoxicoză. Nu se va asocia cu beta-blocante neselective. Hipokaliemie, cu monitorizarea potasemiei. *Oral:* Trat. pe termen lung cu salbutamol sirop crește riscul cariei dentare.

RA: Tremor fin al mușchilor scheletici, mai ales mâinile. Ocazional dureri de cap, vasodilatație periferică cu creștere compensatorie a frecvenței cardiace. Reacții de hipersensibilitate (angioedem, urticarie, bronhospasm, hTA și colaps foarte rar). Crampe musculare. Agitație la copii. Tahicardie foarte rar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PROTAMINI SULFAS
PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM

Cod ATC: R03AC12**SEREVENT CFC-FREE INHALER** GLAXO SMITHKLINE; Aerosol 25 µg/ doză; ct. × 1 fl. × 120 doze (**P-6L**)**Ind:** Trat. de lungă durată al obstrucției reversibile a căilor respiratorii din astmul bronșic, bronșita cronică și emfizemul pulmonar; profilaxia de lungă durată a bronhospasmului indus de efortul fizic.**Dz:** *Adulți:* 2 inhal. de 2 ori/zi; maxim 4 inhal. de 2 ori/zi. *Copii peste 4 ani:* 2 inhal. de 2 ori/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la oricare dintre ingredientii. Copii sub 4 ani.**Al:** Salmeterol nu este un înlocuitor pentru corticosteroizii orali sau inhalanți; el trebuie folosit complementar cu ei. La pacienții cu risc trebuie monitorizat zilnic VEMS-ul. Salmeterolul nu este activ în trat. simptomelor acute ale astmului. Precauție la pacienții cu tireotoxicoză. Sarcină. Alăptare.**RA:** Tremor, palpitații subiective și cefalee, tranzitorii. Uneori tahicardie. Bronhospasm paradoxal cu o creștere imediată în intensitate a wheezing-ului după adm. (este necesar un bronhodilatator inhalator cu acțiune scurtă). Rare cazuri de artralgie și reacții de hipersensibilitate (urticarie, edem și angioedem), crampe musculare, aritmii cardiace (fibrilație atrială, tahicardie supraventriculară și extrasistole).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

PROTEIN SUCCINILAT DE FER
PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R03AK06

SERETIDE® 25/50 µg INHALER CFC FREE; SERETIDE® 25/125 µg INHALER CFC FREE; SERETIDE® 25/250 µg INHALER CFC FREE GLAXO SMITHKLINE; Aerosol susp. inhal. 25/50 µg, 25/125 µg și 25/250 µg/doză; ct. × 1 fl. × 120 doze (**P-RF**)
SERETIDE DISKUS 50/100; SERETIDE DISKUS 50/250; SERETIDE DISKUS 50/500 GLAXO SMITHKLINE; Pulb. inhal. 50/100, 50/250, 50/500; ct. × 1 aplicator bucal Diskus × 60 doze (**P-RF**)

Ind: Tratamentul cronic al bolii obstructive reversibile a căilor aeriene, incluzând astmul bronșic la copii și adulți, în cazurile în care este adecvată utilizarea unei asociații medicamentoase (bronhodilatator și glucocorticoid inhalator). Acestea pot include: pacienți tratați cu doze de întreținere de agonști β_2 -adrenergici cu acțiune de lungă durată și glucocorticoizi inhalatori; pacienți simptomatici în tratament curent cu glucocorticoizi inhalatori; pacienți tratați regulat cu bronhodilatatoare, care necesită glucocorticoizi inhalatori.

Dz: Inhalator. *Adulți și adolescenți peste 12 ani:* doza uzuală, 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 50 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi; 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 125 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi; 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 250 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi. *Copii cu vârsta între 4-12 ani:* doza uzuală, 2 pufuri a 25 µg salmeterol și 50 µg propionat de fluticazonă de 2 ori pe zi. Nu se ajustează dozele la vârstnici, pacienți cu insuficiență renală sau hepatică.

Cind: Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului.

Al: Nu este eficace pentru înlăturarea simptomelor acute. Tratamentul nu se întrerupe brusc. Se administrează cu prudență la pacienții cu tireotoxicoză, tuberculoză pulmonară activă sau latentă. La doze mari, utilizate timp îndelungat pot apărea efecte sistemice ale glucocorticoidului: supresia glandei corticosuprenale, întârzierea creșterii la copii și adolescenți, scăderea densității minerale osoase, cataractă și glaucom. La copii tratați timp îndelungat cu glucocorticoizi inhalatori, se recomandă măsurarea periodică a înălțimii. La trecerea de la tratament oral cu glucocorticosteroizi, la tratament inhalator, se monitorizează funcția corticosuprenaliană. Interacțiuni cu: blocante beta adrenergice selective și neselective; prudență la asocierea cu inhibitori enzimatici: ketoconazol, ritonavir. În sarcină și alăptare se administrează numai dacă beneficiul terapeutic pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau sugar.

RA: Produse de salmeterol: tremor, palpitații, cefalee (diminuă pe parcursul tratamentului), aritmii cardiace, reacții de hipersensibilitate: erupții, edeme și edem angioneurotic, artralgie, crampe musculare. Produse de propionat de fluticazonă: disfonie, candidoză orală și faringiană; rar: edem facial și orofaringian; bronhospasm paradoxal. Asocierea salmeterol propionat de fluticazonă: răgușeală/disfonie, iritație faringiană, cefalee, candidoză bucală și faringiană, palpitații.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AE01

PROTIONAMIDUM
PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM

FORTOVASE ROCHE ROMÂNIA; Cps. 200 mg; ct. × 1 sau 3 fl. × 180 cps. (S/P-RF)

INVIRASE® ROCHE ROMÂNIA; Cps. 200 mg; ct. × 1 fl. × 270 cps. (S/P-RF)

Ind: Trat. pacienților adulți infectați cu HIV-1 în combinație cu agenții retrovirali.

Dz: Adulți și copii peste 16 ani: 1200 mg de 3 ori/zi, în decurs de 2 ore după o masă.

Cind: Hipersensibilitate la substanță sau la oricare dintre celelalte componente conținute în capsulă. Nu se asociază cu terfenadină, astemizol și cisapridă (risc de aritmii cardiace serioase și/sau amenințătoare de viață). Alăptare.

Al: Saquinavirul nu determină vindecarea infecției cu HIV. Prudență în afectarea hepatică și renală. Pacienți sub 16 și peste 60 de ani. Pacienți cu hemofilie: sângerare crescută, incluzând hematoame cutanate spontane și hemartroze cu necesitatea admin. de factor VIII. Diabet zaharat și hiperglicemie: cazuri de diabet zaharat nou-debutat, hiperglicemie sau exacerbari ale unui diabet zaharat preexistent. Combinația ritonavir - saquinavir trebuie folosită cu prudență. Sarcină.

RA: Cel mai frecvent: diaree, greață, vărsături, disconfort abdominal și dispepsie, flatulență, cefalee, astenie, depresie. Mai rar: constipație, insomnie, anxietate, tulburări ale libidoului, alterarea gustului, dureri musculoscheletale și veruci; confuzie, ataxie, slăbiciune; tentativă de suicid; leucemie acută mieloblastică; anemie hemolitică; creșterea testelor funcționale hepatice, icter, ascită, trombocitopenie și hemoragie intracraniană; febră medicamentoasă; erupție cutanată buloasă, chiar sd. Stevens-Johnson, ulceratii ale mucoasei bucale și rash (erupții cutanate); poliartrită; nefrolitiază; pancreatită; obstrucție intestinală; hipertensiune portală; vasoconstricție periferică; neuropatie periferică, convulsii, reacții alergice, diabet zaharat. Anomalii semnificative ale testelor de laborator clinic: scăderea glicemiei, creșterea CPK, gama-glutamyltransferazei, ALT, AST, creșterea potasemiei și neutropenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: NO4BD01

PROTOXID DE AZOT
PSEUDOEFEDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM

ALS-SELEGILINA APOTEX INC.; Cpr. 5 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (P-6L)
COGNITIV® 5 mg; COGNITIV® 10 mg EBEWE PHARMA; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
JUMEX® 5 mg CHINOIN - Membru al SANOFI-SYNTHELABO GROUP; Cpr. 5 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
SELECIM® 5 mg SIEGFRIED PHARMA; Cpr. 5 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 25 cpr. (P-6L)
SELEGILINE TEVA TEVA PHARM.; Cpr. 5 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (P-6L)
SELEGOS MEDOCHEMIE Ltd.; Cpr. 5 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Monoterapie în stadiile precoce ale parkinsonismului. Potențează și prelungește efectul levodopa. Boala Alzheimer și demența de tip Alzheimer ușoară și moderată.

Dz: Boala Parkinson, doză inițială zilnică: 5-10 mg dimineța. În boala Alzheimer și SDAT, doza zilnică inițială 5 mg dimineța, maxim 10 mg/zi.

Cind: Sindroame extrapiramidale ce nu sunt însoțite de deficiență de dopamină (tremor esențial, coree Huntington); hipersensibilitate la selegilină.

Al: În prezența bolilor asociate: ulcer gastric și duodenal, hipertensiune oscilantă, aritmii, angină pectorală severă sau psihoză. În asociație cu levodopa se recomandă control medical strict. La doze peste 20 mg, crește riscul reacțiilor hipertensive, în special în cazul consumării alimentelor bogate în tiramină (brânzeturi, vin roșu, ficat de pasăre etc.). Tulburări gastrointestinale la pacienții cu intoleranță la lactoză.

RA: Rareori, în monoterapie: uscăciunea gurii, tulburări moderate ale somnului, vedere încețoșată.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PSEUDOEDEFDRINUM
PYGEUM AFRICANUM
PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM

Cod ATC: D11AC03**SELSUN® ABBOTT**; Susp. cutanată 2,5%; ct. × 1 fl. × 120 sau 240 ml (*OTC*)**Ind:** Pitiriazis versicolor. Dermatită seboreică a scalpului.**Dz:** *Pitiriazis versicolor*. După spălarea și uscarea întregului corp se aplică pe suprafețele cutanate și se îndepărtează prin clătire cu multă apă după 15 minute. Se repetă de 2 ori pe săpt. timp de 2 săpt. *Dermatită seboreică a scalpului*. Inițial se udă scalpul cu apă caldă, apoi se aplică pe toată suprafața scalpului un volum de suspensie corespunzător la 2-3 lingurițe cu un masaj energic. După 3 minute se îndepărtează prin clătire cu multă apă, apoi se repetă operațiunile de mai sus.**Cind:** Hipersensibilitate la sulfura de seleniu sau la oricare dintre componenții produsului. Aplicații pe tegumentele inflamate, cu excoriații sau fisuri. Copii sub 5 ani. Primele trei luni de sarcină și în timpul alăptării.**Al:** Se evită contactul cu ochii și cu mucoasele.**RA:** Irritație cutanată. Rareori, prurit și înroșirea scalpului, care necesită întreruperea trat. Alopecie, sebooree reactivă (după utilizare îndelungată), decolorarea părului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06AB06

PYGEUM AFRICANUM
 PYRANTELUM
 PYRAZINAMIDUM
 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
SERTRALINUM

ASENTRA® KRKA; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (*P-RF*)
SERLIFT RANBAXY LAB.; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)
SERTRALIN OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. film. 50 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)
SERTRALINA ARENA GROUP SA; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 3 sau 50 blist. × 10 cpr. (*S/P-RF*)
STIMULOTON® 50 mg; STIMULOTON® 100 mg EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr., respectiv ct. × 2 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)
ZOLOFT® 50 mg; ZOLOFT® 100 mg PFIZER; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)
ZOLOFT® PFIZER; Sol. orală 20 mg/ml; ct. × 1 fl. × 60 ml (*P-RF*)

Ind: Simptomele tulburărilor depresive, inclusiv depresia acompaniată de anxietate, la pacienți cu sau fără manifestări maniacale în antecedente. Sindromul obsesiv-compulsiv (OCD). Atacul de panică, cu sau fără agorafobie.

Dz: O dată/zi, dimineața sau seara indiferent de orarul meselor. Depresie - 50 mg/ zi. Sindrom obsesiv-compulsiv și atac de panică - doza minimă 50 mg/ zi. Se începe cu 25 mg/zi și se crește la 50 mg/zi după o săpt. Doza zilnică pentru toate indicațiile poate fi crescută cu 50 mg în decurs de câteva săpt. Doza maximă 200 mg/zi.

Cind: Pacienți în trat. cu IMAO sau la mai puțin de 14 zile de la întreruperea trat. cu un IMAO. Hipersensibilitate cunoscută la sertralină.

Al: IMAO asociate - RA majore, uneori fatale, cum ar fi: hipertermie, rigiditate, mioclonii, instabilitate autonomică cu posibile fluctuații rapide ale semnelor vitale, modificări ale statusului mental incluzând confuzie, iritabilitate și agitație extremă, cu evoluție progresivă spre delir și comă. Precauție în asocierea cu alte medicamente serotoninergice: triptofanul sau fenfluramina. Precauție când se decide schimbarea trat. cu agenți cu acțiune prelungită (ex. fluoxetina). Activarea maniei/hipomaniei. Convulsii (se evită la pacienții cu epilepsie instabilă iar cei cu epilepsie aflată sub control vor fi monitorizați atent). Medicația se va întrerupe în caz de convulsii. Suicidul. Supraveghere atentă la începutul trat. În IH risc de creștere a nivelurilor plasmatice. Sarcină. Alăptare. *oferi și activități de precizie.

RA: Greață, diaree/scaune moi, anorexie, dispepsie, tremor, amețeală, insomnie, somnolență, transpirații, uscăciunea mucoasei bucale și disfuncții sexuale (mai ales întârzierea ejaculării). S-au mai descris: vărsături, dureri abdominale, tulburări de motilitate (ca de exemplu simptome extrapiramidale și tulburări de mers), convulsii, tulburări menstruale, hiperprolactinemie, galactoree, rash (inclusiv cazuri rare de eritem polimorf) și, rar, pancreatită și tulburări hepatice (inclusiv hepatită, icter și insuficiență hepatică). Rareori: parestezii, hipoestezii, simptome depresive, halucinații, reacții agresive, agitație, anxietate, psihoze, creșteri asimptomatice ale transaminazelor serice (TGO și TGP), hiponatriemie, sd. de secreție inadecvată de hormon antidiuretic, alterarea funcției plachetare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PYRANTELUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER

Cod ATC: V03AE02

RENAGEL® GENZYME Ltd.; Cpr. film. 400 mg, 800 mg; ct. × 1, 2 sau 3 fl. × 180 cpr., resp. ct. × 1, 2 sau 3 fl. × 360 cpr. (S/P-RF)

Ind: Controlul hiperfosfatemiei la pacienți hemodializați. Se adm. în trat. multiplu, cu supliment de calciu, vitamina D₃ sau un analog, pentru controlul evoluției formei osoase a bolii renale.

Dz: *Adulți:* Doza medie 800-1600 mg. Doza se stabilește în funcție de nivelul fosfatului seric (valoarea sa trebuie menținută la cel mult 1,94 mmol/l. Determinarea fosfatului seric se face la 2-3 săptămâni.

Cind: Copii sub 18 ani. Hipofosfatemie. Obstrucție intestinală.

RA: Diaree, grețuri, vome, constipație, infecții, cefalee, tuse, hTA, amețeli, dispnee, tromboze, edeme periferice, febră, prurit.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N01AB08

PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM

SEVORANE® ABBOTT; Sol. pt. inhalatie 99,975%; ct. × 1 fl. × 250 ml (**S**)

Ind: Inducerea și menținerea anesteziei generale, la adulți și copii.

Dz: Valorile concentrației alveolare minime (M.A.C.) ale sevofluranului scad cu vârsta și prin adăugare de protoxid de azot. *Inducția:* se realizează în asociere cu oxigen sau cu mixturi oxigen/protoxid de azot (concentrații inspirate de până la 8% sevofluran provoacă anestezie chirurgicală în mai puțin de 2 minute la adulți și copii). *Menținerea:* anestezia necesară se menține cu 0,5-3% sevofluran, cu sau fără folosirea concomitentă de oxid azotos. *Revenirea din anestezie:* timpul de trezire este în general scurt. *Vârșnici:* MAC scade cu înaintarea în vârstă. Concentrația medie de sevofluran pentru a realiza MAC la vârsta de 80 ani este 50% din cea necesară pentru vârsta de 20 ani. *IH:* eficace și bine suportat de pacienții cu IH clasele Child-Plugh A și B. *IR:* nu provoacă o deteriorare suplimentară a funcției renale.

Cind: Hipersensibilitate la sevofluran sau la alte hidrocarburi halogenate. Hipertermie malignă genetică diagnosticată sau suspectată.

Al: Se adm. numai prin vaporizatoare specific calibrate pentru anestezic. Hipo- tensiunea arterială și deprimarea respirației cresc pe măsură ce anestezia devine mai profundă. Hipertermia malignă este mai frecventă la persoanele susceptibile, cu apariția de hipercapnie, rigiditate musculară, tahicardie, tahipnee, cianoză, aritmii și/sau TA instabilă. Se întrerupe adm. anestezicului și se adm. i.v. dantrolen și trat. de susținere a funcțiilor vitale. Se monitorizează diureza. Prudență în IR și în caz de HT intracraniană. Performanțele activităților care necesită vigilență și atenție pot fi reduse o anumită perioadă după anestezia generală. Sarcină. Alăptare.

RA: Deprimare cardiorespiratorie în funcție de doză. Greață și vărsături, tuse, hTA, tahicardie sau bradicardie, agitație, somnolență, frisoane, amețeli, sialoree, tulburări respiratorii, spasme laringiene, febră. Creșteri tranzitorii ale glicemiei și a numărului de leucocite. Creșterea tranzitorie a nivelului plasmatic de fluorură anorganică în timpul și după anestezia cu sevofluran. Modificări trecătoare ale testelor funcționale hepatice, rare cazuri de hepatită postoperatorie. Tulburări motorii de tip distonic cu revenire spontană la copii. Hipertermie malignă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
 PYRIDOXINUM
 PYRITINOLUM
 QUETIAPINUM
 QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM

Cod ATC: A08AA10

REDUCTIL® 10 mg; REDUCTIL® 15 mg ABBOTT; Cps. 10 mg, 15 mg; ct. × 2 blist. × 14 cps. (*P-RF*)

Ind: Trat. adjuvant în combaterea obezității, pentru: pacienți cu obezitate datorată unui dezechilibru energetic, al căror indice de masă corporală (IMC) este de 30 kg/m² sau mai mare sau cu IMC egal cu 27 kg/m² sau mai mare și la care sunt prezenți factori de risc pentru obezitate, cum sunt diabetul zaharat de tip 2 sau dislipidemia.

Dz: *Adulți:* inițial 10 mg o dată/zi, dimineața, indiferent de programul meselor, maxim 15 mg/zi. Se întrerupe la pacienții care nu au răspuns adecvat la sibutramină (au scăzut în greutate mai puțin de 2 kg în 4 săpt.). Durata trat.: maxim 1 an.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la sibutramină sau la oricare dintre componentii produsului; obezitate de cauză organică; dezechilibre alimentare majore (anorexia nervoasă și bulimia nervoasă în antecedente); boli psihice; sindrom Gilles de la Tourette; adm. concomitentă sau în ultimele 2 săpt. de IMAO sau alte medicamente cu acțiune centrală folosite în trat. afecțiunilor psihice (antidepresive, antipsihotice), al tulburărilor de somn (triptofan) sau pentru scăderea greutatei corporale; antecedente de afecțiuni coronariene, IC congestivă, tahicardie, afecțiuni ocluzive ale arterelor membrelor inferioare, aritmii sau afecțiuni cerebrovasculare (AVC sau atac ischemic tranzitor); HTA inadecvat controlată (> 145/90 mmHg); hipertiroidie; IR sau IH severă; adenom de prostată cu retenție urinară; feocromocitom; glaucom cu unghi îngust; abuz de droguri, medicamente sau de alcool etilic în antecedente; sarcină și alăptare; copii și tineri până la 18 ani; pacienți peste 65 ani.

Al: Supraveghere TA și frecvență cardiacă. Precauție în asociere cu medicamente care prelungesc intervalul QTc (astemizol, terfenadină, unele antiaritmice-amiodaronă, chinidină, flecainidă, mexiletină, propafenonă, sotalol, cisapridă, pimozidă, sertindol și antidepresive triciclice) sau la cei cu risc de prelungire a intervalului QTc (depleție de potasiu, de magneziu). Atenție în caz de simptome ca dispnee progresivă, junghi toracic și edeme ale gleznei. Prudență în epilepsie, antecedente familiale de ticuri motorii sau verbale, în IH sau IR ușoară-moderată. Se prescrie doar pacienților care nu au răspuns corespunzător la un regim adecvat de scădere în greutate (care au pierdut în greutate mai puțin de 5 kg în decurs de 3 luni). *oferi și activități de precizie.

RA: Majoritatea în primele 4 săpt. de trat. și scad cu timpul. Aparat cardiovascular: tahicardie, extrasistole, HTA, vasodilație; Tract gastrointestinal: anorexie, constipație, greață, agravarea hemoroizilor; SNC: uscăciunea gurii, insomnie, amețeli, parestezii, cefalee, anxietate; Piele: transpirații; Funcții senzoriale: alterarea gustului. Izolat: nefrită interstițială acută; glomerulonefrită mezangiocapilară; purpură Henoch-Schoenlein; convulsii; trombocitopenie; creșterea reversibilă a enzimelor hepatice; rareori manifestări de sevraj, sub formă de cefalee și creșterea apetitului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G04BE03

PYRIDOXINUM
PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM

REVATIO 20 mg PFIZER; Cpr. film. 20 mg; ct. × 6 blist. × 15 cpr. (P-RF)

VIAGRA® 25 mg; VIAGRA® 50 mg; VIAGRA® 100 mg PFIZER; Cpr. film. 25 mg, 50 mg, 100 mg; ct. × 1 blist. × 1 cpr.; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 4 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. disfuncției erectile, care reprezintă incapacitatea de a obține și/sau menține o erecție suficientă pentru un act sexual satisfăcător. Pentru ca sildenafilul să fie eficient este necesară stimularea sexuală.

Dz: Oral la adulți: 50 mg cu o oră înainte de activitatea sexuală, maxim 100 mg și minim 25 mg, maxim 1 dată/zi. Vârstnici: doza inițială 25 mg, maxim 50-100 mg. IR: ușoară sau moderată (Cl creatinină 30-80 ml/min) aceleași doze ca la adulți; severă (Cl creatinină < 30 ml/min) doza inițială 25 mg, maxim 50-100 mg. IH: Doza inițială 25 mg, maxim 50-100 mg.

Cind: Trat. concomitent cu donori de oxid de azot (nitritul de amil) sau orice formă de nitrați. Bărbați la care activitatea sexuală este contraindicată (tulburări severe cardiovasculare - angina instabilă sau IC severă). Hipersensibilitate cunoscută la oricare component din cpr. Femei. Persoane sub 18 ani.

Al: IH gravă, hTA (TA < 90/50 mmHg), antecedente recente de AVC sau infarct miocardic recent, boli ereditare degenerative, cunoscute, ale retinei (retinita pigmentară). Antecedentele medicale și examenul fizic sunt necesare în vederea stabilirii diagnosticului și a cauzelor posibile de disfuncție erectilă, precum și evaluarea stării aparatului cardiovascular al pacienților înainte de instituirea unui trat. adecvat. Precauție la pacienții cu deformații anatomice ale penisului (angulația, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie) și la cei cu predispoziție la priapism (ca de exemplu anemia falciformă, mielom multiplu sau leucemie). Nu se asociază cu alte trat. pentru disfuncția erectilă, cu ritonavir. Prudență la tulburări de sângerare sau ulcerul peptic activ. *oferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, flush, amețeli, dispepsie, congestie nazală, modificări ușoare și tranzitorii ale vederii, vedere predominant nuanțată a culorilor, creșterea percepției luminii sau vedere încețoșată. Rare cazuri de priapism.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A05BA03

PYRITINOLUM
QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM

LAGOSA® WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Dj. 150 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 25 cpr. (P-6L)

LEGALON 70 mg MADAUS AG; Dj. 70 mg; ct. × 4 blist. × 10 dj. (P-6L)

SILIBINUM ARENA GROUP SA; Cpr. 35 mg; ct. × 1 fl. × 80 cpr. (P-6L)

SILIMARINĂ BIOFARM SA; Cpr. 35 mg; ct. × 4 blist. × 20 cpr. (P-6L)

SILIMARINĂ FABIOL SA; Cpr. 35 mg; ct. × 1 fl. × 80 cpr. (P-6L)

SILYMARIN INSTANT SEDICO; Pulb. eferv. 140 mg/plic; ct. × 10 plicuri × 4,5 g (P-6L)

Ind: Hepatite cronice (inclusiv cele agresive) de etiologie virală, hepatite toxice (mai ales etilice), ciroze compensate, IH; profilactic - în timpul adm. unor substanțe potențial hepatotoxice.

Dz: Câte 140 mg de 3 ori/zi, timp de 3-6 săptăm. Curele vor fi repetate după o pauză de 1-2 săptăm.

Cind: Alergie la silimarină.

RA: Rareori epigastralgiei, diaree, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03AX13

QUETIAPINUM
QUINAPRILUM
RABEPRAZOLUM
RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM

ESPUMISAN® BERLIN-CHEMIE AG; Cps. 40 mg; ct. × 1, 2 sau 4 blist. × 25 cps. (OTC)

ESPUMISAN® L BERLIN-CHEMIE AG; Emulsie orală 40 mg/ml; ct. × 1 fl. × 30 sau 250 ml (OTC)

SAB SIMPLEX PFIZER; Cpr. mast. 80 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (OTC)

SAB SIMPLEX PFIZER; Susp. orală 69,19 mg/ml; ct. × 1 fl. cu picurător × 30 ml; ct. × 50 plicuri × 15 ml (OTC)

Ind: Tratament simptomatic al tulburărilor gastrointestinale determinate de acumulări de gaze (de exemplu meteorism, flatulență, aerofagie, dispepsie, sindrom gastrocadiac, distensie gazoasă postoperatorie). Tratament adjuvant pentru pregătirea cavității abdominale pentru radiografie, ecografie și gastroscopie.

Dz: Tulb. gastrointestinale determinate de acumulări de gaze, inclusiv postoperator: *Adulți și copii peste 6 ani:* doza uzuală este de 80 mg simeticonă oral, de 3-5 ori pe zi. Trat. adjuvant pentru pregătirea cavității abdominale pentru radiografie, ecografie și gastroscopie: doza uzuală este de 80 mg simeticonă administrată oral de 3 ori pe zi în ziua anterioară examinării și 80 mg simeticonă în dimineața zilei în care se face examinarea. Simeticona se va administra în timpul mesei, după masă sau dacă este necesar seara înainte de culcare. Simeticona se poate administra în timpul sarcinii și alăptării.

Cind: Hipersensibilitate la simeticonă sau la excipienți.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

QUINAPRILUM
 RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM

Cod ATC: C10AA0

SIMCOR ANTIBIOTICE SA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 3 sau 150 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)

SIMGAL[®] 10 mg; SIMGAL[®] 20 mg; SIMGAL[®] 40 mg IVAX PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

SIMVACARD[®] 10 mg; SIMVACARD[®] 20 mg; SIMVACARD[®] 40 mg ZENTIVA AS; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

SIMVAGAMMA 5 mg; SIMVAGAMMA 10 mg; SIMVAGAMMA 20 mg; SIMVAGAMMA 40 mg WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 3, 5, 10 sau 50 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)

SIMVAHEXAL[®] 10 mg; SIMVAHEXAL[®] 20 mg; SIMVAHEXAL[®] 30 mg; SIMVAHEXAL[®] 40 mg HEXAL AG; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

SIMVASTATIN 10 mg LAROPHARM SRL; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (P-6L)

SIMVASTATIN 10 mg; SIMVASTATIN 20 mg; SIMVASTATIN 40 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

SIMVASTATIN 10 mg; SIMVASTATIN 20 mg; SIMVASTATIN 40 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr., ct. × 2 sau 4 blist. × 14 cpr. (P-6L)

SIMVASTATIN AL 10 mg; SIMVASTATIN AL 20 mg; SIMVASTATIN AL 40 mg ALIUD PHARMA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

SIMVASTATIN LPH[®] 10 mg; SIMVASTATIN LPH[®] 20 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 15 cpr. (10 mg); ct. × 3 sau 100 blist. × 10 cpr. (20 mg) (S/P-6L)

SIMVOR 5 mg; SIMVOR 10 mg; SIMVOR 20 mg; SIMVOR 40 mg RANBAXY LAB.; Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cpr. (P-6L)

SINTENAL 10 mg; SINTENAL 20 mg; SINTENAL 40 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

VASILIP[®] 10 mg; VASILIP[®] 20 mg; VASILIP[®] 40 mg KRKA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (P-6L)

ZEPLAN[®] 10 mg; ZEPLAN[®] 20 mg; ZEPLAN[®] 40 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. film. 10 mg, 20 mg, 40 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

ZOCOR[®] MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 10 mg, 20 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

ZOCOR[®] FORTE 40 mg MERCK SHARP & DOHME; Cpr. film. 40 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

Ind: Hipercolesterolemie: când răspunsul la dietă sau alte măsuri nefarmacologice a fost insuficient; combinată cu hipertrigliceridemie. Cardiopatie ischemică: reducerea riscului mortalității; încetinirea dezvoltării aterosclerozei coronariene, inclusiv reducerea dezvoltării de noi leziuni și noi ocluzii totale.

Dz: Dieta hipocolesterolemiantă standard se continuă în timpul trat. cu simvastatin. Hipercolesterolemie: 5-10 mg/zi seara, doză unică; maxim 40 mg/zi. Se reduce doza dacă nivelul colesterolului - LDL scade sub 75 mg/dl (1,94 mmol/l) sau dacă nivelul colesterolului total scade sub 140 mg/dl (3,6 mmol/l). Cardiopatia ischemică: doză de atac de 20 mg/zi, în priză unică, seara. IR severă (Cl creatinină sub 30 ml/min) doze sub 10 mg/zi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AA10

RABEPRAZOLUM
 RACECADOTRILUM
 RALOXIFENUM
 RAMIPRILUM
 RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
SIROLIMUS

RAPAMUNE WYETH LAB.; Cpr. film. 1 mg; ct. × 3 sau 10 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Profilaxia rejecției de organ la pacienții adulți cu transplant renal și risc imunologic mic sau moderat.

Dz: *Adulți:* trat. inițial (2-3 luni după transplant): doză inițială 6 mg apoi 2 g/ zi. Trat. de întreținere: Ciclosporina trebuie întreruptă progresiv, în decurs de 4-8 săpt. și doza de sirolimus trebuie ajustată pentru a obține o concentrație înaintea dozei următoare de 12-20 ng/ml.

Cind: Hipersensibilitate la sirolimus sau la oricare dintre excipienți. Sarcină. Alăptare.

Al: Se adm. doar oral. Pacienți cu un risc imunologic ridicat. IH severă. Imunosupresia poate determina o susceptibilitate crescută la infecție și dezvoltarea de limfoame sau alte malignități, în special la nivelul pielii. Se limitează expunerea la lumina solară și radiații UV. În primele 12 luni de la transplant, se face profilaxia pentru pneumonia cu *Pneumocistis carinii* și pentru virusul citomegalic (CMV). Monitorizarea lipidelor plasmatic. Supraveghere funcție renală în asociere cu ciclosporină sau cu alte medicamente nefrotoxice. Copii și adolescenți.

RA: Limfocel, infecții fungice, virale sau bacteriene (infecții micobacteriene, cu virus Epstein-Barr, cu CMV, Herpes zoster, Herpes simplex; sepsis), tahicardie, dureri abdominale, diaree, stomatită, pancreatită, anemie, leucopenie, trombocitopenie, purpură trombotică trombocitopenică/sindrom uremic hemolitic, limfom, tulburări limfoproliferative post-transplant, artralгии, necroză osoasă, epistaxis, pneumonie, acnee, erupții cutanate, infecții tract urinar, pielonefrită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RACECADOTRILUM
RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS

Cod ATC: A06AB08

DULCOPIC® BOEHRINGER INGELHEIM, Sol. orală 7,5 mg/ml; ct. × 1 fl. × 15 ml (OTC)

Ind: Constipație și situații care necesită evacuarea conținutului colonului.

Dz: *Adulți și copii peste 10 ani:* 10-20 picături (5-10 mg picosulfat de sodiu) la nevoie. *Copii între 4 și 10 ani:* 5-10 picături (2,5 -5 mg picosulfat de sodiu) la nevoie. *Copii sub 4 ani:* 250 µg picosulfat de sodiu/kg (1/2 picătură soluție/kg). Trebuie administrat seara, efectul apărând în dimineața următoare. *Notă:* 1 ml soluție (15 picături) conține 7,5 mg picosulfat de sodiu.

Cind: Pacienții care suferă de ileus, ocluzie intestinală, cu abdomen acut chirurgical (inclusiv apendicite), afecțiuni inflamatorii intestinale acute, în stări de deshidratare severă, colită toxică, megacolon toxic, greață și vărsături, insuficiență cardiacă congestivă, stază gastrică. Pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la picosulfat de sodiu sau la oricare dintre excipienții produsului.

Al: Nu se adm. continuu perioadă îndelungată. Precauție la pacienții cu afecțiuni renale sau cardiace, boală inflamatorie cronică a colonului, intervenții chirurgicale pe tractul gastro-intestinal. Pe parcursul tratamentului trebuie asigurat un aport optim de apă și electroliți. La copii se administrează doar la recomandarea medicului. Interacțiuni cu: diuretice și glucocorticoizi. Nu se recomandă adm. în timpul alăptării.

RA: Foarte rar, s-a raportat disconfort abdominal sau diaree. Poate determina cefalee, oboseală, greață, dureri și usturimi anale. Cazuri izolate de reacții anafilactice, vărsături și diaree severă care pot determina hiponatiemie și convulsii în absență aportului adecvat de sare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RALOXIFENUM
RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCIUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE

Cod ATC: G04BD08

VE SICARE 5 mg; VE SICARE 5 mg ASTELLAS PHARMA; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Tratament simptomatic al incontinenței urinare, micțiuni frecvente la pacienți cu vezică hiperactivă.

Dz: 5-10 mg/zi.

Cind: Retenție urinară, megacolon, miastenie, glaucom, IH severă, IR severă, bolnavi sub hemodializă.

RA: Anticolinergice: uscăciunea gurii, dispepsie, constipație, tulburări oculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

RAMIPRILUM
RANITIDINUM
REMIFENTANILUM
REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H01AC01

GENOTROPIN® 16 UI (5,3 mg) PFIZER; Pulb. liof. + solv. pt. sol. inj. 16 UI (5,3 mg/ml); ct. × 1 sau 5 cartușe bicamerale multidoză (**P-RF**)

NORDITROPIN® SIMPLEX® × 5 mg/1,5 ml NOVO NORDISK A/S; Sol. inj. 3,3 mg/ml; ct. × 1 cartuș × 1,5 ml (**P-RF**)

NUTROPINAQ® IPSEN BIOTECH; Sol. inj. 10 mg/2 ml; ct. × 1, 3 sau 6 cartușe × 2 ml (**P-RF**)

ZOMACTON FERING; Liof. pt. sol. inj. 4 ui, 12 ui; ct. × 1 fl. liof. + 1 f. solv. × 1,5 ml, respectiv 3,5 ml (**P-RF**)

Ind: Deficit statural datorat secreției inadecvate de hormon de creștere endogen. Deficit statural la pacienți cu disgenezie gonadală.

Dz: Deficit statural datorat secreției inadecvate de hormon de creștere: 12 UI/ mp suprafață corporală/săpt. sau 0,6 UI/kg/săpt., maxim 20 UI/mp suprafață corporală/săpt. sau 0,8 UI/kg/săpt. Adm. i.m. - doza/săpt. va fi divizată în 3 adm. succesive a câte 4 UI/mp suprafață corporală sau 0,2 UI/kg; adm. s.c.: doza/ săpt. poate fi divizată în 6 sau 7 adm. succesive (2 sau 1,7 UI/mp suprafață corporală) sau în 3 adm. succesive (0,2 UI/kg). Deficit statural datorat disgeneziei gonadale (sindrom Turner) 18 UI/mp suprafață corporală sau 0,6- 0,7 UI/kg/săpt., cu creștere în al doilea an de trat. până la 24 UI/mp suprafață corporală sau 0,8-1,0 UI/kg/săpt. Doza/săpt. va fi divizată în 7 adm., sc. (2,6 UI/mp suprafață corporală sau 0,09-0,1 UI/kg), preferabil seara. Trat. va fi întrerupt când pacientul a atins statura unui adult sau când cartilajele de creștere s-au osificat.

Cind: Tumori cerebrale evolutive. Pacienții cu cartilaje de creștere osificate. Sarcină. Alăptare.

Al: Diabet zaharat (monitorizarea intoleranței la glucoză). Risc de apariție a hipotiroidiei (periodic teste hormonale tiroidiene). În caz de cefalee severă sau recurentă, tulburări de vedere, greață și/sau vărsături, se recomandă efectuarea examenului de fund de ochi, pentru depistarea unui eventual edem papilar (HT intracraniană) - se întrerupe trat. Locul de injectare trebuie schimbat zilnic pentru prevenirea lipodistrofiei. Alcoolul benzilic, sub formă de agent prezervant în soluție injectabilă de clorură de sodiu bacteriostatică, a fost asociat cu fenomenele de toxicitate la nou-născuți.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RANITIDINUM
 REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
SORBITOLUM

Cod ATC: B05BA03

SORBITOL 50 g/l INFOMED FLUIDS SRL; Sol. perf. 5%; ct. × 10 pungi × 500 ml sau 2000 ml (S)

Ind: Substrat energetico-calorigen, singur sau asociat cu soluții perfuzabile de aminoacizi, în cadrul alimentației parenterale, la bolnavi la care ingestia alimentelor nu este posibilă.

Dz: Perf. i.v., 1 g/kg și oră.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

REMIFENTANILUM
 REPAGLINIDUM
 RETEPLASUM
 RETINOLUM
 REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
SOTALOLUM

Cod ATC: C07AA07**ALS-SOTALOL** APOTEX INC.; Cpr. 80 mg, 160 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**DAROB® 80; DAROB® 160** ABBOTT; Cpr. 80 mg, 160 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**SOTAGAMMA 80; SOTAGAMMA 160** WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.; Cpr. 80 mg și 160 mg; ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**SOTALOL AL 80; SOTALOL AL 160** ALIUD PHARMA; Cpr. 80 mg, 160 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 25 cpr. (80 mg); ct. × 2, 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**Ind:** Tahiaritmii simptomatice și care necesită trat.: tahicardia jonțională, tahicardia supraventriculară în cadrul sd. WPW, fibrilația atrială paroxistică. Trat. și profilaxia tahiaritmiilor ventriculare severe.**Dz:** Tahiaritmii: 40 mg de 2-3 ori/zi, ajungând până la 3 × 160 mg, la intervale regulate, înainte de masă. În IR: Cl creatinină de 10-30 ml/min (creatinina serică 2-5 mg/dl) reducerea dozei la 1/2; Cl creatinină sub 10 ml/min (creatinina serică peste 5 mg/dl) reducerea dozei la 1/4. Adm. i.v. - inițial 20 mg în decurs de 5 minute. După 20 minute se pot adm. i.v. lent alte 20 mg (1 mg/min) după diluare dar nu mai mult de 1,5 mg/kg. În cadrul stimulării electrice programate se perf. uniform 1-1,5 mg/kg în 5 până la 15 minute, cu minim 6 ore între 2 doze.**Cind:** IC (clasele NYHA a III-a și a IV-a), IC decompensată, șoc, blocuri AV de gradele II și III, bloc sinoatrial, boala nodului sinusal, bradicardie (sub 50/min), prelungire preexistentă a intervalului QT, hipopotasemie, hTA, afecțiuni circulatorii periferice avansate, boli respiratorii obstructive, acidoză metabolică, edem glotic, rinită alergică severă, sensibilitate cunoscută la sotalol sau sulfonamide.**Al:** În feocromocitom se asociază cu blocanți alfa. Contraindicată adm i.v. concomitentă de blocante de calciu (verapamil sau diltiazem). La pacienții cu infarct miocardic în antecedente sau cu insuficiență ventriculară există riscul agravării aritmiei (efect proaritmogen); monitorizarea cardiacă atentă, cu echipament necesar urgențelor cardiace. Atenție la pacienții cu antecedente patologice sau heredo-colaterale de psoriazis. Poate agrava sensibilitatea la alergeni și reacțiile anafilactice. Atenție la pacienții cu antecedente de hipersensibilitate severă și la cei care urmează trat. de desensibilizare (pentru reacții anafilactice severe). Sarcină. Alăptare. *oferi și activități de precizie.**RA:** Oboseală, vertij, amețeli, cefalee, paretezii și senzații de răceală la nivelul membrelor. Rareori: tulburări gastrointestinale, tulburări ventilatorii obstructive, reacții tegumentare, conjunctivită, tulburări de somn, agravarea IC, bradicardie, tulburări de conducere AV sau hTA. Mai pot apărea: agravarea tulburărilor circulatorii periferice, reducerea secreției lacrimale, hipoglicemie, depresie, confuzie, halucinații, uscăciunea gurii, spasme musculare sau astenie musculară și tulburări de erecție. Uneori agravarea crizelor de angină pectorală sau a aritmiilor cardiace (efect proaritmogen), până la stop cardiac. În cazuri rare, după trat. cu sotalol, au fost semnalate sincope, tulburări

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01XX04

REPAGLINIDUM
RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM

KIRIN MEDOCHEMIE Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 2 g; ct. × 1 fl. + 1 f. × 3,2 ml solv. (S/P-RF)

Ind: Infecțiile gonococice necomplicate (gonoreea uretrală, endocervicală, rectală) sau diseminate.

Dz: Doză unică, de 2-4 g, i.m. profund, în cadranul superoextern al mușchiului gluteal.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la spectinomycină.

Al: Adm. sa poate masca un lues în faza de incubatie. Se efectuează și testele serologice pentru lues.

RA: Rar, jenă la locul injectării, urticarie, greață, frisoane, amețeală, febră, insomnie, scăderea Hb, a Ht și a Cl creatinină, creșterea fosfatazei alcaline, a azotului liber urinar și a TGP.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RETEPLASUM
RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCIINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCIINUM
SPIRAMICINUM

Cod ATC: J01FA02

ROVAMYCINE® 1,5 Mil. UI; ROVAMYCINE® 3 Mil. UI LAB. AVENTIS; Cpr. film. 1,5 Mil. UI, 3 Mil. UI; ct. × 2 blist. × 8 cpr. (1,5 mil. UI); ct. × 2 blist. × 5 cpr. (3 mil. UI) **(P-RF)**

Ind: Angine, sinuzite, rinofaringite, otite. Bronșite acute și cronice, infecții pulmonare acute. Terapia profilactică și curativă a complicațiilor respiratorii ale gripei și bolilor eruptive. Toxoplasmoza femeii gravide și fătului. Profilaxia meningitei meningococice (la contact). Profilaxia recidivelor de RAA.

Dz: *Adulți:* 6-9 Mui de 2-3 ori/zi. *Copii și sugari:* 0,75 Mui pentru fiecare 5 kg din greutatea corporală, de 2-3 ori/zi.

Cind: Alergie la spiramicină. Alăptare.

RA: Rareori, fenomene digestive și manifestări de tip alergic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C03DA01

RETINOLUM
REVIPARINUM
RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM

AL SPIRON 50 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. 50 mg; ct. × 20 cpr. (P-6L)
SPIRONOLACTONĂ 25 mg BIO EEL SRL; Cpr. 25 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
SPIRONOLACTONĂ 25 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. 25 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
SPIRONOLACTONĂ 25 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 25 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)
SPIRONOLACTONĂ 50 mg LAROPHARM SRL; Cps. 50 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-6L)
VERO SPIRON RICHTER GEDEON Ltd.; Cps. 50 mg, 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)

Ind: Retenții hidrosaline cu hiperaldosteronism secundar: edemele din IC congestivă, edemele și ascita din ciroza hepatică, sindrom nefrotic, edeme idiopatice, ascite neoplazice, HTA esențială, miastenia gravis și în diagnosticul hiperaldosteronismului primar.

Dz: În retențiile hidrosaline cu hiperaldosteronism secundar, 100 mg/zi 1 dj. la 6 ore), maxim 400 mg/zi. La copii: 3 mg/kg/zi, în doze fracționate, la 6 ore. HTA esențială, inițial 50-100 mg/zi, aprox. 2 săpt. până se obține efectul hipotensor dorit, apoi doză de întreținere.

Cind: IR acută, IH gravă, alterarea rapidă, progresivă a funcției renale, anurie și hiperkaliemie. Alăptare.

Al: IR cronică, acidoză, ciroză, diabet. Nu se asociază cu săruri de potasiu sau cu alte diuretice care economisesc potasiul.

RA: Hiperkaliemie, hiponatriemie, somnolență, erupții cutanate maculo-papuloase sau eritematoase, stupoare, ataxie, comă hepatică tranzitorie, ginecomastie sau efecte androgenice moderate, amenoree, greață, dureri abdominale, diaree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

REVIPARINUM
 RIBAVIRINUM
 RIBOFLAVINUM
 RIFABUTINUM
 RIFAMPICINUM
 RIFAXIMINUM
 RILMENIDINUM
 RILUZOLUM
 RISPERIDONUM
 RITONAVIR
 RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM

Cod ATC: C03EB01

DIUREX® 100 TERAPIA SA; Cps. spironolactonă 100 mg și furosemidă 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-6L)

DIUREX® 50 TERAPIA SA; Cps. spironolactonă 50 mg și furosemidă 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)

Ind: Tratamentul edemelor rezistente (mai ales al celor asociate cu hiperaldosteronism secundar) din cadrul insuficienței cardiace congestive cronice și cirozei hepatice.

Dz: Doza zilnică recomandată este de 1-4 capsule de 50 mg. În cazurile grave se recomandă doza de 1-4 capsule de 100 mg.

Cind: Hipersensibilitate la furosemidă, spironolactonă, sulfonamide sau la oricare dintre excipienții produselor. Insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/minut sau creatininemia > 1,8-2 mg/100 ml) sau acută, anurie, hiperpotasiemie, encefalopatie hepatică, hipovolemie sau deshidratare, hiponatriemie, obstacol pe căile urinare, sarcină și alăptare.

Al: Asocierea va fi utilizată numai după ce eficiența fiecărui diuretic va fi verificată prin administrare separată. Monitorizarea ionogramei este necesară la începutul tratamentului și în cazurile grave. Atenționare pentru sportivi: produsele pot determina reacție pozitivă la testele de control antidoping. Interacțiuni: nu se recomandă administrarea concomitentă cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IEC), triamteren, amilorid, săruri de potasiu, inhibitori ai receptorilor pentru angiotensina II, antiinflamatoare nesteroidiene, heparine, ciclosporină, tacrolimus și trimetoprim datorită riscului de hiperpotasiemie. Prudență la asocierea cu digitale, antihipertensive, insulină, glucocorticoizi, fenitoină, baclofen, metformină, substanțe de contrast iodate, antidepresive triciclice și neuroleptice. Se evită asocierea cu medicamente care produc torsada vârfurilor (astemizol, bepridil, difemanil, eritromicină i.v., halofantrină, pentamidină, sparfloxacină, sultopridă, vincamină, amiodaronă, disopiramidă, sotalol). Prudență la pacienți cu: hipertrofie benignă de prostată, tulburări de micțiune, afecțiuni hepatice, vârstnici, diabet zaharat latent sau manifest, gută. Influențează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

RA: Furosemida: tratamentul prelungit însoțit de o dietă desodată strictă poate provoca dezechilibru hidroelectrolitic și acido-bazic manifestat prin: deshidratare, hiperazotemie, hiponatriemie, hipokaliemie, hipovolemie cu hipotensiune ortostatică. În prezența insuficienței hepatice, furosemida poate provoca encefalopatie hepatică. Dozele mari de furosemidă sau administrarea în ciroză, în denutriție, diaree cronică sau în insuficiența cardiacă pot provoca hipokaliemie cu sau fără alcaloză metabolică și cu posibilitatea antrenării unor tulburări de ritm grave, mai ales ventriculare. Poate crește: uricemia, glicemia, colesterolul. S-au semnalat cazuri rare de pancreatită, nefrită interstițială, erupții alergice cutanate, leucopenie, trombopenie, dureri lombare. Rar, surditate trecătoare sau definitivă. Riscul crește când furosemida este administrată în doze mari la bolnavii cu insuficiență renală. Spironolactona: la doze mari de spironolactonă și tratament îndelungat poate apărea ginecomastie, obișnuit reversibilă. Alte reacții adverse, obișnuit rare și reversibile sunt: impotență sexuală, tulburări menstruale, intoleranță

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RIBAVIRINUM
RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM

Cod ATC: J05AF04

ZERIT™ BRISTOL-MYERS SQUIBB; Cps. 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg; ct. × 4 blist. × 14 cps.; ct. × 1 fl. × 60 cps. (S/P-RF)

Ind: Tratamentul în HIV-infectat la adulți și copii cu imunodeficiență progresivă sau avansată.

Dz: *Adulți.* Doza inițială recomandată este de 30 mg de două ori pe zi (la fiecare 12 ore) pentru pacienți cu greutate sub 60 kg și de 40 mg de două ori pe zi pentru pacienți cu greutate peste 60 kg. *Copii peste vârsta de 3 luni.* Doza inițială recomandată este de 1 mg/kg de două ori pe zi (la fiecare 12 ore) pentru copii cu greutate sub 30 kg; pentru copii cu greutate peste 30 kg se folosesc dozele de la adult. Pentru absorbția optimă, stavudina trebuie administrată pe stomacul gol (de exemplu cu cel puțin 1 oră înainte de mese) dar, dacă aceasta nu este posibil, el poate fi luat cu o masă ușoară. Stavudina poate fi de asemenea administrată prin deschiderea prudentă a capsulei și omogenizarea conținutului cu alimente.

Cind: Hipersensibilitate la stavudină sau la unul din excipienți. Nu se asociază cu zidovudina. Sarcină și alăptare.

Al: Monitorizare atentă în caz de neuropatie periferică în antecedente sau pancreatită în antecedente.

RA: Neuropatia periferică dependentă de doză, care necesită modificarea dozei. Reacții adverse potențiale: dureri de cap, răceli/febră, disconfort, diaree, constipație, dispepsie, astenie, anorexie, greață/vomă, pneumonie, durere în piept, durere abdominală și durere în spate, mialgie, artralgie, insomnie, depresie, anxietate, sindrom de gripă, transpirație, amețeală, dispnee, reacție alergică, urticarie, prurit, neoplasme cutanate benigne, limfadenopatie și neoplasme.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

RIBOFLAVINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AD01

STREPTASE® HOECHST; Liof. pt. sol. perf. 250000 U.I., 750000 U.I. sau 1500000 U.I. (S)

Ind: IMA, tromboze venoase profunde, embolism pulmonar, tromboze arteriale periferice acute/subacute, boli ocluzive arteriale cronice, ocluzia arterei sau venei centrale a retinei.

Dz: Sistemic sau local. Pentru tromboliza de durată lungă - inițial 250000 U.I. perf. i.v. în 30 min urmată de o doză de întreținere de 100000 U.I./oră (max. 5 zile). Pentru tromboliza de scurtă durată cu doze înalte - 1,5 mil UI/oră (timp de 1 oră în IMA și de 6 ore în ocluziile periferice).

Cind: Hemoragii interne, AVC recent, intervenții chirurgicale intracraniene sau intraspinale, neoplasm intracranian, HTA severă necontrolabilă, tulburări de coagulare necontrolabile, alergie la streptokinază în antecedente.

Al: Situații în care există risc de sângerare masiv/dificil de stăpânit: hemoragii gastrointestinale recente, puncția arterelor mari sau a altor vase necompresibile, intervenții chirurgicale recente, traumatisme severe recente; situații în care există riscul unui embolism cerebral: endocardită bacteriană subacută, defect valvular mitral, fibrilație atrială; afecțiuni cerebrovasculare, afectare hepatică/renală severă, afecțiuni pulmonare cu caverne (ex. TBC activ), pancreatită acută, diabet sever, afecțiuni trombotice, septică. Sarcină, mai ales în primele 18 săptăm.

RA: Febră, frisoane, cefalee, simptomatologie gastrointestinală, exantem generalizat, dureri musculo-scheletale precoce post-adm. Reacții de tip alergic. Hemoragii: minore sau chiar hemoragii interne severe (gastrointestinale, hepatice, urogenitale, retroperitoneale), hemoragii intracerebrale. În cazul apariției de hemoragii severe, trat. se va întrerupe și după caz se va adm. un inhibitor de proteinază (aprotinină). Alte reacții posibile: tulburări de ritm, aritmii de perfuzie, creșterea tranzitorie a transaminazelor serice și a bilirubinei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM

Cod ATC: J01GA01

STREVITAL® pulb. pt. sol. inj. ANTIBIOTICE SA; Pulb. pt. sol. inj. 1 g și 5 g (S)

Ind: TBC (în asociație cu alte antituberculoase); septicemie și endocardite cu streptococ viridans sau enterococ; pestă.

Dz: *Adulți:* în tbc i.m. 1 g de 2 ori/săpt. (la nevoie 1 g/zi), în alte infecții; 1-2 g/zi (fracționat la 4-12 ore); *copii:* 20-30 mg/kg/zi.

Cind: Boli ale urechii (otită medie supurată, tulburări labirintice), miastenie gravă, alergie la streptomicină.

Al: IH, IR (în condiții de anurie, la adult, 0,5 g o dată la 4-6 zile), insuficiența circulatorie și la bătrâni.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V10BX01

RIFAMPICINUM
RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE

METASTRON GE HEALTHCARE; Sol. inj. 35 MGq/ml (S)

Ind: Adjuvant și alternativă la radioterapia externă paliativă a durerii provocate de metastazele osoase secundare carcinomului de prostată în cazul eșecului terapiei hormonale.

Dz: Inj. i.v. 150 MBq (4 mCi) per injecție. La *vârșnici* 2 MBq (55 bCi)/kg. Nu se repetă înainte de 3 luni.

Cind: Afectare severă a funcției măduvei hematopoietice (neutropenie, trombocitopenie), decât dacă se consideră că beneficiul potențial al trat. depășește riscul. Trat. de primă alegere în compresiile medulare secundare metastazelor spinale când este necesar un trat. mai rapid. Copii. Pacienți cu speranță de viață foarte scurtă.

Al: Pacienții cu incontinență urinară semnificativă; pentru minimalizarea riscului contaminării radioactive, este necesară cateterizarea urinară. Monitorizare hematologică. Se poate adm. un agent citotoxic cu condiția ca parametrii hematologici să fie stabili și în limite normale, la un interval de 12 săpt. între cele două trat. Timpul necesar ameliorării durerii este de 10-20 zile după adm. de Metastron.

RA: Exacerbarea durerii în primele zile după adm. Toxicitate hematologică (trombocitopenie și leucopenie).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RIFAXIMINUM
RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM

Cod ATC: M05BX03

OSSEOR 2 g LAB. SERVIER; Gran. pt. susp. orală 2 g; ct. × 7, 14 sau 28 plicuri (**P-6L**)

Ind: Tratarea osteoporozei la femeile aflate la postmenopauză. Reduce riscul de fracturi ale coloanei vertebrale și șoldului.

Dz: Doza uzuală este de 1 plic de 2 g pe zi, seara la culcare.

Cind: Hipersensibilitate la ranelat de stronțiu. Precauții speciale se impun în caz de boli renale, flebită, imobilizare la pat.

Al: Alimentele, laptele și produsele lactate reduc absorbția ranelatului de stronțiu. Se recomandă administrarea la distanță de mese, preferabil la culcare, la cel puțin două ore după consumul de alimente, lapte sau produse lactate sau suplimente de calciu. În caz de tratament pe cale orală cu tetracicline sau chinolone, trebuie întreruptă administrarea concomitentă a ranelatului de stronțiu.

RA: Greață, diaree, cefalee, iritații ale pielii. Rar, flebită, tulburări de memorie, convulsii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RILMENIDINUM
RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM

Cod ATC: A02BX02**GASTROFAIT** E.I.P.I.C.O.; Cpr. 1 g; ct. × 5 blist. × 4 cpr. (P-6L)**SUCRALAN** LANNACHER; Cpr. 1 g; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)**VENTER** KRKA; Cpr. 1 g; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)**Ind:** Trat. și profilaxia ulcerului gastric și duodenal.

Dz: Plicul se adm. după dizolvarea într-o jumătate pahar cu apă. Ulcer duodenal: de 2 ori câte 2 g sau de 4 ori câte 1 g/zi, pe stomacul gol. Ulcer gastric: de 4 ori câte 1 g/zi, pe stomacul gol. Durata trat.: 4-6, chiar 12 săpt. Profilaxia recidivelor de ulcer gastric sau duodenal: de 2 ori câte 1 g/zi, dimi- neața și seara. Trat. se poate prelungi 6-12 luni.

Cind: Hipersensibilitate la sucralfat.

Al: Înainte de începerea trat. pentru ulcer gastric, trebuie eliminată posibilitatea unei tumori maligne gastrice. Evitarea unui trat. prelungit și în doze mari în IR, mai ales la cei cu dializă, în maladia Alzheimer și în alte forme de tulburări funcționale cerebrale. Sarcină. Alăptare.

RA: Constipații ușoare și tulburări nespecifice ca: exantem, greață, vertij, uscăciunea gurii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RILUZOLUM
RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM

Cod ATC: A11DA02

ENERION® LAB. SERVIER; Dj. 200 mg; ct. × 2 blist. × 10 dj., ct. × 2 sau 4 blist. × 15 dj. (OTC)

Ind: Tratament simptomatic al asteniei funcționale.

Dz: Oral 400-600 mg sulbutiamină pe zi; max. 4 săptămâni. Produs destinat exclusiv adulților.

Cind: Hipersensibilitate la sulbutiamină sau la oricare dintre excipienții produsului. Sarcină și alăptare.

RA: Reacții alergice cutanate. Rar, a fost raportată o ușoară agitație psihomotorie la vârstnici.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RISPERIDONUM
RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM

Cod ATC: D06BA01**DERMAZIN®** LEK PHARMACEUTICALS; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 50 g (*P-RF*)**Ind:** Trat. și profilaxia arsurilor infectate și a rănilor suprainfectate, inclusiv escare și răni adânci netratate.**Dz:** După curățarea zonei, se aplică 1 dată/zi într-un strat de 2-4 mm grosime pe suprafața arsurii sau pe un tifon steril peste rană, pe o durată de la câteva zile la maxim o lună.**Cind:** Copii prematuri și nou-născuți. Sarcină.**Al:** Hipersensibilitate la sulfamide, insuficiență congenitală de G-6-PDH, tulburări hepatice și renale. După adm. prelungită pe suprafețe mari se va controla numărul leucocitelor. Creșterea temperaturii corporale, la copii, în primele zile de trat. nu este urmarea adm. sulfadiazinei și nu trebuie să conducă la întreruperea terapiei.**RA:** În trat. prelungit pe suprafețe corporale mari, concentrația sulfonamidelor din sânge poate atinge un nivel egal cu cel al trat. sistemic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01EB0

RITONAVIR
RITUXIMABUM
RIVASTIGMINUM
RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAİNUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM

NEOXAZOL® 500 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 500 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)

SULFAFURAZOL ARENA GROUP SA; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)

Ind: Infecții urinare acute cu germeni sensibili, meningită meningococică, nocardioză, trahom, limfogranulomatoză veneriană, dermatită herpetiformă, toxoplasmoză.

Dz: *Adulți:* oral, în infecții urinare inițial 2 g, apoi câte 1 g la 6 ore; în infecții sistemice inițial 3 g, apoi câte 1g la 4 ore; *copii:* inițial 50 mg/kg, apoi câte 25 mg/kg la 6 ore.

Cind: Alergie sau intoleranță la sulfamide, porfirie, IR sau IH gravă, hemopatii cu leucopenie, eritem exsudativ multiform, sarcină (primul trimestru și ultimele săpt.), nou-născuți (în prima săpt.), alăptare.

RA: Eruptii cutanate, febră, cefalee, greață, vomă, diaree; rareori hepatită, colestază, pancreatită, leucopenie, trombocitopenie, agranulocitoză, anemie aplastică, nevrite, fotosensibilizare, sindrom Lyell sau Stevens-Johnson, congestie conjunctivală, purpură, hematurie, cristalurie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01EE01

RITUXIMABUM
 RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

BISEPTOL 480 POLFA; Cpr. 400 mg + 80 mg; ct. × 20 cpr. (P-RF)
BISEPTIN EUROPHARM SA; Cpr. 400 mg + 80 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
CO-TRIM BIO EEL SRL; Cpr. 400 mg + 80 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
EPITRIM E.I.P.I.C.O.; Susp. orală 200 mg + 40 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-RF)
SEPTRIN GLAXO SMITHKLINE; Sol. inj. 400 mg + 80 mg/5 ml; ct. × 10 f. × 5 ml (S/P-RF)
SUMETROLIM EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 400 mg + 80 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
SUMETROLIM EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Sirop 125 mg + 25 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-RF)
TAGREMIN® ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 400 mg + 80 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
TRIMIDAR® M DAR AL DAWA; Susp. orală 200 mg + 40 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 100 ml (P-RF)

Ind: Infecții cauzate de germeni sensibili: infecții ale căilor respiratorii (incluzând pneumonia cu *Pneumocystis carinii*); infecții din sfera ORL (exceptând tonsilita produsă de streptococi beta-hemolitici); infecții ale căilor urinare și rinichilor incluzând și profilaxia infecțiilor recurente; infecții ale organelor genitale inclusiv prostatitele și unele boli venerice (nu este activ în sifilis); uretrită gonococică, ulcus molle, granulomatoză veneriană; infecții ale tractului digestiv: febra tifoidă, paratifoidă A și B, purtător cronic de bacil tific, shigeloze, diareea călătorilor; în bruceloze, nocardioze.

Dz: *Adulți și copii peste 12 ani:* 160-320 mg/zi, în 2 prize, în cazuri grave 240-480 mg/zi. Profilaxia de lungă durată a recidivei infecției urinare: adulți: 160 mg/zi, seara. *Copii sub 12 ani:* 6-8 mg/kg și zi, în 2 prize. *IR:* dozele se ajustează în funcție de clearance-ul creatininei.

Cind: Hipersensibilitate la sulfamide, trimetoprim și analogi ai trimetoprimului; eritem exsudativ multiform; trombocitopenie, granulocitopenie, anemie megaloblastică, deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, anomalii ale hemoglobinei (Hb Köln și Hb Zürich), IR gravă; IH, hepatită acută, porfirie acută, copii sub 6 ani. Tratament cu ciclosporină. Sarcină. *oferi și activități de precizie.

Al: Afecțiuni renale și hepatice ușoare, afecțiuni ale tiroidei, hipersensibilitate crescută la antidiabetice și diuretice sulfamidice, deficit de ac folic, cromozom X fragil la copii cu retardare psihică. Monitorizarea tabloului sanguin (în special pentru trombocite în caz de tratament prelungit). Alăptare.

RA: Tulburări gastrointestinale, glosită, gingivită și stomatită, reacții de hipersensibilitate cu purpură, fotodermatoză, eritem nodos, cefalee, artralгии. Rareori: hepatoză colestatică, hipopotasemie, tinitus, reacții de hipersensibilitate severe ca sindrom Lyell, sindrom Stevens-Johnson sau dermatită exfoliativă. Foarte rar: creșterea incidenței infecțiilor cu *Candida albicans*, miopie reversibilă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

RIVASTIGMINUM
 RIZATRIPTANUM
 ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM

Cod ATC: A07EC01

SALAZIDIN 500 mg AC HELCOR SRL; Cpr. film. gastrorez. 500 mg sulfasalazină; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

SALAZOPYRIN EN PFIZER; Cpr. film. gastrorez. 500 mg; ct. × 1 fl. × 100 cpr. (P-6L)

SULFASALAZIN-EN KRKA; Cpr. ent. 500 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Colita ulceroasă: formă medie și moderată; terapie adjuvantă în colita ulcerativă severă. Trat. de întreținere a remisiunii colitelor ulceroase. Boala Crohn: forma activă, în special la pacienții cu afectare colonică.

Dz: Se admin. la intervale regulate, în timpul meselor, cu creștere progresivă în primele săpt. Bolile inflamatorii intestinale - Atacurile acute: *Adulți:* atacurile severe: 1-2 g de 3-4 ori/zi; *formele moderate și blânde:* 1 g de 3-4 ori/zi. *Copii:* 40-60 mg/kg/zi divizat în 3-6 doze. *Profilaxia recăderilor:* *Adulți:* 1 g de 2-3 ori /zi ca doză de întreținere. În cazul agravării, se crește la 1-2 g de câte 3-4 ori /zi. *Copii:* 20-30 mg/kg/zi divizat în 3-6 doze. *Poliartrita reumatoidă:* *Adulți:* 1 g de 2 ori/zi, astfel: prima săpt. 0,5 g seara; a doua săpt. 0,5 dimineața și 0,5 g seara; a treia săpt. 0,5 g dimineața și 1 g seara și a patra săpt. (și după aceasta) câte 1 g dimineața și seara. Dacă nu apare un răspuns după 2 luni, doza poate fi crescută la 3 g/zi.

Cind: Hipersensibilitate la sulfonamidă sau salicilați. Porfirie acută intermitentă. Artrita cronică juvenilă

Al: Depresie medulară și leucopenie, de obicei în primele trei luni de trat. Funcție hepatică sau renală redusă. Control regulat HLG, teste funcționale hepatice și sumar de urină. În caz de reacție toxică severă sau hipersensibilitate, se va întrerupe imediat trat. Atenție la cei cu deficit de G-6-PDH - risc de anemie hemolitică. Alăptare.

RA: Greață; anorexie; creșterea temperaturii; eritem și prurit; cefalee. Reacții hematologice: anemie hemolitică, macrocitoză, depresie medulară cu leucopenie, agranulocitoză sau trombocitopenie, cianoză. Reacții gastrointestinale: tulburări gastrice și dureri abdominale, hepatită, pancreatită. Reacții SNC: amețeală și tinitus, neuropatie periferică, meningită aseptică. Reacții renale: proteinurie și hematurie. Reacții dermatologice: piele galbenă, exantem, urticarie, eritem multiform/sindrom Stevens-Johnson, dermatită exfoliativă, sindrom Lyell, fotosensibilitate. Reacții pulmonare: alveolită fibroasă cu dispnee, tuse, febră, eozinofilie. Afectarea funcțiilor genitale: oligospermie cu infertilitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

CODATC:B01AB11

RIZATRIPTANUM
ROCURONIUM BROMIDE
ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM

VESSEL DUE F ALFA WASSERMANN SpA; Cps. moi 250 ULS; ct. × 2 blist. × 25 cps. (P-RF)

VESSEL DUE F ALFA WASSERMANN SpA; Sol. inj. 600 ULS/2 ml; ct. × 10 f. × 2 ml (P-RF)

Ind: Patologia vasculară cu risc crescut de tromboză.

Dz: 1 cps. de 2 ori/zi, între mese sau 1 f./zi i.m. sau i.v. Se începe cu forma injectabilă 15-20 de zile, după care se continuă cu adm. orală timp de 30-40 de zile. Ciclul complet de trat. se repetă de cel puțin 2 ori/an.

Cind: Hipersensibilitate față de produs, de heparină sau heparinoizi. Diateze hemoragice. Sarcină.

Al: Când este în curs de adm. și un trat. anticoagulant, parametrii coagulării trebuie monitorizați periodic.

RA: Cps: greață, vomă, epigastralgie. F.: durere, arsură sau hematom la locul de inj. Foarte rar, manifestări de sensibilizare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AL01

ROCURONIUM BROMIDE
 ROPINIROLUM
 ROPIVACAINUM
 ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
SULPIRIDUM

EGLONYL® 50 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cps. 50 mg; ct. × 2 blist. × 15 cps. (P-RF)
EGLONYL® 200 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. 200 mg; ct. × 1 sau 5 blist. × 12 cpr. (P-RF)
EGLONYL® 100 mg/2 ml SANOFI~SYNTHELABO; Sol. inj. 100 mg/2 ml; ct. × 6 f. × 2 ml (P-RF)

Ind: Trat. de scurtă durată al stărilor de agitație și agresivitate din psihozele acute și cronice (schizofrenie și deliruri cronice non-schizofrenice).

Dz: Inj. i.m. 400-800 mg/zi, timp de 2 săpt. Oral 200-1000 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la sulpiridă sau la oricare dintre componentii produsului; feocromocitom diagnosticat sau suspectat; asociere cu medicamente antiparkinsoniene dopaminergice. *Copii.* În cazul cpr. care conțin lactoză, CI în galactozemia congenitală, sindromul de malabsorbție a glucozei sau galactozei, precum și în caz de deficit de lactază. Nu se ingeră băuturi alcoolice. Alăptare.

Al: Întreruperea trat. în caz de hipertermie (risc de sd. malign cu paloare, hipertermie, tulburări vegetative, alterări ale stării de conștiință, rigiditate musculară). Poate fi precedat de simptome de disfuncție vegetativă (transpirație și TA labilă). Prolungire dependentă de doză a intervalului QT cu risc de torsada vârfurilor favorizată de bradicardie, hipokaliemie sau de un medicament care prelungește intervalul QT. ECG pretrat. Atenție la pacienții cu boală Parkinson. În IR se micșorează dozele. Atenție sporită la: epileptici, vârstnici. Sarcină. *oferi și activități de precizie.

RA: Tulburări neuropsihice: diskinezie precoce (torticolis spasmodic, crize oculogire, trismus); sindrom extrapiramidal: akinezie, cu sau fără hipertonie; sindrom excito-motor hiperkinetic - hipertonic; acatisie; diskinezie tardivă. Tulburări endocrine și metabolice: hiperprolactinemie tranzitorie, reversibilă, cu amenoree, galactoree, ginecomastie, impotență sau frigiditate; creștere în greutate. Tulburări cardiace: prelungirea intervalului QT; rareori torsada vârfurilor. Tulburări vegetative: hTA ortostatică. Sindrom neuroleptic malign.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01CR01

ROPINIROLUM
ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM

UNASYN PFIZER; Cpr. film. 375 mg; ct. × 1 fl. × 12 cpr. (*P-RF*)**UNASYN** PFIZER; Pulb. susp. orală 250 mg/5 ml (*P-RF*)

Ind: Infecții ale căilor respiratorii superioare (sinuzite, otite medii și tonsilite); infecții ale căilor respiratorii inferioare (pneumonii bacteriene și bronșite); infecții ale tractului urinar și pielonefrite; infecții cutanate, ale țesuturilor moi și infecții gonococice.

Dz: *Adulți (inclusiv vârstnici) și copii de peste 30 kg:* 375-750 mg de 2 ori/zi. *Copii sub 30 kg:* 25-50 mg/kg/zi în 2 prize timp de 5-14 zile. În trat. gonoreei necomplicate, oral, doză unică de 2,25 g și teste serologice pentru sifilis. Adm. concomitentă de 1 g probenecid. La Cl creatinină 30 ml/min, adm. se face mai rar.

Cind: Reacții alergice la peniciline în antecedente. Mononucleoza infecțioasă

Al: Persoane cu antecedente de hipersensibilizare la peniciline și/sau la alergeni multipli. Risc de suprainfecții oportuniste; se întrerupe trat. și/sau se instituie terapie corespunzătoare. Verificarea funcțiilor renale, hepatice și hematopoietice. Atenție la nou-născuți. Suspensia orală reconstituită trebuie păstrată la frigider și aruncată după 14 zile. Sarcină. Alăptare.

RA: Diaree/scaune moi; greață, vărsături, disconfort abdominal și dureri/ crampe abdominale. Rar enterocolite și colite pseudomembranoase; rash și prurit; somnolență/sedare, oboseală, indispoziție și cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

ROPIVACAINUM
ROSIGLITAZONUM
ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N02CC01**IMIGRAN SPRAY NAZAL** GLAXO SMITHKLINE; Aerosol nazal 20 mg/ doză (**P-RF**)**IMIGRAN® 50 mg; IMIGRAN® 100 mg** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 50 mg, 100 mg; ct. × 1 blist. × 2 cpr. (**P-RF**)**Ind:** Calmarea rapidă a atacurilor de migrenă cu sau fără aură. Nu se va folosi profilactic.**Dz:** Migrenă: *Adulți:* oral 50-100 mg. Se poate repeta în următoarele 24 de ore, maxim 300 mg/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la orice component al preparatului. Afecțiuni vasculare periferice; semne și simptome de afecțiuni cardiace ischemice; antecedente de AVC sau atacuri ischemice tranzitorii, IH severă sau HT necontrolată, cardiopatie ischemică dureroasă, infarct miocardic în antecedente, angina Prinzmetal. Trat. migrenei hemiplegice, bazilare sau oftalmoplegice. Asocierea cu methysergide, ergotamină sau IMAO. Copii. Pacienții peste 65 de ani.**Al:** Dureri și tensiune toracică. În cazul în care aceste simptome sugerează o afecțiune cardiacă ischemică se va face evaluarea pacientului. Somnolența poate fi rezultatul migrenei sau al trat. cu sumatriptan. Pacienți cu HT controlată sau IR sau IH. Sarcină. Alăptare. *oferi și activități de precizie.**RA:** Senzație de parestezie, căldură, presiune sau greutate în orice parte a corpului, eritem, amețală și senzație de slăbiciune, oboseală și somnolență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ROSIGLITAZONUM
 ROSUVASTATINUM
 ROXITHROMYCINUM
 SALBUTAMOLUM
 SALMETEROLUM
 SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
 SAQUINAVIRUM
 SELEGILINUM
 SELENIUM
 SERTRALINUM
 SEVELAMER
 SEVOFLURANUM
 SIBUTRAMINUM
 SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM

Cod ATC: M03AB01

LYSTHENON® NYCOMED; Sol. inj. 100 mg/5 ml; ct. × 5 sau 25 f. × 5 ml (S)

Ind: Medicație adjuvantă a anesteziei generale, pentru a ușura intubația traheală, ventilație mecanică. Relaxarea mușchilor scheletici în timpul intervențiilor chirurgicale, reducerii fracturilor și dislocărilor articulare, diminuarea contracțiilor în timpul terapiei prin electroșoc și tetanos.

Dz: i.v. 0,05 mg/kg pentru a determina răspunsul individual la începutul intervenției chirurgicale. 0,1 mg/kg produc o relaxare a mușchilor scheletici fără acțiune pe funcția respiratorie. 0,2-1 mg/kg conduc la relaxarea totală a peretelui abdominal și a mușchilor scheletici și la reducerea sau încetarea completă a respirației spontane. i.m. până la 2,5 mg/kg, maxim 150 mg. *Copii* (doar în urgențe): 1-2 mg/kg i.v. sau până la 2,5 mg/kg i.m. *Perf. continuă:* adulți 0,5-5 mg/min, i.v., sol. 0,1-0,2%. În tetanos, sol. 0,1% în perf. 0,1-

0,3 mg/min, cu adm. simultană de O₂ hiperbaric.

Cind: Hipersensibilitate față de clorura de suxametoniu; disfuncții hepatice severe; edem pulmonar; hipertermie malignă (hiperpirexie), deficit de colinesterază, hiperkaliemie; boli neuromusculare și tulburări neurologice, rigiditate musculară; pacienți cu leziuni sau arsuri grave. Pacienți cu uremie. Sarcină. Alăptare.

Al: Afecțiuni cardiace, copii și adolescenți (doar în urgențe). Adm. numai de medici experimentați în respirație artificială și intubare orotraheală, cu acces la echipamentul pentru respirație susținută, numai după inițierea anesteziei. Atropină înainte de suxametoniu, pentru a evita bradicardia excesivă, secreția bronșică sau alte efecte de tip muscarinic. Injectiile i.m. pot provoca o ușoară creștere inițială a tonicității musculare.

RA: În caz de supradozare sau predispoziție specială: tahicardie sau bradicardie, aritmie, fibrilație ventriculară, creșterea sau scăderea TA, creșterea tensiunii intraoculare, spasme bronșice sau laringiene, sialoree, mioglobinurie; rigiditate musculară (risc de hipertermie malignă), dureri musculare după intervenția chirurgicală. Relaxarea prelungită, cu posibilă apnee, poate fi cauzată de colinesteraza serică "atipică" sau deficiența ereditară de colinesterază se-rică. Scăderea temporară a colinesterazei serice apare în: boli severe ale ficatului, anemie severă, după post îndelungat, cașexie, deshidratare, stări febrile, după otrăviri acute, după expunere cronică la/sau ingerare de insecticide inhibitoare de colinesterază sau medicamente (fosfolin, demecarium, neostigmină, fizostigmină, distigmină) și adm. simultană de medicamente care intră în competiție pentru enzimă cu succinilcolina (procaină i.v.).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L04AA05

ROSUVASTATINUM
ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS

PROGRAF® 5 mg/ml ASTELLAS PHARMA; Conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (S)

PROGRAF® 0,5 mg; PROGRAF® 1 mg; PROGRAF® 5 mg ASTELLAS PHARMA; Cps. 0,5 mg, 1 mg, 5 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (S/P-RF)

Ind: Imunosupresie primară la pacienții cu alogrefă hepatică și renală; reacție de rejet la pacienții cu alogrefă hepatică și renală rezistentă la regimurile imunosupresive convenționale.

Dz: *Transplant hepatic:* doza inițială i.v.: la cca. 6 ore după terminarea intervenției chirurgicale, 0,01-0,05 mg/kg și zi, în perfuzie continuă. Totuși, doza se adaptează individual. Nu se adm. nediluat. Adm. orală este de preferat ulterior. Conținutul capsulei poate fi adm. prin sonda nazogastrică. *Oral:* 0,1-0,2 mg/kg și zi, în două prize. *Transplant renal:* oral: 0,15-0,4 mg/kg și zi, în două prize. *Copii:* Doze de 1,5-2 ori mai mari decât la adulți. Terapia de întreținere se stabilește individual.

Cind: Hipersensibilitate la tacrolimus, la alte macrolide sau la excipienții produsului (ulei de ricin polietoxilat). Sarcină și alăptare.

Al: Nu se adm. simultan cu ciclosporina A. Atenție la asocierea cu medicamente nefrotoxice sau hepatotoxice (aminoglicozide, inhibitori ai girazei, vancomicină, cotrimoxazol, AINS, ganciclovir, aciclovir). Risc crescut de infecții (virale, bacteriene, fungice sau parazitare).

RA: Frecvente: HTA, diaree, greață și/sau vărsături, alterarea funcției renale (creșterea conc. creatininei), hiperglicemie, hiperpotasemie, diabet zaharat, tremor, cefalee, insomnie, dureri localizate (artralgii), reacții alergice și anafilactice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

ROXITHROMYCINUM
SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM

Cod ATC: G04BE08**CIALIS®** ELI LILLY; Cpr. film. 10 mg, 20 mg; ct. × 1 blist. × 4 cpr. (10 mg), ct. × 1 blist. × 2, 4, 8 sau 12 cpr. (20 mg) (P-RF)**Ind:** Tratamentul disfuncției erectile.**Dz:** Oral 10 mg cu 30 min-12 ore înainte de activității sexuale. Eficacitatea poate persista 24 ore de la administrare. Dacă doza de 10 mg nu produce un efect adecvat atunci se poate încerca doza de 20 mg. Produsul se adm. maxim o dată pe zi. IR și IH: doza recomandată este de 10 mg. Nu sunt necesare ajustări ale dozei la diabetici.**Cind:** Boli cardiovasculare preexistente, tratament cu nitrați (le crește efectul hipotensor). Hipersensibilitate la substanța activă sau excipienții produsului. Persoane sub 18 ani: nu este recomandată utilizarea de către femei.**Al:** Nu este recomandată utilizarea zilnică.**RA:** Cefalee, dispepsie, amețeli, hiperemie, congestie nazală, dureri lombare, mialgii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C07AB13

SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM

CORDANUM AWD PHARMA; Dj. 50 mg; ct. × 30 dj. (P-6L)

Ind: Beta-blocant selectiv; antihipertensiv.

Dz: Oral 50-100 mg de 1-2 ori pe zi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L02BA01

SALMETEROLUM
SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM

NOLVADEX ASTRAZENECA; Cpr. 10 mg; ct. × 30 cpr. (S/P-RF)

TAMONEPRIN® 10 mg SINDAN SRL; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (S/P-RF)

TAMOXIFEN® 10 HEXAL HEXAL AG; Cpr. film. 10 mg; ct. × 2 sau 10 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)

Ind: Trat. cancerului mamar.

Dz: *Adulți (inclusiv vârstnici):* 20-40 mg/zi, int., în două prize/zi, sau în priză unică.

Cind: Sarcină.

Al: Poate suprima menstruația la femei la premenopauză. Precauție când se asociază cu anticoagulante de tip cumarinic sau cu agenți citotoxici. Orice pacientă care raportează sângerare vaginală anormală trebuie investigată prompt. În perioada de lactație.

RA: Valuri de căldură, metroragii, secreție vaginală și prurit vulvar, intoleranță gastrointestinală, mărirea formațiunilor tumorale, amețeli, reacții cutanate eritematoase și, ocazional, retenție lichidiană, alopecie, hipercalcemie, tulburări ale vederii, incluzând alterări corneene, cataractă și retinopatie, fibrom uterin, creșterea volumului chisturilor ovariene, leucopenie, anemie, trombocitopenie, neutropenie, accidente tromboembolice, modificări ale nivelului enzimelor hepatice, rareori anomalii hepatice cum ar fi degenerescență grasă hepatică, colestază și hepatită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SALMETEROLUM + FLUTICASONUM
SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM

Cod ATC: G04CA02

CONTIFLO MR RANBAXY; Cps. elib. prel. 0,4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
FOKUSIN ZENTIVA AS; Cps. elib. prel. 0,4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
OMNIC® ASTELLAS PHARMA; Cps. elib. prel. 0,4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
OMNIC TOCAS® ASTELLAS PHARMA; Cpr. film. elib. prel. 0,4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
TAMSOL GEDEON RICHTER ROMANIA; Cps. elib. prel. 0,4 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)
TANYZ KRKA; Cps. elib. prel. 0,4 mg; ct. × 3, 6 sau 9 blist. × 10 cps. (P-6L)

Ind: Trat. simptomelor funcționale ale hiperplaziei benigne de prostată (HBP).

Dz: Int. 0,4 mg/zi, după micul dejun.

Cind: Hipersensibilitate la oricare component al produsului. hTA ortostatică. IH severă.

Al: În timpul trat. se poate instala hTA, cu apariția sincopelor. La primele semne de hTA ortostatică, pacientul se va așeza sau se va culca până la dispariția simptomelor. Tușeul rectal și determinarea Antigenului Specific al Prostataei (PSA) trebuie făcute înainte de inițierea trat. și, ulterior, la intervale regulate. Precauție în cazul pacienților cu IR. Precauție în cazul asocierii cu: cimetidină, furosemid, diclofenac, warfarină, alți alfa1-blocanți. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Amețeli, ejaculare retrogradă, cefalee, astenie, hTA ortostatică, palpitații, greață, vărsături, diaree sau constipație, reacții de hipersensibilitate (rash, prurit, urticarie), angioedem, sincope.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SAQUINAVIRUM
SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC

Cod ATC: V09BA02**SCINTIFIN-MEDRONAT** INCDFIN "HORIA HULUBEI"; Liof. pt. sol. inj. 5 mg; ct. × 6 fl. (S)**Ind:** Vizualizarea și localizarea tumorilor osoase.

Dz: În flaconul cu produs liofilizat se introduc în condiții aseptice 2-6 mL soluție sterilă și apirogenă de pertechnetat de sodiu. Se agită flaconul 1-2 minute până la completa dizolvare a pulberii, după care se lasă în repaus 10-15 minute (când are loc reacția de marcarea cu technetiu a MDP-ului). Se injectează intravenos soluția de MDP-^{99m}Tc cu activitatea cuprinsă între 370-555 MBq (10-15 mCi)/pacient în greutate de 70 kg. Imaginea scintigrafică se înregistrează în intervalul 120-180 minute de la injectare.

Cind: Sarcină, alăptare.

Al: Administrarea la copiii sub 18 ani se face numai după evaluarea raportului beneficiu/risc. La femei în perioada de procreare examinările cu produse radiofarmaceutice se fac în primele 10 zile de la debutul menstruației. Administrarea se face numai de către personal medical specializat și autorizat, în condiții de clinică de medicină nucleară astfel încât să fie evitată orice expunere nejustificată atât a pacienților, cât și a personalului medical. Fiind produs radioactiv, se utilizează cu respectarea normelor de radioprotecție.

RA: Nu s-au raportat efecte secundare la administrarea i.v. a acestui produs. Se recomandă totuși o urmărire atentă a pacienților implicând și administrarea de antihistaminice, adrenalină sau corticosteroizi pentru cei care ar manifesta alergii la produsul injectat. Dacă este injectat în doze foarte mari poate provoca o iradiere mare a organismului, astfel încât să apară semnele bolii de iradiere (iritarea pielii, înroșirea feței, creșterea temperaturii).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SELEGILINUM
SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC

Cod ATC: V09CA01, V09AAN2

SCINTIFIN-DTPA INCDFIN "HORIA HULUBEI"; Liof. pt. sol. inj. 6 mg; ct. × 6 fl. (S)

Ind: *Indicații scintigrafice renale:* studii dinamice renale: perfuzii renale, viteza de filtrare glomerulară, renografii, aprecierea funcției renale, refluxul vezico-ureteric, volumul rezidual de urină. *Indicații scintigrafice cerebrale:* screening-pacienți suspecți de tumori pe creier, primare și în fază metastazică, evaluarea accidentelor cerebro-vasculare, urmărirea evoluției pacienților după neurochirurgii, radioterapie și chimioterapia leziunilor cerebrale, evaluarea simptomelor inexplicabile.

Dz: Adult de 70 kg: Scintigrafie renală 2-20 mCi (74-740 MBq); scintigrafie cerebrală 5-20 mCi (185-740 MBq), uzual 555MBq (15 mCi). Admnistrările se fac i.v.

Cind: Anemie severă, leucemie, sarcină, alăptare, copii sub 18 ani.

Al: La femei în perioada de procreere examinările cu produse radiofarmaceutice se fac în primele 10 zile de la debutul menstruației. Administrarea se face numai de către personal medical specializat și autorizat, în condiții de clinică de medicină nucleară astfel încât să fie evitată orice expunere nejustificată atât a pacienților, cât și a personalului medical. Fiind produs radioactiv, se utilizează cu respectarea normelor de radioprotecție.

RA: Nu s-au raportat efecte secundare la administrarea i.v. a acestui produs. Se recomandă totuși o urmarire atentă a pacienților implicând și administrarea de antihistaminice, adrenalină sau corticosteroizi pentru cei care ar manifesta alergie la produsul injectat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SELENIUM
SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT

Cod ATC: V09DB07

SCINTIFIN-FITAT INCDFIN "HORIA HULUBEI"; Liof. pt. sol. inj. 10 mg; ct. × 6 fl. (S)

Ind: Vizualizarea sistemului reticulo-endotelial prin scintigrafie, atunci când se doresc informații despre ficat, fluxul sanguin hepatic și splină.

Dz: Adulți 70 kg: o doză de 185-300 MBq (5-8 mCi), i.v. Scintigrafia se poate realiza după 15-60 minute de la injectare, dar acumularea maximă în ficat are loc după 20-30 minute de la injectare.

Cind: Sarcină, alăptare. Copii sub 18 ani. Insuficiență hepatică și renală gravă.

Al: La femei în perioada de procreere examinările cu produse radiofarmaceutice se fac în primele 10 zile de la debutul menstruației. Administrarea se face numai de către personal medical specializat și autorizat, în condiții de clinică de medicină nucleară astfel încât să fie evitată orice expunere nejustificată atât a pacienților, cât și a personalului medical. Fiind produs radioactiv, se utilizează cu respectarea normelor de radioprotecție. Dacă produsul este administrat pacienților cu afecțiuni în care calciul seric are limite scăzute (hipoparatiroidism, carențe de vitamina D, boli osteolitice (mielomul multiplu, osteomalacie), insuficiență renală, hipoproteinemie, sindrom de absorbție defectuoasă (sprue, ileită, afecțiuni celiace), insuficiență pancreatică, pancreatită gravă cu necroză pancreatică), atunci se administrează acestora și calciu, înainte de efectuarea scintigramei.

RA: Nu s-au raportat efecte secundare la administrarea i.v. a acestui produs. Se recomandă totuși o urmarire atentă a pacienților implicând și administrarea de antihistaminice, adrenalină sau corticosteroizi pentru cei care ar manifesta alergii la produsul injectat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V09FX01

SERTRALINUM
SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT

GENERATOR DE ^{99m}Tc ROMTEC INCDFIN "HORIA HULUBEI"; Sistem cromatografic (S)

Ind: Eluatul ^{99m}Tc pertechnetat de sodiu poate fi utilizat *in vivo*, ca atare sau sub formă de complecși cu ^{99m}Tc, dispunând de diferite truse pentru marcare. Ca soluție de pertechnetat de sodiu este utilizat pentru: scintigrafie cerebrală, 370-740 MBq (10-20 mCi), scintigrafia glandei tiroide, 37-370MBq (1-10 mCi), scintigrafia glandelor salivare 37-185 MBq (1-5 mCi). Aria utilizărilor este mult extinsă prin folosirea truselor de marcare cu ^{99m}Tc pentru: căi hepatobiliare, căi renale, sistem osos, sistem nervos central, miocard, sistem limfatic.

Dz: Dozele estimate de radiații absorbite pentru un adult de 70 kg sunt în funcție de organul iradiat.

Cind: Sarcină, alăptare. Copii sub 18 ani, dacă investigația nu oferă avantaje mult mai importante decât riscul potențial al efectelor iradierii.

Al: Produsul va fi utilizat numai de personal autorizat pentru lucrări cu radioizotopi.

RA: Nu se cunosc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SEVELAMER
SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM

Cod ATC: J01XA02

TARGOCID® 200 mg; TARGOCID® 400 mg AVENTIS PHARMA; Liof.. pt. sol. inj. 200 mg, 400 mg; ct. × 1 fl. liof. + 1 f. solv. (**P-RF**)

Ind: Infecții potențial severe cu germeni gram-pozitivi; în cazurile în care penicilinele și cefalosporinele nu sunt eficiente.

Dz: Adm. i.m. sau i.v. în bolus 30 minute. Se recomandă 1-2 administrări pe zi în funcție de gravitate. În endocardite și osteomielite se recomandă ca tratamentul să dureze minim 3 săptămâni. Profilactic 400 mg în doză unică, înaintea intervenției chirurgicale. *Copii peste 12 ani:* 10 mg/kg corp la 12 ore (primele 3 doze) apoi 10 mg/kg corp pe zi i.v. sau i.m. în doză unică. *Nou-născuți:* doza de atac 16 mg/kg corp în prima zi, apoi doza de întreținere

8 mg/kg corp o dată pe zi. IR: nu este necesară ajustarea dozelor în primele 4 zile de tratament. La un clearance de 40-60 ml/min doza se va reduce la jumătate.

Cind: Hipersensibilitate în antecedente la substanță activă. Sarcină și alăptare.

Al: Teicoplaninul nu se elimină prin dializă. Hipersensibilitate încrucișată cu vancomicină. Testarea funcției renale și hepatice în cursul tratamentului.

RA: Locale: eritem, durere, tromboflebită, abces; hipersensibilitate (rash, prurit, febră, bronhospasm, reacții anafilactice, șoc anafilactic, contractură, urticarie, angioedem); digestive (greață, varsături, diaree); sânge: eozinofilie, leucopenie, trombocitopenie, trombocitoză, neutropenie; sistem nervos: amețeli, cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01BA01

SEVOFLURANUM
SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM

KETEK AVENTIS PHARMA; Cpr. film. 400 mg; ct. × 10, 14, 20 sau 100 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. următoarelor infecții, la pacienți peste 18 ani: pneumonii comunitare, ușoare sau moderate, acutizări ale bronșitelor cronice, sinuzite acute, tonsilite/ faringite provocate de Streptococci beta de grup A. La pacienți între 12 și 18 ani: Tonsilite/faringite provocate de Streptococci beta de grup A.

Dz: Int. 800 mg o dată/zi.

Cind: Hipersensibilitate la telitramicină, la oricare alți agenți antibacterieni din clasa macrolidelor, sau la oricare dintre excipienți. Adm. concomitentă cu: cisapridă, derivați ai alcaloizilor ergotaminici, pimizidă, astemizol, terfenadină, simvastatină, atorvastatină, lovastatină. Antecedente personale sau familiale de sd. QT prelungit și la pacienții cu sindrom QT prelungit dobândit. Pacienții cu intoleranță congenitală la galactoză, deficiență de lactază Lapp sau malabsorbție la glucoză-galactoză. Alăptare.

Al: Prudență la pacienții cu boală coronariană, cu antecedente de aritmii ventriculare, cu hipokaliemie și/sau hipomagneziemie necorectate, cu bradicardie (< 50 bătăi/min) sau în timpul adm. concomitente cu agenți care prelungesc intervalul QT sau cu inhibitori puternici ai CYP 3A4 (rifampicina, fenitoina, carbamazepina, extractul de sunătoare). Diareea, mai ales cea severă, persistentă și/sau sanguinolentă, apărută în timpul trat. poate fi produsă de colita pseudomembranoasă. Prudență la pacienții cu IH. Prudență atunci când agentul patogen suspectat este S. aureus și când există probabilitatea rezistenței la eritromicină. Prudență în cazul asocierii cu: derivați ai alcaloizilor ergotaminici, statine, benzodiazepine, ciclosporină, tacrolimus, sirolimus, digoxină, teofilină, warfarină, itraconazol, ketoconazol, ritonavir. Prudență la femei însărcinate; la șoferi și activități de precizie.

RA: Tulburări gastrointestinale: diaree, greață, vărsături, dureri gastrointestinale, flatulență, constipație, anorexie, moniliază orală, stomatită. Tulburări hepato- biliare: Creșterea enzimelor hepatice (AST, ALT, fosfataza alcalină), icter colestatic. Tulburări ale sistemului nervos: amețeli, cefalee, somnolență, insomnie, nervozitate, parestezii. Tulburări ale sângelui și sistemului limfatic: eozinofilie. Tulburări ale ochilor și organelor senzoriale: tulburări ale gustului, vedere încețoșată. Tulburări ale aparatului reproducător: moniliaza vaginală. Tulburări cutanate: rash, urticarie, prurit, eczeme. Tulburări cardiovasculare: înroșirea feței, palpitații, aritmii atriale, hTA, bradicardie. Următoarele RA au fost semnalate izolat: colita pseudomembranoasă, hepatita, eritemul multiform, parosmia, edemul facial, crampele musculare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SIBUTRAMINUM
SILDENAFILUM
SILIBINUM
SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM

Cod ATC: C09CA07**MICARDIS** BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 20 mg, 40 mg, 80 mg; ct. × 2, 4, 8 sau 14 blist. × 7 cpr. (P-6L)**PRITOR** GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 40 mg, 80 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr. (S/P-6L)**Ind:** HTA esențială.**Dz:** *Adulți:* 20-80 mg o dată, zilnic. La pacienții cu afectare hepatică ușoară-moderată doza nu trebuie să depășească 40 mg/zi.**Cind:** Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți; sarcină și alăptare; afecțiuni biliare obstructive; afectare hepatică severă; afectare renală severă.**Al:** Atenție în caz de: hipertensiune renovasculară; afecțiuni renale și transplant renal; depleția volumului intravascular; alte situații asociate cu stimularea sistemului renină-angiotensină-aldosteron; hiperaldosteronism primar; stenoza aortică și mitrală, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; hiperpotasemie; afectare hepatică ușoară până la moderată; ulcer gastric sau duodenal activ, alte afecțiuni gastrointestinale; pacienții cu intoleranță ereditară la fructoză; antagoniștii angiotensinei sunt mai puțin eficace ca antihipertensive la populația neagră; reducerea excesivă a presiunii sanguine la pacienții cu cardiopatie ischemică sau ateroscleroză avansată poate provoca IM sau accident vascular cerebral. Precauție în cazul asocierii cu digoxină sau cu litiu. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.**RA:** Cefalee, infecții ale tractului respirator superior, amețeli, durere, durere de spate, fatigabilitate, diaree, sinuzită, simptome de tip gripal, dispepsie, mialgie, tuse, durere toracică, infecția tractului urinar, greață, faringită, durere abdominală, bronșită, insomnie, artralgie, anxietate, depresie, palpitații, crampe musculare (la extremitățile inferioare), rash, angioedem, scăderea hemoglobinei sau creșterea acidului uric, creșterea creatininei sau a enzimelor hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SILDENAFILUM
 SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
 SUXAMETHONII CHLORIDUM
 TACROLIMUS
 TADALAFILUM
 TALINOLOLUM
 TAMOXIFENUM
 TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM

Cod ATC: C09CA07

MICARDISPLUS® BOEHRINGER INGELHEIM; Cpr. 40/12,5 mg, 80/12,5 mg; ct. × 2, 4, 8 sau 14 blist. × 7 cpr. (P-6L)

Ind: HTA esențială. Combinația în doză fixă este indicată la pacienții a căror tensiune arterială nu este controlată adecvat numai cu telmisartan.

Dz: *Adulți:* 1 dată pe zi. La pacienții cu afectare hepatică ușoară-moderată doza nu trebuie să depășească 40/12,5 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți; hipersensibilitate la alți derivați de sulfonamidă; sarcină și alăptare; afecțiuni biliare obstructive; afectare hepatică severă; afectare renală severă; hipokaliemie refractară, hipercalcemie.

Al: Atenție în caz de: hipertensiune renovasculară; afecțiuni renale și transplant renal; depleția volumului intravascular; alte situații asociate cu stimularea sistemului renină-angiotensină-aldosteron; hiperaldosteronism primar; stenoza aortică și mitrală, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; diabet zaharat, dislipidemii; dezechilibre hidro-electrolitice; afectare hepatică ușoară până la moderată; ulcer gastric sau duodenal activ, alte afecțiuni gastrointestinale; pacienții cu intoleranță ereditară la fructoză; antagoniștii angiotensinei sunt mai puțin eficace ca antihipertensive la populația neagră; reducerea excesivă a presiunii sanguine la pacienții cu cardiopatie ischemică sau ateroscleroză avansată poate provoca IM sau accident vascular cerebral. Precauție în cazul asocierii cu digoxină sau cu litiu. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Telmisartan - Sistemul nervos: amețeală, vertij, anxietate. Aparat respirator: bronșită, faringită, sinuzită. Aparat digestiv: dureri abdominale, diaree, dispepsie, gastrită. Aparat urinar: infecții urinare. Sistemul musculo-scheletic: artralgie, mialgie. Tegumente și mucoase: eczeme. Tulburări hidroelectrolitice și metabolice: hipercolesterolemie, hipokaliemie. Tulburări endocrine: impotență.

Hidroclorotiazida - Sistemul nervos: agitație, amețeli, vertij, parestezii. Aparat respirator: dificultăți respiratorii (pneumonie, edem pulmonar). Aparat digestiv: anorexie, iritație gastrică, diaree sau constipație, pancreatită, icter colestatic intrahepatic. Aparat urinar: disfuncție renală, nefrită interstițială. Sistemul musculo-scheletic: spasme musculare, slăbiciune musculară. Ochi: xantopsie, tulburare trecătoare a vederii; Sânge: leucopenie, trombocitopenie, anemie aplastică, anemie hemolitică; Tegumente și mucoase: fotosensibilitate, rash, reacții cutanate asemănătoare lupusului eritematos, urticarie, aneită necrotizantă, necroliză epidermică toxică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SILIBINUM
 SIMETHICONUM
 SIMVASTATINUM
 SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
 SUXAMETHONII CHLORIDUM
 TACROLIMUS
 TADALAFILUM
 TALINOLOLUM
 TAMOXIFENUM
 TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM

Cod ATC: L01AX03

TEMODAL 5 mg; TEMODAL 20 mg; TEMODAL 100 mg; TEMODAL 200 mg SCHERING PLOUGH EUROPE; Cps. 5 mg, 20 mg, 100 mg sau 250 mg; ct. × 1 fl. × 5 sau 20 cps. (S/P-RF)

Ind: Gliom malign (glioblastom multiform sau astrocitom anaplazic care prezintă recurentă sau progresie după adm. terapiei standard).

Dz: Oral. *Adulți.* Pacienți care nu au fost trat. anterior cu chimioterapie: 200 mg/m², o dată/zi, timp de 5 zile, repetându-se în cicluri de 28 de zile. Pacienți care au primit anterior chimioterapie: inițial, 150 mg/m², o dată/zi, crescut la 200 mg/m²/zi în cel de-al doilea ciclu. *Copii în vârstă de 3 ani sau mai mari:* 200 mg/m², o dată/zi, timp de 5 zile, repetându-se în cicluri a 28 de zile. Pacienților copii care au primit anterior chimioterapie, li se va adm. o doză inițială de 150 mg/m², o dată/zi, timp de 5 zile, urmând ca doza să fie crescută la 200 mg/m², o dată/zi, în cursul ciclului următor, dacă nu apar manifestări toxice hematologice.

Cind: Hipersensibilitate la componentii produsului sau la dacarbazină. La pacienți cu mielosupresie severă; la femei gravide sau care alăptează.

Al: Înaintea fiecărui ciclu de trat., valoarea parametrilor de laborator trebuie să fie după cum urmează: număr absolut de neutrofile > 1,5 × 10⁹/l și număr de trombocite > 100 × 10⁹/l. În ziua a 22-a trebuie să se efectueze o numărătoare completă a celulelor sanguine (la 21 zile de la prima doză) sau în decursul următoarelor 48 de ore după ziua 21, apoi săptămânal, până în momentul în care NAN depășește 1,5 × 10⁹/l, iar numărul de trombocite depășește 100 × 10⁹/l. Dacă NAN scade sub 1,0 × 10⁹/l sau numărul de trombocite este < 50 × 10⁹/l, în cursul oricăruia dintre ciclurile terapeutice, în următorul ciclu doza se va reduce cu un nivel. Nivelurile dozelor sunt 100 mg/m², 150 mg/m² și 200 mg/m². Doza minimă recomandată este de 100 mg/m². Nu există experiență clinică privind utilizarea la copii cu vârste sub 3 ani. Precauție la pacienții vârstnici (> 70 ani). Pacienții vor fi sfătuiți să utilizeze metode contraceptive în cursul trat. și până la 6 luni de la încheierea acestuia. Prudență în cazul asocierii cu acid valproic și cu alte mielosupresoare. Nu se va adm. concomitent cu alimentele. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Grețuri, vărsături, constipație, diaree, anorexie, rash, febră, oboseală, somnolență, cefalee, astenie, algii (dureri abdominale), amețeli, scădere în greutate, dispnee, dispepsie, alopecie, rigiditate, prurit, stare de rău, pervertirea gustului, parestezii, trombocitopenie și neutropenie (gradele 3-4).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SIMETHICONUM
SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM

Cod ATC: B01AD11

METALYSE® 6000 U, METALYSE® 8000 U, METALYSE® 10000 U BOEHRINGER INGELHEIM; Pulb. inj. + solvent pt. sol. 1000 U/ml; ct. × 1 fl. cu pulb. + seringă preumplută cu solvent + dispozitiv de transvazare aseptică (S/P-RF)

Ind: Tratamentul trombolitic al infarctului miocardic acut (IMA).

Dz: Administrare în funcție de greutatea corporală: < 60: 6000 U (30 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 6 ml); □ 60 la < 70: 7000 U (35 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 7 ml); □ 70 la < 80: 8000 U (40 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 8 ml); □ 80 la < 90: 9000 U (45 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 9 ml); □ 90: 10000 U (50 mg tenecteplază; volum soluție reconstituită, 10 ml). Adm. în bolus i.v. unic în decurs de 5-10 secunde (linia i.v. se spală după administrarea tenecteplazei pentru o administrare corespunzătoare). Se poate adm. o linie i.v. pe care s-a administrat clorură de sodiu. Nu se asociază cu alte produse în sol. inj. sau la linia de perfuzie. Incompatibilă cu sol. de glucoză.

Cind: Hipersensibilitate la tenecteplază sau excipienții produsului. Nu se administrează în caz de: tulburări hemoragice semnificative actuale sau în ultimele 6 luni, diateză hemoragică cunoscută; pacienții care urmează curent tratament anticoagulant oral (INR > 1,3); antecedente de leziuni ale sistemului nervos central (de exemplu, neoplasm, anevrism, intervenții chirurgicale intracraniene sau la nivelul coloanei vertebrale); hipertensiune arterială severă necontrolată; intervenții chirurgicale majore, biopsie a unui organ parenchimos sau leziuni semnificative în ultimele 2 luni (inclusiv orice leziuni asociate cu IMA), leziuni recente la cap sau craniu; resuscitare cardiopulmonară prelungită (>2 minute) sau traumatică în ultimele 2 săptămâni; disfuncții hepatice severe, inclusiv insuficiență hepatică, ciroză hepatică, hipertensiune portală (varice esofagiene) și hepatită activă; retinopatie diabetică hemoragică sau alte condiții de hemoragie oftalmică; ulcer peptic activ; anevrism arterial și malformații arteriale/venoase cunoscute; neoplasm cu risc hemoragic crescut; pericardită acută și/sau endocardită bacteriană subacută; pancreatită acută.

Al: Tratamentul se monitorizează de către medicii specialiști. Risc mare de sângerare, mai ales la asocierea cu anticoagulante, heparină. Frecvența hemoragiilor este mai mare la locul de injectare; ocazional: la nivel genito-urinar și gingival. Prudență la administrare în situațiile: tensiune arterială sistolică > 160 mmHg; antecedent cunoscut sau suspionat de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitor; sângerare gastrointestinală sau genitourinară recentă (în ultimele 10 zile); injecție i.m. recentă (în ultimele 2 zile) cunoscută; vârstă avansată, peste 75 ani; greutate corporală mică < 60 kg; afecțiuni cerebrovasculare. Crește riscul accidentelor tromboembolice la pacienți cu stenoză mitrală sau fibrilație atrială..

RA: Sângerări superficiale, în mod normal la locul de injectare, sângerări interne la nivelul tractului gastrointestinal sau urinar, hemopericard, hemoragii pulmonare, sângerări retroperitoneale și hemoragii cerebrale (inclusiv simptomele neurologice respective, cum sunt somnolență, afazie, convulsii). La pacienții care au suferit un accident

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: P01AX08

SIMVASTATINUM
SIROLIMUS
SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM

ATRICAN 250 LAB. INNOTECH INTERNATIONAL; Cps. 250 mg; ct. × 1 blist. × 8 cps. (P-RF)

Ind: Tricomonas urogenital.

Dz: *Adulți:* 1 cps. dimineața și seara, în timpul meselor, timp de 4 zile. Urmează tratamentul și partenerul indiferent dacă prezintă sau nu semnele clinice.

Cind: Hipersensibilitate, IH. Asocierea cu alcool. Sarcină și alăptare.

Al: Nu se utilizează lentile de contact pe durata tratamentului.

RA: Greață, senzație de greutate gastrică, inapetență, colorarea în galben a lentilelor de contact.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M01AC02

SIROLIMUS
 SODIUM PICOSULFAS
 SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
 SUXAMETHONII CHLORIDUM
 TACROLIMUS
 TADALAFILUM
 TALINOLOLUM
 TAMOXIFENUM
 TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM

NEO-ENDUSIX® ANFARM HELLAS; Cpr. film. 20 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-6L)

NEO-ENDUSIX® ANFARM HELLAS; Pulb. pt. sol. inj. 20 mg; ct. × 1 fl. pulb. + 1 fiolă solv. × 2 ml (P-RF)

TENOXICAM ARENA GROUP SA; Cpr. 20 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-6L)

TENOXICAM LPH® 20 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. 20 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-6L)

TENOXICAM 20 mg LAROPHARM SRL; Cps. 20 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-6L)

TENOXICAM 20 mg SICOMED SA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 1 blist. × 25 cpr. (P-6L)

TILCOTIL HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 20 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-6L)

TILCOTIL HOFFMANN LA ROCHE; Pulb. liof. pt. sol. inj. 20 mg; ct. × 5 fl. pulb. + 5 fiole solv. × 2 ml (P-RF)

Ind: Afecțiuni inflamatorii și degenerative dureroase ale sistemului osteomuscular: artrită reumatoidă; osteoartrită; artroză; spondilită anchilopoietică; afecțiuni extra-articulare, de exemplu tendinită, bursită, periartrită umerală sau de șold, întinderi ligamentare, entorse; gută acută; durere postoperatorie; dismenoree primară.

Dz: Toate indicațiile (în afară de dismenoree primară, durere postoperatorie și gută acută): 20 mg/zi. Dismenoree primară: 20-40 mg/zi. Dureri postoperatorii: 40 mg/zi, max. 5 zile. Crizele acute de artrită cauzată de gută: 40 mg/zi, 2 zile, urmată de 2 mg/zi, 5 zile. Trat. poate fi instaurat prin adm. i.v. sau i.m. o dată pe zi timp de 1-2 zile și continuat apoi pe cale orală sau rectală.

Cind: Hipersensibilitate la medicament sau alte AINS; celor care suferă sau au suferit de afecțiuni ale tractului gastrointestinal superior, cum ar fi gastrite, ulcer gastric și duodenal. Al treilea trimestru de sarcină. Perioada de alăptare.

Al: Este necesar să se monitorizeze în special funcțiile cardiacă și renală. Inhibă agregarea plachetară și poate afecta hemostaza. Pacienții cu tulburări de coagulare sau care beneficiază de trat. medicamentos care afectează hemostaza vor trebui supravegheați cu atenție. Pacienții care prezintă simptome gastrointestinale vor fi monitorizați cu atenție. Dacă se manifestă reacții cutanate severe (sindromul Lyell sau Stevens-Johnson), trat. va fi întrerupt imediat. Se recomandă efectuarea unor controale oftalmologice în cazul pacienților care dezvoltă tulburări de vedere. Precauție atunci când nivelele albuminei plasmatice sunt reduse semnificativ. Poate masca simptomele comune ale infecției. Atenție în cazul trat. asociat cu salicilat sau cu alte AINS, metotrexat, litium, diuretice care cruță potasiul, blocați alfa-adrenergici și IEC, anticoagulante sau antidiabetice orale.

RA: Tract gastrointestinal: disconfort gastric, epigastric și abdominal, dipepsie, greață, constipație, diaree, stomatită, gastrită, vomă, sângerare gastrointestinală, ulcer, melenă, perforare a tractului gastrointestinal. SNC: amețeală, cefalee, fatigabilitate, tulburări ale somnului, pierderea pozei de mâncare, uscăciune a gurii, vertij, tulburări de vedere. Piele: prurit, eritem, exantem, rash, urticarie, sindromul Stevens-Johnson și Lyell, reacții de fotosensibilitate, vasculită. Tractul urinar și rinichi: Creștere a ureei sanguine sau a creatininei, edem. Ficat și tractul biliar: Creștere a activității enzimactice a ficatului, hepatită. Sistemul cardiovascular: palpitații, HTA. Sânge-

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SODIUM PICOSULFAS
SOLIFENACINUM SUCCINATE
SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM

Cod ATC: G04CA03, C02CA05

HYTRIN® 2 mg; HYTRIN® 5 mg; HYTRIN® 10 mg ABBOTT; Cpr. 2 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)
HYTRIN® BPH STARTER PACK ABBOTT; Cpr. 1 mg + 2 mg; ct. × 1 blist. × 7 cpr. × 1 mg + 1 blist. × 7 cpr. × 2 mg (P-6L)
TERAZOSIN EGIS PHARSMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: HTA; trat. simptomatic al adenomului de prostată.

Dz: Int. *Adulți:* HTA: Inițial 1-5 mg/zi, seara la culcare. Adenom de prostată: În prima zi: 1 mg seara la culcare, se continuă cu 2 mg/zi timp de o săptăm., apoi se crește până la 5-10 mg/zi, ca doză de întreținere. Doza max. 20 mg.

Cind: Hipersensibilitate la terazosin sau la alți antagoniști alfa-adrenergici cu structură chimică asemănătoare.

Al: Se pot produce scăderi marcate ale TA, cu caracter predominant ortostatic, care pot fi însoțite de tahicardie. Simptomele clinice constau în amețeli, cădere, chiar pierderea trecătoare a conștienței. *Atenție!* căderea poate fi cauză de accidente traumatiche. În caz de sincopă pacientul trebuie menținut în poziție culcată. Trebuie adm. cu precauție persoanelor cu predispoziție cunoscută la hTA ortostatică, în caz de cardiopatie ischemică, ateroscleroză cerebrală avansată sau alte tulburări cerebrovasculare, diabet zaharat insulino-dependent, IH sau IR. Nu este recomandabil în caz de carcinom de prostată. TA a pacienților cu adenom de prostată trebuie controlată la începutul trat. și atunci când se cresc dozele. Adm. la copii nu este recomandată. Prudență când se asociază cu alte antihipertensive sau cu diuretice. Prudență la femeile însărcinate sau la cele care alăptează. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Hipotensiune de primă doză, hTA ortostatică, vertij, stare de slăbiciune, edeme periferice, tahicardie, palpitații, angină pectorală, creștere în greutate, dispnee, mialgii, tulburări de vedere, congestie nazală, greață, vărsături sau alte tulburări gastro-intestinale, cefalee, scăderea libidoului și impotență.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SOLIFENACINUM SUCCINATE
 SOMATROPINUM
 SORBITOLUM
 SOTALOLUM
 SPECTINOMYCINUM
 SPIRAMICINUM
 SPIRONOLACTONUM
 SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
 SUXAMETHONII CHLORIDUM
 TACROLIMUS
 TADALAFILUM
 TALINOLOLUM
 TAMOXIFENUM
 TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
 TENOXICAMUM
 TERAZOSINUM
TERBINAFINUM

Cod ATC: D01AE15, D01BA02

LAMISIL® NOVARTIS PHARMA; Cpr. 250 mg; ct. × 1 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)
LAMISIL® cremă NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15 g (*OTC*)
LAMISIL® DERMAGEL NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Gel 1%; ct. × 1 tub × 15 sau 30 g (*OTC*)
ONYCHON 125; ONYCHON 250 ZENTIVA AS; Cpr. 125 mg, 250 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 7 cpr. (*P-RF*)
TERBISIL® 250 mg RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. 250 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)
TERBISIL® 250 mg RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. 250 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 14 cpr. (*P-RF*)
TERBISIL® cremă 1% RICHTER GEDEON Ltd.; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 15 g (*OTC*)

Ind: Infecții fungice ale pielii produse de dermatofiți (*Trichophyton*, *Microsporum canis* și *Epidermophyton floccosum*). Infecții ale pielii produse de levuri, în special din genul *Candida*. Pityriasis versicolor (numai forma topică).

Dz: *Int.* 250 mg, o dată pe zi. Durata trat. variază, în funcție de indicație și de severitatea infecției, între 2-6 săptăm. și până la 6 luni. *Adm. topică:* 1-2 aplicații/zi. Durata trat.: 1-4 săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la terbinafină sau la oricare dintre excipienții conținuți în cremă. Perioada de alăptare.

Al: Pacienții cu disfuncție hepatică preexistentă stabilă sau cu funcție renală afectată trebuie să primească 1/2 din doza int. obișnuită. Crema este destinată numai uzului ext. Trebuie evitat contactul cu ochii. Când este necesară adm. int. concomitentă cu medicamente inductoare ale metabolismului sau medicamente care inhibă citocromul P450a, poate fi necesară ajustarea dozei. Prudență la femei însărcinate (în cazul adm. int.).

RA: După adm. int.: simptomele gastrointestinale (senzație de plenitudine, inapetență, greață, dureri abdominale ușoare, diaree), reacții cutanate (erupții, urticarie, sindrom Stevens-Johnson, necroză epidermică toxică), tulburări ale funcției gustative, disfuncție hepato-biliară. După adm. topică: eritem local, prurit sau senzație de usturime, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

SOMATROPINUM
SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R03CC03**AIRONYL SEDICO**; Sirop 1,5 mg/5 ml; ct. × 1 fl. × 120 ml (**P-6L**)**Ind:** Astm bronșic; bronșită cronică; emfizem; alte afecțiuni respiratorii cu bronhospasm ca factor de complicație.**Dz:** *Inhalator: Adulți și copii peste 12 ani:* 0,25-0,5 mg la nevoie. În cazuri severe, se pot adm. 1,5 mg o dată. Doza totală în 24 h nu trebuie să depășească 6 mg. *Copii între 3-12 ani:* 0,25-0,5 mg la nevoie. În cazuri severe se poate adm. 1 mg o dată. Doza totală în 24 h nu trebuie să depășească 4 mg. *Int.: Adulți:* În primele 1-2 săpt.: 2,5 mg de 3 ori/zi. Ulterior, dacă este necesar, doza poate fi crescută la 5 mg de 3 ori/zi. *Copii:* 0,075 mg/kg de 3 ori/zi. Dacă nu s-a obținut răspunsul adecvat, doza poate fi dublată.**Cind:** Hipersensibilitate la terbutalină sau la oricare dintre ingrediente. HTA severă, IC, cardiomiopatie hipertrofică, hipertiroidism, cei sensibili la aminele simpatomimetice, eclampsie, preeclampsie, hemoragie uterină.**Al:** Prudență la pacienții cu susceptibilitate crescută la aminele simpatomimetice. La pacienții astmatici cu diabet concomitent, aflați la începutul trat. cu terbutalină, se recomandă teste adiționale ale glicemiei. Prudență în cazul trat. concomitent cu derivați xantini, steroizi, diuretice sau de hipoxie (trebuie monitorizate nivelele serice de potasiu). Prudență în primul trimestru de sarcină.**RA:** *Adm. inhalator:* tremor, cefalee, crampe musculo-tonice, palpitații, urticarie și exantem, tulburări de somn și tulburări comportamentale (agitație, hiperactivitate, stare de neliniște), bronhospasm. *Adm. int.:* tremor, cefalee, vertij, crampe musculo-tonice, palpitații, tahicardie, greață, vărsături, urticarie și exantem, la copii s-au observat tulburări de somn și tulburări comportamentale, pot să apară reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: H05AA02

SORBITOLUM
SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM

FORSTEO® LILLY FRANCE; Sol. inj. 20 µg/80 µl; ct. × 1 sau 3 stilouri preumplute × 3 ml (*P-RF*)

Ind: Tratamentul osteoporozei stabilite la femeile în postmenopauză.

Dz: 20 µg/zi prin injecție s.c. în coapsă sau abdomen. Durata max. a trat. 18 luni. Pacientele trebuie să primească suplimente de calciu și de vitamina D dacă aportul prin dietă este inadecvat. Nu este necesară ajustarea dozelor în funcție de vârstă.

Cind: IR severă. Prudență la pacientele cu deficit renal moderat. Forsteo nu trebuie folosit la copii sau la adulții tineri cu epifize deschise. Hipersensibilitate la teriparatid sau la oricare din excipienții săi. Hipercalcemie preexistentă. Boală osoasă metabolică, alta decât osteoporoza primară (inclusiv hiperparatiroidia și boala Paget a oaselor). Creșteri neexplicate ale fosfatazei alcaline. Radioterapie scheletală anterioară. Litiază renală/urinară activă sau recentă.

Forsteo nu trebuie folosit în cursul sarcinii sau de către femeile care alăptează.

Al: La pacientele normocalcemice, în urma adm. teriparatid s-au observat creșteri ușoare și tranzitorii ale concentrațiilor calciului seric. Concentrațiile calciului seric ating maximum la 4 până la 6 ore și revin la valorile inițiale la 16 până la 24 ore după fiecare doză de teriparatid. În cursul terapiei nu este necesară monitorizarea de rutină a calciului. În consecință, dacă de la pacientă se recoltează orice fel de probe de sânge, acest lucru trebuie făcut după cel puțin 16 ore de la injecția cea mai recentă. Forsteo poate să cauzeze mici creșteri ale excreției urinare de calciu, dar incidența hipercalcemiei nu a diferit față de cea de la pacientele tratate cu placebo în studiile clinice. Crește concentrațiile serice ale acidului uric.

RA: S-au observat episoade izolate de hTA ortostatică tranzitorie și amețeli. Evenimentul începe în decurs de 4 ore de la adm. și se rezolvă în câteva minute până la câteva ore. Cele mai frecvente RA sunt greața, durerile membrelor, cefaleea și amețeala.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SOTALOLUM
SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM

Cod ATC: H01BA04**REME STYP FERING LEC/VA**; Sol. inj. 100 µg/ml; ct. × 5 f. × 2 ml (*P-RF*)**Ind:** Hemoragii ale tractului gastro-intestinal și hemoragii genito-urinare (varice esofagiene, ulcer gastric cu hemoragie și operații în sfera abdominală și genito-urinară).**Dz:** *Perf.:* i.v. in bolus 1 mg. Durata de acțiune este de 2-8 ore, doza putând fi repetată până la de 3 ori/zi. *Adulți:* 5-20 mg/kg/8 ore. Stabilirea dozei se face în funcție de rata sângerării, durata sângerării și cantitatea de sânge pierdut, în prezența simptomelor de HTA sau șoc. În operațiile în sfera abdominală complicate cu hemoragie intraoperatorie se adm. încet 4 fiole i.v., astfel încât efectul să se mențină pe toată durata operației. Durata trat. variază de la o doză unică la 7 zile de trat.**Cind:** Primele 2-3 săpt. de sarcină, epilepsie.**Al:** Boli cardiace, ischemie, HTA severă, aritmii și astm bronșic. Vârstnici.**RA:** Paloare, contracții uterine, intensificarea peristaltismului intestinal până la colici abdominale, eructații, greață, variații ale TA, dispnee, necroză la locul inj.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

SPECTINOMYCINUM
SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C07AA16**EVARTAN** LAB. SERVIER; Cpr. 5 mg; ct. × 1 blist. × 30 cpr. (P-6L)**Ind:** Hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică.**Dz:** Doza recomandată este de 5 mg/zi, în priză unică, dimineața. Poate fi administrat înainte, în timpul sau după micul dejun, deoarece biodisponibilitatea orală nu este influențată de medicamente.**Cind:** Astm bronșic și bronhopneumopatia cronică obstructivă, insuficiență cardiacă necontrolată prin tratament, șoc cardiogen, bloc atrioventricular de gradul doi sau trei fără pacemaker, angina Prinzmetal, boală sinusală (inclusiv blocul sinoatrial), bradicardie (< 45-50 /min), fenomenul Raynaud și boli arteriale periferice, feocromocitom netratat, hipotensiune arterială, hipersensibilitate la tertatolol sau la oricare dintre excipienții produsului, insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 10 ml/min, ca și măsură de precauție în lipsa studiilor), antecedente de reacție anafilactică.**Al:** Tratamentul cardiopatiei ischemice nu trebuie întrerupt brusc, deoarece simptomele bolii sunt agravate. Se impune precauție la pacienții cu bradicardie, bloc atrio-ventricular, feocromocitom.**RA:** Cele mai frecvente: astenie, răcirea extremităților, bradicardie, tulburări gastro-intestinale (gastralgie, greață și vărsături), impotență sexuală, insomnie și coșmaruri; mult mai rare: încetinirea conductibilității atrioventriculare sau accentuarea blocului atrioventricular existent, insuficiență cardiacă, scăderea brutală a tensiunii arteriale, bronhospasm, hipoglicemie, sindrom Raynaud, agravarea claudicației intermitente, reacții cutanate, inclusiv erupții psoriaziforme.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

SPIRAMICINUM
SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G03BA03**NEBIDO** SCHERING AG; Sol. inj. testosteron undecanoat 1000 mg/4 ml; ct. × 1 f. × 4 ml (S/P-RF)**UNDESTOR TESTOCAPS** N.V. ORGANON; Cps. 40 mg; ct. × 3, 6 sau 12 blist × 10 cps. (P-RF)

Ind: La bărbați: eunucoidism, impotență sau sterilitate prin deficit androgenic; criptorhidie post-pubertală cu hipogonadism; ca medicație adjuvantă în stări de deficit proteic. La femei: tulburări de climacterium, dismenoree, sângerări uterine funcționale, mastită cronică; pt. prevenirea tumefacției dureroase a sânilor post-partum și pt. suprimarea lactației; ca trat. paliativ în cancerul mamar progresiv și cancerul endometrial.

Dz: Inj. i.m. 1 fiolă (1000 mg) la intervale de 10-14 săptămâni. Injecțiile vor fi făcute foarte lent. Int. bărbați: 10-50 mg/zi; femei: 50-200 mg/zi; copii: 10-30 mg/zi sau la 2-3 zile, pe o durată limitată, de 4-6 luni. Este de preferat ca 1/2 din doză să fie luată dimineața și 1/2 seara.

Cind: Alergie la androgeni, policitemie, suspiciune sau diagnostic de carcinom de prostată, adenom de prostată, carcinom mamar la bărbați, boli hepatice grave, nefroză. În sarcină și în perioada de alăptare.

Al: Prudență la bolnavi cu IC, HTA, afecțiuni hepatice și renale, ateroscleroză avansată, migrenă, epilepsie sau alte afecțiuni în care retenția salină este dăunătoare, hipertrofie prostatică. La pacienții cu cancer mamar, trat. cu androgeni poate cauza hipercalcemie prin osteoliză. Adm. prelungită de doze mari se poate asocia cu hepatită și icter și, în cazuri mai grave, cu neoplasm hepatic. Precauție la adm. testosteronului în pubertatea întârziată. Figurează pe lista substanțelor dopante (interzise la sportivi). Precauție în cazul asocierii cu: barbiturice, fenilbutazonă, anticoagulante cumarinice, sulfamide antidiabetice.

RA: Endocrinologice și urogenital: femei - amenoree și alte dereglări menstruale, inhibarea secreției de gonadotropină, virilizare, virilizarea fătului feminin în cazul adm. la gravide; bărbați - ginecomastie, oligospermie, dureri testiculare, priapism. Cutanate: schimbări de culoare ale pielii, hirsutism, acnee. Electroliți și fluide: retenție de sodiu, potasiu, calciu, cloruri, fosfați anorganici și apă. Gastrointestinale și hepatice: diaree, greață, icter colestatic, alterarea probelor hepatice, rar neoplasm celular. Sanguine: hemoragii la pacienții aflați sub trat. cu anticoagulante, policitemie. SNC: creșterea sau diminuarea libidoului, dureri de cap, anxietate, depresie, parestezie generalizată. Metabolice: bilanț pozitiv al azotului, colesterol seric crescut. În cazuri rare, poate apărea o reacție anafilactică. Durere și hematom la locul injectării.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

SPIRONOLACTONUM
SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM

DESCRIERE

INFO

CODATC:H01AA02**SYNACHTEN DEPOT** NOVARTIS PHARMA; Susp. inj. 1 mg/ml; ct. × 1 sau 10 f. x 1 ml (**P-RF**)

Ind: *Boli neurologice:* exacerbări acute la pacienții cu scleroză multiplă; encefalopatie mioclonică infantilă. *Boli reumatice:* ca trat. de scurtă durată în situațiile care indică trat. cu glucocorticoizi. *Boli cutanate:* pemfigus, eczeme cronice severe, forme eritrodermale sau pustuloase de psoriazis. *Boli ale tractului gastrointestinal:* colită ulcerosă și enterita regională. Oncologie: creșterea toleranței la chimioterapie.

Dz: *Adulți:* inițial, 1 mg i.m./zi; în cazurile acute sau în indicațiile oncologice, se poate adm. 1 mg la 12 ore. După atenuarea manifestărilor acute: 1 mg o dată la 2-3 zile; în cazul unui răspuns bun la trat., doza se va reduce la 0,5 mg la 2-3 zile, sau 1 mg pe săpt. *Nou-născuți:* inițial este de 0,25 mg i.m. zilnic; doza de întreținere este de 0,25 mg la 2-8 zile. *Copii mici:* inițial: 0,25-0,50 mg i.m. zilnic; doza de întreținere: 0,25-0,50 mg la 2-8 zile. *Copii de vârstă școlară:* inițial: 0,25-1 mg i.m. zilnic; doza de întreținere: 0,25-1 mg la 2-8 zile.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la tetracosactid și/sau ACTH de origine animală, psihoze acute, boli infecțioase, ulcer peptic, IC refractară, sindrom Cushing, insuficiență corticosuprarenală, sindrom adrenogenital, sarcină și lactație, în trat. astmului sau altor afecțiuni alergice, la nou-născuți.

Al: Înaintea utilizării, trebuie să ne asigurăm că pacientul nu suferă de o afecțiune alergică și că nu este în general susceptibil la alergii. Apariția reacțiilor locale sau sistemice de hipersensibilizare în timpul sau după o injecție impune oprirea adm. Poate fi necesară, ocazional, substituția cu potasiu. Creșterea staturală a copiilor tratați timp îndelungat trebuie monitorizată. La sugarii și copiii mici tratați cu tetracosactid trebuie efectuate regulat ecocardiografii. Precauție în cazul pacienților cu herpes ocular. Precauție în cazul pacienților cu tuberculoză latentă sau reactivitate la tuberculină. Precauție la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Reacții de hipersensibilitate: reacții cutanate la locul injecției; amețeală, greață, vărsături, urticarie, prurit, flushing, dispnee, edem angioneurotic sau edem Quinke. Sistemul musculoscheletal: osteoporoză, oboseală musculară, miopatie steroică, pierderea masei musculare, fracturi prin compresie vertebrală, necroză aseptică de cap femural sau humeral, fractură patologică a oaselor lungi, rupturi tendinoase. Gastrointestinal: Ulcer peptic cu posibilă perforare și hemoragie, pancreatită, flatulență, esofagită ulcerativă. Piele și mucoase: piele subțire, peteșii și echimoze, eritem facial, supresia răspunsului la testele alergice cutanate, acnee, pigmentarea pielii. SNC: convulsii, creșterea presiunii intracraniene cu edem papilar, vertij, cefalee, tulburări psihice. Endocrin: retenție lichidiană, pierderea potasiului și calciului, alcaloză hipokaliemică, modificări ale ciclului menstrual, sindrom Cushing, încetarea procesului de creștere la copii, scăderea toleranței la glucoză, hiperglicemie, manifestarea diabetului latent, hirsutism. Ochi: cataractă posterioară subcapsulară, creșterea presiunii intraoculare, glaucom, cataractă. Cardiovascular: creșterea TA, IC congestivă; hipertrofia miocardică reversibilă poate apărea în cazuri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM
 STAVUDINUM
 STREPTOKINASUM
 STREPTOMYCINUM
 STRONTIUM CLORIDE
 STRONTIUM RANELATUM
 SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
 SUXAMETHONII CHLORIDUM
 TACROLIMUS
 TADALAFILUM
 TALINOLOLUM
 TAMOXIFENUM
 TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
 TENOXICAMUM
 TERAZOSINUM
 TERBINAFINUM
 TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM

Cod ATC: J01AA07, D06AA04

TETRACICLINĂ LEK PHARMATECH; Cps. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
TETRACICLINĂ 250 mg SICOMED SA; Cps. 250 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
TETRACICLINĂ ARENA GROUP SA; Cps. 250 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. (P-RF)
TETRACICLINĂ 250 mg ANTIBIOTICE SA; Cps. 250 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
TETRACICLINĂ 250 mg EUROPHARM SA; Cps. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
TETRACICLINĂ CLORHIDRAT ANTIBIOTICE SA; Ung. 3%; ct. × 1 tub × 12 g (P-RF)

Ind: Rickettsioze, infecții respiratorii și urinare cu germeni sensibili, limfogranuloza benignă, febră recurentă, șancru moale, pestă, bruceloză; ca medicație de rezervă în gonoree, lues, actinomicoză ș.a., infecții cu microorganisme rezistente la penicilină; adjuvant util în amoebiaza intestinală acută și acnee severă, în trahom ș.a. Ca trat. local în acnee și în infecții ale pielii cu streptococi, stafilococi și alți germeni sensibili la tetraciclina. Unguentul oftalmic este indicat în trat. infecțiilor oculare externe ca: blefarite acute și cronice, conjunctivite purulente acute și cronice, hordeolum, blefaroconjunctivite, ulcere ale corneei, infecții secundare la pacienții cu Herpes corneae și tracom; în prevenirea infecțiilor ca urmare a unei intervenții chirurgicale oftalmice.

Dz: Adm. sistemică: *Adulți:* 1-2 g/zi, în 4 prize egale la 6 ore. *Copii (peste 7 ani):* 25-50 mg/kg/zi, în 4 prize egale la 6 ore. La pacienții cu afecțiuni renale se adm. în doze mai mici sau mai rare. Tetraciclina se adm. cu 1 h înainte sau 2 h după masă. *Aplicații cutanate:* în strat subțire, pe întreaga suprafață afectată, de 1-2 ori/zi. Ung. oft. se va aplica în sacul conjunctival inferior la fiecare 2 ore. Ung. se răspândește imediat, prin clipire. Durata trat. depinde de severitatea infecției. Trat. se va aplica încă 2-3 zile de la dispariția simptomelor.

Cind: Alergie cunoscută la tetraciclina sau la oricare din componentii produsului. În a doua jumătate a sarcinii și la copii sub 7 ani. Adm. concomitentă cu peniciline sau cefalosporine.

Al: Unguentul cu tetraciclina nu este indicat pentru trat. piodermitelor, furunculozei, ulcerului varicos, infecțiilor cutanate cu bacterii rezistente la antibiotic și micozelor cutanate. Folosirea pentru profilaxia infecțiilor cutanate superficiale nu este recomandabilă. Unguentul nu trebuie aplicat pe înțepături, plăgi adânci sau arsuri fără avizul medicului. Se recomandă respectarea unui interval de o oră până la aplicarea altui medicament topic pentru acnee. Precauție în cazul asocierii cu: retinoizi, anticoagulante orale, săruri de fier, săruri și oxizi de aluminiu și magneziu. Poate pozitivă fals glucoza urinară, interferează cu dozarea prin fluorescență a catecolaminelor urinare.

RA: Fenomene gastrice: greață, vomă, diaree, colici abdominale, pancreatită; tulburări pe mucoase: stomatite, glosite, vaginite, rectite, erupții cutanate; creșterea ureei în sânge la cei cu IR; pigmentarea dinților, carii; depuneri în oase, chiar tulburări de creștere; reacții alergice, fotosensibilizare. Reacții locale: durere, eritem cutanat, edem sau semne de iritație locală. Sunt posibile modificarea sensibilității germenilor și suprainfecții locale, inclusiv micotice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M03BX07

STAVUDINUM
STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM

MYOLASTAN® 50 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. film. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

RELAXAM AC HELCOR SRL; Cpr. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**

Ind: Contracturi musculare.

Dz: *Adulți:* 50-150 mg/zi (repartizate în 2-3 prize zilnice). La *vârstnici* se recomandă diminuarea dozei. Durata trat. este de câteva zile. Întreruperea trat. trebuie să se facă progresiv.

Cind: Alergie la benzodiazepine, insuficiență respiratorie, miastenie.

Al: Poate antrena dependență fizică și psihică. Prudență în afecțiuni hepatice, renale sau musculare; în sarcină și alăptare; la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Somnolență, tulburări de memorie, erupții cutanate, amețeli.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

STREPTOKINASUM
STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V09GA02

MYOVIEV® GE HEALTHCARE Ltd.; Liof. pt. sol. inj. 0,23 mg; trusă × 2 fl. sau 5 fl. (S)

Ind: Adjuvant în diagnosticul și localizarea ischemiei miocardice și/sau a IMA.

Dz: Pt. diagnosticul și localizarea ischemiei miocardice procedura recomandată implică două inj. i.v. de ^{99m}Tc-tetrofosmin. *Adulți și vârstnici:* se adm. 185-250 MBq în momentul efortului maxim, apoi 500-750 MBq în repaus după aproximativ 4 ore. Doza adm. trebuie limitată la 1000 MBq/zi. Ca adjuvant în diagnosticul și localizarea IM, este suficientă o singură inj. de ^{99m}Tc-tetrofosmin (185-250 MBq) în repaus.

Cind: În sarcină și la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la tetrofosmin sau la oricare din excipienți.

Al: Conținutul fl. trebuie folosit doar la prepararea sol. inj. radioactive tehnetyu-^{99m}. Asocierea cu medicamente care influențează funcția miocardului și/sau fluxul sanguin, de exemplu, blocantele beta-adrenergice, blocantele canalelor calciului sau nitratii, pot duce la rezultate fals negative în diagnosticul bolilor coronariene. Precauție în cazul femeilor care alăptează.

RA: Senzație de căldură generalizată, vomă, dureri de cap, amețeală, un gust metalic pasager, perturbări ale mirosului sau o senzație ușoară de arsură în gură după injectare. Reacții de hipersensibilitate, incluzând flush-ul, senzații de usturime, rash urticarian sau eritematos, edem facial, hTA și dispnee. Creșteri pasagere ale numărului leucocitelor. Cazuri izolate de reacții anafilactice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

STREPTOMYCINUM
STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM

Cod ATC: R01AA06, S01GA02**TYZINE® PFIZER**; Sol. nazală 0,05%, 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)**VASOPOS® N URSAPHARM**; Sol. oft. 0,05%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)**VISINE® PFIZER**; Sol. oft. 0,05%; ct. × 1 fl. × 15 ml (OTC)

Ind: Decongestionant; la pacienții cu rinită, rinită alergică, faringită, sinuzită; în scop diagnostic; la pacienții cu iritații oculare, la pacienții cu inflamații alergice.

Dz: Adm. nazală: *adulți și copii peste 6 ani:* 2-4 pic. (sol. 0,1%) o dată; *copii între 2-6 ani:* 2-3 pic. (sol. 0,05%) o dată. Se repetă la nevoie, la intervale de max. 4 h. Max. 3-5 zile. Adm. oft.: 1-2 pic. în fiecare ochi afectat de 2-3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la tetrazolină sau la oricare dintre componentii produsului; rinită atrofică; afecțiuni cardiovasculare severe; copii sub 2 ani, glaucom cu unghi închis.

Al: Nu trebuie utilizată timp îndelungat. Prudență la pacienții cu angină pectorală, tahiaritmii, HTA, feocromocitom, hipertiroidie, ateroscleroză, glaucom cu unghi închis, afecțiuni metabolice. Sol. naz. 0,1% nu se va adm. copiilor între 2 și 6 ani. Prudență în cazul asocierii cu: IMAO, anestezice generale, insulină, atropină, propranolol, guanetidină, rezerpină. Prudență în perioada sarcinii și alăptării. În cazul adm. oft., prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie.

RA: Reacții sistemice (extrasistole, cefalee, tremor, oboseală, transpirație, HTA), hiperemie reactivă, senzație de arsură la nivelul mucoasei, congestie nazală cronică, afectarea epitelului mucoasei nazale cu inhibarea activității ciliare sau cu apariția rinitei atrofice. În cazul aplicării conjunctivale: înțepături oculare, arsuri, hiperemie reactivă, vedere neclară, iritație conjunctivală, midriază.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

STRONTIUM CLORIDE
STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R03DA04

TEOFILINĂ SR 50 mg; TEOFILINĂ SR 100 mg; TEOFILINĂ SR 200 mg; TEOFILINĂ SR 300 mg TERAPIA SA; Cps. cu elib. prel. 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)

TEOTARD® 200; TEOTARD® 350 KRKA; Cps. ret. 200 mg, 350 mg; ct. × 4 blist. × 10 cps. (P-RF)

THEO SR 100; THEO SR 200; THEO SR 300 GLAXO SMITHKLINE;

Cps. elib. prel. 100 mg, 200 mg sau 300 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (100 mg); ct. × 1 blist. × 10 cps. (200 mg, 300 mg) (P-RF)

Ind: Prevenirea și trat. dispneei datorate bronho-spasmului din BPOC.

Dz: Optim, dozarea se va face în funcție de concentrația plasmatică a teofilinei (8-20 µg/ml). **Adulți:** doza de întreținere, 11-13 mg/kg/zi. **Copii: 8-12 ani (25-40 kg):** max. 20 mg/kg/zi. **Tineri: 12-16 ani (40-60 kg):** max. 18 mg/kg/zi. Se va lua după mese, nemestecată.

Cind: IM recent, tahiaritmii acute.

Al: Precauție în caz de: angină instabilă, predispoziție la tahiaritmii, HTA severă, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă severă, hipertireoză, crize epileptice, ulcer gastroduodenal, porfirie, disfuncții hepatice sau renale ca și la vârste înaintate. Nivelele serice ale teofilinei trebuie monitorizate periodic. Precauție în cazul asocierii cu: cafeină, beta-2-simpatomimetice, barbiturice, carbamazepină, fenitoină, rifampicină, primidon, sulfinpirazon, isoproterenol, hidroxid de magneziu, contraceptive orale, antibiotice macrolide, antagoniști de calciu, cimetidină, hidrazină, alopurinol, propranolol, propafenonă, interferon, ranitidină, ciprofloxacilină, enoxacină, carbonat de litiu, beta-blocanților, halotan. Precauție în cursul sarcinii și în perioada de alăptare.

RA: Cefalee, agitație, tremurături ale membrilor, neliniște, insomnii, frecvență cardiacă crescută, ritm cardiac neregulat, palpitații, hTA, tulburări gastrointestinale, senzație de greață, vomă, diaree, creșterea diurezei, modificări ale nivelului seric al electrolitilor (în special hipopotasemie, creșterea calciului seric și al creatininei serice, hiperglicemie și hiperuricemie), reflux gastroesofagian, dispnee nocturnă prin aspirarea conținutului gastric, agravarea mastozei fibro-chistice; în cazul supradozării pot apărea: spasme, hTA brutală, aritmii ventriculare ca și tulburări gastrointestinale grave (hemoragii digestive).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

STRONTIUM RANELATUM
SUCRALFATUM
SULBUTIAMINUM
SULFADIAZINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM

Cod ATC: H03BB02

THYROZOL® 5 mg; THYROZOL® 10 mg; THYROZOL® 20 mg MERCK KGaA; Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 2 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. hipertiroidiei (conservator, preoperator, anterior terapiei cu iod radioactiv). Trat. profilactic al hipertiroidiei latente, al gușei hipertiroidizate sau în cazurile cu hipertiroidie în antecedente, înainte de expunerea la iod.

Dz: Int. 20-40 mg/zi, timp de 3-6 săptăm. Doza poate fi redusă apoi la o doză de întreținere de 20-10-5 mg/zi. În sarcină se va adm. într-o doză minimă - 2,5-10 mg/zi. Trat. va dura în general între 6 luni și 2 ani.

Cind: Hipersensibilitate cunoscută la tiamazol sau la tionamide. Afectări în antecedente ale măduvei osoase după carbimazol sau tiamazol.

Al: Atenție în caz de reacții alergice cutanate precoce. Gușile voluminoase care determină compresii asupra traheei se tratează cu tiamazol doar pe o durată scurtă (în combinație cu levotiroxină). Deficitul de iod crește răspunsul la tiamazol, excesul de iod îl scade. Doze minime (până la 10 mg tiamazol/zi) în perioada de alăptare.

RA: Alergii cutanate (prurit, exantem, urticarie), febră medicamentoasă, hipogeuzie, agranulocitoză, artrită, icter (colestatic), hepatită toxică, limfadenopatie generalizată, edem acut al glandelor salivare, trombocitopenie, neurită, polineuropatii, LED, hipotiroidism clinic sau subclinic, mărire a gușei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A11DA01

SUCRALFATUM
 SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
 SUXAMETHONII CHLORIDUM
 TACROLIMUS
 TADALAFILUM
 TALINOLOLUM
 TAMOXIFENUM
 TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
 TENOXICAMUM
 TERAZOSINUM
 TERBINAFINUM
 TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
 TETRACYCLINUM
 TETRAZEPAMUM
 TETROFOSMINUM
 TETRYZOLINUM
 THEOPHYLLINUM
 THIAMAZOLUM
THIAMINUM

SICOVIT® B₁ 10 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. 10 mg; ct. × 1 fl. × 40 cpr. (**P-6L**)

SICOVIT® B₁ 100 mg/2 ml ZENTIVA ROMANIA; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml (**S/P-RF**)

Ind: Boala beri-beri, dietă restrictivă, convalescență, anorexie, hepatite, boli digestive cu tulburări de absorbție, hipovitaminoze cu febră mare, migrene, algii reumatismale, nevrite, polinevrite, nevralgii, paralizii postdifterice și postpoliomielitice, mieloze, encefalopatie Wernicke, nevrite, auto-intoxicații, grețuri și vărsături în sarcină, tulburări de nutriție, spasmofilie, întâzieri în creștere la copii, zona zoster, dermatoze, arsuri întinse, diabet zaharat, hipertiroidie.

Dz: *Adulți:* s.c., i.m., i.v.: 20-40 mg/zi sau la 2 zile, până la 100-300 mg/zi sau la 2 zile în carențele grave. *Copii:* s.c., i.m.: 5-20 mg/zi; nu se adm. i.v.; oral: 10-40 mg/zi curativ, 5-10 mg/zi pt. profilaxie.

Cind: Intoleranță sau alergie la tiamină; incompatibilitate cu vitamina B₂ și cu benzpenicilina.

Al: Dozele mari pot interfera acțiunea altor vitamine din complexul B cu fenomene carentiale consecutive.

RA: Rar, mai ales la injectarea i.v. - șoc tiaminic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SULBUTIAMINUM
 SULFADIAZINUM
 SULFAFURAZOLUM
 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
 SULFASALAZINUM
 SULODEXIDUM
 SULPIRIDUM
 SULTAMICILLINUM
 SUMATRIPTANUM
 SUXAMETHONII CHLORIDUM
 TACROLIMUS
 TADALAFILUM
 TALINOLOLUM
 TAMOXIFENUM
 TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
 TENOXICAMUM
 TERAZOSINUM
 TERBINAFINUM
 TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
 TETRACYCLINUM
 TETRAZEPAMUM
 TETROFOSMINUM
 TETRYZOLINUM
 THEOPHYLLINUM
 THIAMAZOLUM
 THIAMINUM
THIOPENTALUM

Cod ATC: N01AF03

THIOPENTAL SANDOZ GmbH; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg sau 1 g; ct. × 25 fl. (S)

THIOPENTAL SODIUM E.I.P.I.C.O.; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg, 1 g; ct. × 50 fl. (S)

Ind: Anestezie generală de scurtă durată; Inducția anesteziei generale; Controlul stărilor convulsive; in psihiatrie, psihoanaliza și hipnoza induse narcotic.

Dz: Inj. i.v. Mod de întrebuințare: Se recomandă soluții 2,5-5% în apă distilată.

Pentru inducția anesteziei generale: *aduți:* 2-5 mg/kg. Doza max.: 1 g. *Copii peste 5 ani,* 2-7 mg/kg i.v. Stări convulsive: 75-250 mg. Psihoanaliza și hipnoza induse narcotic: 100 mg/min prin inj. lentă.

Cind: Hipersensibilitate la tiopental sau la alte barbiturice. Intoxicații acute cu alcool, soporifice, analgezice sau medicamente psihotrope. Miastenia gravis, insuficiență respiratorie sau vagotonie, stare de rău astmatic, dispnee severă, miocardopatii severe, aritmii cardiace, șoc sever, porfirie hepatică acută, IH sau IR severă, disfuncții metabolice severe.

Al: Aparatura necesară ventilației de urgență trebuie să fie la îndemână. Căile respiratorii trebuie menținute libere. Nu trebuie adm. persoanelor neînsoțite, neinternate. Prudență la șoferi și persoane cu activități de precizie. Prudență în cazul asocierii cu: alcool, antihistaminice, substanțe deprimante ale SNC; barbiturice, fenotiazine, rezerpină, alți agenți hipotensivi, acid valproic, tranilcipromină, metotrexat, depresoare circulatorii, aminofilină.

RA: În timpul inducției: tuse, strănut, sughiț, laringospasm, bronhospasm, depresie respiratorie centrală și apnee, depresia activității cardiace. La scurt timp după inj. se pot observa reflexe de hiperexcitabilitate. Reacții alergice variind de la manifestări minore și șoc anafilactic, depresie respiratorie sau circulatorie și aritmii cardiace. Anemie hemolitică prin mecanism imun cu IR și paralizie a nervului radial. În timpul revenirii sau după anestezie: contracturi musculare, frisoane, hipotermie, somnolență, confuzie și amnezie. Vărsăturile postoperatorii sunt rare. Inj. i.v. poate produce durere la locul inj., tromboflebite.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06AX14

SULFADIAZINUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM

COAXIL® LAB. SERVIER; Cpr. film. 12,5 mg; ct. × 1 blist. × 30 dj. **(P-RF)**

Ind: Trat. stărilor depresive, stărilor anxio-depresive cu tulburări digestive, stărilor anxio-depresive la alcoolici, în special în perioada de sevrăj.

Dz: 37,5 mg pe zi, în 3 prize; *vârstnici* și IR: 25 mg pe zi.

Cind: Sarcină și alăptare; copiii sub 15 ani; asociere cu IMAO.

Al: Prudență în anestezie generală; nu se oprește brusc trat.; șoferi și activități de precizie.

RA: Dureri abdominale, greșuri, vărsături, constipație, uscăciunea gurii, pierderea apetitului, insomnie, somnolență, oboseală, palpitații, cefalee, vertij, amețeli, jenă respiratorie, dureri musculare sau articulare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

SULFAPURAZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05AL03**TIAPRIDAL® 100 mg** SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**TIAPRIDAL 100 mg/2 ml** SANOFI~SYNTHELABO; Sol. inj. 100 mg/2 ml; ct. × 12 f. × 2 ml (P-RF)

Ind: Stare de agitație și de agresivitate, mai ales la subiectul etilic. Dureri intense și rebele. Mișcări anormale de tip coreic.

Dz: *Adulți:* Stări de agitație și agresivitate: 200-300 mg/zi, int. timp de 2 luni. Delir și preelir: 400-1200 mg/zi inj i.m. sau i.v. Mișcări anormale: 300-800 mg/ zi, int. În diskineziile provocate de levodopa: 75-150 mg/zi. Dureri intense și rebele: 200-400 mg/zi, int. sau inj. *Copii peste 7 ani:* 100-150 mg/zi.

Cind: Feocromocitom.

Al: Dacă apare sd. neuroleptic malign se întrerupe trat.; prudență la epileptici, vârstnici, cardiaci, IR, parkinsonieni; interacțiuni medicamentoase cu alcool, levodopa, antihipertensive, antidepresive, opioide, antihistaminice H1, barbiturice, benzodiazepine, clonidină, IEC; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Sd. neuroleptic malign: sedare sau somnolență, diskinezii precoce, sd. extrapiramidal, diskinezii tardive, hTA ortostatică, impotență, frigiditate, amenoree, ginecomastie, hiperprolactinemie, creștere în greutate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01CR03**TIMENTIN** GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. sol. inj. 1,6 g, 3,2 g; ct. × 4 fl. (1,6 g), ct. × 1 sau 10 fl. (3,2 g) (S)

Ind: Infecții severe cu microorganisme sensibile: septicemii, bacteriemii, peritonite; infecții intra-abdominale; infecții post-chirurgicale; infecții osteo-articulare; infecții cutanate și ale părților moi; infecții dovedite sau presupuse, la pacienții cu apărare antiinfecțioasă afectată; infecții ale tractului respirator; infecții renale grave sau complicate (ex. pielonefrite); infecții ale sferei ORL.

Dz: *Adulți* (inclusiv vârstnici): 1,6-3,2 g i.v. la 6-8 ore, în concordanță cu greutatea corporală, max. 3,2 g la 4 ore. În afecțiunile renale: ușoare: (clearance creatinină > 30 ml/min) - 3,2 g i.v. la 8 ore; moderate (clearance creatinină 10-30 ml/min) - 1,6 g i.v. la 8 ore; severe: (clearance creatinină < 10 ml/min) - 1,6 g i.v. la 12 ore. *Copii:* 80 mg/kg corp i.v. la 6-8 ore. Pentru copiii prematuri și cei născuți la termen, în perioada perinatală, doza este de 80 mg/ kg corp i.v. la 12 ore, ulterior se crește frecvența adm. la 8 ore.

Cind: Hipersensibilitate la peniciline.

Al: La unii pacienți a fost observată modificarea parametrilor funcționali hepatici; se recomandă prudență la pacienții cu disfuncții hepatice manifeste. La pacienții cu afecțiuni renale moderate sau severe dozele trebuie ajustate. Tulburările hemoragipare asociate anomaliilor de coagulare sunt mai posibile la pacienții cu afecțiuni renale. În cazul apariției tulburărilor hemoragipare trat. trebuie întrerupt. Sarcină și alăptare.

RA: *Reacții de hipersensibilitate:* reacții buloase, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică. *Reacții gastro-intestinale:* greață, vărsături, diaree, colită pseudomembranoasă. *Reacții hepatice:* creșterea moderată a AST sau/și ALT, hepatită și icter colestatic. *Reacții renale:* hipokaliemie. *SNC:* convulsii, mai ales la pacienți cu afecțiuni renale sau la cei tratați cu doze crescute. *Reacții hematologice:* trombocitopenie, tulburări hemoragipare. *Reacții locale:* tromboflebită în cazul adm. intravenoase.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AC05

SULFASALAZINUM
SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM

IPATON EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. film. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
TICLID® 250 mg SANOFI~SYNTHELABO; Cpr. film. 250 mg; ct. × 2 folii termosudate × 10 cpr. (P-6L)
TICLODIN AC HELCOR SRL; Cpr. film. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
TICLOPIDINE POLI POLI IND. CHIMICA; Cpr. film. 250 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
TICLOTER® 250 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 250 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Profilaxia riscului de accident vascular cerebral și tulburări ischemice (trombotice) ale creierului; stări precursorale ale accidentelor vasculare. Profi-laxia insuficienței circulatorii cu ocluzie trombotică la nivelul membrelor. Corectarea tulburărilor plachetare determinate de intervenții chirurgicale sau hemodializă cronică.

Dz: 250 mg de 2 ori/zi, în timpul mesei. În IH și/sau IR moderată, dozele trebuie micșorate.

Cind: Hipersensibilitate la ticlopidină; diateze hemoragice, leziuni organice cu potențial hemoragic; boli hematologice cu timp de sângerare crescut; IH sau IR severe, agranulocitoză în antecedente, leucopenie, trombocitopenie.

Al: Ticlopidina nu este indicată pentru profilaxia trombozei la persoane sănătoase; monitorizare hematologică; prudență în risc de sângerare, intervenții chirurgicale, IH, IR severă; interacțiuni medicamentoase cu AINS, antiagregante plachetare, anticoagulante orale, heparină, salicilați și/sau derivați salicilici, trombolitice, teofilină, fenitoină, antiacide; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Hemoragii, greață și diaree ușoară, neutropenie, aplazie medulară, pancitopenie, purpură trombocitopenică, anemie hemolitică, rash maculopapular sau urticarie, prurit, hepatită, icter colestatic, vertij, cefalee, slăbiciune, pierderea apetitului, somnolență, tinitus, palpitații, nervozitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01ED01

SULODEXIDUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM

ARUTIMOL ANKERPHARM GROUP CHAUVAIN; Sol. oft. 0,25%, 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-RF**)

NYOLOL® GEL NOVARTIS PHARMA; Gel. oft. 0,1%; ct. × 1 fl. × 5 g + dop picurător (**P-RF**)

OPHTAMOLOL® 0,5% DAR AL DAWA; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-RF**)

TIMO-COMOD® URSAPHARM; Sol. oft. 0,25%, 0,5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (**P-6L**)

TIMO-GAL TERAPIA SA; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (**P-6L**)

TIMOLOL 0,25%; TIMOLOL 0,5% E.I.P.I.C.O.; Sol. oft. 0,25%, 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)

TIMOPTIC® 0,25%; TIMOPTIC® 0,5% MERCK SHARP & DOHME; Sol. oft. 0,25%, 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 ml (**P-6L**)

UNITIMOLOL® UNIMED PHARMA; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 5 sau 10 ml (**P-6L**)

Ind: Reducerea presiunii intraoculare crescute la pacienții cu: hipertensiune oculară, glaucom cronic cu unghi deschis, afakie cu glaucom, unele cazuri de glaucom secundar. Glaucom cu unghi închis sau antecedente de glaucom cu unghi închis, apărut spontan sau indus iatrogen, la ochiul neafectat, dacă este necesară reducerea presiunii intraoculare. Terapie concomitentă la pacienții cu glaucom congenital.

Dz: Inițial 1 pic. sol. 0,25%, de 2 ori/zi; doza poate fi crescută la 1 pic. sol. 0,5%, de 2 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la timolol; astm bronșic, BPCO, bradicardie sinusală, BAV de gradul II - III, IC manifestă, șoc cardiogen.

Al: Prudență în IC, afecțiuni cardiace severe în antecedente, prematuri sau nou-născuți, lentile de contact moi; interacțiuni medicamentoase cu adrenalină, chinidină, blocante ale canalelor de calciu, inhibitori ai terminațiilor simpatice, beta-blocante; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Iritație oculară, arsuri și înțepături oculare, conjunctivite, blefarite, keratite, scăderea sensibilității corneene, uscăciune oculară, tulburări vizuale, diplopie, ptoză palpebrală, detașare a coroidelor, tinitus, bradicardie, aritmii, hTA, sincopă, blocuri, accident vascular cerebral, ischemie cerebrală, IC congestivă, palpitații, stop cardiac, edeme, claudicații intermitente, fenomene Raynaud, extremități reci, bronhospasm, insuficiență respiratorie, dispnee, tuse, cefalee, astenie, oboseală, dureri toracice, alopecie, rash psoriaziform sau exacerbare a psoriazisului, reacții alergice, urticarie, rash localizat sau generalizat, vertij, depresie, insomnie, coșmaruri, pierderea memoriei, accentuarea semnelor și simptomelor de miastenia gravis, parestezii, greață, diaree, dispepsie, uscăciunea gurii, scăderea libidoului, boală Peyronie, lupus eritematos sistemic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SULPIRIDUM
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM

Cod ATC: P01AB02, J01XD02**FASIGYN** PFIZER; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 4 cpr. (P-RF)**TINIZOL® 2 g/l** INFOMED FLUIDS SRL; Sol. perf. 0,2%; ct. × 1 sau 12 fl. × 200 ml (S)**TINIZOL® 500 mg** ZENTIVA ROMANIA; Cpr. film. 500 mg; ct. × 1 blist. × 4 cpr. (P-RF)**TIPROGYN 500 mg** AC HELCOR SRL; Cpr. film. 500 mg; ct. × 4 cpr. (P-RF)

Ind: Profilaxia infecțiilor postoperatorii cauzate de bacterii anaerobe, în special celor asociate chirurgiei colonului, gastrointestinale și ginecologice. Trat. infecțiilor intraperitoneale, ginecologice, ale plăgilor postoperatorii, ale tegumentelor și țesuturilor moi, ale tractului respirator superior și inferior, septicemiilor. Vaginită nespecifică. Gingivită ulcerativă acută. Tricomoniază urogenitală. Giardioză. Amebioză intestinală. Amebioză hepatică.

Dz: Doza variază între 0,45-12 g/zi, în funcție de indicație. *Oral, adulți:* prevenirea infecțiilor post-operatorii: 2 g o dată, cu 12 ore înaintea intervenției chirurgicale; infecții cu germeni anaerobi: 2 g în prima zi, apoi 1 g/zi (în 1-2 prize) timp de 5-6 zile; vaginită nespecifică, gingivită ulcerativă, tricomoniază urogenitală, amebioză intestinală, giardioză 2 g/zi doză unică; amebiaza hepatică: 4,5-12 g/zi timp de 3 zile. *Copii:* 50-75 mg/kg corp în doză unică. *Adm. i.v.:* în infecții cu germeni anaerobi: doză de atac 800 mg, apoi 400 mg la 12 ore și se continuă cu doze orale (dacă este posibil) 1,5-2 g.

Cind: Hipersensibilitate la tinidazol, afecțiuni neurologice organice, discredii sanguine, sarcină și alăptare.

Al: Băuturile alcoolice trebuie evitate; dacă apar semne neurologice anormale, trat. trebuie întrerupt. În tricomoniaza urogenitală se impune și tratamentul concomitent al partenerului.

RA: Greață, vărsături, anorexie, diaree, gust metalic, dureri abdominale, reacții de hipersensibilizare, leucopenie, cefalee, oboseală, limbă încărcată și urina închisă la culoare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AB10

INNOHEP® LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS; Sol. inj. tinzaparină sodică corespunzător la 10000 UI antifactor Xa/ml sau 20000 UI anti-factor Xa/ml; ct. × 10 fl. × 2 ml; ct. cu 2 seringi preumplute × 3500 UI anti-factor Xa/0,35 ml, 4500 UI anti-factor Xa/0,45 ml, 10000 UI anti-factor Xa/0,5 ml, 14000 UI anti-factor Xa/0,7 ml și 18000 UI anti-factor Xa/0,9 ml (**P-RF**)

Ind: Trat. curativ al trombozei venoase profunde și al emboliei pulmonare; profilaxia trombozei venoase profunde la pacienții supuși unor intervenții chirurgicale generale sau ortopedice; prevenirea coagulării în circuitul circulației extracorporale sau pentru hemodializă.

Dz: Trat. trombozei venoase profunde și al emboliei pulmonare: 175 UI/kg inj. s.c., o dată pe zi. Profilaxia trombozei venoase: în ziua intervenției chirurgicale 3500-4500 UI inj. s.c. cu 2 ore înaintea intervenției și postoperator 3500 UI o dată pe zi, timp de 7-10 zile. Hemodializa pe perioadă scurtă: 2000-2500 UI în linia arterială a circuitului de dializă (sau i.v.), la începutul dializei. Hemodializa pe perioadă lungă: 2500 UI în linia arterială a circuitului de dializă (sau i.v.), la începutul dializei, apoi perf. 750 UI/oră.

Cind: Hipersensibilitate la tinzaparină, la alte preparate de heparină; trombocitopenie produsă de heparină; risc crescut de hemoragii.

A!: Prudență la pacienții cu risc de complicații hemoragice, IR, nou-născuți; monitorizarea hematologică; nu se inj. i.m.; interacțiuni medicamentoase cu acid acetilsalicilic, alte AINS, antiagregante plachetare, anticoagulante cumarinice, dextran; sarcină și alăptare.

RA: Hemoragii, mici echimoze la locul injectiei, creșteri temporare ale transaminazelor, erupții cutanate, urticarie, angioedem, trombocitopenie, priapism, reacțiile anafilactice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01BB03

SUMATRIPTANUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM

LANVIS GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 40 mg; ct. × 1 fl. × 25 cpr. (S/P-RF)

Ind: Trat. leucemiilor acute, în mod special al leucemiilor mielocitare acute și al leucemiilor limfoblastice acute; trat. leucemiilor granulocitare cronice.

Dz: Inducție: 100-200 mg/m² și zi, timp de 5-20 zile. Întreținere: 60-200 mg/ m², zilnic sau intermitent.

Cind: Având în vedere importanța indicațiilor, nu există Cind absolute.

Al: Monitorizarea hemoleucogramei; evitarea hiperuricemiei și/sau hiperuricozuriei; prudență în IR, IH, sdr. Lesch-Nyhan; interacțiuni medicamentoase cu busulfan; sarcină și alăptare.

RA: Intoleranță gastrointestinală, stomatite, necroză intestinală cu perforație, disfuncții hepatice, icter, ocluzia venei hepatice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

SUXAMETHONII CHLORIDUM
TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM

Cod ATC: R03BB04

SPIRIVA®18 µg BOEHRINGER INGELHEIM; Cps. cu pulb. inhal. 18 µg + dispozitiv HandiHaler; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cps. + dispozitiv HandiHaler; ct. × 3 sau 9 blist. × 10 cps. **(P-6L)**

Ind: Bronhodilatator indicat în tratamentul de întreținere al bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPCO).

Dz: O dată pe zi, zilnic, la aceeași oră.

Cind: Pacienți sub 18 ani. Hipersensibilitate la tiotropină, ipratropină, oxitropină sau atropină. Nu se folosește în urgențe, în terapia de inițiere.

Al: Glaucom cu unghi îngust. Hipertrofie de prostată. Sarcină și alăptare.

RA: Reacții alergice, uscăciunea gurii, constipație, tahicardie, moniliază, sinuzită, faringită, dificultăți de micțiune.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TACROLIMUS
TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA

Cod ATC: V04CJ01**THYROGEN®** GENZYME Ltd.; Liof. pt. sol. inj. 0,9 mg; ct. × 2 fl. (P-RF)

Ind: Detectarea resturilor de tiroidă și a cancerului bine diferențiat de tiroidă, la pacienții post tiroidectomie, cărora li se administrează terapie hormonosupresoare (THST); se folosește împreună cu testul la tireoglobulină serică, asociat sau nu cu investigația cu radioizotopi de iod. Stimulare preterapeutică la pacienții post tiroidectomie cu risc mic, menținuți pe terapie hormonosupresoare pentru îndepărtarea resturilor de țesut tiroidian în combinație cu 100 mCi iod radioactiv.

Dz: Doza recomandată este de 2 doze de 0,9 g, administrate la un interval de 24 ore, numai prin injectare i.m. Tratamentul trebuie să fie monitorizat de un medic specialist în cancerul tiroidian.

Cind: Hipersensibilitate. Sarcină

Al: Produsul nu trebuie injectat i.v. Există o posibilitate teoretică ca Thyrogen, asemenea suprimării hormonilor tiroidieni, să producă stimularea creșterii tumorale, însă studiile clinice nu au evidențiat acest fenomen.

RA: Greață, vomă, fatigabilitate, amețeală, cefalee, astenie, durere de spate, simptome gripale, febră, frisoane, parestezie, erupții cutanate, urticarie, senzație de căldură.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TADALAFILUM
TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM

Cod ATC: B01AC17

AGGRASTAT MERCK SHARP & DOHME; Conc. pt. sol. perf. 0,25 mg/ml; ct. × 1 fl. × 50 ml (S)

Ind: Prevenirea infarctului miocardic precoce la pacienții cu angină instabilă sau infarct miocardic non-Q cu ultimul episod dureros precordial apărut în ultimele 12 ore și cu modificări ECG și/sau cu valori crescute ale enzimelor cardiace. Se utilizează împreună cu acid acetilsalicilic și heparină nefracționată.

Dz: Adm. i.v. cu un debit inițial de 0,4 μg/kg corp și minut timp de 30 min., apoi perf. de întreținere cu debit de 0,1 μg/kg corp și minut. IR severă: doza se ajustează la jumătate.

Cind: Hipersensibilitate; antecedente de accident cerebral în ultimele 30 de zile; afecțiuni intracraniene (neoplasm, anevrism, malformație arterio-venoasă); hemoragii; HTA malignă; intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 săptămâni; IH severă. Copii.

Al: Nu se recomandă adm. fără heparină nefracționată. Sarcină.

RA: Hemoragii, greață, febră, cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R01AD07

TALINOLOLUM
TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM

PIVALONE 1% PFIZER; Susp. nazală 1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (*P-RF*)

Ind: Manifestări inflamatorii și alergice rinofaringiene: rinite alergice, rinite congestive acute și cronice.

Dz: 1-2 pulverizări în fiecare nară de 2 până la 4 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la pivalat de tixocortol; epistaxis.

RA: Reacții de intoleranță locală, senzație de urscăciune a mucoasei nazale, reacții alergice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TAMOXIFENUM
TAMSULOSINUM
TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM

Cod ATC: J01GB01, S01AA12**TOBI®** CARDINAL HEALTH; Sol. inhal. 300 mg/5 ml; ct. × 28 f. × 5 ml (*P-RF*)**TOBRABACT®** CIBA VISION; Sol. oft. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (*P-RF*)**TOBREX®** ALCON; Sol. oft. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (*P-RF*)**TOBREX®** ALCON; Ung. oft. 0,3%; ct. × 1 tub × 3,5 g (*P-RF*)**TOBRIN** E.I.P.I.C.O.; Sol. oft. 0,3%; ct. × 1 fl. × 5 ml (*P-RF*)

Ind: *Local:* infecțiile externe ale ochiului și anexelor, produse de germeni sensibili; otită externă provocată de microbi sensibili. *Sistemic:* infecții bacteriene grave cauzate de tulpini sensibile în septicemie, infecții ale tractului respirator inferior, meningită, infecții intraabdominale, infecții osoase și tegumentare, infecții ale tractului urinar.

Dz: *Local:* 1,5 cm ung. sau 1-2 pic. colir în sacul conjunctival inferior al ochiului afectat de 2-3 ori pe zi sau la fiecare 3-4 ore în infecțiile severe. *Sistemic: Adulți:* 3-5 mg/kg și zi inj. i.m. sau i.v. *Copii:* 6-7,5 mg/kg și zi. *Nou-născuți la termen sau prematurii care au o săpt. sau mai puțin:* până la 4 mg/kg și zi în două doze egale, la 12 ore.

Cind: Hipersensibilitate la tobramicină și la aminoglicozide; utilizarea auriculară la bolnavii cu timpanul perforat.

Al: Urmărirea atentă a evoluției afecțiunii; risc de rezistență, prudență în IR; interacțiuni medicamentoase cu alte aminoglicozide, sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: *Local:* hipersensibilitate, prurit, edem palpebral, eritem conjunctival. *Sistemic:* Neurotoxicitate asupra ramurilor vestibulare și acustice ale nervului VIII, amețeală, vertij, tinitus, zgomote puternice în urechi, pierderea auzului, nefrotoxicitate, anemie, granulocitopenie și trombocitopenie, febră, erupții, dermatită exfoliativă, prurit, urticarie, greață, vărsături, diaree, cefalee, letargie, durere la locul de injectare, confuzie mentală și dezorientare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A11HA03

TAMSULOSINUM
 TC 99M - ACID MEDRONIC
 TC 99M - ACID PENTETIC
 TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
 TENOXICAMUM
 TERAZOSINUM
 TERBINAFINUM
 TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
 TETRACYCLINUM
 TETRAZEPAMUM
 TETROFOSMINUM
 TETRYZOLINUM
 THEOPHYLLINUM
 THIAMAZOLUM
 THIAMINUM
 THIOPENTALUM
 TIANEPTINUM
 TIAPRIDUM
 TICARCILLINUM
 TICLOPIDINUM
 TIMOLOLUM
 TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM

EUROVITA E 100 mg GLAXO SMITHKLINE; Cps. 100 mg; ct. × 2 blist. × 15 cps. (OTC)

EUROVITA E FORTE 400 mg GLAXO SMITHKLINE; Cps. 400 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (OTC)

SICOVIT® E 100 mg SICOMED SA; Cps. 100 mg; ct. × 4 blist. × 10 cps. (OTC)

SICOVIT® E 30 mg/ml SICOMED SA; Sol. inj. 30 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 1 ml (P-RF)

VITAMIN E 100 mg; VITAMIN E 400 mg PHARCO PHARM.; Cps. gelat. moi 100 mg și 400 mg; ct. × 2 blist. × 12 cps. (OTC)

VITAMINA E BIOFARM SA; Cps. moi 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (OTC)

VITAMIN E 100; VITAMIN E 200; VITAMIN E 400 ZENTIVA AS; Cps. moi 100 mg, 200 mg sau 400 mg; ct. × 1 fl. × 30 cps. (OTC)

Ind: Trat. și prevenirea carențelor în Vit. E: sindromul neurologic al bolnavilor cu malabsorbție; avort habitual, sterilitate; distrofii musculare; afecțiuni cardiovasculare; incontinența urinară la femei; retinopatia prematurilor; profilaxia fibroplaziei retrolentale la nou-născuții cărora li se adm. cantități mari de oxigen.

Dz: Oral, 100-300 mg/zi (fracționat), la nevoie, 400-500 mg/zi; inj. i.m. 30-300 mg/zi (mai mult în arterite - până la 600 mg).

Cind: Hipersensibilitate la Vitamina E.

Al: Interacțiuni medicamentoase cu anticoagulante cumarinice.

RA: Obişnuit, bine tolerată. Tratamentul de durată cu doze mari (400-800 mg/zi) poate provoca tulburări gastrointestinale: greață, diaree, dureri abdominale; oligo- și azoospermie, involuția ovarelor, tulburări menstruale, hemoragii.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TC 99M - ACID MEDRONIC
TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINIUM
TELITROMICINIUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM

Cod ATC: N05BA23**GRANDAXIN** EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.; Cpr. 50 mg; ct. × 1 fl. × 20 cpr. (P-RF)

Ind: Tulburări vegetative, anxietate, lipsă de motivație, oboseală, apatie, nevroze, depresie reactivă, neurastenii; ameliorarea simptomelor nevrotice secundare; amendarea simptomelor produse de tulburările de climacteriu; sdr. de abținere la alcoolici; miastenia gravis, miopatie, neuropatie, atrofie musculară.

Dz: 50-300 mg/zi, în 1-3 prize.

Cind: Psihopatii agresive.

Al: Prudență în sarcină și alăptare.

RA: Grețuri, dureri epigastrice, rash, hiperactivitate, agresivitate, tulburări de somn.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TC 99M - ACID PENTETIC
TC 99M - FITAT
TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM

Cod ATC: A10BB03

TOLBUTAMID SINTOFARM SA; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (S/P-6L)

Ind: Diabet non-insulinodependent, stabil, la adultul cu greutate normală.

Dz: 400-800 mg în prima zi; 300-600 mg în a doua zi; 300-500 mg în a treia zi; 100-300 mg în zilele următoare, ca trat. de întreținere. Adm. se face după mese, în 2 sau 3 prize pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la tolbutamidă, diabet juvenil, diabet instabil, diabet cu acidoză, cetoză sau comă, diabet în prezența febrei, traumatismelor grave sau infecțiilor, IH gravă, insuficiența tiroidiană gravă, porfirie hepatică, sarcină.

Al: Prudență în IH; interacțiuni medicamentoase cu diureticele tiazidice și alte saluretice, glucocorticoizii, asociațiile estro-progestative, barbituricele, acidul nicotinic, hormonii tiroidieni, simpatomimeticele, clorpromazina, insulina, metformina, unele sulfamide antibacteriene, cloramfenicolul, tetraciclina, fenilbutazona, aminofenazona și alți pirazoli, clofibratul, blocantele beta-adrenergice, anticoagulantele cumarinice, salicilații, probenecidul, ciclofosfamida, alcoolul.

RA: Microgranuloame în diferite țesuturi, inclusiv în miocard.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TC 99M - FITAT
 TC 99M - PERTECHNETAT
 TEICOPLANINUM
 TELITROMICINUM
 TELMISARTANUM
 TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
 TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
 TENOXICAMUM
 TERAZOSINUM
 TERBINAFINUM
 TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
 TETRACYCLINUM
 TETRAZEPAMUM
 TETROFOSMINUM
 TETRYZOLINUM
 THEOPHYLLINUM
 THIAMAZOLUM
 THIAMINUM
 THIOPENTALUM
 TIANEPTINUM
 TIAPRIDUM
 TICARCILLINUM
 TICLOPIDINUM
 TIMOLOLUM
 TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM

Cod ATC: D01AE18

MICONAFT EUROPHARM SA; Cremă 1%; ct. × 1 tub × 40 g (*P-RF*)

Ind: Dermatofitiile pielii glabre, Tinea pedis, Tinea cruris, Tinea circinata corporis, Tinea unguium, Pitiriazis versicolor.

Dz: Se aplică în strat subțire, pe zona afectată a pielii și pe zona perilezională, de 2-3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la tolnaftat.

Al: Nu este eficient în candidomicoze; prudență la sugari, dermatofitii pe suprafețe extinse, se evită contactul cu ochii.

RA: Irritație sau sensibilizare locală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: M03BX04

TC 99M - PERTECHNETAT
TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM

MYDOCALM RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. film. 50 mg, 150 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**
MYDOCALM GEDEON RICHTER Ltd.; Sol. inj. 100 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml **(P-RF)**
TOLPERISON 50 mg TERAPIA SA; Dj. 50 mg; ct. × 1 fl. × 30 dj. **(P-6L)**

Ind: Hipertonie musculară, spasme musculare și contractură musculară asociată afecțiunilor locomotorii. Reabilitarea postoperatorie în ortopedie și traumatologie. Bolile vasculare obliterante și tulburări cauzate de lezarea inervației vasculare. Boala Little și alte encefalopatii asociate cu distonie.

Dz: *Adulți:* oral 150-450 mg/zi, inj. i.m. 100 mg de 2 ori/zi, inj. i.v. 200 mg/zi. *Copii:* oral 5 mg/k/zi.

Cind: Hipersensibilitate la tolperisonă. Miastenia gravis.

A!: Interacțiuni medicamentoase cu acid niflumic; prudență în sarcină și alăptare.

RA: Hipotonie musculară, cefalee, hTA, greață, vomă, disconfort abdominal, reacții de hipersensibilitate (prurit, eritem, urticarie, edem angioneurotic, șoc anafilactic, dispnee).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TEICOPLANINUM
TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM

Cod ATC: G04BD07

DETRUSITOL® PHARMACIA & UPJOHN; Cpr. film. 1 mg, 2 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (1 mg), ct. × 1 blist. × 14 cpr. (2 mg) **(P-6L)**
DETRUSITOL SR PHARMACIA; Cps. cu elib. prel. 2 mg, 4 mg; ct. × 4 blist. × 7 cps. **(P-6L)**

Ind: Tratamentul simptomelor vezicii urinare hiperreactive cum sunt polakiuria, senzația imperioasă de micțiune sau incontinența urinară.

Dz: 2 mg tolterodină de 2 ori/zi; în IH 1 mg de 2 ori/zi. La copii siguranța și eficacitatea medicamentului nu au fost încă stabilite. De aceea, până la obținerea mai multor informații, tolterodina nu este recomandată la copii.

Cind: Hipersensibilitate la tolterodină; retenție urinară; glaucom cu unghi îngust, necontrolat prin trat.; miastenia gravis; forme grave de colită ulcerosă; megacolon toxic.

Al: Prudență în obstrucție urinară postvezicală importantă cu risc de retenție urinară; afecțiuni obstructive gastrointestinale; afecțiuni renale; afecțiuni hepatice; neuropatii vegetative; hernie hiatală; copii. Înainte de inițierea trat. cu tolterodină trebuie excluse cauzele organice ale polakiuriei și micțiunilor imperioase; interacțiuni medicamentoase cu antimuscarinice, agoniști ai receptorilor muscarinici, metoclopramidă, cisapridă, sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Uscăciunea gurii, dispepsie, constipație, dureri abdominale, flatulență, vărsături, cefalee, parestezii, somnolență, nervozitate, xeroftalmie, piele uscată, tulburări ale acomodării, durere toracică, retenție urinară, confuzie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N03AX11

TELITROMICINUM
TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM

TOPAMAX JANSSEN C/LAG; Cps. cu microsfere 15 mg; ct. × 1 fl. × 60 cps. (**P-6L**)

TOPAMAX 25; TOPAMAX 50; TOPAMAX 100; TOPAMAX 200 JANSSEN C/LAG; Cpr. film. 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; ct. × 4 blist. × 7 cpr.; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)

Ind: Terapie asociată sau monoterapie, la adulți și copii cu epilepsie, pentru tratamentul crizelor parțiale (crize focale) și convulsiilor tonico-clonice generalizate. Terapie asociată în tratamentul convulsiilor asociate sindromului Lennox-Gastaut.

Dz: Terapie asociată, adulți: inițial: 25-50 mg/zi seara, timp de o săptămână, apoi doza se crește la 1-2 săptămâni cu 25-50 mg/zi. Doza totală zilnică se divide în două prize. Doza minimă eficientă este de cca 200 mg/zi. Doza totală zilnică este de cca 200-400 mg/zi. Terapie asociată, copii peste 2 ani: Doza zilnică totală 5-9 mg/kg corp/zi în două prize. Se începe cu 25 mg seara timp de o săptămână. Ulterior doza se crește la 1-2 săptămâni cu 1-3 mg/kg corp/zi până la obținerea răspunsului clinic optim.

Monoterapie, adulți: Inițial 25 mg seara timp de 1 săptămână; la 1-2 săptămâni se crește doza cu 25-50 mg/zi. Doza zilnică maximă 500 mg în două prize. Monoterapie, copii peste 2 ani: inițial 1-3 mg/kg corp/zi seara, timp de o săptămână; apoi se crește cu 1-3 mg/kg corp/zi la 1-2 săptămâni. Doza totală 3-6 mg/kg corp/zi. Se poate ajunge la 500 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate.

Al: Întreruperea tratamentului se face treptat (cu cca 100 mg pe zi, săptămânal). Risc de formare a calculilor renali (mai ales la cei cu predispoziție la nefrolitiază); se recomandă hidratare adecvată. *oferi și activități de precizie.

RA: În monoterapie: parestezii, cefalee, amețală, oboseală, somnolență, pierdere în greutate, greață și diaree.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TELMISARTANUM
TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM

Cod ATC: L01XX17

HYCAMTIN GLAXO SMITHKLINE; Pulb. pt. sol. inj. 1 mg sau 4 mg; ct. × 1 sau 5 fl. (S)

Ind: Trat. în carcinom pulmonar cu celule mici; carcinom ovarian metastatic după eșecul terapiei de debut sau al celei ulterioare.

Dz: Doza inițială i.v.: 1,5 mg/m² și zi, timp de 5 zile consecutiv. Doza de întreținere: 1,25 mg/m² și zi.

Cind: Hipersensibilitate la topotecan; depresie medulară severă; sarcină și alăptare.

Al: Nu se adm. decât dacă numărul de neutrofile este peste $1,5 \times 10^9/l$, cel de trombocite peste $100 \times 10^9/l$; readm. se face dacă numărul de neutrofile este de minim $10^9/l$ și cel al trobocitelor de minim $100 \times 10^9/l$, iar valoarea hemoglobinei este de minim 9 g/dl; prudență la pacienții cu o stare generală alterată, IR, IH; șoferi și activități de precizie.

RA: Neutropenie, febră, infecții, septicemie, leucopenie, trombocitopenie, anemie, grețuri, vărsături, diaree, stomatită, constipație, dureri abdominale, oboseală, astenie, alopecie, anorexie, rash, indispoziție, hiperbilirubinemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TEMOZOLOMIDUM
TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A

Cod ATC: M03AX01**DYSPORT® 500** IPSEN BIOPHARM Ltd.; Pulb. pt. sol. inj. 500 UI; ct. × 1 sau 2 fl. (S/P-RF)

Ind: Ca medicație adjuvantă fizioterapiei, realizează reducerea spasticității membrului superior aparută ca urmare a unui accident vascular cerebral- prezentând astfel un beneficiu semnificativ pentru pacient; deformarea dinamică - piciorul equin- datorată spasticității, în cazul pacienților cu infirmitate motorie centrală, având vârsta de doi ani sau mai mult. Tratamentul se efectuează numai în centre medicale specializate cu personal pregătit corespunzător; torticolis spasmodic la adulți; blefarospasm la adulți; spasm hemifacial la adulți; hiperhidroza axilară

Dz: Spasticitate în infirmitate motorie centrală pediatrică: inițial 20 UI/kg, ca doză împărțită între ambii mușchi ai gambei. Dacă este afectată o singură gambă, ar trebui utilizată o doză de 10 UI/kg. Torticolis spasmodic: inițial 500 UI/pacient, doză împărțită și administrată celor doi sau trei dintre cei mai activi mușchi ai gâtului. Blefarospasm și spasm hemifacial: doza inițială recomandată este de 120 unități/ochi.

Cind: Sarcină și alăptare. Hipersensibilitate. Miastenie.

Al: Asocierea cu aminoglicozide poate potența blocul neuromuscular.

RA: În ordinea descrescătoare a frecvenței: după administrarea în mușchii gambei - dureri de picioare, leziuni accidentale (căderi), mers anormal, faringite, bronșite, febră, astenie, incontinență urinară; după administrare în caz de torticolis spasmodic - paralizia grupelor musculare din apropiere, disfagie, uscăciunea gurii, schimbări ale vocii; după administrare la nivel ocular - ptoză, diplopie, paralizia mușchilor faciali centrali, keratită, hiposecreție lacrimală.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N02AX02

TEMOZOLOMIDUM
 TENECTEPLASUM
 TENONITROZOLUM
 TENOXICAMUM
 TERAZOSINUM
 TERBINAFINUM
 TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
 TETRACYCLINUM
 TETRAZEPAMUM
 TETROFOSMINUM
 TETRYZOLINUM
 THEOPHYLLINUM
 THIAMAZOLUM
 THIAMINUM
 THIOPENTALUM
 TIANEPTINUM
 TIAPRIDUM
 TICARCILLINUM
 TICLOPIDINUM
 TIMOLOLUM
 TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
 TOLNAFTATUM
 TOLPERISONUM
 TOLTERODINUM
 TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM

K-ALMA ANTIBIOTICE SA; Cps. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
MABRON MEDOCHEMIE Ltd.; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 sau 100 f. × 2 ml (S/P-RF)
MABRON MEDOCHEMIE Ltd.; Cps. 50 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
TRADOLAN® LANNACHER HEILLMITTEL; Cpr. film. 50 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
TRADOLAN® LANNACHER HEILLMITTEL; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 sau 2 ml (P-RF)
TRADOLAN® LANNACHER HEILLMITTEL; Supoz. 100 mg; ct. × 1 blist. × 5 sup. (P-RF)
TRADOLAN® LANNACHER HEILLMITTEL; Sol. orală 100 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-RF)
TRALGIT SR 100; TRALGIT SR 150; TRALGIT SR 200 ZENTIVA AS; Cpr. elib. prel. 100 mg, 150 mg sau 200 mg; ct. × 1, 3 sau 5 blist. × 10 cpr.
TRAMACALM AC HELCOR SRL; Cps. 50 mg; ct. × 1 sau 50 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
TRAMADOL 50 mg/ml SICOMED SA; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml, ct. × 10 f. × 1 ml (P-RF)
TRAMADOL KRKA; Cps. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
TRAMADOL RETARD KRKA; Cpr. elib. prel. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)
TRAMADOL KRKA; Supoz. 100 mg; ct. × 1 blist. × 5 supoz. (P-RF)
TRAMADOL KRKA Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 sau 2 ml (P-RF)
TRAMADOL AL 50 ALIUD PHARMA; Cps. 50 mg; ct. × 1, 3, 5 sau 10 blist. × 10 cps. (P-RF)
TRAMADOL AL ALIUD PHARMA; Sol. orală 100 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 sau 20 ml (P-RF)
TRAMADOL AL 100 fiole ALIUD PHARMA; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 sau 10 f. × 2 ml (P-RF)
TRAMADOL EEL BIO EEL SRL; Cpr. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
TRAMADOL LPH® 50 mg LABORMED PHARMA SA; Cps. 50 mg; ct. × 2 sau 100 blist. × 10 cps. (S/P-RF)
TRAMADOLOR® 100 ID HEXAL AG; Cpr. cu elib. modif. 100 mg; ct. × 1 sau 5 blist. × 10 cpr. (P-RF)
TRAMAG 50 MAGISTRA C&C; Cpr. 50 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
TRAMAG 100 MAGISTRA C&C; Sup. 100 mg; ct. × 1 blist. × 5 sup. (P-RF)
TRAMAL® GRUNENTHAL GmbH; Cps. 50 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cps. (P-RF)
TRAMAL® 50; TRAMAL® 100 GRUNENTHAL GmbH; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 sau 2 ml (P-RF)
TRAMAL® GRUNENTHAL GmbH; Supoz. 100 mg; ct. × 1 folie × 5 sup. (P-RF)
TRAMAL® GRUNENTHAL GmbH; Sol. orală 100 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml (P-RF)
TRAMAL RETARD 100 mg; TRAMAL RETARD 150 mg; TRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL GmbH; Cpr. film. ret. 100 mg, 150 mg, 200 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-RF)
URGENDOL WIN-MEDICARE Ltd.; Cps. 50 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. (P-RF)
URGENDOL WIN-MEDICARE Ltd.; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml sau 2 ml (P-RF)

Ind: Trat. durerilor de intensitate moderată - severă, acute și cronice.

Dz: Int.: La adulți și adolescenți peste 14 ani: 50 mg, eventual se repetă la 30-60 min; maxim 400 mg/zi. Inj.: i.v. lent, perf. i.v., i.m. sau s.c., inițial 100 mg; după o oră 50 mg la intervale de 10-20 de min, maxim 250 mg. La

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TENECTEPLASUM
TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM

Cod ATC: R01AA09

MUCONASAL® PLUS SPRAY BOEHRINGER INGELHEIM; Sol. nazală 1,18 mg/ml; ct. × 1 fl. × 10 ml + pompa dozatoare + aplicator nazal (**OTC**)

Ind: Inflamații ale mucoasei nazale (congestie nazală) asociate cu răceală comună și rinită alergică. Facilitarea drenajului secrețiilor în sinuzite și otite medii (ocluzia trompei lui Eustachio).

Dz: *Adulți:* 1 puf (0,0826 mg clorhidrat de tramazolin) de max. 4 ori pe zi, în fiecare nară. *Copii (6-12 ani):* 1 puf de max. 2 ori pe zi, în fiecare nară.

Cind: Copii sub 6 ani. Rinită uscată. Hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți.

Al: Produsul poate produce amețeli (atenție în cazul șoferilor sau activităților de precizie). Utilizarea prelungită poate duce la inflamație cronică prin tahifilaxie și la atrofia mucoasei nazale. Asocierea cu IMAO sau antidepresive triciclice poate determina HTA. Atenție la pacienții cu glaucom cu unghi închis. Se va evita contactul cu ochii. Precauție în sarcină și alăptare.

RA: Edem al mocoasei (hiperemie reactivă), senzație de arsură nazală la pacienții sensibili. Rar cazuri severe de greață, vărsături, amețeli, cefalee, secreții nazale, tulburări ale gustului. Este posibil să apară efecte cardiovasculare (palpitații, modificări ale frecvenței cardiace sau HTA).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TENONITROZOLUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM

Cod ATC: C09AA10

GOPTEN® 0,5 mg; GOPTEN® 2 mg; GOPTEN® 4 mg ABBOTT; Cps. 0,5 mg, 2 mg, 4 mg; ct. × 2, 6 sau 10 blist. × 10 cps. (0,5 mg), ct. × 2 blist. × 7 cps. (2 mg, 4 mg) (**P-6L**)

Ind: HTA esențială. Disfuncție ventriculară stângă după IMA.

Dz: 2 mg/zi într-o singură priză. Dacă Cl creatininei este 10-30 ml/min doza inițială este de 0,5 mg și se poate crește, dacă este necesar, la 1 mg. Dacă Cl creatininei este <10 ml/min doza este 0,5 mg o dată/zi.

Cind: Hipersensibilitate la trandolapril sau la un alt IEC; antecedente de angiodem asociat cu terapie anterioară cu IEC; edem angioneurotic sau ereditar; sarcină și alăptare.

Al: Monitorizarea funcției renale și a potasemiei în prima săpt. de trat.; prudență în IR, IH, deficiență hidrosalină, HTA severă, IC, vârstnici, stenoza de arteră renală; nu se va efectua dializă sau hemofiltrare; interacțiuni medicamentoase cu sare de bucătărie, hipotensoare, AINS, potasiu, diuretice economisitoare de potasiu, litiu, alcool, hipnotice, allopurinol, imunodepresive, citostatice, corticoizi, procainamidă; șoferi și activități de precizie.

RA: IC, HTA severă, amețeli, slăbiciuni, tulburări de vedere, tahicardie, palpitații, tulburări de ritm, angină pectorală, IMA, accidente ischemice tranzitorii, tulburări ale funcției renale, proteinurie, tuse iritativă uscată și bronșită, dispnee, sinuzite, rinite, bronhospasm, glosită, uscăciunea gurii, edem angio-neurotic, greață, diaree, vărsături, constipație, inapetență, icter colestatic, IH, pancreatită, ileus, exantem, urticarie, febră, mialgii, artralгии, vasculite, eozinofilie, tulburări psoriaziforme, foto-sensibilitate, alopecie, onikoliză, sindrom Raynaud, cefalee, oboseală, depresii, tulburări de somn, impotență, parastezii, tulburări de echilibru, confuzii, vertij, vedere încețoșată, tulburări gustative sau pierderea trecătoare a gustului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01EX

TENOXICAMUM
TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM

TRAVATAN® ALCON; Sol. oft. 40 µg/ml; ct. × 1 fl. × 2,5 ml (*P-RF*)

Ind: Hipertensiune intraoculară sau glaucom cu unghi deschis (monoterapie sau terapie complementară).

Dz: 1 picătură în sacul conjunctival, o dată pe zi. Recomandabil a se adm. seara.

Cind: Persoane sub 18 ani. Hipersensibilitate. Sarcină şi alăptare.

Al: Poate modifica culoarea irisului prin creşterea numărului de melanozomi în melanocite.

RA: *Local:* hiperemie oculară, prurit ocular, durere sau senzaţie de arsură, senzaţie de corp străin, modificarea culorii irisului, fotofobie, reacţie celulară, keratită şi congestie. *Efecte sistemice:* cefalee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TERAZOSINUM
TERBINAFINUM
TERBUTALINUM
TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM

Cod ATC: N06AX05

TRITTICO AC 75 mg; TRITTICO AC 150 mg CSC PHARMACEUTICALS/ ANGELINI FRANCESCO S.p.A.; Cpr. elib. prel. 75 mg, 150 mg; ct. × 30 cpr. (75 mg); ct. × 20 sau 60 cpr. **(P-RF)**

Ind: Trat. depresiei, însoțită sau nu de anxietate.

Dz: *Int.* Inițial, 150 mg/zi; doza se poate crește la intervale de 3-4 zile, până la max. 450 mg pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la clorhidrat de trazodonă sau la celelalte componente ale produsului.

Al: Prudență la pacienți cu afectări hepatice și renale grave. Adm. concomitentă de antihipertensive necesită reducerea dozei de antihipertensiv. Prudență la cardiaci. Dacă apar tulburări de erecție trat. trebuie imediat oprit. Hemograma este necesară dacă apar febră sau alte semne și simptome de infecție. În primele săpt. de trat. pacienții trebuie urmăriți atent. Nu se recomandă adm. la copii. Prudență în cazul asocierii cu alte medicamente psihotrope, digoxină, fenitoină, IMAO, warfarină. Terapia concomitentă cu electroșoc trebuie evitată în timpul trat. cu trazodonă. Prudență în timpul sarcinii și la femeile ce alăptează; la șoferi și activități de precizie.

RA: Somnolență, cefalee, astenie, vertij și episoade de hTA. Rar, tulburări digestive: greață, vărsături, scăderea apetitului. Priapism.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: D10AD01, L01XX14

TERBINAFINUM
 TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
 TETRACYCLINUM
 TETRAZEPAMUM
 TETROFOSMINUM
 TETRYZOLINUM
 THEOPHYLLINUM
 THIAMAZOLUM
 THIAMINUM
 THIOPENTALUM
 TIANEPTINUM
 TIAPRIDUM
 TICARCILLINUM
 TICLOPIDINUM
 TIMOLOLUM
 TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
 TOLNAFTATUM
 TOLPERISONUM
 TOLTERODINUM
 TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
 TRAMADOLUM
 TRAMAZOLINUM
 TRANDOLAPRILUM
 TRAVOPROSTUM
 TRAZODONUM
TRETINOINUM

ACNEDERM NIHFI; Cremă 0,05%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)

AIROL® LAB. PIERRE FABRE; Sol. cut. 0,05%; ct. × 1 fl. × 50 ml (*P-RF*)

AIROL® cremă LAB. PIERRE FABRE; Cremă 0,05%; ct. × 1 tub × 20 g (*P-RF*)

DIAMALIN® 25 mg SINDAN SRL; Dj. 25 mg; ct. × 1 fl. × 40 dj. (*S/P-RF*)

RETIN-A® JANSSEN CILAG; Cremă 0,05%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)

SMOODERM DAR AL DAWA; Cremă 0,05%; ct. × 1 tub × 30 g (*P-RF*)

Ind: Adm. sistemic este indicat în trat. adjuvant al neoplaziilor, în leziuni preneoplazice și în afecțiuni dermatologice. Adm. topic este util în trat. acneei vulgare.

Dz: Adm. int.: 25-75 mg timp de 3-4 săpt. Nr. de cicluri de trat. și doza totală se ajustează în funcție de tolerabilitate și de rezultatele terapeutice. Crema trebuie aplicată o dată pe zi. Se acoperă cu un strat subțire de cremă numai zona afectată (nu și în jurul acestei zone). Rezultatele terapiei apar după 1 1/2 - 3 luni de trat.

Cind: Hipersensibilitate la unul din componenții produsului. În sarcină și în timpul alăptării, hipervitaminoză A, IRA.

Al: Trat. trebuie întrerupt dacă apar semne de hipersensibilitate la tretinoin sau alte componente ale produsului. Pe parcursul trat. se vor urmări probele funcționale hepatice și renale. Există posibilitatea agravării acneei în primele 2-3 săpt. de trat. Pacienții cu hipersensibilitate la etretinat, isotretinoina sau alți derivați de vitamina A pot prezenta hipersensibilitate și la tretinoină. Precauție în cazul asocierii cu: agenți de curățire, descuamanți sau abrazivi; benzoil peroxid; minoxidil; medicamente fotosensibilizante.

RA: Semne și simptome ale hipervitaminozei A. Piele: uscăciune, eritem și rash, prurit, hipersudorație, scăderea pilozității. Membranele mucoase: cheilită, uscăciune a gurii, nasului, conjunctivei sau altor membrane, cu sau fără simptome inflamatorii. Sistemul nervos central: cefalee, pseudotumoră cerebrală (în special la copii), febră, tremor, amețeli, anxietate, paretezii, confuzie, depresie, insomnie, stare de rău. Simțuri: tulburări de vedere și auditive. Sistemul musculo-osos: dureri osoase, toracalii. Tractul gastrointestinal: greață, vomă, durere abdominală, constipație, diaree, anorexie. Disfuncții metabolice, hepatice și renale: hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, creșterea transaminazelor și edeme. Aparatul respirator: dispnee, insuficiență respiratorie, pleurezie, raluri, wheezing. Aparatul cardio-vascular: aritmii, fibrilații. "Sindromul acidului retinoic" la pacienții cu LAP. Teratogenitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TERBUTALINUM
 TERIPARATIDUM
 TERLIPRESSINUM
 TERTATOLOLUM
 TESTOSTERONUM
 TETRACOSACTIDUM
 TETRACYCLINUM
 TETRAZEPAMUM
 TETROFOSMINUM
 TETRYZOLINUM
 THEOPHYLLINUM
 THIAMAZOLUM
 THIAMINUM
 THIOPENTALUM
 TIANEPTINUM
 TIAPRIDUM
 TICARCILLINUM
 TICLOPIDINUM
 TIMOLOLUM
 TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
 TOLNAFTATUM
 TOLPERISONUM
 TOLTERODINUM
 TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
 TRAMADOLUM
 TRAMAZOLINUM
 TRANDOLAPRILUM
 TRAVOPROSTUM
 TRAZODONUM
 TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM

Cod ATC: R01AD11, D07AB09**NASACORT® AQ AVENTIS PHARMA;** Aerosol susp. nazală 55 µg/doză; ct. × 1 fl. × 120 doze (P-RF)**TRIAMCINOLON ACETONID ANTIBIOTICE SA;** Cremă 0,1%; ct. × 1 tub × 12 g (P-RF)

Ind: *Sistemic:* astm bronșic, bronșită cronică cu emfizem, rinită alergică, reacții alergice cutanate, dermatită de contact, dermatită atopică, pemfigus vulgar, psoriazis, dermatita herpetiformă, dermatita atopică, exfoliativă, eczematoasă, boala serului, polimialgie reumatoidă, colagenoze în faza pasivă, poliartrite cronice, artrita juvenilă, dermatite alergice, fibroză pulmonară, sarcoidoză, sindrom nefrotic, leucemie limfatică, limfosarcom, limfogranulomatoză, purpură trombopenică, anemie hemolitică. *Local:* intraarticular în afecțiuni articulare inflamatorii cronice, artrită exsudativă în gută și pseudo-gută, artroză activată, hidrops articular intermitent, umăr blocat cu atrofia sinovialei; inflamații cronice ale sinovialei; intrafocal în bursite, periostite și adenopatii; intralezional în focare izolate de psoriazis, lichen plan, lichen cronic simplu, alopecie cu zone circumscrise, lupus cronic diseminat discoid și pentru cheloide. *Inhalator:* în astm bronșic.

Dz: *Sistemic:* Oral: inițial la 24-40 mg/zi, doza de întreținere este de 2-8 mg/ zi. *Copii:* 1/3-1/2 din doza unui adult. Inj. i.m.: 40-80 mg la interval de cel puțin 4 săpt. *Local.* Intraarticular 10-40 mg la interval de cel puțin 2 săpt. Intralezional 40 mg la interval de cel puțin 2 săpt. *Inhalator:* *Adulți:* 400 µg de 3-4 ori/zi. *Copii 6-12 ani:* 200-400 µg de 3-4 ori/zi.

Cind: *Sistemic:* ulcer gastric și duodenal, osteoporoză, tulburări psihice, infecții produse de viruși, varicelă, amibiază, micoze sistemice, poliomielită, cu 8 săpt. înainte și 2 săpt. după o vaccinare, cataractă. *Local:* varicelă, reacții postvaccinare, procese cutanate tbc sau luetice, micoze, piodermite, keilite, acnee rozacee, infecții respiratorii. *Inhal.:* Trat. primar al status asthmaticus sau al altor episoade astmatice acute ce impun terapia intensivă; hipersensibilitate la triamcinolonă.

Al: Corticoterapia nu se întrerupe brusc; prudență în ulcer gastroduodenal, diverticulită, anastomoze intestinale recente, miozită, tendință la tromboză și embolie, carcinoame cu metastaze, diabet zaharat, boli renale, glomerulonefrită acută, nefrită cronică, limfadenită consecutivă vaccinării B.C.G., copii, TBC în antecedente; nu va fi utilizată pentru trat. crizei de astm; interacțiuni medicamentoase cu digitale, diuretice, antidiabetice, anticoagulante cumarinice, rifampicină, fenitoină, barbiturice, AINS; sarcină și alăptare.

RA: *Sistemic:* față "în lună plină", adipozitate, miopatie, atrofie, osteoporoză, scăderea toleranței la glucoză, activarea sau agravarea diabetului, tulburări ale secreției hormonilor sexuali, teleangiectazii, peteșii, echimoze cutanate, acnee, pierderi de potasiu, tulburări gastrointestinale, ulcer gastroduodenal, creșterea riscului la infecții, scăderea capacității de apărare a organismului, întârzierea procesului de vindecare a rănilor sau de sudare a oaselor, tulburări de creștere la copii, necroze osoase aseptice, cefalee, HTA, transpirație excesivă, amețeli, glaucom, cataractă, tendință la tromboză, pancreatită, inactivarea sau atrofierea corticosuprarenalei, depresie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: B01AC18

TERIPARATIDUM
TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM

AFLEN® SICOMED SA; Cps. 300 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (P-RF)

Ind: Profilaxia accidentelor tromboembolice. Tratamentul complicațiilor trombotice.

Dz: Oral, 300-600 mg triflusal (1-2 capsule) pe zi, în funcție de situația clinică. Capsulele se înghit întregi în timpul sau la sfârșitul meselor. În cazuri particulare, se recomandă următoarele doze: pacienți cu risc crescut de episoade trombotice: 900 mg triflusal (3 capsule) pe zi, iar ca doză de întreținere, 600 mg triflusal (2 capsule) pe zi; profilaxia accidentelor tromboembolice: 300 mg triflusal (1 capsulă) zilnic sau la 2 zile.

Cind: Hipersensibilitate la triflusal, la salicilați sau excipienții produsului. Leziuni gastrointestinale active (de exemplu, gastrite erozive, ulcer gastroduodenal activ) sau antecedente de leziuni gastrointestinale recurente. Accidente hemoragice cerebrovasculare acute. Hepatopatie severă. Diateze hemoragice. Trimestrul III de sarcină.

Al: În timpul tratamentului pe termen lung sunt necesare controale hematologice regulate. Prudență la pacienții cu insuficiență renală cronică severă. Nu se recomandă în cursul primelor 6 luni de sarcină și în cursul alăptării. Precauții la asocierea cu anticoagulate orale și antidiabetice orale.

RA: Reacții adverse gastrointestinale, la pacienții predispuși. La supradozare apar: stimulare sau deprimare a SNC, tulburări ale aparatului respirator, circulator și ale echilibrului electrolitic, hemoragii gastrointestinale și diaree. Tratament: cărbune activat, evacuarea conținutului gastric prin lavaj gastric, corectarea echilibrului electrolitic și tratament simptomatic.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N04AA01

TERLIPRESSINUM
TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM

ROMPARKIN® 2 mg TERAPIA SA; Cpr. 2 mg; ct. × 5 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Boala Parkinson, în special în formele incipiente; parkinsonism provocat de neuroleptice.

Dz: *Adulți:* În boala Parkinson 4-10 mg/zi (în 2-3 prize, după mese) eventual în asociere cu levodopa; în sd. extrapiramidal produs de neuroleptice 4-14 mg/zi, maxim 10 mg/zi la bătrâni. *Copii:* 2-6 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la trihexifenidil, glaucom cu unghi îngust, hipertrofie de prostată cu retenție urinară, stenoza pilorică, epilepsie, atonie intestinală și vezicală, tahiaritmii supraventriculare, fibrilație atrială.

Al: Prudență în sensibilitate crescută la parasimpaticolitice, hipertensivi, IMA, IC, IH și IR; trat. nu se întrerupe brusc; interacțiuni medicamentoase cu amantadină, chinidină, antidepressive triciclice, imipramină, desipramină; sarcină și alăptare.

RA: Uscăciunea gurii, tulburări de vedere, hipotonie oculară, tahicardie, greutate în micțiune, constipație, greață, vomă, amețeli.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: A03AA05

TERTATOLOLUM
TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM

COLOBUTINE® LAB. FOURNIER; Cpr. 100 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

DEBRIDAT PFIZER; Gran. pt. susp. orală 24 mg/5 ml; ct. × 1 fl. gran. pt. 250 ml susp. **(P-6L)**

DEBRIDAT 100 mg PFIZER; Cpr. film. 100 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. **(P-6L)**

IBUTIN® 300 mg ZENTIVA ROMANIA; Cpr. film. cu elib. prel. 300 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

PROMEBUTIN® 100 mg TERAPIA SA; Cpr. 100 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. **(P-6L)**

Ind: Sdr. de colon iritabil sau tulburări digestive funcționale (dureri, crampe abdominale, spasme, balonări, diaree și/sau constipație. La copii în colici, abdomen cronic dureros și tulburări de tranzit intestinal (se poate adm. din prima săptămână de viață).

Dz: *Adulți:* Cpr. film. 100-200 mg de 3 ori pe zi. *Susp.* (adăugare de apă fiartă și răcită) 1-2 lingurițe de 3 ori/zi. *Copii:* 1 ml/kg corp și zi divizat în 2-3 prize; *sugari sub 6 luni:* 1/2 linguriță de 2-3 ori/zi; *sugari 6 luni - 1 an:* 1 linguriță de 2 ori/zi; *1-5 ani:* 1 linguriță de 3 ori/zi; *peste 5 ani:* 2 lingurițe de 3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la trimebutină.

RA: Reacții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C01EB15

TESTOSTERONUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPIENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM

DILATAN® 20 mg; DILATAN® MR 35 mg TERAPIA SA; Cpr. film. 20 mg, Cpr. film. cu elib. modif. 35 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MEDIZIDIN OKASA PHARMA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 1 blist. × 10 cpr. (P-6L)

MODUXIN® 20 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2 blist. × 15 cpr. (P-6L)

PREDOZONE 20 mg OZONE LABORATORIES Ltd.; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2 blist. × 30 cpr. (P-6L)

PREDUCTAL® LAB. SERVIER; Cpr. film. 20 mg; ct. × 2 blist. × 30 cpr. (P-6L)

PREDUCTAL® MR LAB. SERVIER; Cpr. film. elib. modif. 35 mg; ct. × 2 blist. × 30 cpr. (P-6L)

TRIMETAZIDINĂ LPH® 20 mg; TRIMETAZIDINĂ LPH® 35 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 20 mg, cpr. film. cu elib. modif. 35 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 20 cpr. (20 mg), ct. × 6 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-6L)

TRIMETAZIDIN 20 mg VIM SPECTRUM SRL; Cps. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 cps. (P-6L)

TRIVEDON 20 CIPLA; Cpr. film. 20 mg; ct. × 6 blist. × 10 cpr. (P-6L)

Ind: Trat. pe termen lung al ischemiei coronariene, prevenirea crizei de angor în caz de insuficiență coronariană cronică; afecțiuni vasculare corio-retiniene; vertij de origine vasculară, vertij Ménière, acufene.

Dz: 20 mg de 3 ori/zi sau 35 mg de 2 ori/zi, în timpul meselor.

Cind: Hipersensibilitate la trimetazidină.

Al: Prudență în IR; sarcină și alăptare.

RA: Tulburări gastrointestinale cu grețuri și vărsături.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM

Cod ATC: C01EBN1

FOSFOBION S/COMED SA; Sol. inj. 10 mg/ml sarea disodică a acidului adenzintrifosforic (ATP); ct. × 5, 10 sau 100 f. × 1 ml (S/P-RF)

Ind: Processe distrofice și atrofile musculare, insuficiență coronariană cronică și mioidistrofii post-IMA, sdr. de ischemie periferică, tahicardii paroxistice supraventriculare, poliomielită și scleroză multiplă.

Dz: Inj. i.m., i.v. sau intraarterial, 1-3 ml/zi timp de 15-20 zile, putându-se relua după o pauză de 10-15 zile. În ischemiile cronice, 20-30 ml în 200-300 ml ser fiziologic în perf. intraarterială pe cateter în artera femurală.

Cind: IMA recent.

RA: Cefalee, amețeli, dureri precordiale, bradicardie, dispnee, poliurie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L02AE04

TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM

DIPHERELINE® 0,1 mg IPSEN BIOTECH; Pulb. pt. sol. inj. 0,1 mg/fl.; ct. × 7 fl. + 7 f. solv. × 2 ml (S/P-RF)

DIPHERELINE® 3,75 mg; DIPHERELINE® 11,25 mg IPSEN BIOTECH; Pulb. liof. și solv. pt. susp. inj. i.m. cu elib. prel. 3,75 mg/fl., 11,25 mg/fl.; ct. × 1 fl. + 1 f. × 2 ml + 1 seringă × 3 ml + 2 ace (S/P-RF)

Ind: *La bărbat:* cancer de prostată avansat cu metastaze. *La copil:* trat. pubertății precoce la fete sub 8 ani și băieți sub 10 ani. *La femeie:* trat. endometriozei cu localizare genitală sau extragenitală, fibrom uterin, cancer de sân; trat. infertilității feminine ca trat. complementar în fertilizarea in vitro urmată de transfer embrionar.

Dz: *Cancer de prostată:* inj. s.c. 0,1 mg zilnic timp de 7 zile, apoi inj. i.m. 3,75 mg la 28 zile. *Pubertate precoce:* inj. i.m. 50 g/kg la fiecare 4 săpt. *Endometrioză:* inj. i.m. de 3,75 mg în primele 5 zile ale ciclului, repetat lunar. *Infertilitate feminină:* inj. i.m. 3,75 mg în ziua a 2-a a ciclului, apoi din ziua a 15-a începe injectarea de gonadotrofine.

Cind: Sarcină și alăptare.

Al: Monitorizate clinică, biologică și radiologică; prudență în metroragii, ovare polichistice.

RA: *La bărbat:* tulburări urinare, dureri osoase, valuri de căldură, durere la locul de injectare, scăderea libidoului, impotență. *La copil:* la fete mici hemoragii vaginale. *La femeie:* bufeuri de căldură, mucoasă vaginală uscată, cefalee, astenie, pierdere osoasă, dureri pelviene și/sau abdominale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TETRAZEPAMUM
TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)

Cod ATC: B05BB03**TROMETAMOL N** BERLIN-CHEMIE AG; Sol. perf. 3,63%; ct. × 1 sau 10 fl. × 500 ml (S)

Ind: Cazuri selecționate de acidoză metabolică în cadrul chirurgiei cardiace, intervenții chirurgicale cu circulație extracorporală, posttransfuzional, arsuri grave, comă diabetică, edem cerebral, edem pulmonar sever și IR funcțională, postoperatorie; acidoză respiratorie acută gravă; intoxicații acute cu barbiturice, salicilați și alcool metilic.

Dz: Se stabilește doza în funcție de gravitatea acidozei. *Tamponare standard la adulți:* 5-10 ml/kg/oră, în medie 500 ml/oră; doza zilnică este de 1000-2000 ml; *nou-născuți, sugari și copii:* 10-20 ml/kg corp/zi. Perfuzare strict i.v. timp de cel puțin o oră.

Cind: Alcaloză, IR severă, insuficiență respiratorie cronică, soc, hiperhidratare, hipokaliemie, hiponatremie, oligoanurie.

Al: Injectarea paravenoasă poate provoca necroză locală. Prudență în acidoza respiratorie acută (creșterea pH-ului deprimă centrul respirator, făcând necesară asistarea respirației). Monitorizarea glicemiei (risc de hipoglicemie), a ionogramei serice, conc. de bicarbonat, presiunii parțiale a CO₂ și a echilibrului acido-bazic. Menținerea unei diureze corespunzătoare. IR impune reducerea dozelor.

RA: La perfuzare prea rapidă risc de iritare a peretelui venos și hemoliză, tromboflebită, deprimarea respirației, hipoglicemie, dezechilibre hidroelectrolitice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: S01FA06

TETROFOSMINUM
TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM

MYDRIACYL ALCON; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 15 ml (S/P-RF)

MYDRUM ANKERPHARM GROUP CHAUVIN; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-RF)

TROPICAMIDĂ TERAPIA SA; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-RF)

TROPIXAL DEMO SA; Sol. oft. 0,5%; ct. × 1 fl. × 10 ml (S/P-RF)

Ind: Obținerea midriazei și cicloplegiei în scop diagnostic.

Dz: Pentru refracție se instilează 1-2 pic. sol. 1%; se repetă la 5 minute. Pentru examinarea fundului de ochi, se instilează 1-2 pic. din sol. 0,5%, cu 15-20 min. înainte de examinare.

Cind: Hipersensibilitate la tropicamidă, glaucom cu unghi îngust.

Al: Nu se injectează, prudență când presiunea intraoculară este crescută sau nu se cunoaște, când camera anterioară este puțin adâncă.

RA: Senzație de usturime (arsură, înțepătură).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: G04BD09

TETRYZOLINUM
THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM

CERIS® 20 mg MAD AUS AG; Dj. 20 mg; ct. × 3 blist. × 10 dj. (P-RF)

Ind: Hiperactivitate vezicală tradusă prin imperiozitate micțională, cauzată de afecțiuni ale sistemului nervos.

Dz: 1 cpr. de 3 ori pe zi.

Cind: Ocluzie intestinală, retenție urinară cauzată de tulburări uretroprostatice, glaucom cu unghi închis, tahiaritmii, miastenie, dializă, copii sub 15 ani, insuficiență hepatică, femei care alăptează, sarcină.

Al: Activitățile care necesită atenție nu sunt recomandate pe parcursul tratamentului.

RA: Uscăciunea gurii, constipație, tulburări micționale, tulburări ale ritmului cardiac, greață, cefalee, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C05CA04

THEOPHYLLINUM
THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM

TROXERUTIN CHIRMIS FARMIMPEX SRL/TIS FARMACEUTIC; Gel 2%; ct. × 1 tub × 50 g (OTC)

TROXERUTIN MK MARK PHARMACEUTICS; Gel 2%; ct. × 1 tub × 25 sau 45 g (OTC)

TROXEVASIN BALKAN PHARMA TROYAN AD; Cps. 300 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (OTC)

TROXEVASIN BALKAN PHARMA TROYAN AD; Gel 2%; ct. × 1 tub × 40 g (OTC)

VEINAMITOL 3500 mg NEGMA LERADS; Pulb. pt. sol. orală 3,5 g/plic; ct. × 10 plicuri (OTC)

VENOTON EUROPHARM SA; Gel 2%; ct. × 1 tub × 40 g (OTC)

VENORUTON 300 mg NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Cps. 300 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (OTC)

VENORUTON 2% gel NOVARTIS CONSUMER HEALTH; Gel 2%; ct. × 1 tub × 40 g (OTC)

Ind: medicație simptomatică în boala venoasă - varice, hemoroizi. Adjuvant în afecțiuni însoțite de fragilitate capilară: hemoragii retiniene, ateroscleroză, diabet etc.

Dz: *Int.:* Inițial 300 mg de 2-3 ori/zi. *Întreținere* 300 mg/zi timp de 2-4 săptăm. *Ext.* se aplică de 2 ori/zi, timp de 2-3 săptăm.

Cind: Hipersensibilitate la troxerutină.

Al: Trat. trebuie să fie scurt; prudență în sarcină și alăptare.

RA: Greață, cefalee, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

THIAMAZOLUM
THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENXYPHENIDYLLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI

DESCRIERE

INFO

ACT-HIB

[Cod ATC: J07AG01](#)

AVENTIS PASTEUR; Pastilă liof. de vaccin conjugat împotriva Haemophilus influenzae tip b (S/P-RF)

Ind: Imunizarea activă a copiilor împotriva infecțiilor invazive produse de Haemophilus influenzae tip b, începând cu 2 luni.

Dz: Inj. i.m. și s.c. 2 luni - 2 ani: față anterolaterală a coapsei (în treimea medie); 2-5 ani: regiunea deltoidiană. 2-6 luni: 3 doze × 0,5 ml, la 1-2 luni, urmate de un rapel (0,5 ml) la 12 luni de la a 3-a doză; 6 luni - 1 an: 2 doze × 0,5 ml, la 1-2 luni, urmate de un rapel (0,5 ml) la 12 luni de la a 2-a doză; 1-5 ani: 1 doză × 0,5 ml, fără rapel.

Cind: Boli acute febrile, boli acute sau cronice în curs de evoluție, hipersensibilitate la constituenții vaccinului și la proteina tetanică.

Al: Dacă Act - HIB se adm. simultan cu alte vaccinuri (rujeolă, rubeolă, oreion), acestea se vor inj. în zone anatomice diferite.

AVAXIM ADULT

[Cod ATC: J07BC02](#)

AVENTIS PASTEUR; Susp. inj. cu virus hepatitic A inactivat cu formaldehidă (160 U Ag HAV) (S/P-RF)

Ind: Imunizarea activă împotriva infecției cu virusul hepatitic A la adulți (peste 15 ani).

Dz: Inj. i.m., s.c. Se adm. o singură doză de vaccin de 0,5 ml urmată de un rapel la 6 luni.

Cind: Febră, o boală acută sau cronică în evoluție, hipersensibilitate la unul din compuși sau ca urmare a unei vaccinări anterioare. Sarcină și alăptare.

Al: Nu se adm. i.v., în mușchii fesieri datorită stratului variabil de țesut adipos și nici intradermic întrucât pe aceste căi de adm. se induce un slab răspuns imunologic. Acest vaccin nu asigură protecție împotriva infecțiilor cauzate de virusurile hepatitei B, C și E sau a altor agenți patogeni hepatici.

RA: Reacții locale - dureri însoțite de eritem. Foarte rar - noduli la locul injectiei. Reacții sistemice - stări subfebrile, astenie, dureri de cap, mialgie, dureri articulare, tulburări gastrointestinale.

AVAXIM 80 U PEDIATRIC

[Cod ATC: J07BC02](#)

AVENTIS PASTEUR; Susp. inj. cu virus hepatitic A inactivat cu formaldehidă (80 U Ag HAV) (S/P-RF)

Ind: Imunizarea activă împotriva infecției cu virusul hepatitic A la copii, începând cu vârsta de 12 luni, până la 15 ani inclusiv.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AB11

THIAMINUM
THIOPENTALUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM

VALTrex GLAXO SMITHKLINE; Cpr. 500 mg; ct. × 1 fl. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Trat infecției cu herpes zoster.

Dz: 1000 mg de 3 ori/zi.

Cind: Hipersensibilitate la valaciclovir și aciclovir.

Al: Prudență în IR, copii; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină, probenecid; sarcină și alăptare.

RA: Cefalee, greață, IR, anemie hemolitică, trombocitopenie, rash.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

THIOPENTALUM
 TIANEPTINUM
 TIAPRIDUM
 TICARCILLINUM
 TICLOPIDINUM
 TIMOLOLUM
 TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
 TOLNAFTATUM
 TOLPERISONUM
 TOLTERODINUM
 TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
 TRAMADOLUM
 TRAMAZOLINUM
 TRANDOLAPRILUM
 TRAVOPROSTUM
 TRAZODONUM
 TRETINOINUM
 TRIAMCINOLONUM
 TRIFLUSALUM
 TRIHEXYPHENIDYLUM
 TRIMEBUTINUM
 TRIMETAZIDINUM
 TRIPHOSPHADENINUM
 TRIPTORELINUM
 TROMETAMOLUM (THAM)
 TROPICAMIDUM
 TROSPIMUM
 TROXERUTINUM
 VACCINURI
 VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM

Cod ATC: J05AB14**VALCYTE®** HOFFMANN LA ROCHE; Cpr. film. 450 mg; ct. × 1 fl. × 60 cpr. (P-RF)

Ind: Inducția și menținerea tratamentului pentru retinită cu citomegalovirus (CMV) la pacienții cu sindromul imunodeficienței umane dobândite (SIDA). Prevenția bolii CMV la pacienții cu transplant de organ solid care prezintă risc.

Dz: Dozajul standard la *adulți* în tratamentul de inducție al retinitei CMV: Pentru pacienții cu retinită CMV activă, doza recomandată este de 900 mg valganciclovir (două comprimate de Valcyte 450 mg) de două ori pe zi timp de 21 de zile și, când este posibil, administrate cu alimente.

Tratamentul de întreținere al retinitei CMV: după tratamentul de inducție, sau la pacienții cu retinită CMV inactivă, doza recomandată este de 900 mg valganciclovir (două comprimate Valcyte 450 mg) o dată pe zi, dacă este posibil, administrate cu alimente. Pacienții la care retinita s-a agravat pot repeta tratamentul de inducție; totuși trebuie acordată atenție posibilității dezvoltării de rezistență virală.

Prevenția bolii CMV la *pacienții cu transplant*: pentru pacienții care au primit transplant doza recomandată este de 900 mg (două comprimate a 450 mg) o dată pe zi, cu începere în decurs de 10 zile de la transplant până la 100 de zile post-transplant. Oricând este posibil, comprimatele trebuie administrate odată cu ingerarea de alimente. În insuficiența renală se administrează în funcție de clearance-ul creatininei: □ 60: doza de inducție este 900 mg (2 comprimate) de două ori pe zi, doza de menținere/prevenție 900 mg (2 comprimate) o dată pe zi; 40-59: doza de inducție este 450 mg (1 comprimat) de două ori pe zi, doza de menținere este 450 mg (1 comprimat) o dată pe zi; 25-39: doza de inducție este 450 mg (1 comprimat) o dată pe zi, doza de menținere este 450 mg (1 comprimat) la fiecare 2 zile; 10-24: doza de inducție este 450 mg (1 comprimat) la fiecare 2 zile, doza de menținere este 450 mg (1 comprimat) de două ori pe săptămână.

Comprimatele nu trebuie zdrobite sau sparte.

Cind: Hipersensibilitate la valganciclovir, ganciclovir, aciclovir și valaciclovir sau la oricare dintre excipienți. Este contraindicat în timpul alăptării.

Al: Înainte de inițierea terapiei cu valganciclovir, pacienții trebuie informați asupra potențialului risc teratogen și cancerigen. Utilizarea la copii și adolescenți nu este recomandată.

Interacțiuni cu: dapsonă, pentamidină, flucitozină, vincristin, vinblastin, adriamicin, amfotericină B, trimetoprim/combinații sulfa, analogi nucleozidici și hidroxiuree.

Nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă beneficiul terapeutic pentru mamă este mai mare decât riscul potențial de afectare teratogenică a co-pilului. Femeile de vârstă fertilă trebuie sfătuite să utilizeze metode contraceptive eficiente în timpul tratamentului. Pacienții de sex masculin trebuie sfătuiți să utilizeze contracepție de barieră în timpul, și cel puțin 90 de zile după întreruperea tratamentului. Prudență la conducătorii auto.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C09CA03

DIOVAN® 40; DIOVAN® 80; DIOVAN® 160 NOVARTIS PHARMA; Cpr. film. 40 mg, 80 mg sau 160 mg; ct. × 2 blist. × 14 cpr. (P-6L)

Ind: Tratamentul HTA. Insuficiență cardiacă. Post-infarct miocardic.

Dz: Pentru tratamentul HTA, 80 mg pe zi, în priză unică. Efectul maxim apare după 4 săptăm. Doza poate fi crescută la 160 mg/zi. În insuficiența cardiacă, doza recomandată este de 40 mg de două ori pe zi. În caz de post-infarct de miocard, tratamentul trebuie început la cel puțin 12 ore de la producerea infarctului. Doz inițială este de 20 mg de două ori pe zi, iar apoi, timp de câteva săptămâni, se crește doza treptat până la 160 mg de două ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la valsartan, sarcină.

Al: Corectarea depleției sodice și/sau lichidiene înaintea trat.; prudență în stenoza bilaterală de arteră renală sau unilaterală pe rinichi unic funcțional, IR, IH, copii; interacțiuni medicamentoase cu diuretice care economisesc potasiu; alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Cefalee, amețeli, infecții virale, infecții ale tractului respirator superior, tuse, diaree, oboseală, rinită, sinuzită, dureri de spate, dureri abdominale, greață, faringită, artralgii, scăderea hemoglobinei și hematocritului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J01XA01

TIAPRIDUM
TICARCILLINUM
TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)

EDICIN LEK PHARMACEUTICALS; Pulb. liof. pt. sol. inj. 500 mg, 1 g (S)

VANCOCIN ELI LILLY; Pulb. pt. sol. inj. 500 mg, 1 g; ct. × 1 fl. (S)

Ind: Inj. iv: infecții produse de germeni sensibili la vancomicină (cu excepția meningitei), în special infecții stafilococice severe.

Dz: Inj. i.v: *Adulți:* 2 g/zi (aproximativ 30 mg/kg și zi). *Copii și sugari:* 40 mg/kg și zi. În cazul afectării SNC, doza poate fi crescută la 15 mg/kg la fiecare 6 ore (60 mg/kg și zi). *Nou-născuți:* 0-7 zile: 30 mg/kg și zi ca doză de atac, apoi 10 mg/kg la fiecare 12 ore. 7-30 zile: 45 mg/kg și zi. *IR:* doza inițială este 1 g, urmată, la fiecare 7-10 zile, dependent de rezultatele obținute după controlarea concentrației serice, de 1 g sau de 500 mg.

Cind: Hipersensibilitate la vancomicină.

Al: Prudență în IR, tulburări de auz, vârstnici, anestezie generală; interacțiuni medicamentoase cu aminoglicozide, polimixină B, curarizante, cisplatină, anestezice; sarcină și alăptare.

RA: Reacție anafilactică, ototoxicitate, nefrotoxicitate, greață, vomă, febră, urticarie, erupții maculare cutanate, neutropenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TICARCILLINUM
 TICLOPIDINUM
 TIMOLOLUM
 TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
 TOLNAFTATUM
 TOLPERISONUM
 TOLTERODINUM
 TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
 TRAMADOLUM
 TRAMAZOLINUM
 TRANDOLAPRILUM
 TRAVOPROSTUM
 TRAZODONUM
 TRETINOINUM
 TRIAMCINOLONUM
 TRIFLUSALUM
 TRIHEXYPHENIDYLUM
 TRIMEBUTINUM
 TRIMETAZIDINUM
 TRIPHOSPHADENINUM
 TRIPTORELINUM
 TROMETAMOLUM (THAM)
 TROPICAMIDUM
 TROSPIUM
 TROXERUTINUM
 VACCINURI
 VALACYCLOVIRUM
 VALGANCICLOVIRUM
 VALSARTANUM
 VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM

Cod ATC: G04BE09

LEVITRA® 5 mg; LEVITRA® 10 mg; LEVITRA® 20 mg GLAXO SMITHKLINE; Cpr. film. 5 mg, 10 mg, 20 mg; ct. × 1 blist. × 2, 4, 8 sau 12 cpr. (P-RF)

Ind: Tratamentul disfuncției erectile, care reprezintă incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție a penisului suficientă pentru o performanță sexuală satisfăcătoare. Pentru a fi eficace, este necesară stimularea sexuală.

Dz: *Bărbați adulți:* 10 mg oral, adm. cu aproximativ 25-60 minute înainte de activitatea sexuală. În funcție de eficacitate și tolerabilitate doza poate fi crescută la 20 mg sau scăzută la 5 mg. Doza maximă recomandată este de 20 mg. Frecvența maximă de administrare recomandată este de o dată pe zi. Debutul acțiunii poate fi întârziat în cazul administrării cu un prânz bogat în lipide. *Vârstnici:* doza inițială este de 5 mg. În funcție de eficacitate și tolerabilitate, doza poate fi crescută la 10-20 mg. La pacienții cu afectare hepatică ușoară și moderată (scor Child-Pugh A-B) se adm. o doză inițială de 5 mg. În funcție de eficacitate și tolerabilitate, doza poate fi crescută la 10 mg și apoi la 20 mg. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu afectare renală ușoară - moderată. La pacienții cu afectare renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min), se adm. o doză inițială de 5 mg. Pe baza tolerabilității și eficacității doza poate fi crescută la 10-20 mg. Nu este indicată pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Atunci când se administrează în asociere cu eritromicina, doza de vardenafil nu trebuie să depășească 5 mg.

Cind: Co-administrarea cu nitrați sau donori de oxid nitric (cum este nitritul de amil), în orice formă farmaceutică. Nu trebuie administrată la bărbații la care activitatea sexuală nu este recomandată: pacienți cu afecțiuni cardiovasculare severe ca angină instabilă sau insuficiență cardiacă severă (NYHA III sau IV). Afectare hepatică severă (Child-Pugh C), afecțiuni renale în stadiul final care necesită dializă, hipotensiune arterială (presiunea arterială < 90/ 50 mmHg), antecedente recente de accident vascular cerebral sau infarct miocardic (în ultimele 6 luni), angina instabilă și afecțiuni retiniene ereditare degenerative cunoscute, cum este retinita pigmentară. Administrarea concomitentă a vardenafilului cu inhibitori potenți ai CYP 3A4 (ritonavir, indinavir, ketoconazol și itraconazol (forme cu administrare orală) este contraindicată la bărbații cu vârsta peste 75 ani. Hipersensibilitate la vardenafil sau la oricare dintre excipienții produsului.

Al: Înaintea administrării se evaluează statusul cardiovascular al pacienților. Precauție la pacienții cu deformări anatomice ale penisului: angularea, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie, la pacienții cu afecțiuni ce pot predispuce la priapism: siclemia, mielomul multiplu, leucemia. Prudență la pacienți cu tulburări de coagulare sau cu ulcer peptic activ. Interacțiuni cu blocante alfa-adrenergice, ritonavir, indinavir, itraconazol și ketoconazol, eritromicină, suc de grapefruit. Nu este indicată administrarea la femei. Prudență la conducătorii auto și la cei care lucrează cu utilaje (s-au raportat amețeli și tulburări de vedere).

RA: Foarte frecvente (≥ 10%): înroșirea feței, cefalee. Frecvente (> 1%, < 10%): dispepsie, greață, amețeli, rinită.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TICLOPIDINUM
TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM

Cod ATC: M03AC03**NORCURON® 4 mg** ORGANON; Pulb. + solv. pt. sol. inj. 4 mg; ct. × 10 sau 50 f. pulb. + 10 sau 50 f. solv. **(S)****NORCURON® 10 mg** ORGANON; Pulb. pt. sol. inj. 10 mg; ct. × 4, 10 sau 20 fl. **(S)**

Ind: Curarizant antidepolarizant. Adjuvant în anestezia generală pentru facilitarea intubației traheale și asigurarea unei relaxări musculare bune care să permită actul chirurgical.

Dz: i.v.; doza se adaptează în funcție de pacient. *Adulți și copii peste un an:* doza de intubare 0,08-0,1 mg/kg; doza de întreținere 0,02-0,03 mg/kg; *nou-născuți:* 0,01-0,02 mg/kg. *Cezariană:* 0,1 mg/kg.

Cind: Antecedente cunoscute de reacție anafilactică.

A!: Reacții anafilactice.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06AX16

TIMOLOLUM
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM

EFFECTIN WYETH LEDERLE PHARMA; Cpr. 37,5 mg, 75 mg; ct. × 2 sau 4 blist. × 14 cpr. **(P-RF)**
EFFECTIN ER WYETH MEDICA; Cps. 37,5 mg, 75 mg, 150 mg; ct. × 1 blist. × 14 sau 28 cpr., ct. × 3 blist. × 10 cpr. **(P-RF)**
VENLAFAXIN LPH 37,5 mg; VENLAFAXIN LPH 75 mg LABORMED PHARMA; Cpr. 37,5 mg, 75 mg; ct. × 3 sau 100 blist. × 20 cpr., respectiv ct. × 6 sau 100 blist. × 10 cpr. **(S/P-RF)**

Ind: Simptome ale bolilor depresive, inclusiv boli depresive asociate cu anxietate.

Dz: 37,5 mg de 2 ori pe zi.

Cind: Hipersensibilitate la venlafaxină; copii sub 18 ani; trat. recent cu IMAO; sarcină și alăptare.

Al: Prudență în afecțiuni hepatice și renale, antecedente de epilepsie, boli cardiace; interacțiuni medicamentoase cu cimetidină; șoferi și activități de precizie.

RA: Rash, reacții alergice; cefalee, disconfort abdominal; frecvență cardiacă neregulată sau crescută; schimbări ale apetitului, indigestii, flatulență, greață, vomă; creștere în greutate; schimbări de dispoziție, anxietate, amețală, insomnie, scăderea apetitului sexual, impotență, slăbiciune, tremor; transpirații, gură uscată; senzații de înțepături sau arsuri la nivelul pielii; tulburări ale vederii; tulburări de ejaculare/orgasm; hTA ortostatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TINIDAZOLUM
 TINZAPARINUM
 TIOGUANINUM
 TIOTROPIUM
 TIREOTROPINUM ALFA
 TIROFIBANUM
 TIXOCORTOLUM
 TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
 TOLNAFTATUM
 TOLPERISONUM
 TOLTERODINUM
 TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
 TRAMADOLUM
 TRAMAZOLINUM
 TRANDOLAPRILUM
 TRAVOPROSTUM
 TRAZODONUM
 TRETINOINUM
 TRIAMCINOLONUM
 TRIFLUSALUM
 TRIHEXYPHENIDYLLUM
 TRIMEBUTINUM
 TRIMETAZIDINUM
 TRIPHOSPHADENINUM
 TRIPTORELINUM
 TROMETAMOLUM (THAM)
 TROPICAMIDUM
 TROSPIMUM
 TROXERUTINUM
 VACCINURI
 VALACYCLOVIRUM
 VALGANCICLOVIRUM
 VALSARTANUM
 VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
 VARDENAFILUM
 VECURONIUM
 VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM

Cod ATC: C08DA01

CORDAMIL 40, CORDAMIL 80 AC HELCOR SRL; Cpr. film. 40 mg, 80 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (P-6L)
FALICARD AWD PHARMA GmbH & Co. KG; Sol. inj. 2,5 mg/ml (f. × 2 ml) (S)
FALICARD 40; FALICARD 80; FALICARD 120 AWD PHARMA GmbH & Co. KG; Cpr. film. 40 mg; 80 mg sau 120 mg (P-6L)
FALICARD LONG AWD PHARMA GmbH & Co. KG; Cps. ret. 180 mg (P-6L)
ISOPTIN® 40 mg; ISOPTIN® 80 mg ABBOTT; Cpr. film. 40 mg, 80 mg; ct. × 5 blist. × 10 sau 20 cpr. (P-6L)
ISOPTIN RR ABBOTT; Cpr. film. elib. prel. 240 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-6L)
VERAPAMIL CHINOIN - membru al SANOFI-SYNTHELABO GROUP; Dj. 40 mg, 80 mg; ct. × 2 blist. × 25 dj. (P-6L)
VERAPAMIL ARENA GROUP SA; Cps. 80 mg; ct. × 1 fl. × 20 cps. (P-6L)
VERAPAMIL AL 40; VERAPAMIL AL 80 ALIUD PHARMA; Cpr. film. 40 mg, 80 mg; ct. × 5 sau 10 blist. × 10 cpr. (P-6L)
VEROGALID® ER 240 mg IVAX PHARMACEUTICALS; Cpr. film. elib. prel. 240 mg; ct. × 1 sau 3 blist. × 10 cpr., ct. × 1 fl. × 30 sau 100 cpr. (P-6L)

Ind: Int.: Profilaxia și tratamentul stărilor de insuficiență coronariană cronică: angină cronică stabilă; angină de repaus, inclusiv angină vasospastică, angină instabilă; angină post IMA; HTA; tahiaritmii de tipul tahicardiei paroxistice supraventriculare; flutter și fibrilație atrială cu ritm ventricular rapid (în afară de sdr. WPW). Inj.: Tahiaritmii ca tahicardia paroxistică supraventriculară; fibrilație atrială/flutter atrial cu tahiaritmie (exceptând sindromul WPW,); crize hipertensive; insuficiența coronariană acută (spasme coronariene).

Dz: Int.: *adulti:* 40-80 mg de 3-4 ori/zi. *Copii sub 6 ani:* 80-120 mg/zi. *Copii peste 6 ani:* 40-120 mg de 2-3 ori/zi (maxim 360 mg/zi). Pacienți cu ciroză hepatică: la început se adm. 40 mg de 2-3 ori/zi. Forme retard: pt. HTA: 240 mg dimineața, suplimentat la nevoie cu 120-240 mg; pt. celelalte indicații: 120 mg de 2 ori/zi, maxim 480 mg/zi. Inj.: i.v. lent *adulti:* inițial 5 mg, repetat la nevoie după 5-10 min; perf. 5-10 mg/oră. *Copiii: nou-născuți:* 0,75-1 mg; *sugari:* 0,75-2 mg; *1-5 ani:* 2-3 mg; *6-14 ani:* 2,5-5 mg.

Cind: Colaps cardiocirculator, IMA recent însoțit de complicații (bradicardie, hTA accentuată, insuficiență ventriculară stângă); tulburări grave ale conducerii impulsului electric (BAV de gradul II sau III, bloc sinuatric); sindromul nodului sinusal bolnav (sindromul bradicardie-tahicardie).

AI: Preparatele retard nu se administrează la copii; prudență în caz BAV de gradul I, bradicardie sub 50 bătăi/min, hTA, tahicardii ventriculare, fibrilație atrială/flutter atrial în prezența simultană a unui sindrom de preexcitare, IC, distrofie musculară progresivă, insuficiență coronariană acută; interacțiuni medicamentoase cu betablocante și alte antihipertensive, alte antiaritmice (chinidină), anestezice inhalatorii, digoxină, carbamazepină, ciclosporină, teofilină, cimetidină, miorelaxante; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Bradiaritmii ca bradicardie sinusală, oprire sinusală cu asistolie, BAV de gradul II sau III, bradiaritmie ventriculară, dezvoltarea sau accentuarea unei IC, aritmii atriale, hTA, constipație, greață, amețeli, senzație de hui măceală, cefalee, înroșirea pielii feței, năuseală, nervozitate, edeme ale gleznelor, eritem, eritem al nasului, năusee.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TINZAPARINUM
TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM

Cod ATC: L01XD02**VISUDYNE** NOVARTIS PHARMA; Pulb. pt. sol. perf. 15 mg; ct. × 1 fl. (S)**Ind:** Trat. degenerescentei maculare senile la pacienții la care predomină forma clasică de neovascularizație coroidiană subfoveală.**Dz:** Inițial perf. i.v. timp de 10 minute a 6 mg/m², apoi activarea prin acțiunea luminii, la 15 minute după începerea perfuziei, cu lumină roșie non-termică (lungime de undă 689 nm ± 3 nm) produsă de un laser cu diode, dirijată cu ajutorul unui sistem optic de fibră de sticlă montat la lampa cu fantă și a unei lentile de contact adecvate. La intensitatea recomandată a luminii de 600 mW/cm², sunt necesare 83 de secunde pentru a elibera doza necesară de lumină de 50 J/cm².**Cind:** Hipersensibilitate la verteporfină, porfirie, IH severă.**Al:** Pacienții trebuie reevaluați la 3 luni; trat. poate fi repetat de maxim 4 ori pe an; pacienții trebuie să evite expunerea neprotejată a pielii, ochilor sau altor părți ale corpului la lumina solară directă sau la o lumină de interior puternică 48 ore după perf.; prudență în IH moderată, obstrucție biliară, extravazare, IC necontrolată, HTA necontrolată; interacțiuni medicamentoase cu agenți fotosensibilizanți; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.**RA:** Vedere anormală, diminuarea acuității vizuale, defecte de câmp vizual, tulburări lacrimale, hemoragie subretiniană, hemoragie intravitrăasă, durere, edem, extravazare, greață, reacții de fotosensibilizare, dureri lombare, astenie, prurit, hipercolesterolemie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01CA01

TIOGUANINUM
TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYFENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM

VELBE® LILLY FRANCE; Pulb. pt. sol. inj. 10 mg/fl. (S)

Ind: Maladia Hodgkin și limfoame non- Hodgkin, cancer testicular, cancer de sân, cancer al rinichiului, cancer al vezicii urinare, unele cazuri de histiocitoză.

Dz: *Copii:* doza inițială 2,5 mg/m²; se crește cu 1,25 mg/m² pe săptămână până la atingerea dozei maxime de 12,5 mg/m². *Adulți:* doza inițială 4-7 mg/m²; max. 18,5 mg/m² pe săptămână. Perfuzie continuă: 1,5-2 mg/m² 4-5 zile. Factorul care limitează doza este leucopenia.

Cind: Hipersensibilitate, sarcină, alăptare, neutropenii nelegate de maladia tratată, infecții.

Al: Adm. strict i.v. de către personal cu experiență. Se va evita contactul soluției cu ochii sau pielea. Controlul formulei sanguine înaintea inițierii terapiei. Interacțiuni medicamentoase cu ciclosporina, vaccinuri vii atenuate, medicamente care inhibă izoenzima citocrom P450 CYP 3A, fenitoina, mitomicina C. Prudență la șoferi și activități de precizie.

RA: Deprimare medulară, leucopenie, constipație, anorexie, grețuri, vărsături, dureri abdominale, scaune cu mucus, diaree, hemoragie digestivă (cu ulcer preexistent), enterocolită hemoragică, HTA, alopecie reversibilă, hiponatriemie la doze mari.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: C04AX07

TIOTROPIUM
TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENXYPHENIDYLLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM

OXYBRAL SR GLAXO SMITHKLINE; Cps. ret. 30 mg; ct. × 1 blist. × 10 cps. **(P-6L)****VINCAMINĂ** BIOFARM SA; Dj. 10 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. **(P-6L)**

Ind: Normalizarea și adaptarea fluxului vascular cerebral la nevoile metabolice. Tulb. de memorie la vârstnici, tulb. de concentrare, atenție și conștiență. Boli trofice degenerative (diabet zaharat, ateroscleroză), accidente cerebrale acute (post-traumatic, post-apoplectic, encefalopatie hipertensivă). Amețeală, vertij, cefalee de origine vasculară și migrenă. Tulb. de auz de origine vasculară. Tulb. de vedere de origine vasculară. Tulb. psihiatrice: orientare temporo-spațial, tulb. emoționale, tulb. cerebro-vasculare în special ischiemice. Îmbunătățirea capacității intelectuale la copii și adolescenți.

Dz: Copii: 1/2 linguriță de 3 ori pe zi. **Adulți:** 1-2 lingurițe de 3 ori pe zi sau 1 cps. de 2 ori pe zi.

Cind: Tumori intracraniene, hipersensibilitate. Sarcină și alăptare.

Al: Precauție în IH și afecțiuni cardiace.

RA: Tulb. digestive foarte rare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: L01CA02

TIREOTROPINUM ALFA
TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYFENIDILUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM

CITOMID LEMERY SA; Liof. pt. sol. inj. 1 mg; ct. × 1 fl. + 1 f. solv. × 10 ml (S)

SINDOVIN® 1 mg SINDAN SRL; Liof. pt. sol. inj./perf. 1 mg; ct. × 1 fl. (S)

Ind: Polichimioterapie: Leucemie acută limfoblastică, boala Hodgkin, limfoame non-Hodgkin, cancer pulmonar cu celule mici, cancer de sân, cancer de col uterin, mielom multiplu, rabdomiosarcom, neuroblastom, nefroblastom, tumori embrionare ale copilului, sarcom Ewing, osteosarcom. Monoterapie în purpura trombocitopenică idiopatică.

Dz: Monoterapie, adulți: 1,4 mg/m² o dată pe săptămână. Copii cu greutate peste 10 kg: 1-2 mg/m². Copii cu greutate mai mică de 10 kg: 0,05 mg/m² o dată pe săptămână.

Cind: Hipersensibilitate, forme demielinizante ale sd. Charcot-Marie-Tooth. Asociere cu itraconazol sau nifedipină.

Al: Adm. strict i.v. Administrarea intratecală poate fi fatală. Prudență la asocierea cu alte citostatice, vârstnici, în prezența leucopeniei și trombocitopeniei, IH și obstrucție biliară.

RA: De obicei reversibile și dependente de doză. Tulb. neurologice, vegetative (constipație, dureri abdominale, tulb. de micțiune), tulb. gastrointestinale (greață, vărsături, anorexie, diaree, perforații intestinale), reacții de hipersensibilitate, tulb. hematologice (leucopenie, trombocitopenie), tulb. endocrine care antrenează hiponatremia, tulb. cardiovasculare (hTA sau HTA, infarct acut de miocard), tulb. pulmonare (bronhospasm sever, dispnee), cefalee, febră, alopecie de obicei tranzitorie, azoospermie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TIROFIBANUM
TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM

Cod ATC: L01CA04**NAVELBINE** LAB. PIERRE FABRE; Sol. inj. 10 mg/ml; ct. × 10 f. × 1, 4 sau 5 ml (S)**NAVELBINE** LAB. PIERRE FABRE; Cps. moi 20 mg, 30 mg; ct. × 1 blist. × 1 cps. (S/P-RF)**VINORELBIN SINDAN 10 mg/ml SINDAN SRL**; Conc. pt. sol. perf. 10 mg/ ml; ct. × 1 fl. × 1 sau 5 ml (S)**Ind:** Cancer pulmonar fără celule mici, cancer de sân cu metastaze.**Dz:** Monoterapie, doza uzuală 25-30 mg/m² o dată pe săptămână. Polichimioterapie: doza se ajusteaza individual. IH; se reduc dozele.**Cind:** IH severă, sarcină și alăptare.**A!:** Adm. strict i.v. Atenție în IR.**RA:** Anemie, oboseală, constipație, vărsături, dispnee, bronhospasm.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N06BX18

TIXOCORTOLUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYDRIUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM

CAVINTON RICHTER GEDEON Ltd.; Conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 ml (**S**)

CAVINTON; CAVINTON FORTE RICHTER GEDEON Ltd.; Cpr. 5 mg, 10 mg; ct. × 2 blist. × 25 cpr. (5 mg), ct. × 2 sau 6 blist. × 15 cpr. (10 mg) (**P-6L**)

VIMPOCETIN 5 mg VIM SPECTRUM SRL; Cps. 5 mg; ct. × 5 blist. × 10 cps. (**P-6L**)

VINPOCETIN 5 mg LAROPHARM SRL; Cps. 5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cps. (**P-6L**)

Ind: Tulburări circulatorii cerebrale: atacuri ischemice tranzitorii (AIT), ictus și stări postictus, demență vasculară, ateroscleroză cerebrală, tulburări ischemice posttraumatice, encefalopatie hipertensivă, insuficiență vertebrobazilară; atenuarea simptomelor neurologice și psihice ale afecțiunilor cerebrovasculare. Tulburări vasculare ale coroidelor și retinei. Presbiacuzie acută, boala Ménière, nevrită cohleo-vestibulară, tinitus.

Dz: Perf. i.v. lent maxim 1 mg/kg și zi. **Int.** 15-30 mg/zi.

Cind: Hipersensibilitate la vinpocetină, faza acută a hemoragiei cerebrale, ischemie coronariană severă, aritmii severe, sarcină și alăptare.

Al: Vinpocetina în soluție este incompatibilă cu heparina.

RA: HTA, tahicardie, extrasistole, insomnie, amețeală, cefalee, senzație de slăbiciune, erupții cutanate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J02AC03

TOBRAMYCINUM
 TOCOFERSOLANUM
 TOFISOPAMUM
 TOLBUTAMIDUM
 TOLNAFTATUM
 TOLPERISONUM
 TOLTERODINUM
 TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
 TRAMADOLUM
 TRAMAZOLINUM
 TRANDOLAPRILUM
 TRAVOPROSTUM
 TRAZODONUM
 TRETINOINUM
 TRIAMCINOLONUM
 TRIFLUSALUM
 TRIHEXYPHENIDYLLUM
 TRIMEBUTINUM
 TRIMETAZIDINUM
 TRIPHOSPHADENINUM
 TRIPTORELINUM
 TROMETAMOLUM (THAM)
 TROPICAMIDUM
 TROSPIMUM
 TROXERUTINUM
 VACCINURI
 VALACYCLOVIRUM
 VALGANCICLOVIRUM
 VALSARTANUM
 VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
 VARDENAFILUM
 VECURONIUM
 VENLAFAXINUM
 VERAPAMILUM
 VERTEPORFINUM
 VINBLASTINUM
 VINCAMINUM
 VINCRISTINUM
 VINOELBINUM
 VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM

VFEND® PFIZER; Pulb. pt. sol. perf. 200 mg; ct. × 1 fl. unidoză × 200 mg (**S**)

VFEND® PFIZER; Cpr. film. 50 mg, 200 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr., ct. × 4 blist. × 7 cpr. (**P-RF**)

VFEND® 40 mg/ml PFIZER; Pulb. pt. sol. orală 40 mg/ml; ct. × 1 fl. × 45 g pulb. (**P-RF**)

Ind: Aspergiloza invazivă, candidoze severe, invazive, rezistente la fluconazol. Infecții cu *Scedosporium*, *Fusarium*.

Dz: Cu cel puțin o oră înainte sau după masă. *Adulți, oral:* inițial: 400 mg la 12 ore în două prize (pacienți cu greutate sub 40 kg doza se reduce la jumătate). *Întreținere:* 200 mg de 2 ori pe zi (100 mg la cei cu mai puțin de 40 kg greutate corporală). *i.v.:* inițial 6 mg/kg la 12 ore, în două prize; *întreținere:* 4 mg/kg de 2 ori pe zi. Nu este necesară ajustarea dozelor la vârstnici, IR sau IH. *Copii:* 2-12 ani: inițial 6 mg/kg i.v. sau oral. La 12 ore, două doze; *întreținere* 4 mg/kg de 2 ori pe zi.

Cind: Nu se asociază cu terfenadina, astemizol, pimoziid, chinidină, fenobarbital.

RA: Febră, cefalee, dureri abdominale, frison, astenie, dureri toracice, edem facial, sindrom pseudo-gripal, hTA, tromboflebită, aritmii, greață, vome, diaree, pozitivarea testelor hepatice, trombopenie, anemie, leucopenie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TOCOFERSOLANUM
TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINOELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS

Cod ATC: C04AD02**SADAMIN® PLIVA KRAKOW**; Cpr. 150 mg; ct. × 3 blist. × 10 cpr. (**P-6L**)**SADAMIN® PLIVA KRAKOW**; Sol. inj. 150 mg/ml; ct. × 10 f. × 2 ml (**P-RF**)

Ind: Tulburări circulatorii periferice: endangită obliterantă, claudicație intermitentă, boală Raynaud, angiopatie diabetică, tromboze, embolii, ulcer varicos, degerături; ateroscleroză cerebrală, sechele postictus; tulburări circulatorii ale retinei și urechii interne; cardiopatii ischemice, sechele post-IMA.

Dz: Int. 150-600 mg de 3 ori/zi, după mese. Inj. i.m. sau i.v. (lent), 300 mg de 1-3 ori/zi. Perf. i.v. 1500-4500 mg.

Cind: IC, IMA, accidente cerebro-vasculare acute, hemoragii acute, colaps, ulcer gastroduodenal în evoluție.

Al: Prudență la bolnavii cu TA labilă, diabetici, infarct cerebral; interacțiuni medicamentoase cu simpatolitice, vasodilatatoare, IMAO; sarcină și alăptare.

RA: Congestie a pielii, prurit, eritem, cefalee, hTA, dureri abdominale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: R01AA07

TOFISOPAMUM
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM

BIXTONIM XYLO 0,1% BIOFARM SA; Spray nazal 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)
OLYNTH 0,05%; OLYNTH 0,1% PFIZER; Aerosol nazal 0,05%, 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)
RHINXYL 0,05%; RHINXYL 0,1% TERAPIA SA; Sol. ext. 0,05%, 0,1%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)
XYLO AL 0,05% ALIUD PHARMA; Sol. nazală 0,05%; ct. × 1 fl. × 10 ml (OTC)

Ind: Coriză, rinită vasomotorie și rinită alergică, inflamații ale sinusurilor paranazale, inflamații catarale ale urechii medii asociate cu coriza.

Dz: 1-2 pic. în fiecare nară, de cel mult 3 ori/zi, maxim 5 zile.

Cind: Hipersensibilitate la xilometazolină; rinita sicca; copii sub 6 ani pt. sol. 1%, respectiv copii sub 2 ani pt. sol. 0,05%; glaucom, îndeosebi cu unghi îngust.

Al: Trat. cronic are risc de atrofie a mucoasei nazale; prudență la cardiaci, feocromocitom, hipertiroidie, diabet zaharat; fenomene de rebound; interacțiuni medicamentoase cu IMAO, antidepresive triciclice; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Irritație locală, moderată și tranzitorie, rebound al congestiei, congestie reactivă cu rinită indusă medicamentos, cefalee, insomnie, astenie, tulburări de vedere, palpitații, tahicardie, HTA.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: V10X

TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE

YTRACIS CIS BIO INTERNATIONAL; Precursor radiofarmaceutic, soluție 1850 GBq/ml; ct. × 1 recipient Pb × 0,5-2 ml (S)

Ind: Marcarea radioactivă a medicamentelor administrate în diferite scopuri terapeutice.

Dz: Posologie stabilită de medic.

Cind: Hipersensibilitate, sarcină, alăptare.

Al: Produsul nu se administrează direct pacientului.

RA: Specifice medicamentului care trebuie marcat radioactiv.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AF03

TOLNAFTATUM
TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM

HIVID ROCHE ROMÂNIA SRL; Cpr. film. 0,375 mg, 0,750 mg; ct. × 1 fl. × 100 cpr. (S/P-RF)

Ind: Terapie asociată cu zidovudină pentru SIDA sau pentru ARC (Complex Asociat SIDA) avansat, cu număr de celule CD4 mai mic sau egal cu 200/mm³.

Dz: Monoterapie: 0,75 mg, la 8 ore. Dacă apare neuropatie periferică: 0,375 mg la 8 ore. Terapie asociată: 0,75 mg zalcitabină, concomitent cu 200 mg zidovudină la 8 ore.

Cind: Hipersensibilitate la zalcitabină.

Al: Monitorizarea pacienților: numărătoarea celulelor CD4, evaluări neurologice, hematologice și clinice; prudență în trat. lungi, persoane infectate cu virusul HIV și asimptomatice, copii sub 12 ani, neuropatie periferică, funcție renală afectată, afecțiuni hepatice preexistente, pancreatită în antecedente, ulcer esofagian, hiperglicemie preexistentă; interacțiuni medicamentoase cu cloramfenicol, iodochinol, etionamidă, aur, ribavirină, vincristină, cisplatină, glutetimidă, hidralazină, nitrofurantoină, dapsonă, fenitoină, isoniazidă, piridoxină, pentamidină, amfotericină; sarcină și alăptare.

RA: Neuropatie periferică, stomatită ulcerativă, cefalee, exantem, oboseală, greață, mialgie, prurit, amețelă, dureri abdominale, faringită, vomă, pierdere în greutate, dureri toracice, astenie, febră, dureri, dureri substernale, tahicardie, anorexie, disfagie, stomatită aftoasă, diaree, dureri abdominale, uscăciune a gurii, ulcer esofagian, vomă, constipație, dureri esofagiene, dispepsie, glosită, stomatită, hemoragie rectală, hemoroizi, ulceratii rectale, abdomen dilatat, afectări gingivale, afectări hepatocelulare, hepatită, artralgie, umăr dureros și crampe ale musculaturii picioarelor, hipertonie, tremor, tremur al mâinilor, confuzie, putere de concentrare diminuată, amnezie, insomnie, somnolență, depresie, faringită, dispnee, tuse, dermatită, exantem maculo-papular, alopecie, urticarie, afectarea simțului gustativ, tulburări de vedere, dureri oculare, xeroftalmie, micțiune frecventă, afecțiuni renale acute.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TOLPERISONUM
TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM
ZANAMIVIRUM

Cod ATC: J05AH01

RELENZA® GLAXO SMITHKLINE; Pulb. liof. 5 mg/doză; ct. × 5 sau 7 blist. (Rotadisk®) × 4 doze pulb. + dispozitiv Diskhaler® (P-RF)

Ind: Trat. infecțiilor provocate de virusurile gripale A și B ale adulților și adolescenților (peste 12 ani).

Dz: Inhal. orale, 10 mg de 2 ori/zi, timp de 5 zile; trat. trebuie început cât de repede posibil.

Cind: Hipersensibilitate la zanamivir.

Al: Prudență în sarcină și alăptare.

RA: Zanamivir este bine tolerat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: J05AF01

TOLTERODINUM
TOPIRAMATUM
TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM
ZANAMIVIRUM
ZIDOVUDINUM

RETROVIR GLAXO SMITHKLINE; Cps. 100 mg; ct. × 1 fl. × 100 cps. (S/P-RF)

RETROVIR GLAXO SMITHKLINE; Sirop 1%; ct. × 1 fl. × 200 ml (S/P-RF)

Ind: Trat. pacienților cu infecție cu virusul HIV asimptomatici sau aflați în stadiile inițiale de progresie a bolii HIV; trat. pacienților cu boală HIV avansată, cum ar fi cei cu SIDA sau cu ARC (Complex Asociat SIDA).

Dz: *Adulți:* 500-600 mg/zi, divizat în 3-5 prize. Alternativ, este eficientă și doza de 1000 mg/zi, divizată în 2-4 prize. *Copii:* peste 3 luni, 180 mg/m², la fiecare 6 ore (720 mg/m² și zi).

Cind: Hipersensibilitate la zidovudină, neutropenie sub $0,75 \times 10^9/l$ sau cu hemoglobină sub 7,5 g/dl.

Al: Nu previne transmiterea HIV; nu vindecă infecția HIV; monitorizare hematologică; prudență la femei obeze, hepatomegalie, hepatită sau alt factor de risc pentru boli hepatice, vârstnici, IR, IH; interacțiuni medicamentoase cu fenitoină, paracetamol, aspirină, codeină, morfină, indometacină, ketoprofen, naproxen, oxazepam, lorazepam, cimetidină, clofibrat, dapsonă, izoprinosină, produse potențial nefrotoxice sau mielosupresive, ribavirină, sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Anemie, neutropenie, leucopenie, grețuri, vărsături, anorexie, dureri abdominale, cefalee, rash, febră, mialgii, paretezii, insomnie, stare de disconfort, astenie, dispepsie, somnolență, diaree, amețeli, dispnee, flatulență, modificarea gustului, dureri toracice, pierderea acuității mentale, anxietate, polakiurie, depresie, dureri generalizate, frisoane, tuse, urticarie, prurit și sindrom pseudo-gripal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TOPIRAMATUM
 TOPOTECAMUM
 TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
 TRAMADOLUM
 TRAMAZOLINUM
 TRANDOLAPRILUM
 TRAVOPROSTUM
 TRAZODONUM
 TRETINOINUM
 TRIAMCINOLONUM
 TRIFLUSALUM
 TRIHEXYPHENIDYLUM
 TRIMEBUTINUM
 TRIMETAZIDINUM
 TRIPHOSPHADENINUM
 TRIPTORELINUM
 TROMETAMOLUM (THAM)
 TROPICAMIDUM
 TROSPIMUM
 TROXERUTINUM
 VACCINURI
 VALACYCLOVIRUM
 VALGANCICLOVIRUM
 VALSARTANUM
 VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
 VARDENAFILUM
 VECURONIUM
 VENLAFAXINUM
 VERAPAMILUM
 VERTEPORFINUM
 VINBLASTINUM
 VINCAMINUM
 VINCRISTINUM
 VINORELBINUM
 VINPOCETINUM
 VORICONAZOLUM
 XANTINOLI NICOTINAS
 XYLOMETAZOLINUM
 YTRIUM HYDROCHLORIDE
 ZALCITABINUM
 ZANAMIVIRUM
 ZIDOVUDINUM
 ZIPRASIDONUM

ZELDOX® 20 mg; ZELDOX® 40 mg; ZELDOX® 60 mg; ZELDOX® 80 mg PFIZER; Cps. 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg; ct. × 1 sau 4 blist. × 14 cps; ct. × 2, 3, 5, 6 sau 10 blist. × 10 cps. (P-RF)

ZELDOX® 10 mg/ml PFIZER; Susp. orală 10 mg/ml; ct. × 1 fl. × 60 sau 240 ml (P-RF)

ZELDOX® 20 mg/ml PFIZER; Liof. pt. sol. inj. + solvent 20 mg/ml; ct. × 1 fl. + 1 f. × 1,2 ml solv. (S/P-RF)

Ind: Tratamentul schizofreniei.

Dz: Oral: Doza de atac: 40 mg de 2 ori pe zi, în timpul meselor. Doza max. 80 mg de 2 ori pe zi. Doza maximă se poate atinge la nevoie în a 3-a zi de tratament. De regulă doza de întreținere este de 20 mg de 2 ori pe zi. La vârstnici peste 65 ani și în IH se reduc dozele. În IR nu este necesară reducerea dozelor. i.m.: 10-20 mg, maxim. 40 mg/zi. Dozele de 10 mg pot fi adm. la 2 ore. Se recomandă pentru trat. de întreținere înlocuirea căii i.m. cu calea orală. Vârstnici peste 65 ani: nu se recomandă calea i.m. Atenție în cazul IR și IH la adm. i.m.

Cind: Hipersensibilitate, sd. congenital de interval QT, IMA recent, IC decompensată, aritmii tratate cu antiaritmice din clasa IA și III. Asocierea cu medic. care prelungesc intervalul QT. Sarcină. Alăptare. *oferi și activități de precizie. Alcool.

Al: Ziprasidona produce, în funcție de doză, o prelungire ușoară sau moderată a intervalului QT. Prudență la pacienții cu bradicardie semnificativă. Prudență în caz de hipokaliemie, hipomagneziemie (crește riscul aritmiilor maligne). Prudență la cei cu convulsii în antecedente. Prudență în IH.

RA: După adm. orală: somnolență, astenie, cefalee, constipație, uscăciunea gurii, dispepsie, hipersalivație, greață, vărsături, agitație, acatizie, amețeli, distonie, sd. extrapiramidal, hipertonie, tremor, tulb. de vedere, dischinezie tardivă (se recomandă reducerea dozei sau întreruperea trat.); după adm. i.m.: durere la locul injectiei, astenie, cefalee, HTA, hTA ortostatică, diaree, greață, somnolență, amețeli, acatizie, tahicardie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

Cod ATC: N05CF02

TOPOTECAMUM
TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANDOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENXYPHENIDYLUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM
ZANAMIVIRUM
ZIDOVUDINUM
ZIPRASIDONUM
ZOLPIDEMUM

HYPNOGEN® 10 mg ZENTIVA AS; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 blist. × 7, 15 sau 20 cpr. (P-RF)
SANVAL® 10 mg LEK PHARMACEUTICALS; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
STILNOX® 10 mg SANOFI-SYNTHELABO; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ZOLPIDEM 10 mg LABORMED PHARMA SA; Cpr. film. 10 mg; ct. × 1 sau 100 blist. × 10 cpr. (S/P-RF)
ZOLPIDEM AL 5 mg; ZOLPIDEM AL 10 mg ALIUD PHARMA; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 1 sau 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)
ZOLPIDEM STADA 5 mg; ZOLPIDEM STADA 10 mg STADA ARZNEIMITTEL; Cpr. film. 5 mg, 10 mg; ct. × 1, 2 sau 3 blist. × 10 cpr. (P-RF)

Ind: Trat. de scurtă durată a insomniei, în situații în care insomnia este invalidantă sau determină un disconfort important pentru pacient.

Dz: *Adulți* 10 mg imediat înainte de culcare sau în pat. *Vârstnicii* 5 mg.

Cind: Hipersensibilitate la zolpidem, apnee obstructivă de somn, miastenia gravis, IH severă, insuficiență respiratorie acută și/sau severă, copii.

Al: Trat. nu trebuie să depășească 4 săpt.; trebuie identificată cauza insomniei; prudență la vârstnici, insuficiență respiratorie, tulburări psihotice, IH, risc de amnezie, reacții psihice și "paradoxe", toleranță, dependență, trat. nu se întrerupe brusc; interacțiuni medicamentoase cu alcool, deprimante ale SNC, inhibitori enzimatici, inductori enzimatici; sarcină și alăptare; șoferi și activități de precizie.

RA: Somnolență diurnă, reducerea atenției, stare de confuzie, oboseală, cefalee, amețală, slăbiciune musculară, tulburări de vorbire, diplopie, tulburări gastro- intestinale, modificări de libido, reacții cutanate, amnezie anterogradă, neliniște, agravarea insomniei, agitație, iritabilitate, agresivitate, delir, furie, coșmaruri, halucinații, comportament neadecvat, somnambulism, depresie preexistentă.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TOXINUM BOTULINICUM TYPUM A
TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENYFENIDILUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM
ZANAMIVIRUM
ZIDOVUDINUM
ZIPRASIDONUM
ZOLPIDEMUM
ZOPICLONUM

Cod ATC: N05CF01**ALS-ZOPICLON** APOTEX INC.; Cpr. film. 7,5 mg; ct. × 2 blist. × 10 cpr. (P-RF)**IMOVANE** LAB. AVENTIS; Cpr. film. 7,5 mg; ct. × 1 blist. × 20 cpr. (P-RF)**ZOPIMERCK 7,5 mg** GENERICS Ltd.; Cpr. film. 7,5 mg; ct. × 2 sau 6 blist. × 5 cpr., ct. × 10 blist. × 10 cpr. (P-RF)**Ind:** Insomnii de diferite etiologii.**Dz:** *Adulți:* 7,5 mg seara, la culcare. *Vârstnici:* se va iniția trat. cu 3,75 mg seara, la culcare. *IH:* 3,75 mg seara la culcare.**Cind:** Hipersensibilitate la zopiclonă; insuficiență respiratorie decompensată; copii sub 15 ani; sarcină și alăptare.**Al:** Durata trat. max. 4 săptăm.; risc de dependență; prudență în IH severă, miastenii, insuficiență respiratorie; interacțiuni medicamentoase cu miorelaxante nedepolarizante și alte deprimante ale SNC (mai ales neuroleptice); șoferi și activități de precizie.**RA:** Somnolență reziduală diurnă, gust amar, uscăciunea gurii, hipotonie musculară, amnezie anterogradă, senzație pseudo-ebrioasă, iritabilitate, agresivitate, sindrom confuziv oniric, cefalee, astenie, sindrom de sevraj.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENIDILUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM
ZANAMIVIRUM
ZIDOVUDINUM
ZIPRASIDONUM
ZOLPIDEMUM
ZOPICLONUM
ZUCLOPENTHIXOLUM

Cod ATC: N05AF05**CLOPIXOL® 10 mg; CLOPIXOL® 25 mg** H. LUNDBECK; Cpr. film. 10 mg, 25 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-RF)**CLOPIXOL 20 mg/ml** H. LUNDBECK; Sol. orală zuclopentixol decanoat 2%; ct. × 1 fl. × 20 ml (P-RF)**CLOPIXOL® ACUPHASE** H. LUNDBECK; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)**CLOPIXOL® DEPOT** H. LUNDBECK; Sol. inj. zuclopentixol decanoat 200 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (P-RF)**Ind:** Schizofrenie, îndeosebi forme cu agitație și agresivitate, delir cronic, psihoze halucinatorii.**Dz:** Inj. i.m. profund, 200-400 mg la 2-4 săptăm. Doza medie zilnică 50-100 mg.**Cind:** Intoxicație acută cu alcool, barbiturice, opioide; bolnavi psihotici care nu tolerează neuroleptice orale, psihoze cu apatie, psihoze cu parkinsonism, arterioscleroză avansată, stări confuzionale senile, boli renale, hepatice și cardiovasculare grave, glaucom.**Al:** Prudență la copii; sarcină și alăptare.**RA:** Reacții extrapiramidale, somnolență, reacții iritative locale, galactoree, amenoree, ginecomastie, diskinezii tardive, hTA ortostatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENIDILUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM
ZANAMIVIRUM
ZIDOVUDINUM
ZIPRASIDONUM
ZOLPIDEMUM
ZOPICLONUM
ZUCLOPENTHIXOLUM

Cod ATC: N05AF05**CLOPIXOL® 10 mg; CLOPIXOL® 25 mg** H. LUNDBECK; Cpr. film. 10 mg, 25 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-RF)**CLOPIXOL 20 mg/ml** H. LUNDBECK; Sol. orală zuclopentixol decanoat 2%; ct. × 1 fl. × 20 ml (P-RF)**CLOPIXOL® ACUPHASE** H. LUNDBECK; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)**CLOPIXOL® DEPOT** H. LUNDBECK; Sol. inj. zuclopentixol decanoat 200 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (P-RF)**Ind:** Schizofrenie, îndeosebi forme cu agitație și agresivitate, delir cronic, psihoze halucinatorii.**Dz:** Inj. i.m. profund, 200-400 mg la 2-4 săptăm. Doza medie zilnică 50-100 mg.**Cind:** Intoxicație acută cu alcool, barbiturice, opioide; bolnavi psihotici care nu tolerează neuroleptice orale, psihoze cu apatie, psihoze cu parkinsonism, arterioscleroză avansată, stări confuzionale senile, boli renale, hepatice și cardiovasculare grave, glaucom.**Al:** Prudență la copii; sarcină și alăptare.**RA:** Reacții extrapiramidale, somnolență, reacții iritative locale, galactoree, amenoree, ginecomastie, diskinezii tardive, hTA ortostatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire

DCI

DESCRIERE

INFO

TRAMADOLUM
TRAMAZOLINUM
TRANOLAPRILUM
TRAVOPROSTUM
TRAZODONUM
TRETINOINUM
TRIAMCINOLONUM
TRIFLUSALUM
TRIHENIDILUM
TRIMEBUTINUM
TRIMETAZIDINUM
TRIPHOSPHADENINUM
TRIPTORELINUM
TROMETAMOLUM (THAM)
TROPICAMIDUM
TROSPIMUM
TROXERUTINUM
VACCINURI
VALACYCLOVIRUM
VALGANCICLOVIRUM
VALSARTANUM
VANCOMYCINUM (HYDROCHLORIDUM)
VARDENAFILUM
VECURONIUM
VENLAFAXINUM
VERAPAMILUM
VERTEPORFINUM
VINBLASTINUM
VINCAMINUM
VINCRISTINUM
VINORELBINUM
VINPOCETINUM
VORICONAZOLUM
XANTINOLI NICOTINAS
XYLOMETAZOLINUM
YTRIUM HYDROCHLORIDE
ZALCITABINUM
ZANAMIVIRUM
ZIDOVUDINUM
ZIPRASIDONUM
ZOLPIDEMUM
ZOPICLONUM
ZUCLOPENTHIXOLUM

Cod ATC: N05AF05**CLOPIXOL® 10 mg; CLOPIXOL® 25 mg** H. LUNDBECK; Cpr. film. 10 mg, 25 mg; ct. × 1 fl. × 50 cpr. (P-RF)**CLOPIXOL 20 mg/ml** H. LUNDBECK; Sol. orală zuclopentixol decanoat 2%; ct. × 1 fl. × 20 ml (P-RF)**CLOPIXOL® ACUPHASE** H. LUNDBECK; Sol. inj. 50 mg/ml; ct. × 5 f. × 1 ml (P-RF)**CLOPIXOL® DEPOT** H. LUNDBECK; Sol. inj. zuclopentixol decanoat 200 mg/ml; ct. × 10 f. × 1 ml (P-RF)**Ind:** Schizofrenie, îndeosebi forme cu agitație și agresivitate, delir cronic, psihoze halucinatorii.**Dz:** Inj. i.m. profund, 200-400 mg la 2-4 săptăm. Doza medie zilnică 50-100 mg.**Cind:** Intoxicație acută cu alcool, barbiturice, opioide; bolnavi psihotici care nu tolerează neuroleptice orale, psihoze cu apatie, psihoze cu parkinsonism, arterioscleroză avansată, stări confuzionale senile, boli renale, hepatice și cardiovasculare grave, glaucom.**Al:** Prudență la copii; sarcină și alăptare.**RA:** Reacții extrapiramidale, somnolență, reacții iritative locale, galactoree, amenoree, ginecomastie, diskinezii tardive, hTA ortostatică.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toate

Cauta DCI

Cauta descriere

Iesire